柴胡剤の薬理学的研究 (第4報)

糖質ステロイド剤の抗炎症作用に対するサイコサポニンの影響

阿部 博子, 阪口真智子, 有地 滋

近畿大学東洋医学研究所*

(昭和57年5月10日〔特〕)

要約: サイコサポニンの糖質コルチコイドの抗肉芽作用に対する影響を検討した。ラットに綿球を植え込み, 4日間サイコサポニン d 0.1 mg/kg/day 筋肉内投与あるいは dexamethasone 0.1 mg/kg/day 筋肉内投与すると, サイコサポニン d 投与群での肉芽重量 (乾燥重量) は対照群の肉芽重量より 10.42% の減少を示し, dexamethasone 投与群では 11.46% の減少であった。これらの肉芽形成の抑制力は共に対照群のそれに比べて有意の抗肉芽作用ではないが, サイコサポニン d と dexamethasone 併用群では肉芽重量は 37.50% の減少を示し, 明らかに有意の抗肉芽作用を示した。この抗肉芽作用の力価はサイコサポニンあるいは dexamethasone をそれぞれ単独に投与した場合の抗肉芽作用を加算した力価より大きく, dexamethasone とサイコサポニン d の併用によって抗肉芽作用が増強されたものと考えられる。dexamethasone のみ投与したラットの体重増加率は対照群に比べて有意に減少し, 胸腺, 副腎の重量も共に有意の減少を示した。しかしサイコサポニン投与ラットでは, 胸腺重量の減少は見られたが, 副腎重量では有意の減少は認められなかった。dexamethasone とサイコサポニン d の併用によって, 体重増加率は dexamethasone 単独投与群よりさらに低下を示し, 副腎の重量では dexamethasone 単独投与群より著明な減少を認めた。ラットに dexamethasone を投与すると, 血中コレステロールおよびトリグリセライド値は共に増加する。サイコサポニン d の併用によって, トリグリセライド値はやや減少の傾向を示したが, コレステロール値はむしろより増加の傾向を示した。

緒 言

糖質コルチコイド (以後ステロイドと略) と漢方処方 “小柴胡湯合五苓散 (柴苓湯)” を併用することによって, ステロイドの副作用軽減あるいはステロイドの減量, 離脱が容易になることを臨床的に多く経験し^{1~3)}, さらに動物実験でもステロイドの抗炎症作用が柴苓湯併用によって増強されること, 従って, 両者の併用によりステロイドの減量が可能であることを確認している⁴⁾。

柴苓湯の処方中には, 甘草, 人參, 柴胡など極めて多くの興味深い生薬が含まれており, ステロイドの抗炎症作用に及ぼす柴苓湯の影響についての薬理的検討には, これらの各生薬あるいはその生薬の有効成分についての詳細な検討が必要である。本研究では, 柴苓湯の主要生薬である柴胡の有効成分・サイコサポニンとステロイドの併用に関する基礎的検討を行なった。

柴胡の有効成分として現在までに単離精製され, 構造式の決定されたサイコサポニンには a, b₁, b₂, c, d (Fig. 1) などがあり^{5~7)}, その薬理学的作用として, 実験的肝障害抑制作用^{8~11)}, 抗炎症作用¹²⁾ などが報告されている。またそれらの溶血活性¹³⁾, 溶血保護作用¹⁴⁾, 膜流動性¹⁵⁾, 表面荷電¹⁶⁾ に対する作用など生体膜諸性質への影響が詳細に検討されている。これらの薬理学的作用の力価はサイコサポニン d で最も強く, 次いで a, b₁, b₂, c の順であり, またサイコサポニンの抗炎症作用は特に肉芽形成期に最も著明な作用を示すことから, 本研究ではサイコサポニン d を用い, ステロイドとの併用による作用力の増減の判定を抗肉芽作用について検討した。

* 589 大阪府南河内郡狭山町西山380

実験材料および方法

1. 実験動物

ウイスター系雄性ラット (170±5 g) を市販固型飼料で飼育し, 各実験群当り 11 匹を用いた。

2. 糖質コルチコイドおよびサイコサポニン d

糖質コルチコイドとしては dexamethasone 製剤として市販されている デカドロン注射液 (萬有製薬株式会社製) を用いた。サイコサポニン d は生薬・柴胡 (Bupleuri Radix) から, Kubota and Tonami⁶⁾ および Ishii ら¹⁷⁾ の方法で抽出精製された (塩野義製薬株式会社より供与)。サイコサポニン d の構造式は Fig. 1 に示されている。

Fig. 1 Structure of saikosaponins extracted from Bupleuri Radix.

3. 糖質コルチコイドおよびサイコサポニン d の投与量と投与方法

軽エーテル麻酔下でラット背部皮下に 50±3 mg の滅菌綿球 2 個を植え込み, ラットを 1) control; 生理食塩水を筋注, 2) saikosaponin d; サイコサポニン d 0.1 mg/kg 筋注, 3) dexamethasone; dexamethasone 0.1 mg/kg 筋注, 4) dexamethasone+saikosaponin d; dexamethasone 0.1 mg/kg, サイコサポニン d 0.1 mg/kg 同時筋注の 4 群に分け, 綿球植え込み当日から 4 日間投与した。投与方法は薬物による局所刺激性の有無を確認するため, またサイコサポニン d の大量入手が困難なことなどから, 筋肉注射とした。投与量および日数は, 予備実験によって, dexamethasone あるいはサイコサポニン d の単独投与で 0.01<P<0.05 (*t* 検定) の抗肉芽作用を示す 0.1 mg/kg, 4 日間の投与に設定した。

4. 綿球重量、各種臓器の重量測定

綿球植え込みおよび薬物投与開始から5日目にラットを屠殺し、綿球を取り出し、湿重量および乾燥重量を測定し、挿入時綿球重量をさし引いて肉芽重量を算出した。各臓器重量は周囲の脂肪組織を出来る限り除去して秤量した。

5. 血清脂質類の測定

綿球挿入および薬物投与開始から5日目にラットから心臓採血にて採取した血液の血清を分離し、総コレステロール測定試薬およびトリグリセライド測定試薬（和光純薬工業株式会社製）を用いてそれぞれの測定を行った。

実験結果

1. 体重および各種臓器重量の変化

綿球挿入ラットにサイコサポニンdのみ投与した群では、対照群に比べて体重増加率がやや減少し、胸腺の重量も減少を示したが、体重比重量では有意の差は認められなかった。また副腎重量はやや増加傾向を示しているが、有意の差は認められなかった。dexamethasone 投与群では、体重が減少し、脾臓、胸腺、副腎重量はいずれも対照群に比べて有意に減少を示した。dexamethasone とサイコサポニンdを併用した群では、胸腺、脾臓重量の減少率はdexamethasone 単独投与群との間に有意の差は認められないが、体重はdexamethasone 単独投与群よりさらに減少し、肝の体重比重量は増加傾向を示した。また副腎重量はdexamethasone にサイコサポニンdを併用することによってより著しい減少を示したが、体重減少を考慮した体重比重量では、dexamethasone による重量減少がやや抑制される傾向を示した。

2. 血清コレステロール、トリグリセライド値の変化

dexamethasone の投与によって、血清トリグリセライド値は 220.7 ± 19.4 mg/dl となり、対照群の 119.1 ± 10.8 mg/dl に比べて、有意 ($P < 0.001$) に増加する。血清コレステロール値は対照群で 48.1 ± 3.3 mg/dl、dexamethasone 投与群では 53.4 ± 4.5 mg/dl でやや増加傾向は見られるが、有意の差は認められない。サイコサポニンd単独投与群では血清トリグリセライド、コレステロール値はおおの 128.4 ± 17.1 , 44.7 ± 2.6 mg/dl で、対照群との間に有意の差は認められなかった。dexamethasone とサイコサポニンdを併用した群では血清トリグリセライド値は 205.2 ± 16.4 mg/dl で対照群より有意 ($P < 0.001$) に高いが、dexamethasone 単独投与群よりやや低い傾向を示している。しかし有意差は認められなかった。血清コレステロール値は 65.7 ± 4.0 mg/dl で、対照群との間に有意差 ($P < 0.005$) が認められ、dexamethasone 単独投与群より増加する傾向 ($P < 0.1$) を示した。

3. 抗肉芽作用に対する効果

正常ラット背部に綿球を植え込むと、5日目にはその周囲に乾燥重量で 96 ± 8 mg (湿重量 680 ± 19 mg) の肉芽形成が見られる。サイコサポニンd単独投与群では、肉芽の乾燥重量は 86 ± 5 mg (湿重量 618 ± 15 mg)、dexamethasone 単独投与群では乾燥重量 85 ± 7 mg (湿重量 609 ± 26 mg) で、対照群との間にいずれも有意の抗肉芽作用は認められなかった。dexamethasone とサイコサポニンdとを併用すると、肉芽の乾燥重量は 60 ± 4 mg (湿重量 508 ± 15 mg) で、対照群に比べて有意 ($P < 0.001$) に減少し、dexamethasone 単独投与群との間にも有意の差 ($P < 0.005$) が認められた。

考 察

ラットにサイコサポニンdのみあるいはdexamethasoneのみ投与すると、いずれの群でも有意 ($P < 0.01$) の抗肉芽作用は認められないが、肉芽重量の平均値から肉芽形成の減少率（対照群に対する）を算出すると、サイコサポニンのみ投与の場合、乾燥重量では10.42%、dexamethasoneの場合、11.46%、両者併用した場合、37.50%であった。この結果はサイコサポニンdとdexamethasoneを併用した場合に得られる抗肉芽作用がサイコサポニンdあるいはdexamethasoneを単独で投与した場合の各抗肉芽作用力の加算値より著しく高く、併

Table 1 Effects of saikosaponin d and dexamethasone on body, liver, thymus, spleen, adrenal, and kidney weights

Treatment	Initial body weight g	Final body weight g	Increase of body weight % initial b.w.	Liver g (% b.w.)	Thymus g (% b.w.)	Spleen g (% b.w.)	Adrenal mg (% b.w.)	Kidney g (% b.w.)
I Control	166.0±1.5	174.2±2.3	104.6±1.2	7.47±0.21 (4.28±0.08)	0.264±0.011 (0.152±0.007)	0.483±0.012 (0.273±0.009)	15.15±2.90 (0.0087±0.0002)	0.723±0.013 (0.415±0.006)
II Saikosaponin d	169.4±3.0	171.9±3.2	101.5±1.2	7.26±0.29 (4.22±0.12)	0.240±0.001 ⁶ (0.140±0.004)	0.421±0.042 (0.269±0.013)	15.56±3.04 (0.0091±0.0002)	0.727±0.011 (0.423±0.006)
III Dexamethasone	171.5±2.5	164.8±1.7 ²	96.1±1.0 ¹	7.45±0.15 (4.53±0.08)	0.087±0.006 ¹ (0.0531±0.004)	0.344±0.011 ¹ (0.211±0.007)	13.29±5.96 ² (0.0077±0.0002) ²	0.696±0.016 (0.422±0.008)
IV Saikosaponin d + Dexamethasone	172.1±2.3	15..6±2.2 ¹	92.2±1.3 ¹	7.42±0.20 (4.63±0.09)	0.098±0.007 ¹ (0.061±0.004)	0.349±0.002 ¹ (0.218±0.009)	12.72±3.70 ¹ (0.0079±0.0003)	0.732±0.016 (0.348±0.011) ²

Saikosaponin d and dexamethasone were administered for 4 days immediately after the insertion of cotton pellets.
Values are means±S.E. Statistically significant differences between controls treated groups; ¹P<0.001, ²P<0.01.

Fig. 2 Effects of saikosaponin d and dexamethasone on serum cholesterol and triglyceride. Saikosaponin d(s.s.d) (0.1 mg/kg/day) and dexamethasone (Dexa.) (0.1 mg/kg/day) were injected i.m. for 4 days. Serum cholesterol and triglyceride were remarkably increased by administration of dexamethasone. The increase of serum triglyceride was slightly inhibited, but the cholesterol was increased by combined administration of saikosaponin d.

用によって得られる抗肉芽作用が明らかに増強されることを示している。

これらの各群の体重増加率および臓器重量を比較すると、サイコサポニン d 単独投与群では、対照群に比べて体重増加率がやや低下し、副腎重量は増加傾向を示す。また dexamethasone のみ投与したラットでは体重増加率、脾臓、胸腺、副腎重量が対照群に比して有意に低下し、サイコサポニン d を併用すると、体重増加率はさらに低下する。副腎重量でも dexamethasone 単独投与群より著明な減少を示したが、体重比重量では有意の差は得られなかった。胸腺重量は dexamethasone 単独投与で著しく減少し、サイコサポニンの併用で有意差は認められないが、やや減少の抑制傾向が観察された。このような各臓器重量の変化がその機能とどのような関連性をもつかは不明であるが、サイコサポニン d の併用による体重増加率の低下はサイコサポニンの毒性による生体反応の低下を示唆していることも考えられ、サイコサポニン d とステロイドとの併用による抗炎症力の増強のメカニズムを考える上で重要な所見であると思われる。また肝臓重量において各群の間で有意の差は認められないが、サイコサポニンが肝臓の各種酵素活性に著明な影響を及ぼす⁹⁻¹¹⁾ことを考慮すると、サイコサポニン d によるステロイドの抗炎症作用増強の作用に肝臓でのステロイド代謝、特に 5α , β -reductase の活性などの変化が関与している可能性が考えられるであろう¹⁸⁾。また日合ら^{19,20)}によれば、サイコサポニン投与後 30 分では血中 ACTH 値の上昇と共に corticosterone 値が上昇することを報告しており、サイコサポニンの副腎への作用もまたステロイドの抗炎症作用増強に大きな役割を果たしていると思われる。

一方、血清トリグリセライド値はサイコサポニンの併用で dexamethasone 単独投与群よりもやや減少する

Fig. 3 Antigranulomatous action of saikosaponin d and dexamethasone. Cotton pellets weighing about 50 mg were inserted bilaterally s.c. into the dorsal area, and then saikosaponin d (s.s.d) (0.1 mg/kg/day) and dexamethasone (Dexa.) (0.1 mg/kg/day) were administered i.m. for 4 days. The antigranulomatous action of dexamethasone was significantly increased by combined administration of saikosaponin d.

傾向を示すが、コレステロール値ではむしろ増加する傾向が認められた。山本ら²¹⁾はサイコサポニン a, c, d の混合物 (約 3 : 2 : 2 の比), 10 mg/kg/day の投与では高コレステロール食で飼育したラットの血清中コレステロール, トリグリセライド値が対照ラットに比べて低下すると報告している。本研究での血中脂質に対するサイコサポニンの作用は、コレステロール値について山本らの報告²¹⁾とは異なった結果が得られている。これは本実験でのサイコサポニンの用量が山本らの実験²¹⁾に比べて極めて低用量であることによると推測され、サイコサポニンの脂質代謝への作用の投与量による違いを示唆していると思われる。

本研究では柴苓湯中の柴胡, 特にサイコサポニンにステロイドの抗肉芽作用の増強作用のあることを確認し, このことからステロイド剤の減量時にサイコサポニンを併用すれば, ステロイド減量中にも減量以前の抗肉芽作用を維持し得ること, またその力価は単なる相加ではなくより増強されることを見出した。言うまでもなく, ステロイド剤は抗炎症作用のみならず, 免疫抑制作用など生体に対して様々な作用を持っており, ステロイド減量時には抗炎症作用以外の種々の作用についても詳細な検討が必要である。さらにサイコサポニンによるステロイド作用の増強のメカニズムの追求には, 肝臓でのステロイド代謝あるいは糖質代謝への影響などの検討が必要であり, 現在これらの点についてさらに研究をすすめている。

文 献

- 1) 有地 滋, 阿部 博子: 薬物療法 **12**, 105 (1979)
- 2) ARICHI, S., ABE, H. AND TANI, T.: *Am. J. Chinese Med.* **7**, 351 (1979)
- 3) 阿部 博子, 有地 滋: 臨床と研究 **58**, 2672 (1981)
- 4) 阿部 博子, 小西裕紀子, 有地 滋: 日薬理誌 **78**, 465 (1981)
- 5) KUBOTA, T., TONAMI, F. AND HINOH, H.: *Tetrahedron Lett.* **701** (1966)
- 6) KUBOTA, T. AND TONAMI, F.: *Tetrahedron* **23**, 3333 (1967)
- 7) KUBOTA, T. AND HINOH, H.: *Tetrahedron* **24**, 675 (1968)
- 8) 有地 滋, 小西 啓悦, 阿部 博子: 肝臓 **19**, 430 (1978)
- 9) 阿部 博子, 小西 啓悦, 有地 滋, 小田島肅夫: 肝臓 **19**, 1053 (1978)
- 10) 阿部 博子, 長尾 孝治, 有地 滋: 肝臓 **19**, 1058 (1978)
- 11) ABE, H., SAKAGUCHI, M., YAMADA, M., ARICHI, S. AND ODASHIMA, S.: *Planta Medica* **40**, 366 (1980)
- 12) YAMAMOTO, M., KUMAGAI, M. AND YAMAMURA, Y.: *Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)* **25**, 1021 (1975)
- 13) ABE, H., SAKAGUCHI, M., KONISHI, H., TANI, T. AND ARICHI, S.: *Planta Medica* **34**, 160 (1978)
- 14) ABE, H., SAKAGUCHI, M., ANNO, M. AND ARICHI, S.: *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol.* **316**, 262 (1981)
- 15) ABE, H., ODASHIMA, S. AND ARICHI, S.: *Planta Medica* **34**, 287 (1978)
- 16) ABE, H., KONISHI, H., KOMIYA, H. AND ARICHI, S.: *Planta Medica* **42**, 356 (1981)
- 17) ISHII, H., NAKAMURA, M., SEO, S., TORI, K., TOZOY, T. AND YOSHIMURA, Y.: *Chem. Pharm. Bull.* **28**, 2367 (1980)
- 18) 阪口真智子, 西村 典子, 阿部 博子, 有地 滋: 第28回日本生薬学会発表 (1981)
- 19) HIAI, S., YOKOYAMA, H., NAGASAWA, T. AND OURA, H.: *Chem. Pharm. Bull.* **29**, 495 (1981)
- 20) YOKOYAMA, H., HIAI, S. AND OURA, H.: *Chem. Pharm. Bull.* **29**, 500 (1981)
- 21) YAMAMOTO, M., KUMAGAI, A. AND YAMAMURA, Y.: *Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)* **25**, 1240 (1975)

Abstract—Hiroko ABE, Machiko SAKAGUCHI and Shigeru ARICHI (The Research Institute of Oriental Medicine, Kinki University, Sayama, Minamikawachi-gun, Osaka 589, Japan). Pharmacological studies on a prescription containing Bupleuri Radix (IV). Effects of saikosaponin on the antiinflammatory action of glucocorticoid. *Folia pharmacol. japon.* **80**, 155~161 (1982)

Effects of saikosaponin d extracted from Bupleuri Radix on the antigranulomatous action of glucocorticoid were investigated in rats by the cotton pellet method. Saikosaponin d (0.1 mg/kg/day $\times$ 4 days) and dexamethasone (0.1 mg/kg/day $\times$ 4 days) reduced the weight of cotton-induced granuloma to 89.58% and 88.54% of the control, respectively. These antigranulomatous actions failed to show a significant difference from the control. However, the combined administration of saikosaponin d and dexamethasone produced a significant antigranulomatous action, namely, the decrease in the weight of granuloma to 62.5% of the control. While the combination of saikosaponin d and dexamethasone showed an inhibitory trend against the increase in serum triglyceride as induced by dexamethasone, the cholesterol level was elevated by the combination. The body weight was significantly reduced by the combined administration as compared with the group treated with dexamethasone alone, but no apparent difference existed in the adrenal and thymus weights between them.