蔵王火山*

Zao volcano

伴 雅雄¹

Masao Ban¹

2013年1月31日受付.

2013年4月18日受理.

* 日本地質学会第120年学術大会(2013年・仙台)

見学旅行(H班)案内書

¹ 山形大学理学部地球環境学科
Department of Earth and Environmental Sciences,
Faculty of Science, Yamagata University, 1-4-12,
Kojirakawa-machi, Yamagata 990-8560, Japan

Corresponding author: Masao Ban,
ban@sci.kj.yamagata-u.ac.jp

概要

蔵王山は、東北日本火山フロントに位置する成層火山である。本コースでは、テフラや火口近傍の噴出物を観察することにより、蔵王山の最新期の噴火履歴を理解する。また最新期中最大の約3万年前の噴火によってもたらされた火砕岩の様々な岩相も観察する。

Key Words

活火山, 噴火史, 火砕サージ, アグルチネート, テフラ, マグマ進化
active volcano, volcanic history, pyroclastic surge, agglutinate, tephra, evolution of magma

地形図

1 : 25,000 : 「蔵王山」

見学コース

8 : 00 仙台駅 → 9 : 40 蔵王山大黒天からの眺望 : 蔵王山の成り立ち → 大黒天付近のテフラ : 最新期のテフラ層序全容 → 10 : 40 蔵王山頂付近 : 最新期噴出物の全容および馬の背アグルチネート → 馬の背 : 1895年噴出物 → 大黒天西方 : 駒草平アグルチネート → 15 : 00 駒草平 : 駒草平アグルチネート → 17 : 00 仙台駅

見学地点

見学地点の緯度経度および観察項目を以下に、また位置を Fig. 1 に示す。

- Stop 1 (38° 07' 52" N, 140° 27' 51" E) 大黒天からの眺望 : 蔵王山の成り立ち
Stop 2 (38° 07' 51" N, 140° 27' 55" E) 大黒天付近のテフラ : 最新期活動のテフラ層序全容
Stop 3 (38° 07' 56" N, 140° 26' 47" E) 蔵王山頂付近 : 最新期噴出物の全容および馬の背アグルチネート中の火砕サージ堆積物 / アグルチネート
Stop 4 (38° 08' 17" N, 140° 26' 34" E) 馬の背 : 1895年噴出物
Stop 5 (38° 07' 50" N, 140° 27' 33" E) 大黒天西方 : 駒草平アグルチネート中の火砕サージ堆積物 / アグルチネート
Stop 6 (38° 08' 11" N, 140° 28' 05" E) 駒草平 : 駒草平アグルチネート中の強溶結したアグルチネート

Fig. 1. Locations of observation points. Distributions of the geologic units are from Sakayori (1992). White arrows show lava flow directions, and numbered red circles indicate observation points.

はじめに

蔵王火山は東北地方の火山の中でも噴火記録数が最多の火山である。このように活発な活動を行ってきた蔵王火山については、古くから数多くの地質学・岩石学的な研究がおこなわれてきた。筆者は10年ほど前に蔵王火山のハザードマップの作成に携わった際に、蔵王火山については数多くの研究によって地質や岩石の全体像が明らかにされてきているが、特に最新期の噴火史や噴火様式などについてさらに研究を進める必要があることを痛感した。その後、多くの共同研究者と共に、特に最新期の噴出物の地質学・岩石学的研究を進めてきた。本巡検コースでは、先行研究で明らかにされてきたことを踏まえた上で、特に最近の研究によって明らかになってきた蔵王山の最新期の活動について焦点を当てて巡検コースを組んだ。テフラや火口近傍の噴出物を観察することにより、蔵王火山の最新期の活動の特徴やその推移をご覧いただく。

蔵王火山の位置

東北の火山は、火山フロントを形成する那須火山帯と、より背弧側の鳥海火山帯の2列に配列していることが古くから認識されている (Kawano et al., 1961; Tatsumi et al., 1983 など)。蔵王火山は東北地方の火山フロントを代表する火山の一つである (Fig. 2)。東北地方はいわゆる環太平洋火山地帯の北西部に位置しており、ここでは白亜紀から現在まで火山活動は断続的に継続してきた。特に約60万年前以降、その活動が活発化し、50余りの火山が形成されている。そのうち、恐山・八甲田山・岩木山・十和田・八幡平・秋田焼山・岩手山・秋田駒ヶ岳・栗駒山・鳥海山・肘折・鳴子・蔵王

山・吾妻山・安達太良山・磐梯山・沼沢・燧ヶ岳の18が活火山である。

東北の約100万年前以降の火山の分布をより詳しくみると、火山フロント上においては、およそ30～50kmの中に数個～数十個の成層火山とカルデラ火山が存在してクラスターを構成している地域が70～100kmの間隔で認められる (Fig. 2)。クラスター間には火山が存在しない。背弧側では、フロントの火山クラスターの延長上のみ火山が分布している (梅田ほか, 1999; Tamura et al., 2002)。Tamura et al. (2002) は、地震波トモグラフィー、重力のブーゲ異常分布も検討し、上記の火山分布は、背弧側から各火山クラスターへと延びる指状のマントル高温域 (ホットフィンガー) の分布によって説明できるとした。蔵王火山は中央部のクラスターに含まれ、その背弧側には白鷹山や月山が存在している。上記マントル高温域は数多くの地震波トモグラフィー研究によって確認されている (Nakajima et al., 2001; Wang and Zhao, 2005; Huang et al., 2011 など)。また、最近の研究によれば、沈み込んだスラブが約100kmに達した付近から上方へほぼ垂直に延びる板状の地震波低速度領域も認められている (Huang et al., 2011 など)。

蔵王火山の範囲及び地形

蔵王山は、多数のピークを持つ成層火山の代表の一つで、北北東～南南西に連なる多数の山頂を有す。そのうちの中央部の五色岳-御釜を中心とする地蔵山、熊野岳、刈田岳などからなる山体をここでは蔵王火山と称す。その北方には約100万年前の瀧山、約30万年前の雁戸山 (高岡ほか, 1989) が、南方には約100～10万年前に形成された前山、烏帽子岳、杉ヶ峰、屏風岳、馬ノ神岳、不忘岳などからなる南蔵王

Fig. 2. Map showing the location of Zao volcano.

火山が隣接している。

蔵王火山は、溶岩流の表面地形と思われる、なだらかな地形からなる部分が多い。溶岩流の末端崖などの溶岩原地形が保存されている部分もある。一方で、崩壊地形も多数認められる。特に中央部に認められる東に開口した長径約2kmのものは馬の背カルデラと命名されている(酒寄, 1992)。その他に山体の縁辺部分に崩壊地形が認められる。その開口方向には、流山地形が認められる場合もある。また、中央部には、明瞭な火口地形を有する御釜がある。御釜は火砕丘である五色岳の西麓に形成されている(Fig. 3)。御釜の東方および馬の背付近には、北北西～南南東に延びる断層が認められている(大場・今田, 1989)。後者は、馬の背カルデラの形成に伴うものと思われる。

蔵王火山の研究史

蔵王火山の地質と岩石は、市村の一連の研究(Ichimura, 1951, 1960)によって、その地質の全容が明らかにされ、その後、千葉(1961)やKawano et al. (1961)によって構成岩石の性質が明らかにされた。さらに、中央部については、大場・今田(1989)、酒寄(1992)によって詳細な地質と岩石の研究が進められた。また、高岡ほか(1989)によって蔵王火山全体の年代学的研究が進められた。高岡ほか(1989)の

年代学的研究結果を火山層序に対応させて、大場・今田(1989)および酒寄(1992)は、蔵王火山の活動を約60～80万年前、約40～10万年前、約3万年前以降に分けている。なお、酒寄(1992)は、上記の第2番目を約40～30万年前と約30～10万年前の活動に2分している。約60～80万年前の活動はソレライト質マグマの活動であるのに対し、それ以降はカルクアルカリ質マグマの活動であった。同じカルクアルカリ質のものでも3万年前以降のものはそれ以前のものより K_2O 含有量が低いなどの特徴がある。約3万年前に始まる最新活動期については、井村(1994)や伴ほか(2005)による火山灰層序学的な研究や、Ban et al. (2008)による層序区分、Takebe and Ban (2011)による火山地質学的研究がある。また、最近の1894～1895年噴火についてはFujinawa et al. (2008)やMiura et al. (2012)の火山地質学的研究が、1939～1940の活動については安斎による一連の観測報告(安斎, 1940, 1941, 1961)がある。

岩石の成因に関して酒寄(1991)は、ソレライト系列内の組成変化は玄武岩質マグマからの結晶分化作用によって、カルクアルカリ系列は玄武岩質マグマとデイサイト質マグマの混合によって形成されたことを明らかにした。またデイサイト質マグマの温度は時間が進むにつれ高くなること、玄武岩質マグマは背弧側のマグマに匹敵する液相濃集元素量を持つことも明らかにしている。さらにTatsumi et al. (2008)により蔵王火山に産するソレライト、カルクアルカリ両系列について系統的に採取された試料について各種微量元素、同位体比、斑晶局所分析が進められ、カルクアルカリ玄武岩は上部マントル起源、ソレライト質玄武岩は下部地殻起源であるという、従来の東北日本の第四紀火山で得られた見解とは逆の斬新なマグマ成因論が提唱された。また最近期噴出物の地殻内マグマプロセスについてはBan et al. (2008)によって最新期噴出物の一部について詳しい検討が進められている。

蔵王火山の基盤

本火山群の基盤岩類は先第三紀の花崗岩や変成岩類、中新世の堆積岩類・火山岩類などからなる。先第三紀の花崗岩は本火山群の中央部に変成岩類を伴って露出している。中新世の地層は南部と中央部では、二井宿層、青根層(山田, 1972)、七ヶ宿層、横川層などが見られる。北部や北西部では、主に緑色凝灰岩からなる宝沢層(市村, 1957)、凝灰岩や凝灰角礫岩主体の成沢層(神保, 1965)が主である。基盤岩は、最高で標高1,490mの名号峰山頂にまで露出しており、このように底上げされた基盤を蔵王山噴出物は覆っている。噴出物の総体積は約25km³と見積もられている(第四紀火山カタログ委員会, 1999)。

蔵王火山の活動概要

ここでは、蔵王火山全体の地質を明らかにした研究のうち比較的新しい大場・今田(1989)と酒寄(1992)に基づき、活動を約80～60万年前、約40～10万年前、約3万年前以降に分けて概要を紹介する。酒寄(1992)による蔵王全体の地質図とBan et al. (2008)による山頂付近の地質図をFig. 4

Fig. 3. Photograph taken from Umanose showing the Goshikidake pyroclastic cone and the Okama Crater Lake.

Fig. 4. Geologic map of Zao volcano after Sakayori (1992) (a) and that of the summit area after Ban et al. (2008) (b).

に示す。

約 80 ～ 60 万年前に形成されたと考えられる山体は、中央部の丸山沢に見られる。玄武岩を主体とする火砕岩や岩脈によって構成されている（大場・今田, 1989; 酒寄, 1992 など）。岩相からこれらは水中に噴出したものと判断される（伴, 2010）。侵食が進んでおり、かつ、後の噴出物によって覆われているため、形成当時の山容の復元は困難であるが、当時、この付近に海水が侵入していたとする証拠はなく、おそらく蔵王火山に先行しカルデラ湖が存在していたと推測される（伴, 2010）。

約 40 ～ 30 万年前に形成されたと考えられる山体は、中央部の中丸山付近である。中丸山付近は、安山岩～デイサイトの溶岩流および火砕岩（大場・今田, 1989; 酒寄, 1992 など）によって構成されている。約 30 ～ 10 万年前に、中央部の熊野岳～刈田岳付近を構成する山体が形成された。これらは安山岩～デイサイトの溶岩流や火砕岩によって構成されている。噴出口は少なくとも 5 つ存在したと考えられる。この期間はブルカノ式噴火が卓越したものと考えられる。

最新期である約 3 万年前以降の活動は、御釜～五色岳付近に火口が限定される。噴出量は蔵王山の総噴出量の 1 割程度である。この活動は馬の背の東部に位置する、東方に開いた馬蹄形の馬の背カルデラの形成に始まる。井村（1994）の火山灰層序学的研究によれば、馬の背カルデラは約 3.1 万年前に形成されたと考えられている。このカルデラは山体崩壊によって形成されたとの見解もあるが、現在のところ対応する岩屑なだれ堆積物は発見されていない。一方で以下に記すようにカルデラ形成と同時期の噴出物が火口近傍に多数認められることから、このカルデラは火口が拡大して形成されたものである可能性がある。噴出物は主に玄武岩質安山岩からなる集塊岩や降下スコリア堆積物が主である（大場・今田, 1989; 酒寄, 1992 など）。酒寄（1992）は濁川沿いに点々と分布する溶岩流もこの時期に形成されたと考えている。その後、伴ほか（2005）や Ban et al.（2008）によって、この間に形成された火口近傍に分布する噴出物は、古い方から、駒草平アグルチネート、馬の背アグルチネートおよび五色岳火砕岩に分類された。さらに、Takebe and Ban（2011）によって駒草平アグルチネートは、古い方から、熊野岳アグルチネート、駒草平火砕岩および刈田岳火砕岩に分類されている。駒草平アグルチネートは馬の背カルデラ壁沿いに分布し、馬の背アグルチネートはカルデラ壁沿いからその内側かけて分布している。後者の下位層が前者を覆っているのが確認されている（Takebe and Ban, 2011）。五色岳火砕岩はカルデラ内に主に分布する。その下位の層が馬の背アグルチネートの一部を覆っているのが確認されている（Ban et al., 2008）。井村（1994）を踏襲し、発展させた伴ほか（2005）の火山灰層序学的研究によれば、駒草平アグルチネートは約 3 ～ 1.8 万年前、馬の背アグルチネート約 7.5 ～ 4.1 千年前、五色岳火砕岩は約 2 千年前～現在の活動によって形成されたと考えられている。なお、最新期には Z-To 1 から 14 のスコリア質火山灰層が認められており、Z-To 1 から 4 が駒草平アグルチネート活動期に、Z-To 5 から 8 が馬の背アグルチネート期に、

Z-To 9 から 14 が五色岳火砕岩活動期に形成されたと考えられている（伴ほか, 2005）。テフラ層の総合柱状図を Fig. 5 に示す。さらに Miura et al.（2008）の火山灰層序学的研究によって Z-To 1 から 4 の年代は、およそ 33-32, 30.7, 27.1, 12.9 cal kyr BP と推定されている。

文章記録としては 773 年の噴火記録を最古のものとして多数のものがあるが、その中の 1894 ～ 1895 年の活動では水蒸気爆発を繰り返し、クライマックスの 9 月 27 日には噴煙柱が約 350 m 上空にまで立ち上がった。この噴火の経緯については Fujinawa et al.（2008）に概要が、Miura et al.（2012）に詳細が述べられている。また 1939 ～ 1940 年には御釜の湖水が沸騰し、一時は硫黄で湖面が覆われた。また、この時期には五色岳の北西方向に存在する新噴気孔からごく小規模の水蒸気爆発が生じたと判断される記録がある（安斎, 1940, 1941, 1961）。

見学地点の説明

Stop 1 大黒天からの眺望（蔵王山の成り立ち）

〔地形図〕 1 : 25,000 : 「蔵王山」

〔位置〕 38°07'52" N, 140°27'51" E

〔解説〕 この地点から、蔵王火山の約 80 ～ 60 万年前、約 30 ～ 10 万年前、約 3 万年前に形成された山体あるいは噴出物を望み、蔵王火山の成り立ちを大まかに把握することができる。Fig. 6 に約 80 ～ 60 万年前に形成された噴出物からなるロバの耳岩の写真を、Fig. 7 に五色岳の写真を示す。Fig. 6 a の中央部に見える小規模の山体がロバの耳岩である。Fig. 6 b はその近景である。弱い成層構造を持つ火山角礫岩～凝灰角礫岩からなる。これらは急冷構造を持つ火山弾・その破片および細粒物質からなっており、水中にマグマが噴出しそのしぶきが急冷され、水底に降り積もったものと推測される（Fig. 6 b の中写真）。また、それを高角で貫く岩脈が認められる。Fig. 7 は五色岳火砕岩からなる五色岳火砕丘の東部を見たものである。多数の火砕岩層が累重している。その大部分は火砕サージ堆積物で、アグルチネートが僅かに認められる。また、ここでは五色岳火砕丘が下位の白色化した噴出物を不整合に覆っているのが認められる。白色化は変質によると思われる。この白色化した噴出物はこれまでの研究では約 30 ～ 10 万年前の噴出物に含められていたが、最近の筆者らの調査によって約 80 ～ 60 万年前の噴出部に対比される可能性が出てきた。この件についてはさらに調査が必要である。なお、概要で述べたように、五色岳は約 2 千年前から成長を開始したと考えられている（Ban et al., 2008）。

Stop 2 大黒天付近のテフラ（最新期活動のテフラ層序全容）

〔地形図〕 1 : 25,000 : 「蔵王山」

〔位置〕 38°07'51" N, 140°27'55" E

〔解説〕 ここでは最新期のテフラの全容が観察できる。最下部には約 3 万年前に形成された火砕サージ堆積物が見られる。この噴出物にはデューン構造やサグ構造などが頻繁に認められる。中部には馬の背アグルチネート活動期に噴出した複数枚のスコリア層がローム層に狭在して認められる。これ

Fig. 5. Idealized section showing the stratigraphy of tephra layers in the summit area (a) and on the east foot (b) of Zao volcano; after Ban et al. (2005), with ^{14}C ages given in years BP.

らは主に青灰色のスコリア質火山灰層からなる。その中で最も厚いものがZ-To 5である。Z-To 5は下位よりサージ堆積物、青灰色降下スコリア層、スコリアおよび火山砂層の互層、赤色降下スコリア層と重なり合っている。Fig. 8aにその写真をFig. 8bに構成物比およびその粒度分布を示す。なお、Z-To 5の下位には十和田中掬テフラ（To-Cu）が認められる。上部には五色岳火砕岩形成期のテフラが認められる。主に青灰色のスコリア質火山灰層と白色の水蒸気爆発によるテフラがロームに挟まれる。前者は馬の背アグルチネート活動期のものに比較して薄い枚数は多い。後者は前者に先行して見られる傾向がある。最上位の土壌の下位には1895年噴火による白色の火山灰層が認められる。

Stop 3 蔵王山頂付近（最新期噴出物の全容および馬の背アグルチネート中の火砕サージ堆積物 / アグルチネート）

〔地形図〕 1 : 25,000 : 「蔵王山」

〔位置〕 38° 07' 56" N, 140° 26' 47" E

〔解説〕 この地点からは、最新期活動によって火口近傍に堆積した噴出物の全容を望むことができる。この地点は、東方に開口する馬の背カルデラ壁の西南部に位置している。カルデラ南部の壁上には、約3～1.8万年前に形成された駒草平アグルチネートが断続的に分布しているのが認められ、西部ではそれに加えて、約7.5～4.1千年前に形成された馬の背アグルチネートがほぼ連続的にカルデラ壁上に分布しているのが観察される。カルデラ内部には、約2千年前から活動を開始した五色岳火砕丘が位置している。最新期噴出物のテフラ層序と五色岳火砕岩の層序を比較検討した結果から、火口が現在の御釜の位置に移ったのは約800年前と推定されている（三浦ほか, 2005）。それ以前の火口は現在の御釜のすぐ南東に見られる凹地形の場所であったと考えられる。五色岳の表層付近を覆っている灰色の噴出物は1895年の（マグマ）水蒸気噴火によってもたらされたものである。

この地点からカルデラ壁を下る方向には最新期活動期の噴出物が断続的に露出している（Fig. 9a）。下部は駒草平アグルチネート、上部は馬の背アグルチネートからなる。ここでは

Fig. 6. Photographs taken from Daikokuten (a) and from Umanose (b) showing the area around Robanomimi-iwa.

Fig. 7. Photograph taken from Daikokuten showing the Goshikidake pyroclastic cone.

Fig. 8. (a) A photograph of the observation point 2 showing the different facies of Z-To5 tephra. Z-To6 and 7 are also indicated. Z-To7 is scattered within the deposit. (b) Results of the component analysis and frequency histograms showing grain size distributions of black-coloured fall deposits from the Z-To5 tephra. After Ban et al. (2008).

Fig. 9. (a) Photograph showing the area around observation point 3. (b) Photograph showing one of the layers of the Umanose agglutinate at observation point 3.

Umanose caldera floor

Rim of the crater lake

(loc. 1)

Layer 6
(>3 m)0
1 mWestern part
(loc. 26)

Layer 5

Layer 4
Layer 3
Layer 2
Layer 1
1984 ash

Southern part

Eastern part
(Goshikidake)

Northern part

(loc. 6)

(loc. 19)

(loc. 4)

(loc. 7)

(loc. 14)

Layer 6

Layer 5

Legend

- Surface
- Gray andesite
- Altered lithic fragment
- Scoria
- Volcanic ash
- Accretionary lapilli
- Gray colored fine ash
- Loam
- Paleosol
- GSP

Outside of the Umanose caldera

loc. 30

loc. 36

loc. 38

Layer 6

1984 ash

1984 ash

0
10 cm

Fig. 10. Representative columnar sections for the 1895 products in Zao volcano after Miura et al. (2012). See Miura et al. (2012) for the locations of respective sections. The scales differ for sections obtained inside and outside of the Umanose caldera.

Fig. 11. Photograph taken at observation point 4 showing a large bomb within the pyroclastic deposit that formed during the 1895 eruption.

上部の馬の背アグルチネートの中の約5.3千年前（伴ほか、2005）に噴出したと考えられている層を観察する（Fig. 9b）。その層はスコリア質火山弾を主体とするアグルチネートであるが、基質の細粒物質がなす層構造が側方に連続的でなく、また層理面が波打ったような形状を示す場合が普通である。なお、この層には発泡度の弱いガラス状光沢を示す火山弾が特徴的に含まれる。

馬の背カルデラの西部カルデラ壁に露出する駒草平アグルチネートの下位には、約30～10万年前の噴出物が露出している。カルデラ壁の中位に位置し、側方方向に連続的に露出している溶岩が認められるが、これがカルクアルカリ玄武岩質溶岩である。Tatsumi et al. (2008) の岩石成因論の研究の際に重要な試料となったものである。

Stop 4 馬の背（1895年噴出物）

〔地形図〕 1：25,000：「蔵王山」

〔位置〕 38°08′17″ N, 140°26′34″ E

〔解説〕 1895年噴火噴出物は主に火口である御釜の周囲に厚く堆積している。その南西縁では7mに及んでいる（Miura et al., 2012）。Miura et al. (2012) によれば堆積物は大きく6層（layer 1～layer 6）に分類される（Fig. 10）。何れも熱水変質を受けた粘土質の火山灰を基質とするものである。含まれる岩片の種類と割合はlayerによって異なっている。Miura et al. (2012) は岩相解析、粒度分析、組成分析のデータと文

書記録の解析結果を組み合わせることで各layerの噴出時期や堆積機構を考察した。それによればlayer 1と2は2月に発生した水蒸気噴火による比較的規模の小さい降下物、その上位のlayer 3と4は8月の噴火によるもので、前者は水蒸気噴火による降下物、後者は特殊な密度流的なものと考えられている。また層が厚いlayer 5と6は、活動がクライマックスに至った9月27～28日の噴出物と考えられている。火口南西縁では爆発的な噴火によって火口の極近傍に堆積した特殊な降下火砕物と判断された。

この観察地点ではlayer 6相当層が観察できる。ここで見られる堆積物は、熱水変質を受けたと考えられる灰色の粘土質火山灰中に、多種多様な岩片が含まれる凝灰角礫岩である。岩片としては、未変質～強度に変質を受けた安山岩質岩片やスコリアが認められる。大きさは地層の内部に含まれるものは径20cm以下のものが多いが表層付近に分布するものはメートルサイズのものが目立つ。注意深く観察すると、小片に分解し元の形が失われつつあるが、小片同士を組み合わせると大型の紡錘状の火山弾であったと考えられるものも地表付近に散在している。これらは変質が進んでいない場合が多い。Fig. 11に示すものは長径が約3.5m、短径は約1mである。この付近に分布する同様の火山弾の長軸は必ずしも火口である御釜の方向を向いてはいない。先行研究では1895年噴火によってマグマが噴出した証拠は認められていなかったが、上記の大型の火山弾は噴火ときにマグマが固結したもの

Fig. 12. (a) Columnar sections of some representative outcrops of Komakusadaira agglutinate after Takebe and Ban (2011). (b) One of the representative agglutinate layers of Komakusadaira agglutinate at observation point 5.

Fig. 13. Photograph showing a highly welded agglutinate layer within the Komakusadaira agglutinate at observation point 6.

と判断される。従って、1895年噴火のクライマックスはマグマ水蒸気噴火であったと考えられる。

Stop 5 大黒天西方（駒草平アグルチネート中の火砕サージ堆積物 / アグルチネート）

〔地形図〕 1 : 25,000 : 「蔵王山」

〔位置〕 38° 07' 50" N, 140° 27' 33" E

〔解説〕 駒草平アグルチネートは最新期活動中最大の噴火によってもたらされたと考えられる。Takebe and Ban (2011) によって噴出物は、熊野岳火砕岩、駒草平火砕岩、刈田岳火砕岩に細分されている。何れも多数の火砕岩層からなる。Takebe and Ban (2011) による代表的地点の柱状図を Fig. 12a に示す。

この観察地点では、駒草平火砕岩中の火砕サージ堆積物およびアグルチネートを観察する。Fig. 12b に示すように、この露頭の下部には火砕サージ堆積物が認められる。多数の薄層から成る成層構造が顕著に認められる。斜交層理などの特徴的な構造が認められ、また側方で殲滅する場合が多い。スコリア質の火山弾もまれに認められる。上部は、下部を整合的に覆っており、長径1m程度の扁平した溶岩餅状の火山弾が幾重にも積み重なって構成されているアグルチネートからなる。火山砂からなる基質も認められ、それは部分的に薄い成層構造をなしている。この成層構造をなす部分は側方方向に連続性が悪く、また層理面はうねっているのが普通である。両層ともにマントルベッティングしており、また全体の層厚が側方方向で急激に変化する。これらの層をもたらしした噴火はマグマ水蒸気噴火であったと考えられるが、初期にはマグマの地表への放出量が少なかったために火砕サージ中の

火山弾の量が少なく、後に、弾道状にマグマのしぶきを多数吹き上げたためその含有量が多くなったと考えられる。

Stop 6 駒草平（駒草平アグルチネート）

〔地形図〕 1 : 25,000 : 「蔵王山」

〔位置〕 38° 08' 11" N, 140° 28' 05" E

〔解説〕 ここでは Stop 5 で見られたものと同様のアグルチネートを観察することができる。この地点では、強溶結部が認められる。Fig. 13 に露頭写真を示す。

謝 辞

蔵王火山の地質調査に当たり、山形県環境課、宮城県自然保護課および関連機関の担当者の皆様には許可申請の際に大変お世話になった。八木浩司、藤縄明彦、中川光弘、大場司、三浦光太郎、武部義宣の各氏をはじめとして、共同研究者の方々からは有意義なご助言を頂いた。査読者の林 信太郎氏と宮本 毅氏からのご指摘により原稿が大きく改善された。大場 司氏と本山 功氏には編集を担当していただき多くのご助言をいただいた。以上の方々に御礼を申し上げる。

引用文献

- 安斎 徹 (Anzai, T.), 1940, 昭和 14 年度蔵王火山火口湖研究要報. 財団法人齋藤報恩会事業年報 (*Annual Report of Incorporated Foundation of SaitoHo-onkai*), 16, 34-37.
- 安斎 徹 (Anzai, T.), 1941, 蔵王火口湖並に其の噴出物の研究. 財団法人齋藤報恩会事業年報 (*Annual Report of Incorporated Foundation of SaitoHo-onkai*), 17, 32-39.
- 安斎 徹 (Anzai, T.), 1961, 神秘の火口湖蔵王の御釜. 山形地質学研究

- 所 (Yamagata Geological Research Institute), 224p.
- 伴 雅雄 (Ban, M.), 2010, 藏王火山・山形県の火山. 山野井徹編, 山形県地学のガイド (*Geological Guide book in Yamagata Prefecture*), コロナ社 (Corona Publisher, Japan), 199–205.
- Ban, M., Sagawa, H., Miura, K., Hirotani, S., 2008, Evidence for short-lived stratified magma chamber: petrology of Z-To tephra layer (~5.8 ka) at Zao volcano, NE Japan. *In* Zellmer, G. and Annen, C., eds., *Dynamics of Crustal Magma Transfer, Storage, and Differentiation Integrating Geochemical and Geophysical Constraints*; Geol. Soc. London, Spec. Pub., **304**, 149–168.
- 伴 雅雄・佐川日和・三浦光太郎・田中勇三 (Ban, M., Sagawa, H., Miura, K. and Tanaka, Y.), 2005, 藏王山の火山防災マップ. 月刊地球 (*Chikyu Monthly*), **27**, 317–320.
- 第四紀火山カタログ委員会 (Committee for Catalog of Quaternary Volcanoes in Japan), 1999, 日本の第四紀火山カタログ (*Catalog of Quaternary Volcanoes in Japan*) CD-ROM. 日本火山学会 (The Volcanological Society of Japan).
- Fujinawa, A., Ban, M., Ohba, T., Kontani, K. and Miura, K., 2008, Characterization of low temperature pyroclastic surges that occurred in the northeastern Japan arc during the late 19th century. *Jour. Volcanol. Geotherm. Res.*, **178**, 113–130.
- Huang, Z., Zhao, D. and Wang, L., 2011, Seismic heterogeneity and anisotropy of the Honshu arc from the Japan Trench to the Japan Sea. *Geophys. Jour. Internat.*, **184**, 1428–1444.
- Ichimura, T., 1951, Geological investigation on the Zao volcanoes: I. Goshikidake, a central cone of the Zao proper. *Bull. Earthquake Res. Instit.*, **29**, 327–339.
- 市村 毅 (Ichimura, T.), 1957, 竜山火山の活動. 山形大紀要 (自然科学) (*Bull. Yamagata Univ. Nat. Sci.*), **4**, 283–297.
- Ichimura, T., 1960, Geological investigation on the Zao volcanoes: V. Kumano volcano. *Bull. Earthquake Res. Instit.*, **38**, 255–290.
- 井村隆介 (Imura, R.), 1994, 藏王火山五色岳の噴火史. 日本火山学会 1994 年秋季大会講演予稿集 (*Abstr. Fall Meet. Volcanol. Soc. Japan*), 92.
- 神保 恵 (Jinbo, I.), 1965, 山形県の地質 (*Geology of Yamagata Prefecture*). 山形県商工労働部鉱山課 (Mine Section, Commercial and Industrial Labor Division, Yamagata Prefecture Government), 68p.
- Kawano Y., Yagi, K. and Aoki, K., 1961, Petrography and petrochemistry of the volcanic rocks of Quaternary volcanoes of northeastern Japan. *Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser. III*, **7**, 1–46.
- Miura, K., Ban, M., Ohba, T. and Fujinawa, A., 2012, Sequence of the 1895 eruption of the Zao volcano, Tohoku Japan. *Jour. Volcanol. Geotherm. Res.*, **247–248**, 139–157.
- 三浦光太郎・伴 雅雄・佐藤 光・佐川日和 (Miura, K., Ban, M., Sato, H. and Sagawa, H.), 2005, 藏王山, 最近約 2,000 年間の噴出物について. 日本火山学会 2005 年秋季大会講演予稿集 (*Abstr. Fall Meet. Volcanol. Soc. Japan*), 113.
- Miura, K., Ban, M. and Yagi, K., 2008, The tephra layers distributed around the eastern foot of the Zao volcano: Ages and volumes of the Za-To 1 to 4 tephra. *Bull. Volcanol. Soc. Japan*, **53**, 151–157.
- Nakajima, J., Matsuzawa, T., Hasegawa, A. and Zhao, D., 2001, Three-dimensional structure of Vp, Vs and Vp/Vs beneath northeastern Japan arc: Implications for arc magmatism and fluids. *Jour. Geophys. Res.*, **106**, 21843–21857.
- 大場與志男・今田 正 (Oba, Y. and Konta, T.), 1989, 中央藏王火山の地質と岩石. 山形大紀要 (自然科学) (*Bull. Yamagata Univ. Nat. Sci.*), **12**, 199–210.
- 酒寄淳史 (Sakayori, A.), 1991, 東北日本, 藏王火山におけるマグマ系の変遷. 火山 (*Bull. Volcanol. Soc. Japan*), **36**, 79–92.
- 酒寄淳史 (Sakayori, A.), 1992, 藏王火山の地質と岩石. 岩鉱 (*Jour. Mineral. Petrol. Econ. Geol.*), **87**, 433–444.
- 高岡宜雄・今野幸一・大場與志男・今田 正 (Takaoka, N., Konno, K., Oba, Y. and Konta, T.), 1989, 藏王火山溶岩の K-Ar 年代測定. 地質雑 (*Jour. Geol. Soc. Japan*), **95**, 157–170.
- Takebe, Y. and Ban, M., 2011, Temporal change of geologic features in the pyroclastic surge dominated deposits of the Komakusadaira pyroclastics in Zao volcano, NE Japan. *Internat. Jour. Geol.*, **5**, 1–13.
- Tamura, Y., Tatsumi, Y., Zhao, D., Kido, Y. and Shukuno, H., 2002, Hot fingers in the mantle wedge: new insights into magma genesis in subduction zones. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **197**, 105–116.
- Tatsumi, Y., Sakuyama, M., Fukuyama, H. and Kushiro, I., 1983, Generation of arc basalt magmas and thermal structure of the mantle wedge in subduction zones. *Jour. Geophys. Res.*, **88**, 5815–5825.
- Tatsumi, Y., Takahashi, T., Hirahara, Y., Chang, Q., Miyazaki, T., Kimura, J.-I., Ban, M. and Sakayori A., 2008, New Insights into andesite genesis: The role of mantle-derived calc-alkalic and crust-derived tholeiitic melts in magma differentiation beneath Zao Volcano, NE Japan. *Jour. Petrol.*, **49**, 1971–2008.
- 千葉とき子 (Tiba, T.), 1961, 藏王火山の岩石学的研究. 岩鉱 (*Jour. Japan. Assoc. Mineral. Petrol. Econ. Geol.*), **46**, 74–81.
- 梅田浩司・林 信太郎・伴 雅雄・佐々木 実・大場 司・赤石和幸 (Umeda, K., Hayashi, S., Ban, M., Sasaki, M., Ohba, T. and Akaishi, K.), 1999, 東北日本, 火山フロント付近の 2.0Ma 以降の火山活動とテクトニクスの推移. 火山 (*Bull. Volcanol. Soc. Japan*), **44**, 233–249.
- Wang, Z. and Zhao, D., 2005, Seismic imaging of the entire arc of Tohoku and Hokkaido in Japan using P-wave, S-wave and sP depth-phase data. *Physics Earth Planet. Interiors*, **152**, 144–162.
- 山田栄三 (Yamada, E.), 1972, 宮城県周辺の地質について. 岩井淳一教授記念論文集 (*Professor Iwai Jun-Ichi's Retirement Commemorative Theses*), 367–375.