日高帯札内川上流の変成岩およびミグマタイト類について (第1報)

木 崎 甲 子 郎*

(1952 年 4 月日本地質学会にて講演, 1953 年 2 月 17 日受理)

1. はじめに	4. 化学成分とその考察
2. 地質環境のあらまし	5. 黒雲母について
3. 岩石記載	6. あとがき

1. は じ め に

1951 年末に、地団研専報 6 号として「日高帯の地質」が発表された。それに対していろいろの批判はあつたが、ともかくもそれはわれわれにとつて、日高帯に関する最初の総括的な知識として重要な意味を持つてきた。その後すでに 2 年、団体研究の進展とともに新しい知識が集積され、さらにうらづけられ、あるいは改められなければならないものも出来てくるわけである。この小文はこうした団体研究の一環として、わたくしの分担するミグマタイトに関する研究の一端である。ここでわたくしが述べようとするのは、日高帯のほぼ中央部で東側にあたり、十勝平野にそそぐ札内川上流におけるホルンフェルス・片麻岩およびミグマタイト**類など造山帯の中核部に見られる変成現象につき、記載的事実の概略とそれに対するわたくしの考えである。これに対して諸学兄の御批判をお願いしたい。

この稿を起すにあつて、終始御指導を賜つた鈴木醇教授および日高グループ諸氏にあつく御礼申しあげる。また野外作業をともにした酒匂純俊氏・北大山岳部諸兄、さらに分析に援助を頂いた化学教室千葉幹雄氏、分析室櫻田弘氏また熊野純男氏らの協力に対して深謝するものである。

2. 地質環境のあらまし

日高帯全般の傾向にもれず、この札内川上流の変成帯でも、ほぼ南北性の走向、東落しの傾斜を持つ帯状配列がいちぢるしい。この地域は火成岩の侵入岩体が少くて、ほとんどホルンフェルス・片麻岩・ミグマタイト類で占められている。東に不変成の日高層群に移行し、西では変成帯の西側を劃し南北に巾狭くつらなるソーシュル石斑岩に接している。北は幌尻岳深成岩体の南限が楔形に入りこんでいる。この地域の変成帯は大きくみて、東からホルンフェルス帯・縞状片麻岩帯・粗粒花崗岩質ミグマタイト帯・含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト帯および斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩帯とに分けられる。(第1図)

ホルンフェルス帯:—この地域の東部、7ノ沢より下流に広く、NNE-SSW の走向で幅 6 km にわたつて分布している。原岩は日高層群を構成する砂岩・粘板岩を主とするもので、東から片麻岩帯に近づくに従つて、変砂岩・変粘板岩とされるものから再結晶の程度の強いホルンフェルスとなり、黒雲母の点紋(鏡下では微細な黒雲母の集合体として認められる)が点々と見られるようになる。この程度に再結晶の進んだものでは、一般に点紋状の黒雲母は方向性を示すことが多く、片麻岩帯との境界付近では、ホルンフェルスがいちぢるしい片理を有して黒雲母片岩となつ

* 北海道大学理学部地質学鉱物学教室

** “ミグマタイトとは現象形に与えられたものではなく成因的な名付け方なのである”

(C. E. WEGMANN)

第 1 図 十勝国札内川上流地質概念図

A. ホルンフェルス B. 黒雲母片岩 C. 縞状片麻岩 D. 斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩 E. 粗粒花崗岩質ミグマタイト F. 含破砕片石英閃緑岩質ミグマタイト G. 斑礫岩類 1. 札内岳 2. エサオマントツタベツ岳 3. カムイエクウチカウシ山 4. 記念沢 5. 6ノ沢 6. 9ノ沢 7. 8ノ沢 8. 7ノ沢 9. コイカクシュ札内川 10. 札内川

ているところがある。(札内川本流6ノ沢合流附近・コイカクシュ札内川中流) またホルンフェルスのままで縞状片麻岩に移るところもあるが(この地域の南方ヤオロマップ川上流), 前者の場合は黒雲母片岩の片理に沿って石英・斜長石を主とする優白質縞が出来ることが、後者の場合はホルンフェルスの走向に斜交して優白質縞が出来ている。変砂岩・変粘岩は青灰色あるいは黒灰色の緻密な一見したところでは不変質岩とみまがう程の、層理のはつきりしない岩石であるが、鏡下では細粒の石英・斜長石粒の間を埋める膠結物質中から黒雲母の小片の晶出しているものである。片麻岩帯に近く再結晶の完全な赤茶色のホルンフェルスが見られるのは、このホルンフェルス帯の西側、巾約2kmの間である。これらのホルンフェルスは大部分黒雲母・斜長石・英石の組合せで変化に乏しいが、記念沢上流では堇青石ホルンフェルスが見られる。また砂岩中に、ほぼ定つた層準に限られて存在すると思われる、径10~50cmの石灰質団球は、その周囲のホルンフェル

ス化と共に変成し、斜長石・透輝石・黝簾石・石英の組合せとなつている。

縞状片麻岩帯:—ホルンフェルスあるいは黒雲母片岩との移過部にある縞状片麻岩は、白黒の縞が明瞭ではあるが、まだホルンフェルスの要素を多分に持つている。この帯の中核部では、各鉱物は粗粒になり、優白部も膨縮がいちぢるしく明瞭な縞を示さない。そして一般にプチグマティック褶曲 (ptygmatic folding) が目立っている。この縞状片麻岩帯の中で、部分的に粗粒な石英閃緑岩質部 (斜長石・石英・黒雲母) が処々にあり、また並行縞に無関係な優白質細脈が網目状に拡つて、片麻岩を径 15 cm 内外の塊に分割し、その塊のひとつひとつが廻転しているものもある。鉱物の組合せは主に石英・斜長石・黒雲母であるが、部分的には堇青石・正長石を持つている。堇青石は本流 9ノ沢合流附近その他縞状片麻岩中の処々に見られるが、多くはピナイト化している。正長石は、粗粒花崗岩質ミグマタイトとの境界附近 (記念沢・本流・7ノ沢) の片麻岩中いちぢるしく見出される。そこでは石英粒を包んで基質として他鉱物の間を埋めて発達し稀に 1mm 前後の斑状変晶を作っている。

石灰質団球は、長径 20cm 内外のひきのばされた青色緻密のレンズとして、周囲の片麻岩とはあきらかに区別出来る。この団球は、透輝石・石英・斜長石・緑色角閃石を主とし、透輝石はボーキリティックな発達を見せて、約 2mm 程の半自形変晶になつているものもある。

粗粒花崗岩質ミグマタイト:—縞状片麻岩帯のほぼ中央部に、粗粒無方向性の花崗岩質ミグマタイトが、片麻岩の片理に整合的に数十 m から数百 m の厚さで存在する。縞状片麻岩とはやや急激に移り変つている。つまり数米の間で、片麻岩中には花崗岩質部が生じ、ミグマタイト中には、片麻岩が周りのそれと並行して食い残し様に細長く続く。内部は大体均質であるが、しばしば円形・楕円形

第2図 粗粒花崗岩質ミグマタイト中の正長石の産状、斜長石を交代している有様 (S. 14) 札内川記念沢 Or: 正長石 Bi: 黒雲母 Mr: ミルメカイト Pl: 斜長石 径=1.7mm

第3図 含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト (9ノ沢中流) 捕獲岩様の破碎片は回転している

の黒雲母の集合体が認められる。

鉱物の組合せは、斜長石・石英・黒雲母が主であるが、緑色角閃石や正長石に富む部分もある。とくに記念沢で見られるものは、前述の縞状片麻岩の場合と同様に、基質として他鉱物の間隙を埋め、斜長石を交代して成長している。(第2図)

含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト：— この変成帯の中心部から西よりに、主に7ノ沢、8ノ沢および9ノ沢に中粒の石英閃緑岩質岩が見られる。斜長石・石英・黒雲母および角閃石を主とし、紡錘状のホルンフェルスや片麻岩の破碎片を多量に有しているのが特徴である。この破碎片はそれぞれ回転し、その周囲にはかなり強い鉱物の方向性が認められる。(第3図) この破碎片のあるものは、ただほんやりした長径 15 cm 内外の楕円形の黒雲母の集合体であることもある。

斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩：— この帯はこの変成帯の一番西側に位置し、更に西側は、南北に長く続くソーシュル石斑岩と接している。ほぼ NNW-SSE の走向と東落しの急傾斜で南に続く。日高側に流れる春別川上流で見られるこの片麻岩は、多量の斜長石斑状変晶をとともなう紫黒色の黒雲母片岩とも言えるような片麻岩であつて、主に斜長石・黒雲母・石英およびざくろ石からなっている。この帯の東部、国境稜線附近で見られる石英閃緑岩質ミグマタイトは後述するように、この片麻岩の組織を残している。

以上5つの帯についての概観を述べた。そのおのおのが、野外では漸移とみられるほどに密接に関連している。それにもかかわらず、この地域の南方ヤオロマツブ川上流では、ホルンフェルスの走向 (NE-SW) (砂岩と粘板岩の互層として見られる) と縞状片麻岩の優白質並行細脈の走向 (NW-SE) とは、その境界附近で殆ど 45 度も斜交していること、また含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト中に片麻岩が破碎片として含まれているという事実、粗粒花崗岩質ミグマタイトが南方猿留川地域では、当地域と異り含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト中に存在することなどのことから、ミグマタイトの形成が、ホルンフェルス→片麻岩→ミグマタイトという連続的な1系列のものとは考えられず、それぞれ各相の形成には、時間的なずれがあり、またそれぞれの時期の構造運動の性質にちがいがあつたと考えなければならないだろう。

3. 岩石記載

以上述べた各岩帯のそれぞれの代表的なものの性質を明らかにするために、以下化学分析を行った資料について岩質を記載する。

ホルンフェルス (S 14) (第4図)

産地： 札内川本流 6 ノ沢合流点より 100 m 下流。

産状岩質： 黒雲母の点紋を見得る方向性を持つ片状ホルンフェルス。

鏡下： 石英>黒雲母>斜長石>>緑色角閃石。

石英は 0.1 mm 以下の細粒のものが基質となり、0.1 mm 位のやや円形の粒が散在している。黒雲母は細い 0.1 mm 前後の葉片状で方向性をもち処々に 0.7~1 mm の集合体をなして点紋を作る。x: 淡褐緑色, y: 褐色, z: 褐色, 屈折率 γ : 1.635*。斜長石は石英と共に基質として 0.1 mm 前後の粒状を示す。An%=35±**

縞状片麻岩 (K 70) (第5図)

産地： 札内川本流 9, 10 ノ沢中間。

* 屈折率の測定はすべて浸液法による

** An% の測定は自由廻転台を用いて Zonalmethode による

第4図 ホルンフェルス (S 14)
Bi: 黒雲母 径≒1.7 mm

第5図 縞状片麻岩 (K 70)
Pl: 斜長石 Bi: 黒雲母 Q: 石英 径≒1.7 mm

産状岩質: 黒白部明瞭な縞を示す。

鏡下: 片麻状構造。

黒雲母>石英>斜長石>堇青石・正長石・磷灰石・磁鉄鉱

黒雲母は半自形, 1 mm 以下の葉片状で多色性が強い。x: 淡緑褐色, y: 赤褐色, z: 赤褐色。 $\gamma: 1.634$, $\rho: 1.629$ 。石英は新鮮で1部縫合組織を示す。一般に 0.5 mm 前後の丸味を帯びた形である。斜長石は他形ないし半自形, 1~0.3 mm An% は優黒縞部で 30~45, 優白部では 30±5; 堇青石。0.3 mm 位の粒状でビナイト化しているものが多い。正長石はすべて他形で他鉱物の間隙を埋め, またミルメカイト構造が見られる。

粗粒花崗岩質ミグマタイト (S.B 69) (第6図)

産地: 猿留川上流*

産状岩質: 粗粒優白質塊状岩。

鏡下: グラノブラスティック構造。

斜長石>石英>黒雲母>正長石・磷灰石・ジルコン

斜長石は半自形ないし他形, 最大 4 mm, 平均 2 mm 前後の大晶で, 1 方向に割目が発達し絹雲母で埋められている。An%=35±。石英は他形でやや汚れ波動消光を示す。黒雲母は 1~2 mm の半自形ないし他形, 多色性強く, x: 淡緑褐色, y: 茶褐色, z: 茶褐色。 $\gamma: 1.649$, $\rho: 1.642$ 。

含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト (K 117) (第7図)

産地: 札内川9ノ沢

産状岩質: 中粒塊状で多量のホルンフェルス・片麻岩の破碎片を持つ。

鏡下: グラノブラスティック構造。

斜長石>石英>黒雲母>緑色角閃石・磷灰石・緑泥石・榍石・ジルコン・磁鉄鉱

斜長石は 1 mm 以下の半自形ないし他形, An%=37±。石英は 1 mm 以下の不定形で他鉱物

* 分析した標本による薄片を用いたため, 札内川上流のものではないが産状性質とも同様とみてよい

第6図 粗粒花崗岩質ミグマタイト Pl: 斜長石
Or: 正長石 Bi: 黒雲母 Ap: 燐灰石 径≒1.7 mm

第7図 含破砕片ミグマタイト石英閃緑岩質 (K 117)
Pl: 斜長石 Bi: 黒雲母 Q: 石英 径≒1.7 mm

の間隙を埋めている。黒雲母は、1 mm 前後の半自形を示し、多色性著しく x: 淡褐色, y: 褐色, z: 赤褐色, γ : 1.638。

ホルンフェルス状破砕片 (第8図)

産地: 同上

産状: 含破砕片花崗岩質ミグマタイトに捕獲岩様に含まれる紡縞状基性岩石で、部分的に片麻岩となつている。

鏡下: ホルンフェルス構造。

黒雲母>石英=斜長石>>緑色角閃石・磁鉄鉱・燐灰石。

黒雲母は、0.3 mm 前後の他形ないし半自形, x: 淡褐緑色, y: 褐色, z: 濃褐色。石英は、0.1 mm 以下の粒状。斜長石は、0.1 mm の他形ないし半自形。An%=35~45。

斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩 (K 138) (第9図)

産地: 日高国春別川上流。

産状岩質: 紫黒色の黒雲母片麻岩に米粒状の斜長石斑状変晶の多量に散点する。

鏡下: 斑状変晶を持つ片麻状構造。

斜長石>黒雲母>石英>>ざくろ石・燐灰石・磁鉄鉱

斜長石は、1.5 mm 以下の楕円形斑晶で多少分解している。中央部から絹雲母化している傾向が見られる。黒雲母は、0.2 mm 前後の葉片状で方向性があり、多色性強く, x: 褐緑色, y: 褐色, z: 赤褐色, γ : 1.641。石英は、0.1 mm 以下の不定形で基質をなしている。波動消光をなすものがある。ざくろ石は、0.5 mm 程度の斑状変晶である。

石英閃緑岩質ミグマタイト (K 144) (第10図)

産地: 10ノ沢カール壁

産状岩質: 斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩帯の東端にあたり、粗粒やや方向性を認める。

鏡下: グラノプラスチック構造。

斜長石>石英>黒雲母>ざくろ石
・ 燐灰石・磁鉄鉱

斜長石は、1mm 前後のやや楕円形の斑状変晶を示し、双晶が不明瞭である。An%=30~40。石英は、他鉱物の間隙を埋めて発達し波動消光を示す。黒雲母は、0.5mm 以下の葉片状で斜長石をとりまくように配列している。x: 淡褐緑色, y: 褐色, z: 赤褐色, γ : 1.640。ざくろ石は、1.5mm 以下の斑状変晶を示し、石英粒を包みこむ。

4. 化学成分とその考察

以上のべてきた岩石の総化学成分を次に示す。他地域のもので、産状、岩質の同じものは同格に扱った。(第1表) 第2表は各岩石に於ける主要鉱物の量比である。

第11図はその変化図である。横軸は野外における岩相の配置を示すものとみてよい。化学成分とその構造的位置との関係図とも云える。第12図は含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト中のホルンフェルス様破碎片と母岩および原岩であるホルンフェルスとの比較を示すものである。

これらの図表を眺めると大体次のことがわかる。

- i) 縞状片麻岩帯および斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩帯においては、他に比べて SiO_2 が少ない。
- ii) 縞状片麻岩帯には、 Al_2O_3 と K_2O が多いが、斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩帯では Al_2O_3 の増加は割に小さく、 Na_2O が K_2O に比べて優勢である。
- iii) 粗粒花崗岩質ミグマタイトに K_2O が多い。
- iv) 捕獲岩様破碎片には SiO_2 の減少と $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$, MgO の増加が著しい。

(註) (8) の石英閃緑岩質ミグマタイト (K 144) は斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩の東側にそつて産するもので、産状は明らかでないが、鏡下の構造・量比・化学成分などの点からみて、この片麻岩の要素を多分に持っている。

以上の事実から考えられること。

- i) 縞状片麻岩に Al_2O_3 と K_2O が濃集しているのは、黒雲母が多量にできていることと一致し、また斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩には Na_2O の増加があることは、酸性斜長石(灰曹長石)の生成という現象に一致する。このように東西2つの片麻岩帯には、化学成分や構成鉱物でのち

第8図 含破碎片石英閃緑岩質ミグマタイト (9ノ沢中流)
第3図の一部を示す

G: 片麻岩様部 H: ホルンフェルス様部 M: 石英閃緑岩質ミグマタイト部

第9図 斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩 (K 138)
Pl: 斜長石斑状変晶 Bi: 黒雲母 径≒1.7 mm

第10図 石英閃緑岩質ミグマタイト (K 144)
Pl: 斜長石 Bi: 黒雲母 Q: 石英 G: ざくろ石
径≒1.7 mm

第1表 諸岩石の化学成分表

	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O±	Total
1	70.34	.69	16.12	1.16	4.83	2.85	.58	1.89	.81	1.11	100.38
2	62.94	.45	15.76	2.12	4.81	3.60	1.79	4.44	1.46	2.61	99.98
3	64.70	.60	16.03	.07	3.88	3.40	3.00	4.47	1.88	1.59	99.62
4	58.71	.70	20.92	1.02	4.84	2.42	2.96	2.97	2.62	1.15	98.31
5	60.87	.47	19.06	.67	4.03	2.76	3.92	3.46	3.40	1.06	99.70
6	60.80	.65	17.15	1.83	6.14	3.51	2.01	4.07	.80	2.31	99.27
7	67.14	.42	14.14	1.33	4.13	1.88	4.07	3.64	1.13	1.42	99.30
8	60.60	.83	17.06	1.25	5.87	2.50	3.29	3.21	2.01	2.77	99.39
9	63.83	.65	15.96	2.25	6.13	2.59	2.60	3.62	1.41	—	99.04
10	64.20	.42	15.51	1.25	4.20	2.49	3.25	3.06	3.94	1.41	99.73
11	55.18	.73	15.28	1.84	8.59	5.25	4.56	1.67	2.69	3.31	99.10

(岩名)	(標本番号)	(産地)	(分析者)
(1) ホルンフェルス砂岩源	(S-14)	十勝国札内川6ノ沢	木崎甲子郎
(2) 変粘板岩	(202)	〃 本流	櫻田弘
(3) 堇青石ホルンフェルス		十勝国音調津	金成明
(4) 縞状変麻岩	(2個平均)	〃 札内川上流	木崎甲子郎
(5) 〃	(K-70)	〃	千葉幹雄
(6) 斜長石斑状変晶黒雲母片麻岩	(K-138)	日高国春別川源流	木崎甲子郎
(7) 含破碎片花崗岩質ミグマタイト	(K-117)	十勝国札内川9ノ沢	〃
(8) 花崗岩質ミグマタイト	(K-144)	〃 10ノ沢カールヴァンド	櫻田弘
(9) 〃	(含堇青石)	十勝国美幌川	橋本誠二
(10) 粗粒花崗岩質ミグマタイト	(S.B-69)	日高国猿留川上流	千葉幹雄
(11) (7) 中の紡錘状破碎片	(ホルンフェルス様部)		木崎甲子郎

第 2 表 各岩石の主要鉱物量比 (%)

	石英	正長石	斜長石	黒雲母	角閃石	其他	計	分析番号
縞 状 片 麻 岩	33.0	1.4	24.3	40.2	—	1.1	100.0	(5)
斜 長 石 斑 状 変 晶 岩	29.4	—	36.4	32.5	—	1.7	100.0	(6)
含 破 碎 片 石 英 閃 綠 岩 質 ミ グ マ タ イ ト	43.3	—	40.3	10.2	4.1	2.1	100.0	(7)
石英閃綠岩質ミグマタイト	26.4	—	45.6	25.2	—	2.8	100.0	(8)
粗粒花崗岩質ミグマタイト	30.2	2.1	46.8	18.1	—	2.8	100.0	(9)

第 11 図 各岩相間の变化図

がいがあるが、このちがいは、東側には黒雲母をより多く晶出させるような Al_2O_3 と K_2O の濃集、西側には酸性斜長石斑状変晶を作るような Na_2O の変化があつたとみられる。このことは日高帯における両翼の構造運動*のちがいがこのような現象形の差となつていゝるのではあるまいか**。

* 片麻岩が強い differential movement の支配の下に形成されていることは、酒匂純俊による予察的な石英による構造解析で明らかにされている

** 原岩の差については、この地域では砂岩と粘板岩が主な堆積岩であるが、この両者程度のちがいはそれ程問題にならない

第 12 図 ホルンフェルス様破砕片の基性化の有様

第 13 図 黒雲母とそれを含む岩石との化学成分の比較

ii) 粗粒花崗岩質ミグマタイトに見られる K_2O の増加は、縞状片麻岩の場合のそれとは少し意味のちがったものである。 K_2O はこの場合、正長石の存在に関係する。すなわち粗粒花崗岩質ミグマタイトやそれに接する縞状片麻岩に部分的に正長石が存在し、それが他鉱物の間隙を埋めて発達していることはすでに述べた。この部分における K_2O の増加は、ミグマタイト化作用の後期に、他鉱物の遅れて晶出した正長石に関係あるものとみたい。

iii) 捕獲岩様破砕片の化学組成は、紡錘状の片麻岩中のホルンフェルス様部のものである。一見ホルンフェルスでありながら、その組成は普通のホルンフェルスに比べて著しく基性であることが特徴である。このことは片麻岩・ホルンフェルスがミグマタイト化作用のため、花崗岩様に優白化し粗粒化していくに従って、余剰の基性物質がこの破砕片に集り、まわりの酸性化に対応して基性化しているものと考えられる。

5. 本地域諸岩石中の黒雲母について

この地域におけるホルンフェルス・片麻岩・ミグマタイトなどの諸岩石中、造岩鉱物として主な役割を占めているのは、斜長石・黒雲母・石英である。黒雲母はその物理的性質と化学組成との関係が未だ十分に明らかにされてないうえ、前述5つの岩相の中で、屈折率が粗粒花崗岩質ミグマタイトにおいてもつとも高く、縞状片麻岩においてもつとも低いことがわかつたので、3個について分析し、検討を試みた。

第3表 黒雲母の化学組成

	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O		Total
										+	-	
13	34.58	2.69	22.64	1.67	14.98	10.35	0.63	1.23	6.50	3.20	0.88	99.35
14	37.69	1.53	18.19	3.53	14.86	11.08	0.87	0.78	6.21	4.91	0.15	99.80
15	35.96	1.96	18.37	2.10	15.10	11.66	0.77	0.80	8.08	4.28	0.16	99.24

(試料) (分析者)

(13) 縞状片麻岩 (K 70) 木崎甲子郎
 (14) 含破砕石英閃緑岩質ミグマタイト (K 117) 同上
 (15) 粗粒花崗岩質ミグマタイト (S.B 69) 同上

第4表 黒雲母の色および屈折率

	色	屈折率	FeO/FeO+MgO
片状ホルンフェルス (K 303)	x: 淡褐緑色 y: 褐色 z: 褐色	γ: 1.635	—
縞状片麻岩 (13)	x: 淡緑褐色 y: 赤褐色 z: 赤褐色	γ: 1.634 β: 1.629	0.6142
含破砕石英閃緑岩質 ミグマタイト (14)	x: 淡褐色 y: 褐色 z: 赤褐色	γ: 1.638	0.6195
粗粒花崗岩質 ミグマタイト (15)	x: 淡緑褐色 y: 茶褐色 z: 茶褐色	γ: 1.649 β: 1.642	0.5934

(測定 木崎甲子郎)

この3個の黒雲母の分子式はすべて、 $K(Fe'', Mg)_2Al_2Si_3O_{10}(OH)_2$ で表わすことが出来る。また一般の花崗岩にともなわれる黒雲母に比べて、 Al_2O_3 が多く、屈折率が低いことが特徴である。

$Al_2O_3-FeO(Fe_2O_3 \text{ を含む})-MgO$ の三角図表に黒雲母の組成と、その黒雲母を含む岩石の総化学成分をそれぞれ投影すると、第13図のようになる。

縞状片麻岩にともなう黒雲母は、その岩石におけると同様に、他に比べて Al_2O_3 に富んでい

る。しかも3個の黒雲母の点の位置は、これを含む岩石の点の位置と対応して変化している。

このことは、黒雲母が組成的にかなりの寛容度を持ち、その岩石の成分の変化に相応じて変化することを意味している。

屈折率に関しては、少くもこの場合には、 $\text{FeO}/\text{FeO}+\text{MgO}$ とは関係がないことがいえる。

6. あ と が き

札内川上流の日高変成帯を岩相にもとづいて5つの単元に分け、その典型的と思われる標本についての簡単な記載と、それらの間の化学的傾向について述べた。それぞれの単元の中での問題についてはまだのべるに至っていない。これを要約すれば；

- i) 成分の濃集は構造運動と関連してくるのではないか。
- ii) K_2O の濃集が片麻岩形成時と、花崗岩質ミグマタイト形成の末期とに二通りの形で存在する。
- iii) 捕獲岩様破砕片は、その周囲が花崗岩質となつて酸性化するのと対照的に基性化する。
- iv) 黒雲母の組成は、それを含む岩石の総化学成分に対応している。すなわちある程度置換的であること。

以上のような見通しを得たのであるが、特に i) に関しては資料少く、今後の問題として重視されるべきであろう。

引 用 文 献

- 1) C. E. WEGMANN (1935): Zur Deutung der Migmatit. Geol. Rund. Bd. 26.
- 2) D. L. REYNOLD (1946): The Sequence of Geochemical Changes Leading to Granitization. Q. J. G. S. vol. 52.
- 3) 鈴木 醇 (1934): 十勝国南部海岸ホルンフェルス中の変成石灰質団塊に就いて, 地質雑, vol. 41, pp. 666-680.
- 4) 坪井誠太郎 (1938): 本邦産造岩黒雲母について (続報), 地質雑, vol. 45, pp. 453-455.
- 5) 小出 博 (1949): 段戸花崗閃緑岩類および段戸変成岩類, 地団研専報 No. 3.
- 6) 舟橋三男・橋本誠二 (1951): 日高帯の地質, 地団研専報 No. 6.
- 7) 酒匂純俊 (1951): 札内川上流の地質及岩石, 北大理地卒論手記.
- 8) 木崎甲子郎 (1951): 札内川上流の地質及岩石 (特に混成岩), 北大理地卒論手記.

On the Gneisses and Migmatites of the Central Hidaka Metamorphic Zone

(Abstract)

Kôshirô KIZAKI

Various kinds of Metamorphic rocks which are regarded as the product of the Hidaka Orogeny, constitute a prominent extended zone along the Hidaka mountain range.

Around the upper course of the River Satsunai which is in the central part of the zone, argillaceous metamorphic rocks are widely developed. Their many rock facies are distinguishable and each facies is zonally arranged with N-S trend.

In the argillaceous metamorphic rocks of this area, the writer has discriminated from east to west across the metamorphic zone, five different zones, viz., 1. hornfels zone, 2. banded gneiss zone, 3. coarse granitic migmatite zone, 4. breccia like quartz dioritic migmatite zone and 5. plagioclase porphyroblast biotite gneiss zone.

In this paper their chief petrographical characteristics are described and some considerations about their chemical compositions are also offered.

As to the chemical compositions of these gneisses, the following features are conspicuous:

1) In the banded gneisses, K_2O , Al_2O_3 contents are greater than in the rocks of any other facies.

2) Biotite-gneiss containing plagioclase porphyroblast has the highest Na_2O/K_2O , and contrasts with the banded gneiss which has high K_2O and low Na_2O contents.

3) K_2O is comparatively more abundant also in the coarse granitic migmatite, this abundance may be due to the presence of much orthoclase in the coarse granitic migmatite.

4) In the breccia like quartz dioritic migmatite (agmatitic migmatite), the containing hornfels is more basic than is the hornfels of the hornfels zone. From the petrographical view-point, the rock forming biotites were studied.

Their chemical compositions are varied corresponding to the differences in the bulk composition of the host rocks.

Their relation is given in the $Al_2O_3-FeO-MgO$ Diagram. (Fig. 13)

短 報

水野篤行*: ^{しもさと}下里統について

紀伊半島南部の“下里統”は“宮井統”の下に不整合で横たわる始新統と考えられていた¹⁾が、筆者の今迄の研究で、那智・下里・串本・田並間の海岸地域の上記の両“統”を含む地層は全部一連のものであることが明らかとなつたので、この事実を簡単に報告する。

この地域の層序は柱状図に示したとおりである。基盤(田並以西に分布し、礫岩・砂岩・シルト岩からなる。北 30° ~ 50° 東の方向で著しくもめている。)との斜交不整合は田並駅南方の田ノ崎海岸でみられ、ほとんど平坦な不整合面上に北 50° 東 50° ~ 60° 南の基底礫岩層 A が横たわる。その上位に田並・下里間に分布する砂岩・シルト岩のフリツシュ型互層 B (上部に数枚の泥灰岩層をはさむ。)が横

たわり、さらに下田原・古座間に標式的に発達する塊状シルト岩層 C がその上位に横たわる。その上位は下里付近に分布する含細礫・粗~中粒砂岩層 D をへだてて、砂岩・シルト岩互層 E (砂岩 0.5 cm~10 cm・シルト岩 10 cm~50 cm) となる。最上位に那智駅東方の海崖に露出する中粒砂岩層 F が横たわる。なお、太地半島に中粒砂岩の厚層(シルト岩をはさむ) G が分布するが、上記の諸層と断層関係にある爲、その層序的位置については、まだはつきりしていない。今の所、D に当るのでないかと考えている。上記の諸層から、*Neverita* cfr. *coticae*・*Ancistrolepis* n. sp. (田並, B), *Neverita* sp., *Portlandia* “*laudabilis*” (耳ノ鼻, C), *Turritella tanaguraensis*, *Dosinia* cfr. *nomurai* (下里, D) の

* 東京大学理学部地質学教室