鍾乳洞の形成期について

北備後台地団体研究グループ*

(1969 年 2 月 18 日 受理)

まえがき

古生層や中生層の地質調査にさいして鍾乳洞をみるものが少なくないが、その形成期に関する考察が系統的に行なわれたことは、ほとんどなかったように思われる。というのは、鍾乳洞は雨水の溶蝕によって長年月の間にできるものだ、という素朴な成因的把握にとどまり、その形成について地質的な時代性とか法則性はほとんど考慮されなかったためであろう。

しかし、ひとたび帝釈峡（広島県比婆郡・神石郡）を歩いてみると、洞口の水準が数段に分類できること、すなわち、洞穴の高さは決して任意的なものではないことに気付くであろう（赤木三郎, 1962）。さらに、おのおのの洞口の高さは、河岸段丘の高さとも対応しているのである。このことは、鍾乳洞の形成に段階的な時期があることを意味する。筆者らの調査によれば、本地域における鍾乳洞の本格的な形成は、第四紀中期以降とみられるのである。本論文では、このことについてのべる。

この研究は、中国四国農政局より依頼された、石灰岩台地における地下水賦存調査の一部である。したがって調査内容の詳細については、別に農林省から報告書が公表される予定なので、それを参照していただきたい。

筆者らは、全般的な地質調査を始めるに当たって、団体研究グループを組織し、かつ、いくつかの専門分野を分担した。つぎの方がたには、それぞれの分野において調査にご協力いただいたことを明記しておく。

洞穴調査(7月): 後藤公男・平井繁光・藤原茂・川田英治・向井唯昭・西山雅人・小野啓一・白石政男・山内平三郎・矢野学(以上愛媛大探検部) 柴田喜太郎(広島大)、同(8月)村中民義・滝田澄正(鳥取大) 高安克己・和田信彦(東京教育大)

表層地質調査: 星見清晴(鳥取県名和中学校) 佐治考式(鳥取県倉吉西中学校) 福本幹久(鳥取市末恒小学校) 市原実(大阪市大)

地形調査: 加藤哲也・森脇喜一(広島大)

基盤調査: 柴田喜太郎・岩田健一(広島大) 村中民義

* 本稿はつぎの代表者の討論・執筆による(ABC順)。赤木三郎(鳥取大地理学教室) 鹿島愛彦(愛媛大教育学部地理学教室) 桑野幸夫(資源研) 沖村雄二(広島大地理学教室) 大久保雅弘(東大地理学教室) 柴崎達雄(資源研) 武永健一郎(鈴鹿女子大)

滝田澄正(鳥取大) 高安克己・和田信彦(東京教育大) 清水守康(埼玉大)

また、現地調査は 1967 年 12 月, 1968 年 7 月, 8 月, 10 月に分けて実施されたが、この間、東城町の佐川町長をはじめ関係各位、および白雲洞の積山澄晃氏らには終始お世話になった。以上の方がたに厚くお礼を申上げる。

農政局の向井久一・栗原権四郎・田中恭一・工藤浩・初倉克幹・西島輝之および外長理の諸氏には、調査の機会を与えられたこと、および現地において何かとご教示をえたことを厚く感謝する。

鍾乳洞の分布とその水準

帝釈台地は、広島県比婆郡東城町を中心に広く展開している石灰岩台地であって、その主部は二畳・石炭紀の石灰岩で占められている。台地の上には、ドリーネやウバーレなどのカルスト地形が発達しており、台地を切る河川ぞいには、鍾乳洞の洞口が数多くみられる。その河川の 1 つ、帝釈川にそう約 20 km にわたる峡谷が帝釈峡とよばれている。

第 1 図 帝釈川・東城川ぞいの主要鍾乳洞分布図(番号は第 2~4 図および本文中の番号と対応する。1: 鬼の岩屋, 2: 賽の河原, 4: 白雲洞, 5: 雄橋, 9: 雌橋, 15: 半瀬のバクチ穴, 22: 便蔵穴, 23: 天川洞, 27: 鬼釜, 30: 日切大師)

第2図 鍾乳洞開口部の高さと段丘との比較 (I : 矢不立城面, II : 帝釈学校面, III : 河仁吾面, IV : 東城面)

いま、数多い鍾乳洞のうち、帝釈川および東城川の本流ぞいに開口するおもなものについて、地域的な分布を示すと第1図のとおりである。各洞の名前は、当地域で一般に呼称されているものだけをあげておいた。これらの洞穴の規模についていえば、奥行100mをこえるものはわずかに3洞(天川洞・鬼の岩屋・白雲洞)ほどであって、その他の大部分は30~50m程度である。この規模というのは、もちろん、現在入洞可能な範囲内のことである。

鍾乳洞の形態はさまざまであるが、一般的に横穴形式のものが多く、すべて流出型である。その洞口の水準を、現河床からの比高で示すと第2図のようになり、5つの水準に分類できる。

A水準：比高70m付近に開口する洞穴であって、この水準のものは縦穴形式が多い。No.3(第1図・第2図の番号。以下同じ)は、白雲洞の上、標高490m前後の平坦部に開口している縦穴であって、その底は白雲洞の奥につながるものと思われる。No.10は、^やた不立城趾のある段丘面に開口している縦穴であって、底は神竜湖の水面に達している。No.11~13は、犬瀬付近の路傍の石灰岩壁に散見する小さな洞穴群であり、いずれも横には延びないで、斜め上方あるいは下方へと縦穴を形成している。なかには、小規模ながら裂罅堆積物がみられることもある。No.14は、火の首部落の南端にあり、奥行約50mの横穴である。本洞は他のものと異なり、下盤の輝緑凝灰岩層の直上に位置する特殊な場合である。

No.15は^{はんぜ}半瀬のバクチ穴とよばれ、湖上の遊覧船から望見されるものであって、石灰岩壁の中段に開口する大きな洞穴である。その天井には、小さな縦穴が数本あいている。

B水準：比高約30mの水準に開口している洞穴群であって、ほとんどが横穴形式を示している。No.1は鬼の岩屋とよばれ、帝釈川上流にある、奥行130mぐらいの横穴である(第3図参照)。No.7は、そうめん滝を湧出している洞穴であり、No.8は、それより約200m下流側に開口しており、いずれも奥行50mほどの横穴である。No.30は、東城町羽場の日切大師をまつた小さな洞穴であるが、比高30mの段丘面と相対している。No.5は鍾乳洞ではなく、^{おんばし}雄橋という天然橋であるが、その上面が本水準に対応し、かつ、そこにはわずかながら礫層が残っている。

C水準：比高13m前後の水準に開口する洞穴は、他の水準にくらべて数が少ないが、一応、1つの水準として識別できる。その代表的なものは、No.4の白雲洞である。本洞は、当地域で唯一つの観光洞であるために、多少の人工が加わっているが、その主部はこの水準に位置する。また、No.5雄橋の下面、すなわち、トンネル部の天井の高さが、ほぼこの水準に相当する。No.18, No.25は、洞口は大きいと奥行の短い横穴である。

D水準：比高6m付近に開口する洞穴群であって、いずれも、他の水準のものよりは規模が小さいようである。No.6は、養魚場の湧水の開口部であって、水は禪

仏寺谷のポノールに由来するものと思われる。No. 9は雌橋とよばれている天然橋の上面であるが、現在は湖下面に水没している。No. 22, 26, 29は、いずれも小さな横穴である。

E水準：現河床面ないし比高1mぐらいの所に開口する横穴群であって、比較的に規模が大きい。洞内では河川とほぼ同水準の水流や水溜りをみることも多い。No. 2は、永明寺の下にある、賽の河原という洞穴であって、現河川の溶蝕により生じたノッチと連続した形態を示している。No. 20もこれとほぼ同じであって、水面上にある岩陰状の洞穴ないし窪みである。この種のもは、本流ぞいに数多くみられる。No. 23の天川洞は、当地域最大の洞穴であって、奥行約400mの横穴である。ただし、洞床は1水準だけではなく、数m高い水準の段もみられる。No. 28は、70mほどほぼ直線状に発達している横穴であって、奥は現河川の水準で水没している（第4図参照）。本洞においても、天川洞と同様に、洞床は数mの高低差を示している。

以上のように、帝釈川および東城川ぞいの鍾乳洞の比高は、A～Eの5水準に区分できるが、もちろん、当地域のすべての洞穴がこの水準のどれかに合致するとは限らない。中間の水準に開口するものも存在する。しかし水準による区分が可能である事実を、まず最初に明確にしておきたい。

つぎに横穴および縦穴といった形式との関連でいえば、縦穴形式はA水準のほかには、C/D間あるいはD/E間のような中間の水準に認められることが多いようである。そして、B～E各水準の洞穴は、その規模は別として、横穴形式で代表される。この事実もまた、はじめに指摘しておきたいのである。

鍾乳洞の洞口の比高をこのように分類した一方、両河川に発達している河岸段丘の高さとの比較を試みた。第2図の右端に、各段丘面の高さを表示したが、この図は、両者の間に成因的な相関関係があることを明白に物語っている。

なお、帝釈地域は考古学上の試料発掘も盛んな所であって、馬渡遺跡、寄倉遺跡など縄文時代の遺跡が有名である。これらは、いずれも岩陰遺跡であって、その水準は、上記のD水準またはD/E間に位置している。

鍾乳洞の形態

鍾乳洞の形は曲線的であり、複雑であるので、その形態ないし発達様式を分類することは難しい問題であるが、最も常識的には、縦穴および横穴の2大区分が可能

第3図 鍾乳洞の形態例。No. 1 (鬼の岩屋)。A：平面図，B：断面投影図（ab線は洞入口の高さ）

である。

縦穴といっても、煙突のようにすっぽりと洞穴が空いていることはまれであって、その中間にテラス状の段が形成されていることが多い。また、垂直ではなく、急角度の斜抗型になっていることも実際にはよくみられる。横穴の場合も同様に、1つの水準に平坦な洞穴に限られることは、むしろまれであって、洞床が傾斜したり、あるいは、2段またはそれ以上にわたる多水準の洞床が存在している場合も少なくない。

実際に、われわれが地質調査に入洞したとき、洞穴の伸長方向と断層・節理などの割れ目系統との関連にまず目をひかれる。もっとも、洞内は二次生成物の被膜でおおわれていることが多いために、割れ目の存否を確認できない場合もある。また、割れ目といっても、たんなる節理と断層との区別がつかないことも多い。しかしながら、第3図と第4図に実例を図示したように、洞内の主要な通路や空洞の伸長方向は、割れ目の方向に支配されていることが多いのである。このような割れ目は、地域的に発達している割れ目系統の一部であるが、特定方向のものに限られるのかどうか、という点については規則性はないように見える。

つぎに、洞床の高低差についてみると、数mを隔てて段ができていたり、あるいは洞内が2層構造ないし多層

第4図 鍾乳洞の形態例. No. 28. A: 平面図, B: 断面投影図 (ab 線は現河川の水面の高さ)

構造を呈していることがある。これは、洞穴を形成した地下水の水準面の変動を意味するものであって、段丘の形成と同義である。ただし、洞内の段が、そのまま洞外の河岸段丘と1対1で対応するとは限らない。合致する場合もあれば、合致しない場合もある。このことを少し大規模に考えると、たとえば、1つの鍾乳洞の中に、C水準の洞穴とD水準の洞穴とが一緒に存在する場合、さらには、もっと多くの水準の洞穴が相互に連結し合っている場合などが予想される。

形態を詳しく論じることは論旨からそれるので、ここでは、時間的にも空間的にも、地質的要因の規制をうけていることを例示するにとどめておく。

地形面および火山灰の年代

鍾乳洞の形成期を知る手がかりとして、第2図からもわかるように、段丘の時代を考察しておきたい。帝釈川および東城川流域に発達する地形面ないし河岸段丘は、高位より低位へ、つぎのように識別できる。

帝釈高原面	標高 500~600m
矢不立城面	比高約 70m
帝釈学校面	比高 20~30m
河仁吾面	比高約 12m
東城面	比高 3~8m

いわゆる中国準平原には吉備高原面と道後山面とがあり、帝釈高原面は吉備高原面の一部であって、丘陵状の広い山地を形づくっている。この面の形成は、一般に第三紀鮮新世ごろと推定されている。石灰岩台地においては、この面はやや低く、標高 450~550m の地形面に相当し、ここには、ドリーネやウバーレなどが発達している。

矢不立城面は、帝釈高原面より数 10 m 低く、標高 420m 付近に位置し、河床からの比高は約 70m である。帝釈峡の中心地である矢不立城趾の模式地においては、河岸段丘堆積物の露頭とともに、小洞穴を埋めた堆積物の断面が観察できる。東城川ぞいでは、この面は、中新統の備北層群を侵蝕した面を形成している。

帝釈学校面は、帝釈小・中学校の位置する段丘面を模式地としたものであって、古三瓶火山灰(18,000~22,000 y. B. P.*) をのせている。

河仁吾面は、帝釈川中流の断魚溪付近にあり、比高 12 m である。ここには火山灰がのっていないが、全域的な調査結果から判断して、新三瓶火山灰 (10,000—15,000 y. B. P.*) より古いものと考えられる。

東城面は、東城町が位置する段丘面であって、平均して比高 6 m 前後のところにあり、ここには火山灰は認められない。

なお、古崖錐の形成は2期にわたっており、それぞれ、帝釈学校面および河仁吾面の形成期にほぼ相当する。

鍾乳洞の形成期

鍾乳洞形成の年代を考察するためには、洞穴堆積物も有力な手がかりである。しかし、帝釈地域の洞穴からは、地質年代を推定しうる古生物学的資料はほとんど発

* 第四紀録研・三瓶団体研究グループ (1968, MS) による。

第5図 帝釈峡および東城川の模式断面図。a：新三瓶火山灰，b：古三瓶火山灰，c：古崖錐，d：段丘堆積物，e：備北層群（中新統），f：古生層（主に石灰岩），T：帝釈高原面，A～Eは第2図のそれらに対応する）

第1表 帝釈峡における第四紀の編年

		地形・段丘	地 質	鍾乳洞	その他
第 四 紀	沖積世	現河床面		E水準の洞穴群	石灰岩にノッチの形成 馬渡・寄倉の岩陰遺跡 洞穴形成の最盛期
	後 期	東城面（比高 3～8m）	……………新三瓶火山灰…………… (10.000～15.000 y. B. P.)	D水準の洞穴群	
		河仁吾面（比高 12m）	……………古崖錐形成Ⅱ…………… ……………古三瓶火山灰…………… (18.000～22.000 y. B. P.)	C水準の洞穴群	
	中 期	帝釈学校面 （比高 20～30m）	古崖錐形成Ⅰ	B水準の洞穴群	
	前 期	矢不立城面 （比高 70m） （標高 420m）		A水準の洞穴群 縦穴の生長 鍾乳洞の萌芽的形成 ドリーネ・ウバーレの形成開始	
・第三紀		帝釈高原面の形成 （標高 500～600m）	~~~~~ 備北層群 （中新統）		

見されていない。

他方、この地域には、備北層群* とよばれる海成の中

* 今村外治（1960）によれば、備北層群は東城川の河床面から帝釈高原面まで分布しており、砂岩を主とする層厚約 192 m の地層である。高位にある段丘面には、未固結の砂礫層が発達し、岩相的には備北層群の砂岩・礫岩層とはかなり異っている。これらをすべて中新統とするにはかなり疑問があり、礫構成や固結度の差からみて、より新期の堆積層として区別される可能性もある。もしそうならば、洞穴形成期はさらに限定されるだろう。

新統がかなり広く分布しており、石灰岩台地の山間部を占めているが、同層群によって埋積された洞穴は見当らないのである。このことは中新世にはまだ洞穴が存在しなかった、という消極的な証拠にはなるだろう。

前項において段丘面形成の年代にふれたが、それらとの対比をつうじて、本地域の鍾乳洞の形成は第四紀であ

ると考える。そして、その開始は第四紀早期にさかのぼるが、形成の最盛期は第四紀中期以降と推論される。その概略を地史的に要約するとつぎのようであるが、第1表および第5図のようにまとめることができる。

第三紀末期には、いわゆる中国準平原が形成されたが、鍾乳洞形成の条件はまだできていなかった。

第四紀早期になって、帝釈高原面の浸蝕がすすみ、石灰岩台地においてはカルスト地形ができ始めた。

第四紀前期（多摩期？）になって、鍾乳洞の形成が進展しはじめた。この最初の大規模な洞穴群が、A水準の縦穴である。現在、この水準の洞穴群に横穴がほとんどみられないことは、帝釈高原面形成期から矢不立城面形成期にわたる間に、下刻および側方浸食の規模が大きかったため、かつては多少とも形成されたはずの横穴が著しく削剝されたものと考えられることもできる。

第四紀中期およびそれ以降になると、河川の下刻期と停止期との繰返しが顕著になってきた。これは河岸段丘の形成として表現されているが、鍾乳洞形成の上では、B水準以下にみられるような横穴形式の洞穴群が発達したのである。河川の下刻作用の一時的停止、すなわち、地下水面低下の一時的停止が、横穴形式の洞穴形成を促進したのである。年代的には、B水準は下末吉期、C・D水準は武蔵野～立川期、E水準は沖積世にほぼ相当しよう。

結 論

(1) 広島県帝釈峡付近に発達している鍾乳洞は、河床からの比高により、A～Eの5水準（第2図）に区分できる。

(2) この5水準は、それぞれ河岸段丘面に対比することができる（第2図・第5図・第1表）。

(3) 鍾乳洞の主たる形成期は、第四紀前期以降であって、とくに中期以後において本格化した。

(4) 洞穴の形態についていえば、河床面の安定期には横穴形式が、不安定期（下刻期）には縦穴形式が主として発達する。

今 後 の 問 題

(1) 上記の所論が、他の地域の鍾乳洞形成についても妥当といえるのかどうか？ 現在、われわれが聞き知っている限りでは、第三紀に形成された鍾乳洞はないようである。帝釈峡に隣接する地域でいえば、秋吉台の秋芳洞、阿哲台の井倉洞・満奇洞などは、本論文と同じ手法でみれば、第四紀中期以降に主たる形成期があったように思える。地質学的な報告は少ないが、同様の例は、岩手県の布佐洞（一関高校地学部、1967）愛媛県の黒岩洞・仕出ヶ岳洞（永井浩三、1961）福岡県の平尾台青竜窟・千仏洞（宮久・鹿島、1962）などに関する報文からうかがうことができる。このような点を考えると、上記の所論が全国的に拡大できそうな気がする。

(2) 海外の鍾乳洞のなかには、第三紀に形成されたものがあるとさく。もし、日本の鍾乳洞を第四紀の形成だとした場合、この時代的な差異はどこから生じるのだろうか？ 鍾乳洞形成が第四紀であること、また、第四紀中期以降の段丘面と対応する水準に横穴が発達していること、これらは日本の特徴なのであるか？ 今後の地質調査をまつとともに、諸賢のご教示をえたい。

(3) 鍾乳洞は、遺跡をつうじて考古学と、特殊化した生物を媒介として生態学とも結びついている。いずれの方面でも、時間的、空間的背景として、鍾乳洞形成史を無視できないが、本稿の所論が関連分野においても容認されるだろうか？ 一般論的な議論だけではなく、個々の洞穴調査においても、関連分野を含めた団体研究に期待したいものである。

文 献

- 赤木三郎 (1962), 帝釈峡をめぐる備北の第四紀メモ。比婆科学, 14, vol. 4, p. 16—23.
 一関高等学校地学部 (1967), 布佐洞の地学的研究。自然科学研究。vol. 1, p. 49—66.
 今村外治 (1950), 東城町付近に貝類化石産地を訪ねて。比婆科学, vol. 18, p. 1—4.
 宮久三千年・鹿島愛彦 (1962), 平尾台カルストの石灰洞群にみられる曲流現象。愛媛大学紀要, vol. 4, pp. 121—133.
 永井浩三 (1961), 愛媛の地質。pp. 31—32. 松菊堂。

On the age of the formation of limestone caves : an example

Kita-Bingo Plateau Research Group

(Abstract)

Through the geologic survey on the Taishyaku plateau, Hiroshima Pref., western Japan, the authors found that the height of the limestone cave entrances could be divided into several levels, which are correlative to the height of the river terraces. These facts imply that the vertical distribution of the cave levels has resulted from regular geologic processes during the Quaternary era.

The cave levels can be classified into five zones as follows (in relative height). A zone: 70 m, B zone: 20—30 m, C zone: 12 m, D zone: 3—8m, E zone: 0 m.

The age of the terraces as well as the levels of the caves, can be estimated as follows. The A zone may be

referred to the Tama stage, and the B, C and D zones may be correlated to the Shimosueyoshi, the Musashino and the Tachikawa stages respectively. These estimates are based on the age determination of the tephra layers on the terraces and the geologic correlation of the terraces. In a word, these caves were formed essentially since the Middle Quaternary.

In respect to morphology of the caves, the horizontal type caves were formed in stable periods of terrace formation, while the vertical type ones were made in unstable periods of river valley deepening.