嶺岡帯, ピクライト玄武岩のクロムスピネル

田 崎 耕 市*

(1975 年 1 月 16 日 受理)

I. はじめに

月試料のスピネル系酸化鉱物の研究が EPMA を駆使して進められ, これらの鉱物はウルボスピネルとクロマイトの間のほぼ連続の固溶体系列をなすこと, また, マグネタイト分子がほとんど含まれないことなどが明らかにされてきた (AGRELL *et al.*, 1970; HAGGERTY and MEYER, 1970; HAGGERTY *et al.*, 1970; REID, 1971; WEIGAND and HOLLISTER, 1973).

以後, 各地の火山岩類や層状分化岩体からも, クロムを含むチタノマグネタイト, チタンを含むクロムスピネルが次々に報告されている (HENDERSON and SUDDABY, 1971; EVANS and WRIGHT, 1972; CAMERON and GLOVER, 1973; THOMPSON, 1973).

今回, 房総半島, 嶺岡帯のピクライト玄武岩のスピネルがこれらと類似の, チタンを含むクロムスピネルであることが分かったので, その EPMA 分析結果を報告するとともに, 若干の考察を述べる.

II. 地質概略と岩石記載

房総半島南部, 鴨川から西に延びる嶺岡帯には, 砂泥互層を主とする嶺岡層群と, ピクライト玄武岩, 枕状溶岩などの噴出岩類, 蛇紋岩化したかんらん岩, はんれい岩等が分布する (河井, 1957; 陶山・成瀬, 1959; 市川他, 1970) (第 1 図).

また, この地域の基盤岩類と推定される黒雲母片岩, ザクロ石-石英片岩, 角閃石片岩などが, かんらん岩中の捕獲岩として, あるいは鴨川漁港近くの岩礁として報告されている (小池, 1957; 兼平他, 1968).

嶺岡帯は, 四万十帯の延長と考えられ, 層序的に, また地向斜性火山活動のタイプから, 四万十区南帯, 瀬戸川帯の滝沢亜層群と対比されている (市川他, 1970; 牛来, 1973).

嶺岡帯および瀬戸川帯のピクライト玄武岩類といわれる超苦鉄質噴出岩について, 鮫島 (1958, 1970) は, そ

の産状と岩石の化学組成からアルカリ超苦鉄質噴出岩のメイメチャイトに類似した岩石であろうと述べている.

今回, 検討したピクライト玄武岩は, 黒色緻密で, カンラン石の大型斑晶が肉眼で認められる. 斑晶は自形ないし半自形のカンラン石 (2~6 mm × 1~4 mm) から成り, 大型の結晶 (5~6 mm × 3~4 mm) では蛇紋石化が著しい. 1 mm 以下の微斑晶として自形のカンラン石と少量の普通輝石が存在する.

石基部分は, 急冷相と推定される羊歯状のチタン輝石 (titanaugite) とその間隙のアルミニウムとアルカリに富む斜長石組成のガラスから成る (田崎, 1974). 自形のクロムスピネルは 0.03~0.08 mm で, 半ば蛇紋石化した大型カンラン石斑晶の内部, チタン輝石の粒間などに

Fig. 1. Location of the Mineoka tectonic belt (compiled after geological map of Chiba prefecture, 1959).

1 : Neogene sediments, 2 : Mineoka group (Paleogene), 3 : Mafic-ultramafic rocks, 4 : Sampling locality, Km : Kamogawa, Hd : Hoda.

* 岡山大学温泉研究所

Table 1. Chemical compositions of picrite basalts from the Mineoka tectonic belt.

	1	2	3	4	5
SiO ₂	38.25	37.50	39.38	37.86	39.57
TiO ₂	1.14	0.74	1.11	0.69	1.04
Al ₂ O ₃	5.37	4.47	5.56	4.28	5.43
Cr ₂ O ₃	—	0.23	0.20	0.40	0.33
Fe ₂ O ₃	4.53	5.27	4.45	2.63	4.32
FeO	6.32	6.40	6.68	8.01	6.96
MnO	0.14	0.22	0.15	0.13	0.15
MgO	27.86	32.47	28.52	30.03	28.89
NiO	—	0.18	0.08	0.23	0.20
CaO	4.81	1.94	5.50	3.77	4.40
Na ₂ O	0.67	0.37	0.99	0.20	0.56
K ₂ O	0.35	0.16	0.30	0.16	0.14
P ₂ O ₅	0.06	0.17	0.22	0.09	0.13
H ₂ O ⁺	8.47	8.06	6.43	8.99	6.88
H ₂ O ⁻	1.58	1.95	0.95	1.73	1.12
Total	99.55	100.13	100.52	100.06	100.12
(A	2.6	1.2	3.2	0.8	1.7
M	70.9	73.6	70.4	73.7	71.4
F	26.5	25.2	26.4	25.5	26.8

1: TAZAKI, 2~5: SAMEJIMA (1970).

散在する。まれに斑晶状のものも認められる。

この岩石の化学分析値をすでに発表されている同様な岩石のものとともに第1表に示す。斑晶カンラン石の蛇紋石化が著しいために、H₂O[±]が8~12%含まれ、MgOは27.9~32.5%, ΣFeOが10~11%で、化学成分の上からも明らかに超苦鉄質であることが示される。しかし、Al₂O₃、TiO₂などが相対的に多く、地向斜性超塩基性岩(牛来, 1973)のうちでも、アルカリ岩系列のものにより似た組成とみることができる。

III. クロムスピネルの EPMA 分析結果

クロムスピネルの EPMA 分析は、日本電子KK, JXA 5A(取出し角 40°)の装置を用い、標準物質としては、すべて合成酸化物を使用した。分析条件は、加速電圧 15kV、試料電流 0.02μA、ビーム径約 3μm、で 10 秒ごとの測定を 5 回繰り返し平均した。他の条件はすべて田崎・平野 (1973) に従った。

補正方法は、BENCE and ALBEE (1968) に従い、α値は NAKAMURA and KUSHIRO (1970) を用いた。分析点は、累帯構造の認められないことを確かめた上で、結晶粒ごとに 3~5 点採った。

分析結果を、カンラン石中に取り込まれているもの、石基の急冷チタン輝石粒間のものに区別して第2表に示した。第2表における、FeO、Fe₂O₃の割合は一般に行われるように R²⁺+R³⁺+2O₄を基準に O=32 として陽イ

オン数が 24.00 に最も近くなるように計算して求めた。

半ば蛇紋石化したカンラン石斑晶に含まれるスピネルと石基の急冷チタン輝石粒間にあるものとを比較すると、わずかながら組成の差が認められる。

TiO₂についてみると、蛇紋石化カンラン石に含まれるもの、およびカンラン石に半ば取り込まれ、一部石基に接しているもので、2.9~4.8% 含有されるのに対し、石基にあるスピネルでは、3%近いものの外に、2%以下のものがある。また Al₂O₃についてみると、前者で 14.8~18.5% であるのに対し、後者では 13.9~16.6% とやや少ない傾向がある。Cr₂O₃についてみると、30~47.9% で 50% を超えるものは見出されなかった。このうち、40%を超えるものは、すべて石基のスピネルであり、35% 以下のものはすべて、カンラン石に含まれるか、一部で石基に接しているものである。

IV. 考 察

顕微鏡下の観察から、スピネルは、斑晶カンラン石と同時に、あるいはそれ以前の段階で晶出したと推定できるものと、急冷相チタン輝石と同時期に晶出したとみなされるものが存在する。斑晶カンラン石が蛇紋石化する過程で、その中に包有されるスピネルが組成を変化させていることは予想されるが、その事実を示すような反応関係や湾入形態は認められない。

また、石基の急冷相と共存するスピネルは、輝石の粒間を埋める斜長石質のガラスが粘土化を免れていることから二次的変質の影響をほとんど受けていないとみさせる。したがって、今回分析したスピネルは、晶出時の化学組成を比較的良好に保っているものとみることができる。

クロマイト [(Fe, Mg)Cr₂O₄] とウルボスピネル [(Fe, Mg)₂TiO₄] の固溶関係を検討するために Ti と Cr+Al の関係を第2図に示した。O=32 としたときの Ti=5.5, Cr+Al=16 を結ぶ直線は、スピネル中にマグネタイト [(Fe, Mg)Fe₂O₄] がまったく固溶していないときのクロムスピネルに含まれるチタン量を示す。

アポロ 12 号試料においては、クロマイトに固溶するマグネタイト分子の量は、多くても 4% と見積もられ、むしろその存在は否定的である (HAGGERTY and MEYER, 1970)。

その後の結果からも、月試料のスピネル系酸化鉱物では、マグネタイトをほとんど欠いた、ウルボスピネルとクロマイトの間の連続固溶体を確認されている (REID, 1971; HAGGERTY, 1972)。

Table 2. Microprobe analyses of titanian chrome spinels.

No.	1*	2*	3*	4*	5**	6**	7*	8**	9**	10**	11**	12**	13**
Grain no.	7	1-1	1-2	6	3	4	2	9	13	10	8	12	11
TiO ₂	4.77	3.08	3.13	3.42	2.86	3.02	2.89	2.72	1.76	1.76	1.51	1.67	1.37
Al ₂ O ₃	14.82	18.31	18.55	16.64	16.58	16.14	15.74	16.57	14.10	14.49	14.39	14.68	13.85
Fe ₂ O ₃	16.74	13.52	13.22	12.82	14.28	12.62	12.18	11.73	9.38	8.91	8.76	13.31	7.16
Cr ₂ O ₃	30.31	33.84	34.66	36.03	36.70	37.84	38.19	38.82	44.03	45.18	45.55	44.18	47.94
FeO	20.00	17.95	18.01	19.10	17.78	18.25	18.05	17.62	17.25	16.82	17.32	9.04	16.52
MnO	0.37	0.36	0.36	0.39	0.40	0.41	0.38	0.37	0.39	0.41	0.46	0.37	0.44
MgO	11.62	12.35	12.66	11.97	12.34	12.12	11.95	12.38	11.30	11.90	11.29	16.73	11.72
Total	98.70	99.41	100.59	100.37	100.94	100.40	99.38	100.21	98.21	99.47	99.28	99.98	99.00

Structure formulae on the basis of O=32

Ti	0.936	0.588	0.589	0.654	0.543	0.577	0.559	0.519	0.347	0.341	0.295	0.312	0.268
Al	4.558	5.475	5.476	4.985	4.929	4.836	4.771	4.953	4.360	4.405	4.401	4.302	4.242
Fe ³⁺	3.287	2.581	2.491	2.452	2.711	2.414	2.357	2.239	1.852	1.729	1.710	2.490	1.400
Cr	6.253	6.788	6.863	7.240	7.319	7.606	7.764	7.784	9.132	9.214	9.345	8.685	9.849
Fe ²⁺	4.380	3.809	3.772	4.059	3.751	3.880	3.882	3.737	3.784	3.628	3.758	1.880	3.590
Mn	0.082	0.077	0.076	0.084	0.085	0.088	0.083	0.079	0.087	0.089	0.101	0.078	0.097
Mg	4.520	4.671	4.726	4.535	4.640	4.593	4.581	4.681	4.419	4.576	4.367	6.201	4.540
Total	24.02	23.99	23.99	24.01	23.98	23.99	24.00	23.99	23.98	23.98	23.98	23.95	23.99
Cr	57.8	55.4	55.6	58.7	59.7	61.1	62.0	61.1	67.7	67.7	68.0	66.9	69.9
Cr+Al													
Mg×100	50.8	55.08	55.61	52.77	55.30	54.21	54.13	55.61	53.87	55.78	53.75	76.73	55.84
Mg+Fe													

*: Chromian spinels enclosed in or protruded from olivine.

**: Chromian spinels in groundmass.

Fig. 2. Ti vs Cr+Al relation of chromian spinels. The solid line extending from Ti=5.5 to Cr+Al=16 represent the Ti contents on the basis of O=32 in chrome spinels where no magnetite is contained as solid solution.

Fig. 3. Al : Cr : Fe³⁺ relation of chromian spinels. Symbols are the same as those in Fig. 2.

今回分析した嶺岡帯、ピクライト玄武岩のスピネルでは、 $O=32$ とした時、 $Ti < 1.0$ 、 $Cr + Al = 10.8 \sim 14.1$ で $Cr + Al$ が増加するとともに、 Ti はほぼ連続的に減少する。

比較のために示した Hawaii, Kilauea Iki (1959) のソレイト質玄武岩の liquidus chromite (EVANS and WRIGHT, 1972) は嶺岡帯のものに極めて似ており、ほとんどその組成範囲内にある。

Snake River Plain のソレイト玄武岩のクロムスピネルは、 $Cr + Al = 6.0 \sim 8.8$ 、 $Ti = 3.1 \sim 1.6$ で、その組成は連続的な変化を示す (THOMPSON, 1973)。

嶺岡帯のクロムスピネルと Snake River Plain のそれとの間では、 $Cr + Al = 8.8 \sim 10.8$ の部分に相当する組成が知られていない。月試料においても、 $Cr + Al = 8.0 \sim 9.5$ に相当する組成はわずかしは見出されていない。

北関東山地の単斜輝石かんらん岩に含まれる累帯構造の著しいクロマイトには、たまたま、この中間の組成を持った部分があり興味深い (田崎・猪俣, 1974)。

第2図にプロットした嶺岡帯のピクライト玄武岩を含む各地の玄武岩類のクロムスピネル組成を月試料と比較した時、等量のチタンに対する $Al + Cr$ の値が前者において低いことを、その特徴として挙げる事ができる。

このウルボスピネル—クロマイト固溶体からの距離は、玄武岩類のクロムスピネルに含まれている Fe^{3+} の量、すなわちマグネタイト分子の固溶量の多少に対応している。

第3図にクロムスピネルの Cr 、 Al 、 Fe^{3+} の関係を示した。この図によってクロマイト、スピネルそしてマグネタイトの量比を便宜的に表現できる。

Snake River Plain のクロムスピネルは、嶺岡帯のものに比較してマグネタイトの割合が高く、Kilauea Iki のクロムスピネルが嶺岡帯のものと極めて類似した組成であることは、この図においても示される。北関東山地の累帯クロムスピネルでは、辺縁部に急激にマグネタイト分子の増加することが示されている。

いわゆるアルプス型といわれる超苦鉄質岩類に含まれるクロムスピネルないしクロマイトのチタン含量は、しばしば無視されるためか、公表されている分析値は多くない。その結果によれば、チタンはほとんど含有されないか、あってもごく微量である (MILLER, 1953; STOLLE, 1958; 北原, 1962; 香場, 1963; GREEN, 1964; IRVINE, 1967; JACKSON, 1969, 田崎・飯泉他, 1975)。Twin Sister, Dun Mountain, Red Hill などのかんらん岩体から TiO_2 を $0.8 \sim 1.6\%$ 含むクロムスピネルが報告されているのは、例外的といえるであろう (ROSS *et al.*, 1954; CHALLIS, 1965)。

クロムスピネルがチタンを含む原因について、流体との反応によってチタンが富化された場合 (CAMERON and GLOVER, 1973)と晶出段階ですでにチタンに富んでいたと推定される場合とがある (HENDERSON and SUDDABY, 1971; EVANS and WRIGHT, 1972; THOMPSON, 1973)。

嶺岡帯のピクライト玄武岩では、すでに述べたように、半ば蛇紋石化したカンラン石中のクロムスピネルのチタン量が石基の急冷チタン輝石粒間のものより高い。したがってカンラン石と同時に、それに先立って晶出したクロムスピネルが晶出時、すでにチタンに富んでいたとみなせるであろう。

このような噴出岩型のクロムスピネルと、かんらん岩

Fig. 4. Ti vs $\text{Fe}^{3+} \times 100 / (\text{Al} + \text{Cr} + \text{Fe}^{3+})$ relation of chromian spinels.

あるいは蛇紋岩侵入岩体のクロムスピネルとの化学組成の差異は、チタン含量の外に、3価イオンのなかで、 Fe^{3+} の占める割合が著しく異なる点にある。

いま産状を異にするクロムスピネルの $\text{Fe}^{3+} \times 100 / (\text{Cr} + \text{Al} + \text{Fe}^{3+})$ の値を採って比較すると、嶺岡帯, Snake River Plain, Kilauea Iki などの玄武岩質噴出岩で 10~40, Muskox, Bushveld などの層状分化岩体では <20, かんらん岩や蛇紋岩侵入体では <10 となり、後者においてはアルミニウムクロマイトと言えるものが大部分である (北原, 1962; 香場, 1963; IRVINE, 1967)。

この噴出岩型のクロムスピネルで、二次的なマグネタイト化を受けない限り、チタン量と $\text{Fe}^{3+} \times 100 / (\text{Cr} + \text{Al} + \text{Fe}^{3+})$ とは正の相関関係にある (第4図)。このことは、玄武岩質噴出岩起源のスピネルでチタノマグネタイトの固溶量が多いこと、したがってクロムスピネル中のチタン量の多少は、チタノマグネタイトの固溶量によって決まることを示している。

CAMERON and GLOVER (1973) は、東部 Bushveld complex の交代性ペグマタイトから、チタニウムクロマイトとクロミアンチタノマグネタイトの間の連続固溶体を示唆する一連の組成のスピネルを見出しており、玄武岩質噴出岩源のクロムスピネルにおいても、この固溶領域はひろいことが予想される。

Kilauea Iki のクロムスピネルのチタン量について EVANS and WRIGHT (1972) は、マグマ中のチタン濃度が相対的に高いためであろうと推定している。

今回分析したピクライト玄武岩の全岩化学組成で TiO_2 は 1.4%, 石基部で 2.5~3%, 急冷相チタン輝石では、3~4% である (田崎, 1974)。Snake River Plain, ソレアイト玄武岩の TiO_2 は全岩で 3.2%, グラス部分で 4.0% である (TILLEY and THOMPSON, 1970)。

常圧における Akermanite-diopside-nepheline に 10~20% の $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ を加えた系 (YAGI and ONUMA, 1969) および $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ -diopside- SiO_2 系 (GUPTA et al, 1973) の実験結果から、スピネルとカンラン石の初相域の境界は、diopside-nepheline あるいは diopside- $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ を結ぶ線にきわめて近くかつ diopside 寄りに位置することが知られている。これらの結果は、 TiO_2 を含むスピネルが晶出する訳ではないので直接に対応させて考えることはできない。しかし玄武岩ないしピクライト玄武岩質のマグマ中に数%の TiO_2 が存在すれば、チタンを含むスピネルが、カンラン石と同時に、それに先立って晶出することは、十分、予想される。

また、ソレアイト玄武岩マグマにおいて、マグマ中の Cr 含量がわずかに増加するだけで、 $\log f_{\text{O}_2}$ -温度図に

においてクロムスピネルの液相線が高温・低 f_{O_2} 側に著しく広がることや、 f_{O_2} が低くなると、晶出するスピネルのCr含量が急激に増すが、実験的に知られている(HILL and ROEDER, 1974).

この図において、カンラン石+液の液相線は、玄武岩の組成に依存するから、MgOが25%以上含有されるピクライト玄武岩では、著しく高温側に移る。またスピネル+液の液相線は、 Cr_2O_3 が0.3%（無水平平均）も含有されれば、ソレイト玄武岩類の場合よりも低 f_{O_2} 側に広がると思われる。

筆者がこのピクライト玄武岩について行った予備的な熔融実験の結果では、石基は、1190°~1200°Cの間で完全に熔融し、カンラン石+スピネル+ガラスの組合わせとなる。

また、 $\log f_{O_2} > -7.5$ のとき、カンラン石中に鉄酸化物が析出し、 $\log f_{O_2} \leq -10.5$ では、カンラン石が天然のものよりFa成分にとんでくる。これらの結果とHILL and ROEDER (1974)の実験結果とをあわせ考えると、嶺岡帯、ピクライト玄武岩の、少なくとも石基部のスピネルの生成条件は、温度が $1100^\circ < T < 1200^\circ C$ 、酸素のフュガシティーが、 $-10.5 < \log f_{O_2} < -7.5$ といった範囲であろう。

北関東山地、単斜輝石かんらん岩の累帯構造をもつクロムスピネルは、 Al_2O_3 が少なく、 Fe_2O_3 がおおく算出される噴出岩型のクロムスピネルで(田崎・猪俣, 1974)、同様のスピネルは、愛知県、雨生山地域のかんらん岩からも見出されている(猪俣, 私信)。

このようなクロムスピネルは御荷鉢帯の同じような産状をしめすかんらん岩類にひろく見出されることが期待される。

謝 辞

本研究をすすめるにあたり、岡山大学温泉研究所の麻田斉技官に薄片の作製および技術的援助をいただき、山浦裕子氏には、図表の作製を手伝っていただいた。また福井裕美氏には、岩石の化学分析をしていただいた。

以上の方々にあつくお礼申上げる。東京教育大学の猪俣道也氏からは貴重な試料の提供をうけ、有益な助言をうけたことを記して感謝申上げる。最後に本研究をすすめることができたのは、兼平慶一郎氏をはじめとする千葉大学地学教室関係者の本地域に関する詳細な地質調査が基礎となっていることを記して敬意を表する。

文 献

- AGRELL, S. O., BOYD, T. E., CAMERON, E. N., DENCE, M. R., DOUGLAS, J. A., HAGGERTY, S. E., JAMES, O. B., KEIL, K., PECKETT, A., PRINZ, M., and TRAIL, R. J. (1970), Titanian chromite, aluminian chromite and chromian ulvöspinel from Apollo II rocks. *Geochim. Cosmochim. Acta*, supplement. I.
- 番場猛夫(1963), 本邦クロム鉱床の成因的研究. 地質調査所報告, No. 200.
- BENCE, A. E. and ALBEE, A. L. (1968), Empirical correction factors for the electron microanalysis of silicate and oxides. *Jour. Geol.*, vol. 76, p. 382—403.
- CHALLIS, G. A. (1965), The origin of New Zealand ultramafic intrusions. *Jour. Petrol.*, vol. 6, p. 322—364.
- CAMERON, E. N. and GLOVER, E. D. (1973), Unusual titanian chromian spinels from the eastern Bushveld complex. *Amer. Mineral.*, vol. 58, p. 172—188.
- EVANS, B. W. and WRIGHT, T. L. (1972), Composition of liquidus chromite from the 1959 (Kilauea Iki) and 1965 (Makaopih) eruptions of Kilauea volcano, Hawaii. *Amer. Mineral.*, vol. 57, p. 217—230.
- 牛来正夫(1973), 火成作用—その地球史における展開— 共立出版 KK.
- GREEN, D. H. (1964), The petrogenesis of the high-temperature alpine-type peridotite at the Lizard, Cornwall. *Jour. Petrol.*, vol. 5, p. 134—188.
- GUPTA, A. K., ONUMA, K., Yagi, K. and Lidiak, E. G. (1973), Effect of silica concentration on the diopsidic pyroxenes in the system diopside-CaTiAl₂O₆-SiO₂. *Contr. Mineral. and Petrol.*, vol. 41, p. 333—344.
- HAGGERTY, S. E. (1972), Luna 16: An opaque mineral study and a systematic examination of compositional variations of spinels from Mare Fecunditatis. *Earth and Planet. Sci. Letters*, vol. 13, 328—352.
- HAGGERTY, S. F. and MEYER, H. O. E. (1970), Apollo 12 opaque oxides. *Earth and Planet. Sci. Letters*, vol. 9, p. 379—387.
- , BOYD, F. R., BELL, P. M., FINGER, L. W. and BRYAN, W. B. (1970), Opaque minerals and olivine in lavas and breccias from Mare Tranquillitatis. *Geochim. Cosmochim. Acta.*, vol. 34, Suppl. 1, p. 513—538.
- HENDERSON, P. and SUDDABY, P. (1971), The nature and origin of the Rhum layered intrusion. *Contr. Mineral. Petrol.*, vol. 33, p. 21—31.
- HILL, R. and ROEDER, P. (1974), The crystallization of spinel from basaltic liquid as a function of

- oxygen fugacity. *Jour. Geol.*, vol. 82, p. 709—729.
- 市川浩一郎・藤田至則・島津光夫(1970), 日本列島地質構造発達史. 築地書館.
- IRVINE, T. N. (1967), Chromian spinel as a petrogenetic indicator Part 2. Petrologic applications. *Canad. Jour. Earth Sci.*, vol. 4, p. 71—103.
- JACKSON, E. D. (1969), Chemical variation in coexisting chromite and olivine in chromite zones of Stillwater complex. *Econ. Geol., Monograph.* 4, p. 41—71.
- 兼平慶一郎・大木靖衛・真田三郎・谷古宇光治・石川文彦(1968), 房総半島南部鴨川町付近で見出された変成岩岩塊. 地質雑, vol. 74, p. 529—534.
- 河井興三(1957), 千葉県鴨川町付近の地質. 石油技協誌, vol. 22, p. 190—197.
- 北原順一(1962), 鳥取県多里地方産クロム鉄鉱の鉱物学的研究. 岩鉱, vol. 47, p. 167—174.
- 小池 清(1957), 南関東の地質構造発達史. 地球科学, No. 34, p. 1—17.
- NAKAMURA, Y. and KUSHIRO, I. (1970), Compositional relations of coexisting orthopyroxene, pigeonite and augite in a tholeiitic andesite from Hakone volcano. *Contr. Mineral. and Petrol.*, vol. 26, p. 265—275.
- MILLER, R. III. (1953), The Webster-Addie ultramafic ring, Jackson county, North Carolina, and secondary alteration of its chromite. *Amer. Mineral.*, vol. 38, p. 1134—1147.
- REID, J. B. Jr. (1971), Apollo 12 spinels as petrogenetic indicators. *Earth and Planet. Sci. Letters.*, vol. 10, p. 351—356.
- ROSS, C. S., FOSTER, M. D. and MYERS, A. T. (1954) Origin of dunites and of olivine-rich inclusions in basaltic rocks. *Amer. Mineral.*, vol. 39, p. 693—737.
- 鮫島輝彦(1958), 房総半島南部のピクライト玄武岩. 地質雑, vol. 64, p. 683.
- (1970), 房総半島のピクライト玄武岩. 第77年学術大会講演要旨, 日本地質学会, p. 266.
- STOLL, W. C. (1958), Geology and petrology of the Masinic chromite deposits, Zambales, Luzon, Philippine islands. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, vol. 69, p. 419—448.
- 陶山国男・成瀬 洋(1959), 千葉県地質図.
- 田崎耕市(1974), 千葉県鴨川産ピクライトの輝石について. 第81年学術大会講演要旨, 日本地質学会, p. 271.
- ・平野英雄(1973), X線マイクロアナライザー(JXA 5A)の定量精度に関する2, 3の検討. 岡大温研報, No. 42, p. 9—23.
- ・猪俣道也(1974), 北関東山地, 単斜輝石かんらん岩の金雲母とパーガス閃石. 岡大温研報, No. 43, p. 1—13.
- ・飯泉 滋(1975), 神居古潭かんらん岩研究グループ. 神居古潭帯, 岩内岳かんらん岩のカンラン石と輝石. GDP ニュース, No. 3.
- THOMPSON, R. N. (1973), Titanian chromite and chromian titanomagnetite from a Snake River Plain basalt, a terrestrial analogue to lunar spinels. *Amer. Mineral.*, vol. 58, p. 826—830.
- TILLEY, C. E. and THOMPSON, R. N. (1970), Melting and crystallizations of the Snake River basalts of Southern Idaho, USA. *Earth and Planet. Sci. Letters.*, vol. 8, p. 79—92.
- WEIGAND, P. W. and HOLLISTER, L. S. (1973), Basaltic vitrophyre 15597: An undifferentiated melt sample. *Earth and planet. Sci. Letters.*, vol. 19, p. 61—74.
- YAGI, K. and ONUMA, K. (1969), An experimental study on the role of titanium in alkalic basalts in light of the system diopside-akermanite-nepheline-CaTiAl₂O₆. *Amer. Jour. Sci.*, vol. 267—A, p. 509—549.

Chromian Spinel in Picrite Basalt from Mineoka Tectonic Belt, Boso Peninsula, Central Japan

Koichi TAZAKI

(Abstract)

Chromian spinels rich in titanium were found in picrite basalt from the Mineoka tectonic belt, southern Boso Peninsula. The picrite basalt is porphyritic, being abundant in gross olivine phenocrysts up to 6 mm in length and 4 mm in width. The groundmass is composed of the ferny or dendritic titanaugites and Al-rich glass. The spinels occur sporadically in partially serpentinized olivine phenocrysts, or protruding from olivine to groundmass, or among the groundmass titanaugites.

The picrite basalt analyzed is regarded as a rather alkaline ultramafic extrusive rock by its high magnesian and titanium-rich nature. The TiO_2 content of chromian spinels analyzed is 2.9 to 4.8% for those occurring in, or protruding from, partially serpentinized olivine, and is lower than 3% for those in the groundmass. Neither reaction nor embayment relations are observable in olivine. The Ti versus Cr+Al relation of these spinels shows that Ti decreases successively in relation to increase of Cr+Al (Fig. 2).

Chromian spinels in basic extrusive rocks

such as the Kilauea Iki(1959) tholeiitic basalt and the Snake River Plain tholeiitic basalt are characterized by high titanium and high ferric contents which are in common with the chromian spinels in the picrite basalt from the Mineoka tectonic belt.

CAMERON and GLOVER (1973) suggested a solid solution between chromian titanomagnetite and titanian chrome spinel from the eastern Bushveld complex. Such a solid solution relation would exist in the chromian spinels from the basic extrusive rocks since the titanium content is intimately related to the ferric content (Fig. 4).

Experiments on the systems $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ -diopside-nepheline (YAGI and ONUMA, 1969) and $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ -diopside- SiO_2 (GUPTA et al., 1973) at atmospheric pressure revealed that the liquidus boundary of olivine and spinel is located in the neighborhood of diopside. These results suggest that a small amount of titanium in magma will satisfy the crystallization of titanium-bearing spinel under some restricted Po_2 conditions.