($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) - SiO_2 図からみた日本の第三紀花崗岩類

菊 池 丈 治*

(1974 年 12 月 10 日 受理)

I. は じ め に

ARAMAKI *et al.* (1970, 1972) は, それまでに発表された数多くの分析値をもとに, 日本の花崗岩類の化学組成の一般的傾向を明らかにした. その結果によれば日本の花崗岩類は全体としてかなりよいまとまりを示し, 顕著な時代的・地域的差は認められない. 筆者 (1974) は花崗岩類と火山岩類とはまったく異なる性質を示すものかどうかを調べる目的で, 今まであまり花崗岩類には用いられることのなかった ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) - SiO_2 図を用いて, 日本の白亜紀花崗岩類の地域性を調べてみた. その結果, 日本の白亜紀花崗岩類にも第四紀火山岩の地域と似た地域性, つまりアルカリ含量が太平洋側から日本海側に向って増大していく傾向が認められることが判った. ただし白亜紀花崗岩類の地域性は第四紀火山岩の地域性ほど顕著ではなかった.

第三紀にも中新世を中心として白亜紀ほど多量ではないが, 花崗岩類の活動がある. そこで第三紀花崗岩類も白亜紀の花崗岩類と同様に ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) - SiO_2 図に投影してみた. 用いた分析値数は今までに発表されたうち, 礫・捕獲岩・ペグマタイト等を除いた約 240 である. 第三紀花崗岩類, 特に東北地方の第三紀花崗岩類は岩相の変化が著しいと言われている (たとえば折本, 1965) ので, 火山岩相を示すものでも花崗岩類と密接に伴っているものは資料として含めた. ただし変質の著しいものは除いた.

扱った地域は西南日本では屋久島までで, それ以南の諸島は除いた. 東北日本の場合, 北海道まで扱いたかったけれども分析値がなく, いきおい本州に限られてしまった. 西南日本の花崗岩類は全体に比較的大きな岩体をなしているためか, 分析値も全地域にわたってある. ただし分析値があるといっても近畿・四国地方の分析値数は多いとはいえない. それに対し東北日本の花崗岩類は小岩体が多いためか, 分析値は全地域にわたっていない.

また分析値数も少ない. フォッサ・マグナ地域の場合, 南部のものについてはかなり多くの分析値があるけれども北部のものには非常にわずかにしかない.

以上のように現在では分析値が全地域にわたってあるわけでもなく, また分析値数も多くないので, この小論の結果は現時点での総括的意味合いが濃い.

Fig. 1. AFM diagram of Japanese Tertiary granites.

- 1: Field of granites on the Pacific Ocean side of Northeast Japan (granites except those of the Ani Mine, the Miyatamata Mine and the Nibetu district, Akita Pref.).
- 2: Field of granites on the Japan Sea side of Northeast Japan (granites of the Ani Mine, the Miyatamata Mine and the Nibetu district, Akita Pref.).
- 3: Field of granites of the Fossa Magna area.
- 4: Field of granites of the Kinki and the Shikoku districts.
- 5: Field of granites of Southern Kyushu.
- 6: Boundary between the pigeonitic rock series (upper) and the hypersthene rock series (lower) (Kuno, 1954).

* 神奈川県立青少年センター

Fig. 2. Tertiary granites of Northeast Japan

Pacific Ocean side (or eastern part of Northeast Japan).

◇ : Granites of the Ryugamori district, Akita Pref. (ORIMOTO, 1965; FUJIMOTO, 1971)

○ : Granites of the Nissho Mine, the Yoshino Mine and Yuzawa city, Yamagata Pref. (SHIBATA, 1955*; ORIMOTO, 1964b, 1965)

+ : Granites occurred along the Ōkoku line, Waga district, Iwate Pref. (ISHII & UEDA, 1955)

× : " " (OIDE *et al.*, 1966)

△ : Granites of Wakamatu city, Fukushima Pref. (SHIBATA, 1960*)

□ : Granites of Mikuni-mura, Niigata Pref. (SHIBATA, 1960*)

Japan Sea side (or western part of Northeast Japan)

■ : Granites of the Ani Mine, Akita Pref. (ORIMOTO, 1964a)

◆ : Granites of the Nibetu district, west of Mt. Taihei-san, Akita Pref. (KIM, 1969)

▲ : Granites of the Miyatamata Mine, Akita Pref. (ORIMOTO, 1965)

* : Data requoted from SHIBATA (1967)

この小論で用いた 1965 年以前の分析値の多くは柴田編 (1967) に、一部は服部・野沢 (1959) に負った。柴田編 (1967) ならびに服部・野沢 (1959) に載っている文献はこの小論の文献名としては省略した。

この小論をまとめるに当り、神奈川県立青少年センターの板橋義美氏をはじめ科学部の皆様にはいろいろな御援助をいただいた。また神奈川県立博物館の松島義章・今永勇両氏には文献の便宜をはかっていただいた。以上の方々に厚く感謝する。

II. AFM 図からみた日本の第三紀花崗岩類

日本の第三紀花崗岩類がアルカリ岩系、カルクアルカリ岩系、ソレアイト岩系のどの岩系に属するものかを知るために、第三紀花崗岩類の分析値からアルカリ—石灰指数を求め、さらに AFM 図に投影してみた。アルカリ

—石灰指数は東北日本の日本海側の第三紀花崗岩類では 54~58、東北日本の太平洋側・フォッサ・マグナ地域・南九州南部の花崗岩類では 61~67、近畿・四国・南九州北部の花崗岩類では 56~62 となる。AFM 図 (第 1 図) では東北日本のものも、フォッサ・マグナ地域のものも、西南日本のものもほとんど差はなく、カルクアルカリ岩系 (紫蘇輝石質岩系) のほぼ同じ領域に投影される。しかしほんの一部 (山形県日正鉾山附近の花崗岩類) はソレアイト岩系 (ピジョン輝石質岩系) の領域に投影される。

以上のことから判るように日本の第三紀花崗岩類はほとんどカルクアルカリ岩系であるといえる。

Fig. 3. Tertiary granites of the Fossa Magna area

East side of South Fossa Magna

+ : Granites of the Tanzawa Mountains, Kanagawa Pref. (KOJIMA, 1952*; SHIBATA & OKADA, 1955*; SHIBATA, 1960*)

○ : Granites around Kōfu basin, Yamanashi Pref. (SHIBATA & KITAMURA 1944*; SHIBATA & OKADA, 1955*; SHIBATA, 1956*, 1967; FUJIMOTO *et al.*, 1958*; ISHII, 1961*; KATO, 1968)

□ : Granites of Aigi-mura, Nagano Pref. (SHIBATA, 1967)

◇ : Tsuburai granites of the Akaishi Mountains, Yamanashi Pref. (SHIBATA & KOBAYASHI, 1965*; SHIBATA, 1967)

West side of South Fossa Magna

● : Kaikoma granites and Yakejizō granites of the Akaishi Mountains, Yamanashi Pref. (SHIBATA, 1960*, 1962*, 1967; SHIBATA & KOBAYASHI, 1965*)

North Fossa Magna

▲ : Granites of Shimosuwa-machi and Chino city, Nagano Pref. (SHIBATA & OKADA, 1955*; SHIBATA, 1967)

◆ : Granites of Wada-mura and Buseki-mura, Nagano Pref. (HONMA, 1931**)

* : Data requoted from SHIBATA (1967)

** : Data requoted from HATTORI & NOZAWA (1959)

III. (Na₂O+K₂O)—SiO₂ 図からみた日本の第三紀花崗岩類

日本の第三紀花崗岩類は分類上では、前節で明らかのようにほとんどカルクアルカリ岩系に属する。しかしこれから KUNO (1966) の (Na₂O+K₂O)—SiO₂ 図を用いて、日本の第三紀花崗岩類の地域性を検討していく場合、言葉として妥当でないかもしれないが、適当な言葉がみつけれないため、便宜上アルカリ含量の少ない方から低アルカリソレイト系列(またはソレイト系列)の占める領域、高アルカリソレイト系列(または高アルミナ玄武岩系列)の占める領域、アルカリ岩系列の占

める領域という言葉を用いる*。

a. 東北日本

東北日本の第三紀花崗岩類はグリーンタフ地域全体に小岩体として点在する。また白亜紀花崗岩類の活動地域にはほぼ含まれる。ただし活動の規模は白亜紀に比べて非常に小さい。

東北日本の第三紀花崗岩類を(Na₂O+K₂O)—SiO₂ 図に投影したのが第2図である。日本海側に位置する秋田

* たとえば第2図の A の領域を低アルカリソレイト系列の占める領域、B の領域を高アルカリソレイト系列の占める領域、C の領域をアルカリ岩系の占める領域と呼ぶ。

Fig. 4. Tertiary granites of the Kinki and the Shikoku districts.

◆ : Granites of the Kinki district (SAWATARI, 1932*; SHIBATA, 1967)

● : Granites of the Shikoku district (TSUYA, 1935*; SHIBATA *et al.*, 1958*, 1960*; SHIBATA, 1967)

* : Data requoted from SHIBATA (1967)

県阿仁鉾山付近、宮田又鉾山ならびに太平山西方の仁別地域の花崗岩類は、比較的アルカリ含量が多く、KUNO (1966) による高アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。以上の花崗岩類より太平洋側に位置する花崗岩類の多く（秋田県湯沢市、山形県日正鉾山・吉野鉾山、福島県若松市ならびに新潟県魚沼郡三国村の花崗岩類）はアルカリ含量が少なく、低アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。一部（秋田県竜ヶ森地域*と岩手県和賀地帯横黒線沿線の花崗岩類）は低アルカリソレイト系列の占める領域から高アルカリソレイト系列の占める領域までかなり広い領域に投影される。

以上のように東北日本の第三紀花崗岩類にも、分析値が多くなく即断はできないが、太平洋側から日本海側に向ってアルカリ含量が増加していく第四紀火山岩や白亜紀花崗岩類に認められる傾向と同様な傾向が認められそうである。

b. フォッサ・マグナ地域

フォッサ・マグナ地域の第三紀花崗岩類は西南日本外

帯の花崗岩類と似て、規模の大きな岩体が多い。また白亜紀花崗岩類の活動地域とは北部フォッサ・マグナ地域で一部重なる地域もあるが、かなりの地域は重ならない。

フォッサ・マグナ地域の第三紀花崗岩類を $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) - \text{SiO}_2$ 図に投影したのが第3図である。南部フォッサ・マグナ地域の東側に位置する神奈川県丹沢山地と山梨県の甲府盆地周縁の花崗岩類ならびに赤石山地東側の円井花崗岩類の多くはアルカリ含量が少なく、KUNO (1966) による低アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。ただし、甲府盆地周縁の花崗岩類のうち瑞橋昇仙峡型（加藤, 1968）はアルカリ含量が多く高アルカリソレイト系列の占める領域に投影され**、他の花崗岩類と異なる。

円井花崗岩類よりも西側に位置し、糸魚川—静岡構造線に接して産する赤石山地の甲斐駒花崗岩類ならびに焼地蔵花崗岩は東側の花崗岩類よりも全体的にアルカリ含量は多く、高アルカリソレイト系列の占める領域に多

* 藤本 (1971) による新期岩体の資料を用いた。

** 第3図では甲府盆地周縁の花崗岩類は一括して示してあるが、 SiO_2 73wt% 以上で高アルカリソレイト系列の占める領域に入っているものはすべて瑞橋昇仙峡のものである。

Fig. 5. Tertiary granites of Southern Kyushu.

× : Granites of the southern part of Southern Kyushu (TAKIMOTO, 1941*; ŌBA, 1960*, 1963*; NOZAWA & TAKAHASHI, 1960*; SHIBATA *et al.*, 1960*; SHIBATA, 1961*, 1967; KAWACHI, 1961*; YAMAMOTO *et al.*, 1970)

○ : Granites of the northern part of Southern Kyushu (TAKIMOTO, 1941*; SHIBATA, 1958*, 1967; NOZAWA & TAKAHASHI, 1960*; SHIBATA, 1966)

* : Data requoted from SHIBATA (1967)

くは投影される。

以上の花崗岩類より北方に位置する花崗岩類の多く(長野県南佐久郡相木村, 小県郡和田村・武石村の花崗岩類)はほとんど低アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。一部(下諏訪町と茅野市の花崗岩類)は, ひとつずつの分析値しかないが, アルカリ含量が多く, 高アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。

以上のことから判るようにフォッサ・マグナ地域の第三紀花崗岩類にも東北日本の第三紀花崗岩類と同様な傾向が認められそうである。つまり, アルカリ含量が東側(あるいは太平洋側)から西側(あるいは日本海側)に向って増大していくように見える。ただし分析値数が少なく, 特に北部フォッサ・マグナ地域の分析値が少ないので断定はできない。

C. 西南日本

西南日本の第三紀花崗岩類の活動は多く西南日本外帯であり, 白亜紀花崗岩類の活動地域が西南日本内帯だけであったのとはかなり際立った違いである。西南日本内

帯にもわずかではあるが第三紀花崗岩類がある。内帯の花崗岩類の分析値はほとんどないので, ここでは西南日本外帯の第三紀花崗岩類*に限った。

近畿・四国地方の第三紀花崗岩類を(Na₂O+K₂O)—SiO₂図に投影したのが第4図である。近畿・四国地方の第三紀花崗岩類は共にアルカリ含量が多く, KUNO (1966)による高アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。

南九州地方の第三紀花崗岩類を(Na₂O+K₂O)—SiO₂図に投影したのが第5図である。南九州北部(大分県・宮崎県・熊本県および鹿児島県北部の紫尾山地域と甕島)の花崗岩類も近畿・四国地方の第三紀花崗岩類と似てアルカリ含量が多く, ほとんどが高アルカリソレイト系列の占める領域に投影される。ただし熊本県と宮崎県の境に位置する市房山の花崗岩類は, 有効な分析値がたったひとつしかないが, その分析値は低アルカリソレイト系列の占める領域に投影される**。市房山について

* 紀伊半島の熊野酸性岩類も含めた。

** 第5図では南九州北部の花崗岩類として一括してあるが, 低アルカリソレイト系列の占める領域に深く入りこんでいる分析値は市房山のものである。

ては今後の研究に待ちたい。南九州南部（鹿児島県の薩摩半島・大隅半島および屋久島）の花崗岩類は低アルカリソレイト系列の占める領域から高アルカリソレイト系列の占める領域までかなり広い範囲に投影される。南九州南部の第三紀花崗岩類が示すような、アルカリ含量がかなり広い範囲に投影される性質は白亜紀の領家花崗岩類に類似している。

以上のことから判るように西南日本外帯の第三紀花崗岩類にも、東北日本の第三紀花崗岩類と同様にアルカリ含量が太平洋側から日本海側に向って増加していく傾向がうかがえる。第四紀火山岩や白亜紀花崗岩類に認められる傾向と同様な傾向である。特に領家帯の花崗岩類のように低アルカリソレイト系列の占める領域から高アルカリソレイト系列の占める領域にまで広く投影される地域があるという点では白亜紀花崗岩類に類似している。

IV. ま と め

日本の第三紀花崗岩類を $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) - \text{SiO}_2$ 図に投影してみた結果、分析値が多くなり断定はできないが、次のようなことが明らかになった。

東北日本でも、フォッサ・マグナ地域でも、西南日本外帯でも第三紀花崗岩類のアルカリ含量は太平洋側から日本海側に向って増加していく傾向が認められる。このような傾向は第四紀火山岩や白亜紀花崗岩類に認められる傾向と類似している。特に低アルカリソレイト系列の占める領域から高アルカリソレイト系列の占める領域にまで広く投影される地域があるという点では白亜紀花崗岩類に類似している。

文 献

ARAMAKI, S., HIRAYAMA, K. and NOZAWA, T. (1970),

Chemical composition of Japanese granites. Part 1. Variation trends of 400 analyses. *Bull. Earthq. Res. Inst.*, vol. 48, p. 491—505.

——— (1972), Chemical composition of Japanese granites, Part 2. Variation trends and Average composition of 1200 analyses. *Jour. Geol. Soc. Japan*, vol. 77, p. 39—49.

藤本幸雄 (1971), 秋田県竜ヶ森地域の花崗岩質岩体. 岩鉱, vol. 65, p. 16—33.

服部 仁・野沢 保 (1959), 本邦産花崗岩質岩石の化学成分. 217p., 地質調査所.

石井清彦・植田良夫 (1955), 東北日本第三紀花崗岩類 I (和賀地帯横黒線沿線の花崗岩類). 岩鉱, vol. 39, p. 43—58.

加藤祐三 (1968), 山梨県甲府盆地周縁の第三紀花崗岩類について. 岩鉱, vol. 59, p. 21—39.

菊池丈治 (1974), $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) - \text{SiO}_2$ 図からみた日本の白亜紀花崗岩類. 地質雑, vol. 80, p. 251—259.

金 容義 (1969), 秋田県太平山西方仁別地域の第三紀花崗岩. 岩鉱, vol. 62, p. 339—347.

久野 久 (1954), 火山及び火山岩. 255p., 岩波書店, 東京.

KUNO, H. (1966), Lateral variation of basalt magma type across continental margins and island arcs. *Bull. volcanol.*, vol. 29, p. 195—222.

生出慶司・矢島淳吉・折本左千夫・山岸いくま・八島隆一・宇留野勝敏・加藤祐三 (1966), 脊梁地域の第三紀花崗岩類. 地団研専報, p. 35—41.

折本左千夫 (1964a), 秋田県阿仁鉱山付近の第三紀花崗岩質岩類. 岩鉱, vol. 51, p. 200—209.

——— (1964b), 山形県日正鉱山付近の地質, とくに第三紀花崗岩について. 鉱山地質, vol. 14, p. 248—260.

——— (1965), 東北地方“第三紀花崗岩”岩体の 2・3 の特徴について. 岩鉱, vol. 53, p. 55—66.

山本英司・山本温彦・大庭 昇 (1970), 鹿児島県薩摩半島花崗岩質岩類について. 岩鉱, vol. 64, p. 95—103.

**The Japanese Tertiary granitic rock province based
on Kuno's silica-total alkalis variation diagram**

Jōji KIKUCHI

(Abstract)

About 240 published analyses of the Japanese Tertiary granites are selected and plotted on KUNO's silica-total alkalis variation diagram.

In Northeast Japan, zones of low alkalis (with a small amount of rocks of high alkalis type) and high alkalis types of the calc-alkali rock series are arranged from the Pacific Ocean side (or the east) to the Japan Sea side (or the west). In the Fossa Magna area, zones of low alkalis and high alkalis (with a small amount of rocks of low alkalis

type) types of the calc-alkali rock series are roughly arranged from the east to the west. In Southwest Japan, zones of low alkalis+high alkalis and high alkalis types of the calc-alkali rock series are arranged from the Pacific Ocean side (or the south) to the Japan Sea side (or the north).

From the facts described above, the present writer concludes that the Japanese Tertiary granites show fundamentally a zonal arrangement with respect to the alkalis content.