静岡県中部に分布する第三系大井川層群の海底地すべり堆積物と異地性角礫岩塊*

杉 山 雄 一**

Submarine sliding deposits and allochthonous blocks in the Tertiary Ooigawa Group,
Shizuoka Prefecture, Central Japan*

Yūichi SUGIYAMA**

Abstract Some limestone and chert bodies in the Ooigawa Group, which have been interpreted by previous workers as either inliers belonging to the underlying Setogawa Group or hetero-facies of sandstone and mudstone of the Ooigawa Group, have been found to be allochthonous blocks derived from the Setogawa Group. The allochthonous nature of the bodies is clearly indicated by (1) the lack of normal facies change between the bodies and the host deposits surrounding them or the abrupt truncation of lithology and internal fabrics of the bodies at their margins; (2) the difference in deformation styles between the bodies and the surrounding beds; (3) the discordance in stratigraphic attitude between the bodies and the surrounding beds, etc. Besides limestone and chert, green tuffaceous shale, black shale, sandstone and basalt, which are quite similar in lithology to those in the Setogawa Group, are also constituents of some allochthonous blocks. The areal distribution of these allochthons is closely related, both in abundance and lithology, with that of corresponding facies of the Setogawa Group juxtaposed on the northeast and north of the Ooigawa Group. Therefore, the provenance of the allochthonous blocks is ascribed to the Setogawa Group exposed and upheaved close to the depositional basin of the Ooigawa Group. The allochthonous blocks were formed by gravity collapses and transported southwards and southwestwards by gravitational flows into the depositional basin of the Ooigawa Group. These blocks are embedded in the lower and middle formations in the eastern to central part of the Ooigawa Group. On the other hand, in the middle formation in the western area occur conglomerate and sliding deposits characterized by rounded gravels. The sharp contrast seen in the nature of deposits in the middle formation between the western area and the eastern to central area reflects the difference in paleogeographic conditions between the western and the northern to northeastern source areas. In the upper formation, however, there is no recognizable difference in lithology between the western and eastern areas. It is suggested that the pre-existent difference in paleogeographic conditions between the two source areas had disappeared when the upper formation was being deposited. The predominance of sliding deposits in the Ooigawa Group denotes the unstable environment where the group was laid down.

ま え が き

海底地すべり堆積物は、オフィオライトやタービダイトなどととも、地向斜堆積物の主要な構成要素をなしている。海底地すべり堆積物は、それが分布している地

向斜地区やその後背地域における地殻変動を如実に反映した堆積物であり、後背地域をも含めた地向斜や堆積盆地の堆積—造構造運動史を明らかにする上で、重要な鍵を握っている。

最近、九州から紀伊半島にかけての“四万十累層群”に、巨大な異地性岩塊を含む大規模な海底地すべり堆積物が発達していることが明らかになってきている（勘米良・佐々木, 1977; 酒井・勘米良, 1977; 恒石ほか,

1980 年 3 月 29 日 受理

* 日本地質学会第 86 年学術大会（秋田）において一部発表。

** 地質調査所環境地質部, Environmental Geology Department, Geological Survey of Japan, Yatabe-cho, Tsukuba-gun, Ibaraki, 305 Japan.

1977; 勘米良, 1977 など). これらの大規模な海底地すべり堆積物は, 従来, 構造的擾乱の結果などと解釈されていたものである. 一方, 赤石山地の広義の四万十帯(木村, 1979)に分布する“四万十累層群”(三倉・瀬戸川・大井川の3層群)にも, 様々な性状および規模の海底地すべり堆積物が発達している. 中でも, 本地域の“四万十累層群”の最上部を占める大井川層群には, 瀬戸川層群起源の石灰岩やチャート, 緑色凝灰質頁岩などからなる長径数 mm から 500 m 以上にわたる異地性角礫岩塊を含む海底地すべり堆積物が広く分布している. これらの外来角礫岩塊(オリストリス)は, 従来, “正常”堆積層と誤って考えられたため, 大井川層群の主体をなす砂岩—泥岩互層や泥岩の同時異相とか, 背斜の軸部に内座層として露出した現地性の瀬戸川層群と見なされていた(伊田, 1952; 斎藤, 1960; 横山ほか, 1975 など).

本稿では, まず, 大井川層群の層序・地質構造などの一般的事項について述べる. 次に, 外来岩塊の認定の根

拠となった観察事実について記載する. その後に, 外来岩塊の空間的分布, および外来岩塊を構成している岩石の地域的差異と後背地の瀬戸川層群に見られる各種岩層の分布との対応などから, 外来岩塊の供給源と運搬された方向を推定する. 最後に, 大井川層群の堆積史ならびに広義の四万十地向斜(木村, 1979)における意義について, 若干の考察を行う.

地 質 概 説

大井川層群は, Fig. 1 に示したように, 主として大井川下流域の島田市南部から藤枝市南部にかけての地域に分布している. 本層群は, 主として, 海底地すべりによって様々な程度に擾乱された砂岩—泥岩互層, 塊状の砂岩や泥岩, および礫岩からなっており, 瀬戸川層群起源の石灰岩やチャートからなる異地性角礫岩塊を含んでいる. しかし, まえがきでも述べたように, “海底地すべり堆積物”という観点からの本層群の研究は, 従来ほとんどなされておらず, これらの異地性岩塊は, 単に岩相

Fig. 1. Geologic map of the central part of Shizuoka Prefecture.

の変化によると解されたり、内座層として露出した現地性の瀬戸川層群と考えられていた。

大井川層群の組織的な研究は、榎山次郎によって始められた。榎山 (1939) は、大井川下流域に分布する、瀬戸川層群より若く、倉真層群より古い地層を大井川層と命名し、下位の砂岩・泥岩・石灰岩からなる女神層と上位の砂岩—泥岩互層からなる蓬来層とに二分した。また、両層の関係は不整合とされた。榎山 (1939) は、相良地域に孤立して分布する女神層から *Lepidocyclus nipponica* (HANZAWA), *Miogyopsina kotoi* HANZAWA などを発見し、大井川層群を下部中新統とした。その後、大井川層群を研究した伊田 (1952)、徳岡 (1964)、MATSUMOTO (1966) などは、層序・地質構造・時代論などについて、榎山とほぼ同様な見解を示している。一方、斎藤 (1960) は、藤枝市瀬戸付近の大井川層群から *Globigerina ampliapertura* などの有孔虫化石を発見し、本層群を下部漸新統とした。また、大井川北岸地域で、先に挙げた相良地域の女神層の延長部と考えられていた地層は、実はその延長部ではないとして、この地層を新たに瀬戸層と命名するとともに、相良地域の女神層を大井川層群から除外した。最近、UJIE (1975) は、相良地域の女神層から Blow の N. 8 (前期中新世末期) に対比される浮游性有孔虫化石群を発見し、斎藤 (1960) によって同時代の有孔虫化石群が発見されている掛川地域

の三笠層群上部 (榎山の西郷層群に相当) に対比している。

大井川層群の西側および北側には、古第三系の瀬戸川層群が分布している。瀬戸川層群と大井川層群とは断層で接している。瀬戸川層群は、主として砂岩・頁岩・チャート・石灰岩および塩基性火成岩類などからなっており、暁新世～漸新世を指示する有孔虫・コッコリス・貝化石などを産する (水野, 1956; 浅野, 1962; Honjo & MINOURA, 1968; MATSUMOTO, 1966 など)。

一方、大井川層群の東側には、下部中新統の高草山層群が分布している。高草山層群と大井川層群とは、明瞭な接触面は観察されないが、両者の地質構造が不調和的であることから断層で接していると推定される。高草山層群は、主としてアルカリ玄武岩・石英安山岩・粗面岩などからなっており、最上部には凝灰角礫岩・凝灰質砂岩なども見られる。高草山層群の上部は、Blow の N. 8 に相当する浮游性有孔虫化石群を含んでおり*、三笠層群上部および相良地域の女神層に対比されることが考えられる (Table 1)。

また、島田市相賀付近には、三倉層群と瀬戸川層群とを境している笹山構造線に沿って、相賀累層** (MATSUMOTO, 1964) が分布している。本累層は瀬戸川層群と断層で接しており、浅貝—幌内型の貝化石を産するため、上部漸新統ないし最下部中新統とされている (MATSUMOTO, 1964, 1966)。相賀累層は、大井川層群とほぼ同時代の地層と考えられるが、詳細については今後の化石による検討に待たなければならない。

Table 1. Simplified stratigraphy in the central part of Shizuoka Prefecture.

		WEST ← → EAST	
PLIOC.	MIOC.	KAKEGAWA Group	
		SAGARA Group	
MID. MIOC.	UP. MIOC.		FUJIKAWA Group
		MIKASA Group	MEGAMI Formation
LOW. MIOC.			TAKAKUSAYAMA Group
			ŌKA Formation
OLIGOC.			OOIGAWA Group
PALEOC.	-EOC.	SETOGAWA Group	
CRET.		MIKURA Group	

大井川層群は、従来、下位の瀬戸層と上位の蓬来層とに二分され、蓬来層は瀬戸層を不整合に覆うとされてきた。しかし、筆者は次に列記するような観察事実から、大井川層群を瀬戸層と蓬来層との2累層に区分することは、適当ではないと考える。

1) 模式地の瀬戸層とその上位の蓬来層との間には、岩質上の差異は認めがたいこと。すなわち、斎藤 (1960) によって瀬戸層の模式地とされた藤枝市瀬戸付近には、主として蓬来層と同様な砂岩—泥岩互層が発達しており、瀬戸層の最も主要な構成岩とされている泥岩は、局部的に見られるのみであること。

* 有孔虫化石の鑑定は、石油資源開発株式会社の井上洋子氏にいただいた。厚く感謝の意を表する。

** MATSUMOTO (1964, 1966) は、本累層名のローマ字表記を Ōga としているが、本稿では地名の発音に従って、Ōka と表記する (Fig. 1, Table 1)。

Fig. 2. Stratigraphic section of the Ooigawa Group.

1 : sandstone—mudstone alternation and sandstone, 2 : mudstone partly with thin sandstone beds, 3 : conglomerate and slump breccia, 4 : white tuff, 5 : allochthonous blocks derived from the Setogawa Group. A : Yainaba—Kishi, B : Sukemune—Horinouchi—Seto, C : Hana-gura—Otowacho—Shida, D : Okabe—Fujioka.

2) 斎藤によって瀬戸層に相当するとされていた、藤枝市中ノ合から堀之内にかけての地域に分布している泥岩卓越層は、模式地の瀬戸層とは異なる層準（より上位の層準）のものであること。

3) 従来、蓬来層として一括されていた砂岩—泥岩互層が卓越する地層は、上述した中ノ合から堀之内にかけての地域に分布している泥岩卓越層よりも下位の部分と上位の部分とに区分されること。

4) 従来、蓬来層—瀬戸層間の不整合の根拠とされていた、主として花倉から堀之内にかけての地域に発達する礫岩層は、上述した泥岩卓越層と指交関係にあり、両者の間には構造的な差異は認められないこと。

以上のような観察事実から、筆者は大井川層群を岩相により、新たに上・中・下の三つの累層に区分することにした。各累層の最も典型的な岩質層の発達する地域の名称をとって、下位より志太累層、中ノ合累層、野田累層と命名する。これらの3累層は順次、整合に重なっている (Figs. 2, 3)。

(1) 志太累層

志太累層は大井川層群の下部を占め、従来の瀬戸層（模式地域に分布するもの）と蓬来層の一部（先に述べた泥岩卓越層よりも下位の部分）に相当する。本累層は、藤枝市志太付近に模式的に分布しており、主として海底

地すべりによって様々な程度に擾乱された砂岩—泥岩互層からなっている (Fig. 2, Plate I-1)。砂岩層の厚さは、一般に 10~30 cm 程度であり、泥岩層は砂岩層よりも薄いことが多い。厚い塊状の砂岩や泥岩は、砂岩—泥岩互層に比べて分布範囲が狭いが、塊状の砂岩は藤枝市藤枝5丁目から音羽町にかけての地域に、また、厚い泥岩層は藤枝市瀬戸付近および島田市岸付近に分布している。志太累層は後に詳述するように、瀬戸川層群起源の異地性角礫岩塊を含んでいる。異地性角礫岩塊をとりまく、いわゆるマトリックスの部分は、激しいスランプ褶曲をなす砂岩—泥岩互層または泥岩からなっている。本累層の下部（藤枝市瀬戸から志太にかけての地域）と上部（藤枝市堀之内付近）には、数mの厚さの白色凝灰岩が見られる。また、瀬戸付近には、砂質基質をもつ細礫—中礫サイズの礫岩が見られる。志太累層の厚さは 1,000 m を越えるのは確実であり、おそらく 1,500 m に達するものと推定される。

(2) 中ノ合累層

中ノ合累層は大井川層群の中部を占め、従来、瀬戸層に相当すると考えられていた、藤枝市中ノ合付近に典型的に分布する泥岩卓越層と同市花倉の南部に典型的に発達する礫岩層（従来の清水礫岩層）、およびこれらの相当層からなる。本累層の岩相は、西部地域と東部地域とで

Fig. 3. Geologic map of the Oigawa Group.

1 : mainly limestone and chert, 2 : tuff breccia, sandstone and mudstone, 3 : alkali basalt and trachyte, 4 : conglomerate, 5 : mainly alternating beds of sandstone & mudstone, 6 : conglomerate and slump breccia, 7 : mudstone partly with thin sandstone beds, 8 : mainly alternating beds of sandstone & mudstone, 9 : mainly alternating beds of sandstone & mudstone. Numbers on the geologic map refer to number of block or block assemblage as in Table 2.

は異なっている (Fig. 2). 西部の島田市野田から東光寺にかけての地域、藤枝市谷稲葉^{やいなば}の北から花倉にかけての地域などでは、砂岩や砂質泥岩を基質とする礫岩や slump breccia, pebbly mudstone などが広く分布している (Plate I -2). 一方、東部の藤枝市中ノ合から岡部町三輪にかけての地域では、本果層は主として泥岩および泥岩の卓越する砂岩-泥岩互層からなっている。これらの泥岩や泥岩優勢の砂岩-泥岩互層には、海底地すべりによるものと推定されるスランプ褶曲などの乱堆積構造が発達しており、瀬戸川層群起源の異地性角礫岩塊が含まれている。中ノ合果層の厚さは地域によって異なっているが、最も厚いと推定される花倉から岡部にかけての地域では 350 m 程度である。

(3) 野田果層

野田果層は大井川層群の上部を占め、先に挙げた泥岩卓越層および清水礫岩層よりも上位の地層からなる。本果層は主として大井川層群分布地域の西部に当たる島田市野田から藤枝市花倉にかけての地域に分布している (Fig. 3). 野田果層は主として、砂岩の卓越する砂岩-泥岩互層からなり、厚い泥岩および砂岩を伴っている。本果層中には、海底地すべりに起因したと考えられるスランプ褶曲やその他の乱堆積構造 (Plate II -1) が頻繁に観察されるが、瀬戸川層群に由来した異地性の角礫岩塊は含まれていない。花倉付近には 1 層の顕著な礫岩層が見られ、1 km ほど追跡できる。野田果層の厚さは 600 m 以上であると推定される。

地 質 構 造

(1) 褶 曲

大井川層群の地質構造は、Fig. 3 に示したように、東部地域と西部地域とは大きく異なっている。すなわち、地層の走向および褶曲軸面の走向は、藤枝市藤岡から岡部町三輪にかけての東部地域では、ほぼ $N25^{\circ}\sim 60^{\circ}W$ であるのに対して、葉梨川以西の地域や中ノ合付近では、一般に $N35^{\circ}\sim 50^{\circ}E$ となっている。しかし、西部地域では後述するように、局部的に北西-南東方向の軸をもつ褶曲が北東-南西方向の軸をもつ褶曲と共に発達している。

東部地域には、朝比奈川に沿って北西-南東方向の軸をもつ開いた向斜構造が発達している。このような北西方向の軸をもつ褶曲構造は、北東-南西方向の軸をもつ瀬戸川層群の褶曲構造とは明瞭に斜交し、十枚山構造線以西に分布している高草山層群の褶曲構造とはほぼ平行している。

一方、西部地域の北東-南西方向の地質構造を最も強く特徴づけているものは、中ノ合から島田市松葉町まで 10 km 以上にわたって追跡できる向斜とその西側に隣接している背斜である。この向斜は堀之内から、谷稲葉にかけての地域では、二つの向斜とその間の背斜からなる複向斜構造となっている。また、この向斜は野田付近、および堀之内から中ノ合にかけての地域では、開いていて、軸面も直立に近いが、谷稲葉から東光寺にかけての地域では、軸面が北西側に傾斜した閉じた向斜となっている。この向斜および背斜の軸跡は、Fig. 3 に示したように複雑に屈曲している。この向斜の東側の地域には、広範囲にわたって北西に $20^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 傾斜した同斜構造が発達している。しかし、南部の藤枝 5 丁目から志太にかけての地域には、北東-南西方向の軸をもつ波長の短い開いた褶曲構造が見られる。さらに、志太から瀬戸にかけての地域や中ノ合付近には、局部的に地層の走向が北西になったり、北西-南東方向の軸をもつ開いた褶曲が発達しているところがある。このような事実は、大井川層群が 2 度の異なった方向の褶曲作用を被ったことを示唆しているものと考えられるが、その詳細については稿を改めて報告する予定である。

(2) 断 層

大井川層群には、これと瀬戸川層群とを境する断層を除いて、その地質構造を規制するような顕著な断層は見られない。

大井川層群と瀬戸川層群との境界断層は、少なくとも野田から花倉にかけての地域では、断層面が西側に傾斜した逆断層であって、断層面に沿って瀬戸川層群が大井川層群の上に衝上している。明瞭な断層面は、Fig. 3 の Loc. 1 で観察される。Loc. 1 では、断層面は $N36^{\circ}W$ の走向をもち、 53° 南西に傾斜している。上盤の瀬戸川層群は、肉眼的にはほとんど破碎されていない。一方、下盤の大井川層群には、30~40 cm の幅の変形・せん断帯が存在する。断層面に沿って、4~6 cm の厚さの断層粘土が見られる。この大井川層群と瀬戸川層群との境界断層は、Loc. 1 の北方で二つの北東方向のほぼ垂直な正断層によって切られている。また、東光寺付近では、南北方向の断層によっても切られている。この南北方向の断層の明瞭な露頭は観察されないため、断層面の傾斜や断層の性質などは不明であるが、境界断層線のみかけの転位から、断層の西側が東側に対して相対的に上昇していると考えられる。大井川層群と瀬戸川層群との境界断層は、Fig. 3 に示したように、花倉から岡部にかけての地域で著しく屈曲している。これは主として、前

述した北西—南東方向の軸をもつ再褶曲の影響と考えられる。

大井川層群と高草山層群との関係は、両層群の明瞭な接触面が観察されないため判然としない。しかしながら、1) 両層群の分布の境界が直線的であること、2) 接触部そのものは見られないが、露頭規模(数mの範囲)では、より古い大井川層群の中部(中ノ合累層)とより新しい高草山層群の最上部とが接していること、3) 分布の境界をはさんで、大井川層群は南西に傾斜しているのに対して、高草山層群は北東に傾斜していること、などから両層群は断層で接していると推定される。

外来角礫岩塊

(1) 外来岩塊の認定

筆者は以下に述べるような観察事実に基づいて、大井川層群に含まれている石灰岩やチャートなどの“硬質岩”を瀬戸川層群に起源を有する異地性岩塊と認定した。まず、一般的な観察事実として、次のような諸点があげられる。

1) (産状) 石灰岩やチャートなどの“硬質岩”は、その全体、または砂岩—泥岩互層や泥岩との接触部が観察される露頭では、常に角礫(岩塊)状の産状を呈する。石灰岩やチャートなどが砂岩—泥岩互層や泥岩と漸移したり、整合に接している露頭は観察されない。

2) (変形) 石灰岩やチャートなどからなる角礫岩塊と接している(またはそれらを取り囲んでいる)砂岩—泥岩互層や泥岩は、海底地すべりによって著しく擾乱されている。これらの砂岩や泥岩には、半固結ないし未固結の状態で海底地すべりに巻き込まれたことを示す流動状の変形が見られる。軟質で明らかに大井川層群起源と考えられる砂岩や泥岩からなる角礫岩塊にも、同様な流動状の変形が見られる場合がある。一方、石灰岩やチャートなどの“硬質岩”からなる角礫岩塊には、一般に流動状の変形は見られない。

3) (地質構造との関係) 石灰岩やチャートなどの“硬質岩”は、Fig. 3に示したように、大井川層群の下部を占める志太累層と中部を占める中ノ合累層に、背斜構造とは関係なく分布している。1例を挙げると、同図の

Fig. 4. Schematic stratigraphic section of the Setogawa Group, showing lithologic change in the Takisawa and Tentokuji Formations.

1—4: Tentokuji Fm., 1: allochthonous blocks derived mainly from the Takisawa Fm., 2: alternating beds of sandstone & shale, 3: sandstone, 4: conglomerate, 5: slump breccia and pebbly mudstone (both formations), 6—15: Takisawa Fm., 6: andesite and andesitic tuff breccia, 7: dolerite and basalt block, 8: serpentinite, 9: black shale, 10: green tuffaceous shale, 11: alternating beds of sandstone & shale in the Takisawa Fm., 12: basalt lava, 13: biosparite, 14: micritic limestone and calcareous shale, 15: chert, 16: alternating beds of sandstone & shale (Sakasagawa Fm.).

上敷田から中ノ合にかけての地域に分布している“硬質岩”は、全体として北に傾斜した同斜構造をなす砂岩—泥岩互層や泥岩中に含まれている。また、個々の露頭においても、これらの“硬質岩”からなる地層の走向・傾斜は、その周囲の地層の全体的な走向・傾斜とは一致しない場合が多い。

4) (岩相・岩質の対比) “硬質”角礫岩塊は、主として石灰岩(石灰質頁岩を含む)またはチャートからなっているが、そのほかに緑色凝灰質頁岩・黒色頁岩・玄武岩・石英質および長石質砂岩・海緑石砂岩などからなる岩塊も存在する。これらの岩石は、海底地すべりによる擾乱をほとんどうけていない“正常層”の大井川層群には全く見られない。一方、瀬戸川層群の中部を占める滝沢累層は、これらの角礫岩塊を構成している岩石(石英質砂岩を除く)と極めてよく類似した石灰岩(海緑石砂岩を伴う)・チャート・緑色凝灰質頁岩・黒色頁岩・長石質砂岩および玄武岩などから構成されている(Fig. 4)。また、瀬戸川層群の上部を占める天徳寺累層には、大井川層群中の一部の“硬質”角礫岩塊を構成している石英質砂岩とよく類似した砂岩が含まれている。

5) (化石) Fig. 3 の No. 37 および No. 42 の角礫岩塊の一部および No. 39 の角礫岩塊を構成している粗粒な石灰岩(biosparite)は、滝沢累層の上部に発達している biosparite と同様な化石群集*(コケ虫・放散虫・石灰藻・二枚貝および古第三紀型の有孔虫)を含んでいる。

次に、主要な露頭における観察事実について記載する。Fig. 3 の Loc. 3 (中ノ合累層に含まれる)には、Plate II-2に示したように、長径約 15 m の白色砂岩からなるレンズ状の角礫岩塊(Fig. 3 の No. 46)が、著しく擾乱され一部は鱗片状になった泥質基質(円礫を含む)中に含まれている。この白色砂岩は、角張った泥質岩や玄武岩の岩片、およびかなりの程度方解石によって交代された斜長石に富んでいる。大井川層群のいわゆる“正常層”には、このような組成・色調をもった砂岩は見られない。一方、瀬戸川層群の滝沢累層の上部(玄武岩溶岩より上位の部分)には、このような砂岩が局所的に発達している。したがって、この白色砂岩岩塊は滝沢累層に由来したものと考えられる。この露頭の下部には、長径約 70 cm の、滝沢累層上部に由来したと考えられる石灰岩の角礫が、数 cm~50 cm 程度の径の白色砂岩や大井川層群起源の砂岩の角礫、および砂岩やチャートの円礫とともに、泥質基質中に含まれている。Loc. 3に見られる海底地すべり堆積物は、南方に追跡すると次第に砂質基質を

もった“円礫礫岩”に漸移している。Loc. 4では、この礫岩は主として瀬戸川層群起源の砂岩の円礫からなっており、礫岩自体が海底地すべりによって“角礫化”している。

Fig. 3 の Loc. 5(志太累層に含まれる)に見られる No. 30の角礫岩塊の集合体は、長径 25 m の一部砂質の石灰質頁岩岩塊と多数のそれよりも小さな石灰岩の岩塊および岩片からなっている。これらの角礫岩塊や岩片は、大井川層群起源の軟質な砂岩岩塊とともに、著しく擾乱された泥質基質中に雑然と散在している。Plate III-1は、異地性角礫岩塊としての石灰岩の産状を明瞭に示している。これらの石灰岩や石灰質頁岩も、岩質の類似性からみて滝沢累層の上部に起源をもっていると考えられる。

Fig. 3 の Loc. 6 から Loc. 7 (志太累層に含まれる)にかけて、連続露頭として観察される No. 42 の角礫岩塊は、約 100m の厚さの石灰岩、チャートおよび白色凝灰岩をはさむ黒色頁岩からなっており、同様に滝沢累層の上部に由来したものと考えられる。Loc. 6では、この角礫岩塊と基質(泥岩の卓越した砂岩と泥岩との細互層)との接触面が観察される。この接触面は、N15°~30°Wの走向で約 30°北東に傾斜した断層面を持つ断層によって切られているため、基質と角礫岩塊とは、この断層を境として接している部分もある(Plate III-2)。Loc. 7では、この角礫岩塊が海底地すべりを伴った砂岩—泥岩互層に覆われているのが観察される。

藤枝市瀬戸の烏帽子山に露出している石灰質頁岩やチャートなど(Fig. 3 の No. 69 の角礫岩塊に相当する)は、従来、楨山(1963)、楨山ほか(1975)などによって、背斜の軸部に内座層として露出した現地性の瀬戸川層群と考えられていたものである。しかし、筆者の調査では、烏帽子山周辺には、北西—南東方向の軸をもつ波長の短い褶曲を除いて、大規模な背斜構造は観察されなかった。烏帽子山を横切る北西—南東断面では、全体として北西側に緩く傾斜した同斜構造が発達している(Fig. 3 の C-C' 断面)。また、烏帽子山の岩体の下位に当たると考えられる Loc. 8 では、この岩体との接触面は観察されないが、海底地すべりによって著しく擾乱された志太累層の砂岩—泥岩互層が見られる。筆者は以上のような観察事実から、烏帽子山の岩体もまた、異地性の巨大な角礫岩塊またはそれらの集合体であると考えている。

(2) 外来岩塊の分布

瀬戸川層群起源の異地性角礫岩塊は、層序の項でも述べたように、大井川層群の下部を占める志太累層と中部を占める中ノ合累層とに含まれている。これらの外来岩

* これらの化石は、角礫岩塊中のものも、滝沢累層の biosparite 中のものも変形と結晶化が進んでいるため種の同定は困難であった。

塊は、Fig. 3 および Fig. 5 に示したように、特徴的な分布を示している。すなわち、外来岩塊は志太累層、中ノ合累層とを問わず、大井川層群分布域の北東部に最も稠密に分布しており、西～南西に向かって次第にまばらになっている。筆者の調査では、花倉一堀之内一岸を結ぶ線よりも西の地域には、外来岩塊は発見されなかった。

(3) 外来岩塊を構成している岩石の地域的差異

大井川層群に含まれている外来岩塊は、主として石灰

岩(石灰質頁岩を含む)とチャートから構成されているが、そのほかに、黒色頁岩・緑色凝灰質頁岩・海緑石砂岩・玄武岩 および 砂岩 などを含む 岩塊もある (Table 2)。このうち、緑色凝灰質頁岩 からなる(またはこれを含む) 外来岩塊は、Table 2 および Fig. 3 に示したように、その分布が高田付近と潮から三輪にかけての東部地域に限られている。東部地域に分布している角礫岩塊が石灰岩やチャートのほかに、緑色凝灰質頁岩を含んで

Table 2. Variation in lithology of allochthonous blocks in places.

Number of block or block assemblage		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Maximum size of blocks*		B	B	B	A	B	C	B	B	B	B	C	B	C	A	B	C	B	B	B	C	C	B	B	A
Lithology	Limestone**	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○		○	○	○
	Glauconite sandstone		●											●	●									○	○
	Chert	●	●		●	●	●		●	●	●									●		○		○	○
	Black shale				●	●		●																	○
	Green shale			●	●						●						●	●							○
	Sandstone																								○
	Basalt																								○
Area		Miwa										Okabe					Ushio								

Number of block or block assemblage		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Maximum size of blocks		A	A	A	C	B	A	B	B	B	C	C	C	A	A	B	A	B	A	B	C	C	A	A	B
Lithology	Limestone	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●		●		●	○	○	○		●		●	○
	Glauconite sandstone													●				○		○					
	Chert				○		○	○	○	○	●	●	●	●				○		○		●			○
	Black shale				○						●					●				○		●		●	
	Green shale		○	○							●									○	●				
	Sandstone																					●	●		
	Basalt																								
Area		Ushio										Takada—Kamiyabuta										Hanagura			

Number of block or block assemblage		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Maximum size of blocks		A	B	B	B	B	C	C	A	A	B	C	B	B	C	B	A	B	B	C	C	A	B	C
Lithology	Limestone	○	○		○	○	○	○	○	●	●	●			●	○	○	○	○			○	○	○
	Glauconite sandstone						○										○	○				○		
	Chert	○	○	○	○	○		○		●	●						○	○			○	○	○	
	Black shale	○								●			●	●	●						○	○		○
	Green shale																							
	Sandstone	○																				○		
	Basalt										●													
Area		Hanagura—Otowacho															Horinouchi—Seto							

Block sizes : A=>10 m, B=1—10 m, C=<1 m. Open circles : blocks in the Shida Formation, solid circles : blocks in the Nakanogo Formation.

* Only the biggest block in the outcrop is represented here.

** Limestone includes calcareous shale.

いるのに対して、中部地域に分布している角礫岩塊には、石灰岩やチャートのほかに黒色頁岩が多く含まれている。特に、角礫岩塊の分布域の西端に当たる花倉から堀之内にかけての地域では、黒色頁岩からなる角礫岩塊はチャートや石灰岩からなる角礫岩塊よりも卓越している。

(4) 外来岩塊の供給源と運搬された方向

外来岩塊の構成岩石に見られるこのような地域的な差異は、Fig. 5に示した大井川層群に隣接した地域に分布する、瀬戸川層群中の各種岩層の分布(特に、滝沢累層上部のもの)とよく対応している。すなわち、外来角礫岩塊の最も主要な構成岩石であるミクライト質石灰岩(石灰質頁岩を含む)は、大井川層群のほぼ北東方に当たる岡部から桂島にかけての地域に広く分布している。また、*biosparite* は玄武岩溶岩とともに、大井川層群のほぼ北に当たる北方付近に分布している。緑色凝灰質頁岩は岡

部付近と北方付近とに発達している。一方、中ノ合から中山にかけての地域に分布している滝沢累層には、緑色凝灰質頁岩はほとんど見られず、黒色頁岩・チャートおよび頁岩の多い海底地すべり堆積物などが発達している。このような、外来岩塊の岩質と隣接地域の瀬戸川層群の各種岩層の分布との対応関係は、外来岩塊が大井川層群の北東～北側の、しかも近接地域の瀬戸川層群に由来したものであることを示している。

また、前述した外来岩塊の分布、および Fig. 5に示したスランプ褶曲の形態(空間的姿勢)から推定した海底地すべりの方向を考慮すると、これらの角礫岩塊は、北東～北から南西～南に向かって運搬されたものと推定される。

堆 積 史

大井川層群を構成している砂岩-泥岩互層および泥岩

Fig. 5. Lithologic map of the Setogawa Group to the immediate north and west of the Ooigawa Group. Legend as in Fig. 4. Arrows indicate directions of submarine slides inferred from slump folds in the Ooigawa Group.

には、層序の項で述べたように、斜面崩壊によるものと考えられる乱堆積構造があらゆる層準にわたって頻繁に観察される。また、前章で詳述したように、大井川層群には、長径数 mm から 500 m 以上に達する瀬戸川層群起源の異地性角礫岩塊が大量に含まれている。このような事実は、大井川層群が極めて“不安定な”環境の下に堆積したことを示している。おそらく、本層群の堆積期間全般を通じて、後背地の著しい隆起（または堆積盆の沈降）が継続していたものと推定される。また、営力の観点からとらえれば、大井川層群の形成過程においては、重力による浸食作用（すなわち、斜面崩壊）および重力流による運搬・堆積作用が大きな役割をはたしていたと考えられる。

大井川層群の堆積史は、堆積盆に供給された物質の変遷によって、大きく、志太累層堆積期、中ノ合累層堆積期、および野田累層堆積期の三つの時期に分けることができる。次に、それぞれの堆積期における堆積作用と堆積環境の特徴ならびにそれらの時代的変遷について考察する。

(1) 志太累層の堆積期 (Fig. 6-I)

前章で考察した外来岩塊の供給源と運搬された方向などから、志太累層の堆積期には、北東～北側の後背地の隆起が著しかったと推定される。本層中の外来岩塊を含む海底地すべり堆積物は、後背地の前縁部を構成していた瀬戸川層群が、このような隆起によって重力的に崩壊し、未固結～半固結の堆積物とともに南側の堆積盆にす

べり込んで形成されたと考えられる。これらの外来岩塊を含む海底地すべり堆積物には、円礫(特に、大礫サイズ以上のもの)はほとんど含まれていない。したがって、北東～北側の後背地の隆起は、堆積盆の縁辺部に局限されていた可能性が強い。一方、この時期における西側の後背地についての情報は、西部地域における志太累層の分布が限られているため非常に少ない。岸から東光寺にかけての地域に分布している本累層上部は、主として泥岩の卓越した砂岩-泥岩互層からなっており、外来角礫岩塊や厚い礫岩層は見られない。したがって、少なくとも志太累層上部が堆積した頃には、西側の後背地からの碎屑物質の供給は、あまり顕著なものではなかったと推定される。

(2) 中ノ合累層の堆積期 (Fig. 6-II)

東・中部地域に分布している中ノ合累層には、下位の志太累層と同様に外来角礫岩塊が含まれており、当堆積期にも北東～北側の後背地から角礫岩塊が供給されていたと推定される。しかし、本層中の外来岩塊の大きさは、下位の志太累層に含まれている岩塊の大きさに比べて一般に小さい。また、外来岩塊を取り囲んでいる基質の部分も、志太累層の基質部分に比べて、細粒(泥岩が卓越する)になっている。このような事実は、北東～北側の後背地における隆起が時代とともに弱まっていったことを暗示している。一方、西部地域の中ノ合累層は、層序の項で述べたように、礫岩および礫岩が海底地すべりを起こすことによって形成されたと考えられる pebbly

Fig. 6. Diagrammatic cross sections illustrating the successive stages in the depositional history of the Ooi-gawa Group.

mudstone や slump breccia からなっている。これらの堆積物に含まれている円礫の直径は、西へ行くほど大きくなっている。東光寺や谷稲葉の、瀬戸川層群との境界断層に隣接した地域では、直径が1 m を越える“円礫”も含まれている。一方、中ノ合から松葉町に至る向斜の東翼に分布している礫岩や pebbly mudstone は、主として中礫ないし小礫サイズの礫を含んでいる。また、これらの礫岩や pebbly mudstone の厚さは、東～東南方向に向かって次第に薄くなっている。このような事実は、中ノ合累層の堆積期には、西側の後背地からも粗粒な碎屑物が供給されていたことを示している。しかし、これらの礫岩や pebbly mudstone には、花倉付近に分布するもの (No. 46 および No. 47 の岩塊) を除いて、明らかに瀬戸川層群起源と考えられる石灰岩やチャートなどの角礫岩塊は含まれていない。このような事実は、部分的には瀬戸川層群中の各種岩層の分布の違いに起因したものであるかもしれないが、第一義的には、西側の後背地と北東～北側の後背地との古地理上の相違が反映されたものと考えられる。おそらく、北東～北側の後背地では、志太累層の堆積期と同様に、堆積盆に近接した地域が隆起したり、急峻な地形を呈していたのに対して、西側の後背地では、隆起の中心 (または碎屑物の主要な供給源) は堆積盆から離れていて、より広範な地域が隆起していたのであろう。

(3) 野田累層の堆積期 (Fig. 6-III)

大井川層群の最上部を占める野田累層は、主として砂岩の優勢な砂岩一泥岩互層からなっており、外来角礫岩塊を含んでいない。また、下位の中ノ合累層に見られたような西部地域と東・中部地域との岩相上の著しい差異も認められない。これらの事実は、堆積盆の北東～北側の近接後背地域の隆起がさらに弱まり、北東～北側の後背地と西側の後背地との間にそれまで存在していた古地理上の差違が、当堆積期にはほとんどなくなっていたことを示している。

広義の四万十帯の地向斜における 大井川層群の意義

本章では本論文の総括として、主として海底地すべり堆積物の観点から、広義の四万十帯の地向斜または地向斜群における大井川層群の位置づけを試みる。

赤石山地で広義の四万十帯と呼ばれている地帯は、北西側から南東側に向かって、三倉層群、瀬戸川層群および大井川層群の3層群から構成されている。これらの3層群に見られる海底地すべり堆積物は、包含されてい

る角礫 (岩塊) の起源と基質部分の源岩とによって、Table 3 のように分類することができる。Aタイプは、海底地すべり堆積物に含まれている角礫 (岩塊) がその海底地すべり堆積物を包含している“正常層”と同一の層準 (累層) にのみ由来しているものをさす。また、Bタイプは、海底地すべり堆積物に含まれている角礫 (岩塊) がその海底地すべり堆積物を包含している累層より古い、同一堆積盆の他の累層にも由来しているものをさす。さらに、Cタイプは、より古い異なる堆積盆または地向斜に起源を有する角礫 (岩塊) をも含んでいる海底地すべり堆積物をさしている。このうち、Bタイプの海底地すべり堆積物の存在は、堆積盆の表面をなす地層よりも下位の地層が地形的により高い位置にもちあげられ、かつ重力的に崩壊していたことを示している。また、Cタイプの海底地すべり堆積物の存在は、後背地の一部が著しい隆起一崩壊帯となっていたことを示していると考えられる。したがって、BおよびCタイプの海底地すべり堆積物は、いずれも極めて不安定な堆積環境を反映していると言える。また、これらの海底地すべり堆積物は、各々基質部分の源岩によって、便宜的に1 (基質の源岩が泥岩)、2 (基質の源岩が砂岩または砂岩一泥岩互層)、3 (基質の源岩が礫岩) の三つのタイプに区分することができる。しかし、異地性岩塊を含んでいない海底地すべり堆積物では、海底地すべりによる擾乱が弱い場合には、“基質”と“礫”との区別は無意味な場合もある。ここでは、このような海底地すべり堆積物もAタイプに含めて議論を進める。

赤石山地の“四万十累層群”の下部を占める三倉層群には、A-1およびA-2タイプに属する海底地すべり堆積物が頻繁に観察される。しかし、現在までのところ、三倉層群からは、明らかにBタイプまたはCタイプに属するとみなすことができる海底地すべり堆積物は、発見されていない。一方、中部を占める瀬戸川層群には、Aタイプのほかに、少量ではあるが明らかにBタイプに属する海底地すべり堆積物 (B-1 および B-2 タイプ) が含まれている。すなわち、瀬戸川層群の最上部を占める天徳寺累層には、下位の累層 (主として滝沢累層) に由来した石灰岩、チャートおよび玄武岩などからなる角礫岩塊が著しく擾乱された砂岩一頁岩互層、または頁岩が基質として含まれている (Fig. 4)。これらの角礫岩塊は、大きなものでは長径100 m以上に達する。さらに、上部を構成している大井川層群には、前章までに詳しく述べたように、Aタイプのほかに、C-1、C-2 および C-3 タイプに属する大規模な海底地すべり堆積物が広く

Table 3. Classification of the sliding deposits observed in the "Shimanto Supergroup" in the Akaishi Mountains.

	Original materials of matrix	Provenance of blocks		
		Same basin		Older basin
		Same formation	Older formation	
	Mudstone	A-1	B-1	C-1
	Sandstone, Alternating beds of sandstone & mudstone	A-2	B-2	C-2
	Conglomerate	A-3	B-3	C-3

分布している。このような事実は、大局的に見ると、四万十帯地向斜区の堆積盆が時代とともに縮小したか、または、堆積盆の中心が南東側に移動したのに伴って、地向斜区内部における“自食性”の堆積作用が次第に盛んになっていったことを暗示している。

以上に述べたことをまとめると、大井川層群に広く分布している瀬戸川層群起源の角礫岩塊を含む海底地すべり堆積物は、広義の四万十帯地向斜区の堆積盆の縮小化、または南東側への移動に伴う地向斜区内部における激しい自食性堆積作用の一つの現れと考えることができる。

ま と め

本論文のまとめとして、次のことが指摘される

1. 静岡県中部地域に分布する第三系大井川層群は、本論文によって、新たに、下位より、志太累層・中ノ合累層・野田累層に区分された。

2. 大井川層群には、従来、同層群の砂岩一泥岩互層の同時異相とか、背斜の軸部に内座層として露出した現地性の瀬戸川層群とみなされていた石灰岩やチャートなどの“硬質岩”が存在する。これらの“硬質岩”は、その周囲に分布する砂岩一泥岩互層や泥岩をも含めた産状観察の結果、異地性の角礫岩塊であることが確かめられた。

3. 大井川層群に含まれているこれらの異地性角礫岩塊に関して、次のようなことが明らかになった。1) 異地性岩塊を構成している各種岩石（石灰岩・チャート・頁岩など）は、瀬戸川層群に含まれている同種の岩石と極

めてよく類似していること、2) 同岩塊の構成岩石種に見られる地域的な差異は、大井川層群に近接した地域に分布している瀬戸川層群に見られる各種岩層の分布と対応していること、3) 同岩塊は、大井川層群分布域の北東部に最も稠密に分布しており、南西～西に向かって次第にまばらになっていること。

4. 3. で述べたような観察事実から、大井川層群に含まれている異地性の角礫岩塊は、同層群の堆積盆の北東～北側の、しかも、それに近接した地域に露出していた瀬戸川層群からもたらされたものと考えられる。

5. 大井川層群の堆積史は、堆積盆に供給された物質の変遷によって、大きく次の三つの時期に分けることができる。1) 北東～北側の後背地から、角礫岩塊が供給され、西側の後背地からの碎屑物の供給は、あまり顕著ではなかったと推定される時期（志太累層堆積期）、2) 北東～北側の後背地からは、引き続き角礫岩塊が供給され、一方、西側の後背地からは主として円礫が供給された時期（中ノ合累層堆積期）、3) 北東～北側の後背地からの角礫岩塊の供給がとだえ、西側の後背地に由来する碎屑物も細粒（主として砂・泥サイズ）となった時期（野田累層堆積期）。

6. 大井川層群に広く分布している瀬戸川層群起源の角礫岩塊を含む海底地すべり堆積物は、広義の四万十帯地向斜区の堆積盆の縮小化、または南東側への移動に伴う地向斜区内部における自食性堆積作用の一つの現れと考えることができる。

謝辞 本論文は、主として筆者が東京大学大学院在学中に行った研究と地質調査所において5万分の1地質図「静岡」の作成のために行った研究の一部をまとめたものである。この一連の研究に際し、終始御指導下さった東京大学理学部の木村敏雄教授、同地震研究所の恒石幸正博士、地質調査所の垣見俊弘地震地質課長、および名古屋大学理学部の吉田鎮男助教授に心から感謝の意を表す。また、筆者が赤石山地の広義の四万十帯の研究を始めるに当たって、大井川層群の研究の重要性を指摘して下さった新潟大学の藤田至則教授と北海道立地下資源調査所の和田信彦氏にも厚く感謝の意を表す。さらに、野外と室内とにおいて、有益な助言と討論をして下さった地質調査所の下川浩一氏と佃栄吉氏に心から御礼を申し上げる。

文 献

- 浅野 清, 1962: 有孔虫化石群からみた日本の古第三系。東北大理地質古生物邦文報告, no. 57. 32 p.
HONJO, J. and MINOURA, N., 1968: *Discoaster bar-*

- badiensis* TAN SIN HOK and the geologic age of the Setogawa Group. *Proc. Japan Acad.*, **44**, 165—169.
- 伊田一善, 1952: 静岡県藤枝町天然ガス地質調査報告. 地調月報, **3**, 169—174.
- 勘米良亀齡, 1977: 地向斜堆積物におけるオリストストロームとその認定. 地団研専報, no. 20, 145—159.
- ・佐々木正巳, 1977: 四万十帯都井崎近傍のオリストストローム. 日本地質学会第 84 年学術大会講演要旨, 163.
- 木村敏雄, 1979: 日本列島—その形成に至るまで—[Ⅱ・上]. 578 p., 古今書院, 東京.
- 槇山次郎, 1939: 大井川層の石灰岩と *Lepidocyclina*. 地質雑, **46**, 243—246.
- , 1963: 5 万分の 1 地質図「掛川」, 同説明書. 30 p., 地質調査所.
- ・森下 晶・糸魚川淳二, 1975: 日本地方地質誌「中部地方」(改訂版). 451 p., 朝倉書店, 東京.
- MATSUMOTO, E., 1964: The Asagai-Poronaian molluscs from Shizuoka Prefecture, Central Japan. *Mem. Coll. Sci., Kyoto Univ.*, [B], **31**, (2), 95—112.
- , 1966: Geology of the Paleogene and lower Neogene formations in the lower course of River Ooigawa, Shizuoka Prefecture, Central Japan. *Ibid.*, **33**, (2), 115—133.
- 水野篤行, 1956: 貝化石による九州北西部古第三系の分帯 (予報) 一本邦古第三系の対比論のために. 地調月報, **7**, 261—270.
- 斎藤常正, 1960: 静岡県島田・掛川市付近の第三系とその浮游性有孔虫化石群. 東北大理地質古生物 邦文報告, no. 51. 45 p.
- 酒井治孝・勘米良亀齡, 1977: オリストリス四十寺山層について. 日本地質学会第 84 年学術大会講演要旨, 161.
- 徳岡隆夫, 1964: 静岡県下の瀬戸川層群, 大井川層群についての概説. 地質雑, **70**, 1—11.
- 恒石幸正・吉田鎮男・木村敏雄, 1977: 高知県中村市付近における四万十層群と中村層群との関係. 日本地質学会第 84 年学術大会講演要旨, 124.
- Ujré, H., 1975: An Early Miocene planktonic foraminiferal fauna from the Megami Formation, Shizuoka Prefecture. *Bull. Natn. Sci. Mus.*, [C], **1**, (3), 83—92.

Explanation of Plates

Plate I.

- 1: Slumped alternating beds of sandstone and mudstone in the Shida Formation near Otowacho.
- 2: Slump breccia in the Nakanogo Formation at Loc. 2, Yainaba.

Plate II.

- 1: Severely disturbed alternating beds of sandstone and mudstone in the Noda Formation near Noda.
- 2: An allochthonous sandstone block in the Nakanogo Formation at Loc. 3. The block is about 15 m across.

Plate III.

- 1: Allochthonous limestone blocks and clasts in the Shida Formation at Loc. 5.
- 2: A large allochthonous block (block 42 in Fig. 3) in the Shida Formation at Loc. 6.
A: allochthonous block, M: matrix part composed of intensely folded thinly alternating beds of sandstone and mudstone, C: contact surface, F: fault cutting the contact surface.