老人の細胞

<司会> 田内 久

1. 序—細胞レベルでの一般的特徴

田内 久

「老人の細胞」という題目でのシンポジウムは本学会としては最初の企画であり、演者はじめ参会の会員各位の協力によって実りのあるシンポジウムとしていただくようお願いしたい。

細胞の老化という場合、動植物の間の差はいうに及ばず、単細胞生物からヒトを含む多細胞生物まで多種多様であって老化とよばれる変化は必ずしも一様ではない。

このシンポジウムでは各種の性格の細胞から成り立っているヒトの細胞を中心としてながめてみたい。

ヒトの成体には生後は分裂増殖しないと考えられる細胞 (stable cell populations, fixed postmitotics), たえず急速に老化死滅するとともに新しく再生増殖しつつある細胞 (renewing cell populations, intermitotics), およびそれらの中間の細胞 (growing cell populations, reverting postmitotics) などがあるが、ヒトでは若い個体にも老化して死滅する細胞があるとともに老個体でも新しく分裂して出来る若い細胞がみられるわけである。

ここでは細胞の老化というよりも、むしろヒトの老個体の細胞レベルでの特徴を中心として考えてみようというわけである。

ヒトを含む高等な多細胞動物では各種実質細胞のほか、脈管系を含む間質が重要な構成成分となっており、これらの加齢に伴う変化もみのがすことは出来ない。またこれら間質の変化による実質細胞への影響も重要であろう。いずれにしてもここでは先ず実質細胞に焦点をあててみることにしたい。

私どもはヒトを含めた老個体における老性変化の特徴として細胞数の加齢に伴う減数による臓器組織の萎縮を第一にあげ、老化の研究の中心の一つはこの加齢に伴う

細胞数の減少の成因、機構などの究明であるとした。

加齢に伴う細胞数の減少は現在ほとんど常識的な事実としてみとめられているようであるが、その科学的確認は必ずしも古いことではない。

神経細胞については若干の少数の報告は別として比較的古くから確認されているようであるが一般実質組織細胞の老性減数については Shock ら (1953¹⁾, 1961²⁾) の生化学的検索成績からの推定と私どもの (1953³⁾, 1954⁴⁾, 1961⁵⁾) 形態学的、微計測的な確認の報告などから始まっているようである。

このような細胞数の減少は個々細胞の老化死滅消失とその促進および再生過程の低下などによるわけである。生後分裂しないと考えられる fixed postmitotics に属する神経細胞を始めとして生体内のすべての細胞の生理的老化死滅消失の機構は勿論のこと、reverting postmitotics や intermitotics に属する細胞の生理的再生増殖過程の減弱の機構などの解明は重要である。

一般組織細胞の立場からはこれら両者の検討がせまられているが、先ず現象論としてこのような細胞数の減少の様相を適確に把握することが必要であろう。

老個体ではこのような細胞数の減少が重要な特徴であるが、老個体の臓器組織としての機能と細胞の減数との関連がどのようになっているのか、すなわち細胞の減数がそのまま臓器組織の機能の低下と直結しているのか問題である。

私どもの成績からみると加齢に伴う細胞数の減少の様相は臓器組織によって種々であるが一般的には減数の時期、程度など細胞の分化の度と関連している。また老個体の細胞の容積も萎縮しているもの、肥大しているものなど区々であるが一般的には生命維持に直結している組織の細胞では萎縮よりもむしろ肥大の傾向をみる場合が

多い^{4) 5) 6)}。

私どもは老個体における一般の生命維持に重要な組織の細胞はその老性減数の代償として機能の亢進を強制されておりそのために予備力、ひいては抵抗力の低下を伴い各種のストレスによって容易に死滅消失するというわけで、老個体の重要組織では一種の悪循環の状態にある点をしばしば報告している⁶⁾。また細胞レベルばかりでなく subcellular のレベルにおいても同様に考慮されるべきような所見をみている。

すなわち細胞内小器官における変化についても細胞の種類によって必ずしも同様ではないが、たとえば肝細胞のミトコンドリアなどでは加齢に伴う減数と増容がみられている⁷⁾。以上のような点については私の協同研究者である佐藤秩子博士の講演内容に譲りたい。

また老個体の細胞では細胞質のほかに核においてもいろいろと特徴的な所見がみられる。私どもは加齢に伴う2核化や、核容積の増加すなわち核のDNA増加ないし polyploid 化をみ、両者の消長の様相にも興味のある年齢差をみている⁸⁾がこれらの様相も細胞の種類によって区々である⁶⁾。

核の動向は細胞の分裂増殖と密接に関連している。私どもも老個体における各種再生増殖過程の減弱をみとめているが、このような老個体における再生増殖過程の減弱と上にあげた核の形態学的な特徴との間には、いわゆる加齢にともなう分裂抑制機構の問題とともに興味ある関連がみられているが、このような点については藤田哲也教授に最近のご研究の成果をもとにした考察をお願いしたい。

一方ヒトはじめ多細胞生物において特殊に分化して特有な機能をもった若干の組織細胞についてはそれぞれの専門の立場からの検索結果の報告にまきたい。

すなわち、第1に神経・筋細胞については朝長正徳博士に、皮膚組織細胞については山口武雄博士に、また免疫担当細胞については広川勝昱博士にそれぞれ老個体におけるそれぞれの細胞の特徴の解析とそれらの成因、機序などについての検討成績をいただきたい。

以上ヒトを中心とした老個体における細胞についての各方面からの検討成果に対して、基礎生物学の立場から江上信雄教授に、また培養細胞の立場から山田正篤教授に有益な示唆をいただいて現在の段階における老人の細胞における特徴の理解と今後のこの方面の研究の進展への足がかりになれば幸と思う次第である。

文 献

- 1) Shock, N.W. et al.: J. Geront., 8: 388, 1953.
- 2) Shock, N.W.: Ann. Rev. Physiol., 23: 97-122, 1961.
- 3) 田内 久, 森川 猛: 日病会誌, 42: 289—290 (1953)
- 4) Tauchi, H. and Morikawa, T.: Nagoya Med. J., 2: 1-12, 1954.
- 5) Tauchi, H.: Nagoya J. Med. Sci., 24: 97-132, 1961.
- 6) 田内 久: 日病会誌, 63: 3—15 (1974)
- 7) Tauchi, H. and Sato, T.: J. Geront., 23: 454-461, 1968.
- 8) Tauchi, H. and Sato, T.: J. Geront., 17: 254-259, 1962.

2. 細胞核を中心として

細胞の分裂増殖と老化

藤田 哲也

はじめに

細胞あるいは組織の老化現象を考えるさいに、細胞の動態的分類を考慮に入れなければならないことを最初に指摘したのは細胞学者の Cowdry¹⁾であった。Cowdry (1942) は、体の中の細胞をその生活史を基礎として分類し、次の4種に大きく分け、老化現象をその各々の細胞種について分析的に考えてみたのである。すなわち、

1. 分裂能をもつ増殖性細胞 (vegetative intermitotics)
2. 分裂しながら分化していく細胞 (differentiating intermitotics)
3. 特別な状態のもとでは増殖しうる分裂完了細胞 (revertant postmitotics), および、
4. 不可逆的に分化し増殖能力を失った分裂完了細胞 (fixed postmitotics).

Cowdry はこの4種の細胞のうちで顕著に老化を示してくるのは後2者に含まれる分裂完了細胞であると考えた。そして intermitotics は第1のものも第2のものも短かい期間の後には分裂を行い更新されるのでそのように“寿命”の短い細胞に老化は起らないとしたのである。この結論の背景には、彼が世代時間を細胞の“寿命 (life span)”とみなし、分裂によって細胞の寿命は振り出しにもどり、細胞はこの短い寿命をいくら繰り返しても堂々めぐりをするだけで老化という現象は進まないだろうという仮説的推論をたてていたことが指摘されよう。ここで細胞を単細胞生物のように考えて、分裂ごとに“寿命”を更新する、と見るのは当時としては極めて斬新な着想であったのみならず、豊富な学識に裏打ちされた彼の議論の展開は大変説得力のあるものであった。従って、その後の細胞レベルでの老化の研究はニューロンや肝細胞や筋細胞など postmitotics に属する細胞に集中され、増殖細胞の老化現象について具体的な研究

はほとんど行われないうまに過ぎてきたのである。

1961年 Hayflick ら²⁾は彼らの有名なヒト2倍体細胞の培養において、増殖細胞には“老化”現象があり一定数の(約50回の)世代を重ねる間に不可逆的に加齢し、その与えられた分裂回数を終了した後は死滅する、という実験事実を呈示した。このデータは、広く信じられてきた Cowdry の postmitotic 老化説に対する強烈なアンチテーゼであり、かつ細胞の“老化”の問題の焦点を一挙に増殖細胞の方に移したといえる程の効果をもっていった。増殖細胞こそ“老化”するのであるという考えが流布し、細胞は増殖しない間にも老化して行くものかどうかが逆に問われる状況も出現してきたのである。

ここで問題を最も crucial な一点に絞るとすれば、<生体内で細胞分裂を繰り返している細胞に“老化”、あるいは広い意味で、加齢現象というものがあるのかどうか>、を問うことになるだろう。Hayflick とその多くの追随者たちは対象を培養器の中のヒト胎児2倍体細胞に限定し、細胞継代50回で“老化”、死滅するというデータをえ、それを一般化して生体内における増殖細胞の老化を推論した。この結果、体内でも増殖細胞は一定回数分裂すれば“老化”し、そのために個体の老化と寿命が一定の年齢に規定されるのであろうという憶測が生れた。しかしこの推論は明かに誤っている。

いま日本人の平均年齢に達した74歳のヒトの消化管粘膜の増殖細胞を考えよう。この年齢になればほとんどの日本人では胃の粘膜が化生性の小腸上皮に変わっているから、化生性、固有腸上皮の別に目くじら立てないとなればここでは小腸粘膜の増殖細胞を考えることにすればよいだろう。この細胞の世代時間は24時間³⁾ないし36時間⁴⁾とされている。だから、今を去る1~1.5日前にはこの細胞を生んだ母細胞が存在していたはずであり、そのまた1~1.5日前にはその母細胞があったはずである。このように、この増殖細胞の系譜を逆に辿っていくと74年にわたって連続と続いてきた増殖細胞の系列があることは明らかである。74年は648, 240時間であるからこ

図1 Polyploidization の分子メカニズム⁶⁾⁷⁾ DNA の二重鎖間に未修復のクロスリンクがいくつか出現すると、この細胞は正常の核分裂を遂行できないで倍数体とならざるをえない。

れを24ないし36時間で割るとその分裂回数は27,010回ないし18,006回と見積れる。つまりこの細胞は既に2万回程度の分裂を経験してきており、もしこの人が100歳以上生きるとすると更に1万回近く分裂することになるのである。消化管上皮と同じく交代組織に属する骨髄や表皮の増殖細胞も同じようなオーダーの分裂を経験してきているはずである。50回というのは培養された胎児細胞の特殊なケースにすぎないと言うほうが正しいだろう。生体内で増殖細胞の加齢が起るのかどうか、起るとすればどのような形で細胞の老化が進行するのか改めて問いたおされなければならないのは、このような理由によるのである。

1961年、Tauchi⁹⁾ はヒトを中心とした広範な細胞老化の研究を総括し、細胞レベルで最も一般的な加齢変化は細胞の老性減数であることを認め、そのさい生命維持に直結している多くの細胞群では核や胞体の容積増大を伴うことを明らかにした。核の倍数体化 (polyploidization) もこれに属する変化である。加齢に伴う倍数体化がどのような機序で生じるのかについて私たちは次のように考えている⁶⁾⁷⁾。すなわち、“DNA の二重鎖間に出現する未修復のクロスリンクが潜在的要因となり (図1)、DNA 合成と (abortive な) 分裂を介して polyploidization が発現する”，と考えるのである。

この考えからすると加齢によって、たとえ量的には組織ごとと異なるとしても、すべての細胞の DNA にはクロスリンクが確率的に出現し、それらの細胞が増殖相に突入すれば必然的に polyploid 化するのが観察されるはずであると予想される。ここで、上に提出しておいた、“生体内で増殖細胞の加齢が起るのかどうか”，という問いに答えるための1つの具体的なアプローチが明かになる。すなわち、生体内の増殖細胞、あるいはそのコンパートメントから直接流出してくる細胞の核 DNA 量を測ることによって倍数体化がどの程度起っているかを定量的に把握し、そこから、この細胞系のなかでどの程度のクロスリンクの集積が進んでいるかを推定すればよい

のである。これが細胞老化を示す1つの molecular indicator になると考えられる。

材料と方法

増殖細胞系としてはヒト、ラット、ハムスターの消化管粘膜細胞を用い、種々の年齢の個体からの塗抹標本作製し Feulgen 染色後⁸⁾、後照射を十分に行い⁹⁾ 蛍光測定法¹⁰⁾によって核 DNA を定量した。増殖細胞系と対比する意味で postmitotic 系に属する肝、心筋細胞の DNA 量を同じくヒト、ラットの各年齢のものについて測定した。また実験的に DNA のクロスリンクを増加させるために、成熟ハムスターに MNNG を50 μ g/ml 加えた飲用水を ad libitum に2週間飲ませ、その胃粘膜を採集して同様に DNA 定量の対象とした。

結果

正常な胃の粘膜上皮細胞を測定すると常に図2a のようなヒストグラムがえられた。ここに示したのはハムスターの幽門粘膜であるがヒトやラットでも同じパターンを示すことがわかった。すなわちこれらは典型的な 2n

図2 胃の粘膜上皮細胞の DNA 量の分布

- a 成熟ハムスター幽門部粘膜全体の塗抹
2c は2倍体細胞 G1 期の DNA 量、4c は G2 期の DNA 量を示す。
- b 生後4週のラットの被蓋上皮のみを塗抹した標本における DNA 量分布
- c 同じく生後1.5年のラットの被蓋上皮における細胞核 DNA 量分布を示す。

図3 ヒト心筋と肝における DNA 量分布

集団であって倍数は全く見られないのである。生後4週の子若ラット(図2b)と1.5年のラット(図2c)の胃の被蓋上皮細胞のみを測定したデータでも、この細胞系は2n量のDNAをもつもののみから成っており倍數体化は全く起っていないことが証明された。これは高齢のヒトで十二指腸のブルンナー氏腺の上皮を測定することによっても確認することができる。ブルンナー氏腺はごく少数のS期細胞を含み half-life 40日で交代する random loss 系の細胞更新をしている¹¹⁾。表1はこの測定結果である。ここでは十二指腸に直接間接の病的変化の及んだ恐れのあるものははぶいてある。33歳から79歳までの測定値のなかで倍數体を思わせるものは全くなく、DNA 合成中と思われる細胞の百分率も年齢による変化を示していない。この細胞系にも老性変化を証明す

表1 ヒト十二指腸腺細胞の DNA 量分布

症例	年齢	性別	測定細胞数	2n-G1	2n-S	≥4n
1.	33	女	822	817(99.39%)	5 (0.61%)	0
2.	64	女	688	685(99.56%)	3 (0.44%)	0
3.	67	男	627	623(99.36%)	4 (0.64%)	0
4.	67	女	628	623(99.20%)	5 (0.80%)	0
5.	70	男	546	543(99.45%)	3 (0.55%)	0
6.	79	男	504	501(99.40%)	3 (0.60%)	0
平均				99.40%	0.60%	

ることができなかつたのである。

消化管上皮の増殖細胞系と対照的に、肝細胞や筋肉細胞では加齢に伴って減数と polyploidization の進行することが知られている¹²⁾¹³⁾。図3a,b はヒト心筋細胞についてのデータ¹³⁾であるが1歳以後68歳まで倍數体化が肝(図3c, d)におけるのと似た形で出現するのが認められる。この他の筋細胞や結合組織細胞においても加齢による倍數体出現が報告されている¹⁴⁾。考えてみると、これらはすべて細胞更新(renewal)の大変遅い組織である。これらの細胞では時とともにDNAクロスリンクが集積し、増殖によって倍數体として表現されるようになるという説明が調和する。

不思議なことに、発生学的に共通の上皮から造りだされる十二指腸粘膜と肝とでは倍數体出現の様子からみればその振舞いは全く違う。同じことは白血球系や赤芽球系の増殖細胞と血管や心臓の細胞についても言えるであろう。この差を説明するのに、発生途上の最終段階の分化の差によって片一方にはクロスリンクが集積するが他方にはこれが起らないかあるいは完全に修復できるようなメカニズムが与えられるという差が生じる、と想像してみることも許されるかもしれない。しかしこれは内容的には前進のない単なる tautology にすぎない。むしろもっとメカニカルな説明として、増殖細胞系にもやはり一定の頻度でDNAにクロスリンクを生じるような変

図4 MNNG 投与2週間のハムスター幽門粘膜細胞のDNA量分布

Polyploidization が顕著である．図2 a のコントロールと比較されたい．

化が起るが、それによって造り出されてくる倍数体細胞は何らかのメカニズムで排除され、正2倍体細胞だけが残るような結果となる、と考えることができる。つまり人工的に胃腸上皮のなかに倍数体細胞を出現させ、それが排除されるかどうか、されるとすればどのようなメカニズムで遂行されるのかを観察すればよいのである。幸いなことに手近かにある発癌剤 MNNG (N-エチル-N'-ニトロ-N-ニトロソグアニジン) をハムスターに水溶液として飲用させると胃の粘膜にだけ急激な倍数体化が起ってくる。これは MNNG が DNA に働いてクロスリンクをつくらせるためであろうと考えられる。しかし今はこれがどんな分子のメカニズムで倍数体を生じるかを論じるのが目的ではなく、ごく微量の MNNG の局所的投与によってともかく胃の粘膜に多数の polyploid (ないし aneuploid) cells が生じる点が重要である。図4は2週間の投与によって生じた polyploid cells の存在を示す DNA 量分布のヒストグラムである。オートラジオグラフィで調べると、各 ploidy で中間の値をとるほとんどの細胞は DNA 合成中であることがわかる。このようになった時点で MNNG の投与を止め、観察を続けていくと既に2週間後には異常細胞は激減し、4週間後には殆んど見られなくなり、8週間後には DNA 量分布のパターンは完全に正常に復するのが見出された。これらの polyploid cells の排除されるメカニズムは2つであった。1つは局所で異常細胞が崩壊する現象で、その多くは、大量の DNA をもつ karyorhexis としてみられ、恐らくその多くのものが mitotic death を起していると考えられるものであった。いま1つは、2週から4週にかけて少数見られた表層における異常細胞の存在が示ところの、上皮のエスカレーター運動による消化管内腔への突き落とし現象である。

消化管の増殖細胞では、1つの世代のうちに、確率的に生じるクロスリンクを偶然持つことになった細胞は次の分裂にさいして倍数体化しようとするさいに mitotic death におちいるか、あるいは倍数体化したうえで2つの排除メカニズムのいずれかによって局所から除かれてしまうのであろうと考えられる。このようにして2倍体細胞の純粋性が半永久的に保たれているのであろう。

考 察

倍数体細胞の出現という指標から調べてみると、活発な増殖細胞をもち比較的速かに細胞交代をしている胃や腸の上皮では、老化現象が殆んど進まないという事実が明かとなった。これは、増殖活性のパラメータである世代時間の長さが、加齢にさいして殆んど変らないで留っており、延長してくるのは老死に近くなってからで、しかもその延び方はごくわずかであるという事実ともよく調和する。ラット胎仔の小腸上皮の世代時間(分裂サイクル1回に要する時間)は13.5時間¹⁵⁾と報告されておりこれは無菌マウス十二指腸上皮の13.6時間¹⁶⁾と殆んど同じ長さである。Thrasher ら¹⁷⁾によると若いマウスの十二指腸上皮の世代時間は13時間であるが生後390日では14時間となり600日では18時間にのびていたという。しかし Lesher¹⁸⁾ は小腸上皮で生後300日から675日まではずっと14.1時間で殆んど変らず老死に近い1050日でやっと15.7時間になったのを見出したという。少なくとも対象を、活発に増殖している細胞に限定するかぎり、消化管でも骨髓でも表皮でも、加齢的变化は殆んどないと考えるのが正しいだろう。それらは個体の死によって終止符を打たれるまで何万回も忠実に分裂サイクルを回り続けるのである。このような活発な増殖と規則正しい細胞交代は、老化(した細胞)を積極的に排除する機構を内在している。これが老性変化を受けない理由であると考えられる。

一方、肝や脳や筋や結合組織など細胞交代が極めて緩やかな組織では、クロスリンクで代表される DNA 障害が個々の細胞の中に現われてもその細胞が排除されないために、結果として長い時間の間に障害が蓄積し、組織は全体として老化してくると考えられる。

おわりに

細胞レベルでの老化現象は、以上に見てきたように、細胞交代の活発な組織と、極めて緩やかな組織とではその

現われ方が大変違っている。したがって老化を研究するときに、この細胞動態的区別をはっきり意識していることが大切であろうと思われる。老化が実際に進行して行くのは後者であり、従って老化そのものを研究するのは後者を対象とすべきであろう。一方、老化の制御ということに目的をおくならば、生体内で実際に老化を排除し、その進行を積極的に予防しているシステムのあることは重要な意味をもっている。従って速かな細胞交代をしている組織の研究は、この意味において今後の老化の研究のなかで重点的に取りあげられなければならない極めて重要な分野であると考えられるのである。

文 献

- 1) Cowdry, E.V.: Ageing of individual cells. Chapter 24. In: Cowdry's Problem of Ageing, pp. 626-663, Williams & Wilkins, Baltimore, 1942.
- 2) Hayflick, L. and Moorehead, P.S.: The serial cultivation of human diploid cell strains. *Exp. Cell Res.*, **25**: 585-621, 1961.
- 3) Lipkin, M., Sherlock, P. and Bell, B.: Cell proliferation kinetics in the gastrointestinal tract of man. *Gastroenterology*, **45**: 721-729, 1963.
- 4) Fujita, S. and Hattori, T.: Cell proliferation, differentiation and migration in the gastric mucosa; A study on a background of carcinogenesis. In: Weisburger, J.H., Farber, E. and Sugimura, T., eds, *Pathophysiology of Carcinogenesis in Digestive Organs*. pp. 21-36, Tokyo Univ. Press, Tokyo, 1977.
- 5) Tauchi, H.: On the fundamental morphology of the senile changes. *Nagoya J. Med. Sci.*, **24**: 97-132, 1961.
- 6) Nakanishi, K. and Fujita, S.: Molecular mechanism of binucleate formation and polyploidization of the hepatocyte. *Cell Structure and Function*, **2**: 261-265 (1977)
- 7) 中西和夫, 藤田哲也: Polyploid cell および二核細胞出現のメカニズム, *医学のあゆみ*, **10**: 621-622 (1977)
- 8) Fujita, S.: DNA cytofluorometry on large and small cell nuclei stained with pararosanilin Feulgen. *Histochemie*, **36**: 193-199, 1973.
- 9) Fujita, S. and Fukuda, M.: Irradiation of specimens by excitation light before and after staining with pararosanilin Feulgen: A new method to reduce non-specific fluorescence in cytofluorometry. *Histochemie*, **40**: 59-67, 1974
- 10) 藤田哲也: 顕微鏡測光法—その理論と実践のポイント—, 浜島義博, 藤田哲也 編, *組織細胞化学の最新技術*, pp. 27-54, 日本組織細胞化学会, 京都, 1977.
- 11) 仁木弘典, 服部隆則, 藤田哲也, 郡大 裕, 川井啓市: 十二指腸粘膜の細胞動態 (I) プルンナー氏腺の細胞動態, *医学のあゆみ*, **97**: 344-346 (1976)
- 12) 田内 久, 佐藤秩子: 老化, 小川・小田・黒住・杉野 編, *細胞学大系*, **5**, pp. 316-354, 朝倉書店, 東京, 1971.
- 13) 中西和夫, 藤田哲也: 加齢に伴う細胞核 DNA の変化, I. 心筋細胞と肝細胞について, *基礎老化研究*, **1**: 48-49 (1977)
- 14) Lindner, J.: Altern des Bindegewebes. In: *Hdb d. allg. Path.*, VI/4, pp. 245-368, Springer, Berlin, 1972.
- 15) Wegener, K., Hollweg, S. and Maurer, W.: Autoradiographische Bestimmung der DNS-verdopplungszeit und anderer Teil-zyklus bei fetalen Ratte. *Z. Zellforsch.*, **63**: 309-326, 1964.
- 16) Leshner, S., Walburg, H.E. and Sacher, G.A.: Generation cycle in the duodenal crypt cells of germ free and conventional mice. *Nature (Lond.)*, **202**: 884-886, 1964.
- 17) Thrasher, J.E. and Greulich, R.C.: The duodenal progenitor population. I. Age related increase in the duration of the cryptal progenitor cycle. *J. exp. Zool.*, **159**: 39-46, 1965.
- 18) Leshner, S.: *Radiation and Aging*, Taylor & Francis, London, 1966.

3. 細胞質を中心として（機能との関連）

佐藤秩子

ヒトを中心とした多細胞生物において、細胞レベルでもっとも顕著な加齢による変化として田内らがみとめて来たのは実質細胞の減数である¹⁻⁹⁾。中枢神経系⁵⁻⁹⁾、骨格筋¹⁰⁾、肝¹¹⁾¹²⁾¹³⁾、腎¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾、膵⁴⁾¹⁷⁾²⁵⁾、甲状腺¹⁸⁾、下垂体⁴⁾、副腎¹⁹⁾、睾丸²⁰⁾、胃²¹⁾、子宮²²⁾、皮膚²³⁾など、いろいろな組織について、組織学的、微計測的に検索し、それぞれの実質細胞の加齢による減数をたしかめて来たが、減数の程度とその経過様相は組織の種類によって種々様々であり、一般的にはいわゆる細胞の分化度と減数の程度とが比例的であるという点がたしかめられている。

一方同じ肝臓においても逐齡的減数の様相が、人種により、あるいは又環境により若干異ってくる点もすでに指摘されている¹²⁾¹³⁾²⁴⁾。同じ、reverting postmitotics に属している細胞でも、たとえば肝、膵、腎それぞれに老性減数の様相を異にし²⁵⁾、又副腎皮質の各層の細胞、胃粘膜腺細胞の各種の細胞にも、逐齡的減数に差がみられ、細胞の微妙な分化度、機能の差を反映しつつ一定のルールに従ってこれらの減数がコントロールされている事が推定されたのであった。

実質細胞の減数に伴う2核細胞の出現、核容積の増大、polyploid 化、aneuploidy の増加なども報告され、細胞の生理的消失に対する再生能の減衰と、分裂を抑制された状態における一種の、active な状態の表現である点が指摘されている⁴⁾⁶⁾⁹⁾。

さらに田内らはこれら細胞の数のほかに、細胞の大きさについても比較検討している。中枢神経では小脳のプルキンエ細胞、肝細胞、腎細尿管上皮、内分泌細胞などでは原則的に細胞の老性萎縮をみず、むしろ容積の増大の傾向をみとめている。

骨格筋に関する田内らのシロネズミの成績により¹⁰⁾、赤筋線維では減数を主として容積の変化は殆んどみないのに対して、白筋線維では減数よりむしろ容積の萎縮がみとめられている。

reverting postmitotics に属する肝、膵、腎についての

図1 加齢による実質細胞数と大きさの消長模式⁷⁾⁸⁾

成績では、まづ田内、佐藤の日本人肝細胞についての微計測的検索報告がある¹¹⁾。これによれば、加齢に伴う肝細胞核の大小不同性がみとめられ、肝細胞数の減少する60歳代をピークとして2核肝細胞の増加があり、やがてその減少と共に、核の増容が顕著となった。一般に肝細胞容積には萎縮はみられず、加齢と共に増容傾向を示していたが、その大きさは、人種別、環境別の比較検討によれば、在ハワイ日本人においてとくに顕著であった¹²⁾¹³⁾。

井上による在ハワイ日本人と在日日本人剖検例膵の微計測的検索成績によれば¹⁷⁾、膵重量の加齢に伴う減少は肝重の減少に比して軽度で、とくに70歳以後にその差が顕著であり、膵腺細胞数の減少もまた肝のそれに比して軽度であった。膵腺細胞ならびにその核の大きさは、減数のより軽い、在ハワイ日本人群では殆んどみられず、在日日本人群に軽度のみとめられた。

図2 実質細胞数の逐齡的消長

図 3 实质細胞の大きさの逐齡的消長

佐々による在日日本人, 在ハワイ日本人, 米白人剖検例腎の微計測的比較成績によれば¹⁶⁾, 腎重量ならびに腎皮質の厚さは逐齡的に減少し, 糸球体係蹄細胞, 尿細管主部上皮にも逐齡的減数がみとめられている. 一定面積内の細胞核数から, 尿細管主部上皮細胞の容積を推定すると, 3群間に多少の差はあるものの, 逐齡的増容がすべての群にみとめられた. いづれにしても加齢に伴う臓器の重量減少が, 細胞容積の減少によるものではない点がこれらの臓器ではあきらかである.

丸山による子宮内膜腺細胞の検索では²²⁾, 加齢にともなう減数と萎縮がみとめられ, 浅井らによって胃の粘膜腺上皮細胞には加齢にともなう減数を主細胞にはむしろ容積の減少がみとめられている²¹⁾.

このように細胞の種類により, 加齢にともなう容積を萎縮する細胞と, 増容の傾向を示すものとが考えられ, 後者には生命維持に直結した細胞が属していると考えられるのである.

田内らはかつて老化過程における实质細胞減数, 残渣細胞の機能亢進および予備力低下などの間の悪循環の様相について報告し, 老個体の, 代償によって機能亢進を強制されたとみなされる細胞肥大の像, 強制された機能亢進にともなう实质細胞の疲備崩壊消失が一層促進され, 減数が進む点を指摘した⁴⁻⁹⁾.

同じ reverting postmitotics に属する細胞でありながら, 膵腺細胞数の加齢に伴う減少, 核, 細胞体の増容が肝に比して軽度であるのは, 膵腺細胞では肝細胞の場合のような悪循環の条件に乏しく, そのためにも減数度が軽く, 又核の増容が軽度で, 大小不同性, 二核化のほとんどみられない点も, 予備力, 代償能などの関連性が考慮されるべきと思われる²⁵⁾.

更に, 核ならびに細胞体の容積については, 減数に対

する代償的意義に加えて, 環境殊に栄養の差も一応考える必要があろう. この際, 細胞質は主として栄養的なないし機能的条件に, 核質は主として増殖の条件に関連している点と考えられる.

何れにしてもこのような肝, 膵両細胞間の差について, 膵細胞数の減少が肝細胞数の減少がに比して軽度な点, 増殖に関与する核における変化が肝細胞に比して膵腺細胞では軽い点などは, 細胞の機能, 分化と増殖能などとの関連のもとに理解出来る. また1世からなる在ハワイ群の高齢群における肝細胞体の顕著な増容は, 顕著な肝細胞減数と, 良好な栄養摂取に帰せられよう⁴¹⁾.

一方在日高齢者にみられた膵腺細胞体の増容については, 比較的つよい減数が問題になろうし, また在ハワイ群において, 肝細胞の場合と反対に膵腺細胞の加齢による増容の殆んどみられなかった点は, 細胞減数の軽い点とともに肝膵両細胞に対する栄養摂取の影響の差も考慮すべきと思われる.

細胞機能の形態学的検索方法の一つとして, 光顕レベルでの酵素組織化学的方法がある. ヒトの生検肝細胞におけるコハク酸脱水素酵素活性, glucose-6-phosphatase 活性について老・若, 同時に並べて作製した標本と比較検討した成績によれば, 光顕レベルでは49歳以下と65歳以上との間に特に差をみとめる事が出来なかった²⁶⁾²⁷⁾.

シロネズミに関する小林の成績によれば²⁸⁾, 静止期肝細胞におけるこれら酵素活性は, 概して小葉中心層では老ネズミに低いようであるが, 辺縁層ではむしろこれを補って若年群より強くみられた. 一方部分的肝切除直後の減衰は, 老ネズミにつよく, 回復も遅れ, 静止期における老ネズミの予備力の低下が推定された.

細胞内小器官における超微計測的成績—肝細胞について—について若干触れてみたい.

ヒト生検肝細胞内ミトコンドリアの数は, 60歳代から減少しはじめ, 個々ミトコンドリアの大きさは増加し, 大小不同性もつよくなり, 不規則な形態を示すものが現れるようになる²⁶⁾.

ミトコンドリアの減数がはじまった60歳代の前半, 個々細胞内ミトコンドリアの総面積は一時むしろ軽く減少し, のち, つよく増加を示す. この時期の変化様相を解明すべく, 個々ミトコンドリアの周の長さ, ミトコンドリア内のすべてのクリステの長さ, 面積などについて, 超微計測的に検討した. この成績によれば, ミトコンドリアの面積に対するクリステの疎密度の年齢別比較では, 49歳以下の群において, クリステはもっとも疎, 60

図4 各年代におけるヒト肝細胞ミトコンドリアの面積とクリステおよび周の長さとの関連性²⁹⁾

歳～64歳においてももっとも密という成績が得られた。すなわち、60歳代の減数に対する応急の代償として、まづミトコンドリア内のクリステの増加によってその機能を補い、ついで徐々にクリステと容積とが共に増加して、進行する減数をカバーして行くと考えられる²⁹⁾。ミトコンドリアの増容に関しては、退行性変化と考えられる“膨化”とは異なるものである事を厳格に区別すべきであるが、基質の淡明化、鬆粗化、クリステの消失で特徴づけられる膨化とは異り、これら減数に対する増容ミトコンドリアのクリステには、電顕酵素細胞化学的にも、明瞭に酵素活性 (cytochrome c oxidase) をみとめる事が出来た^{27) 29)}。

実験的にマウスにコーチゾン投与を行い、急激なミトコンドリアの減数をみる場合に³⁰⁾、ミトコンドリアの容積はこれに伴ってつよく増加するが、予備力に乏しい老マウスでは、減数に対する増容がとくにつよくみられる。この増容ミトコンドリアのクリステにはあきらかに cytochrome c oxidase 活性が形態学的にみとめられている³⁰⁾。

このように老個体では細胞内小器官のレベルでも減数

と肥大ないし機能亢進の状態、予備力の低下を推定させる像がみとめられた。この事は、シロネズミに thyroxine を与えるなどの負荷実験 (田内, 社本ら)³¹⁾における、老ラットミトコンドリアに、巨大なあるいは奇怪な不規則な形がみられるなど肯定的な成績が得られている。

マイクロボディの加齢に伴う変化として、ヒトの肝細胞における成績では、ミトコンドリアの減数のみられる頃からむしろ増数、増容の傾向がみられている³²⁾。一方コーチゾン投与マウス肝細胞においては、静止期ヒト肝細胞におけるよりもよりつよい増数がミトコンドリアの減数に伴ってみとめられ、ミトコンドリア減数のつよい老マウスでは一層顕著にみとめられた³⁰⁾。

粗面ならびに滑面小胞体の加齢に伴う消長は、60歳代から粗面小胞体の減少と、滑面小胞体の増加がみられ、特に囊胞状にひらいた小胞体をみることが老齢群にしばしばであったが、粗面・滑面両小胞体の合計についてもいずれも加齢にともなう消長に有意差はみとめられなかった³³⁾。粗面小胞体の小胞化や拡張は細胞の機能亢進に伴ってみられるという報告もあるが、加齢に伴う小胞体の拡張に関しては未だ数量的検索成績が出し得ない状

図5 ヒト肝細胞の小胞体の年齢的消長

ある。

ミトコンドリアには細胞と同様に、加齢に伴う減数、クリステ、容積の増加、大小不同性の増加、予備力の低下がみとめられており、この点他の小器官とは若干立場を異にしている。

近年ミトコンドリア内に DNA が形態学的にも証明されるようになり^{34) 35) 36)}、またミトコンドリアの独自の分裂増殖がみとめられ、巨大ミトコンドリアには数々の DNA 線維がみられ、polyplod 的ミトコンドリアとよぶ報告もある³⁶⁾。実験動物においても、ヒトの高齢者肝細胞の大型ミトコンドリアにも複数の線維構造をみとめている⁸⁾。

ミトコンドリアは、その膜構造に存する多くの酵素活性に関しては、核 DNA の支配をうけながら、その増

図6 細胞の成熟、老成に伴う分裂抑制因子(田内)の作用機序模式

殖に関しては、ミトコンドリア DNA によって制御される。自己増殖系小器官と考えられるようになっている。

何れにしても老個体にみられる巨大ミトコンドリアの発現は実質細胞にみられる2核、巨核細胞の発現とその機序において一面的には相似の現象とみなすべきで、細胞ならびに細胞内小器官の老性減数は、それら生命単位の老化崩壊消失を意味し、再生機序の解明、これに関して老化に関する仮説の検討、という問題に迄到ると考えられる²⁹⁾。

さきにもふれたように、骨格筋の赤筋線維には加齢に伴う減数がみられ、白筋線維には減数はみられなかったが、白筋線維に比して赤筋線維にはミトコンドリアが豊富にみられ、その加齢変化も生命維持に直結する細胞におけるとされる様相を呈しているのも、ミトコンドリアの加齢減数のもつ意義の大である点を示唆するものと思われる。

田内のいわゆる分裂抑制因子の影響は、このミトコンドリア DNA にも及ぶものと考えられ、加齢に伴うミトコンドリアの減数は、細胞数の減数と同様に解釈し、その増容も、核の polyploid 化と同様の観点から、分裂を抑制された状態における増容と理解した²⁹⁾。

一方肝細胞のマイクロボディ、小胞体に、加齢に伴う消長が顕著でないのは、ミトコンドリアとは異り、DNA を持たない、自己増殖系小器官でない故とも考えたのである。

ミトコンドリア内 DNA の加齢にともなう変化に関する生化学的検索成績は、文献に乏しい現状である。私どもは現在生化学者との共同研究において、同一材料を一方では超微形態学的に、一方では分子生物学的に検索し、少なくとも、ミトコンドリア DNA の分子レベルにおいても加齢変化のあることをシロネズミについてみとめており、形態学的にみたミトコンドリアの加齢に伴う大

図7 人肝細胞内リボフスン沈着様相の年齢的消長⁴⁰⁾中心層

型化, ミトコンドリア内封入体の加齢に伴う増加に対して示唆を与える成績が出つつあり, 何れ近い将来に報告される予定である。

老個体細胞における褐色の色素—リポフスチン—の沈着の増加に関しては, この色素に, age pigment の別名もある如く, 古くから, 老化の一つの指標として問題にされて来た³⁷⁾³⁸⁾。中枢神経, 心筋線維においてあきらかな逐齡的增加が報告されており, 一説にはこれらの物質の沈着が細胞の減数を促すとの説さえある。

又この色素の沈着と細胞の増殖との関連性については neuroblastoma の培養細胞について, 増殖を抑制すると色素が多く沈着し, 除去すると再び増殖が旺になるという報告もみられている³⁹⁾。

在日日本人生検肝, 剖検肝, 在ハワイ日本人, 米白人の剖検肝 (いづれも男性) 細胞について, このリポフスチン沈着様相を検討した⁴⁰⁾。未染色標本の蛍光顕微鏡写真から自動影像分析により量的に比較検討した成績によれば, 在日日本人と米白人の両剖検例の比較では, 色素量, 色素含有細胞数ともに後者に有意に多く, 又ともにリポフスチン量の逐齡的增加がみられる。又リポフスチン顆粒も若年群では微細であるが加齢にともなって次第に粗大化して行くのが両群ともにみとめられた。しかし在日日本人生検例では, リポフスチン保有肝細胞数は, 4群中もっとも多く, 又年齢差も殆んどみられない一方, 顆粒は常に微細で, その色素量の逐齡的增加はみとめられない。又同じ日本人でありながら, 在ハワイ日本人例においては, 色素保有肝細胞数, 色素量ともに他の剖検群に比して有意に多く, 色素顆粒は常に粗大で, この色素の発現様相の年齢差に乏しい。

すべての肝細胞個々の年齢は, 心筋や神経細胞とは異り均一ではなく, リポフスチン沈着様相がすべての肝細胞に均一でない点を一応了解したとしても, すべての年代で, 極めて沈着の僅かなのみがみられ, 高齢者群ではとくに個体差がつよく, 又環境 (とくに栄養環境) によって年齢差以上のものがみとめられた点は注目すべきである。

田内らが本質的な老化の形態学的指標と考えている実質細胞の老化減数の様相と, 同一材料におけるこの色素沈着様相の年齢消長の関連性は, とくに在ハワイ日本人剖検例における消長においてははっきり否定され得る。

又リポフスチンの産生と細胞内小器官との関連性についても報告があり, ミトコンドリアの崩壊と関連するという考えもある。ミトコンドリアは先にも述べた如く60

歳代から減数しはじめるが, 同一材料 (生検肝) におけるリポフスチンの沈着様相には前述の如くはっきりした年齢差がみられていない。

リポフスチン沈着に関しては文献的にも中枢神経系における多くの検索報告がみられる。中枢神経においても一般に逐齡的にこの色素が増加するとされ乍ら, その逐齡的減数と必ずしも一致せず, 部位によってもその発現頻度, 量が異るといわれる³⁸⁾。

肝細胞において加齢とともにリポフスチン顆粒の増加する点は一般的には否定し得ないが, すべての細胞に, 又小葉内に均一にみられるものでもなく, 又細胞内でのこの顆粒の沈着は永久的なものでなく, 絶えず代謝, 変動しているのではないかという事が示唆される。リポフスチンが絶えず細胞内で産生され細胞外へ排除される, その産生と排除のバランスの差がリポフスチン沈着として現れてくるものと思われる。

在ハワイ日本人例に, 若年群からすでに多いのは, 在日日本人と同様な体質, 遺伝的状态において, 栄養環境が比較的欧米的であるため, 排除能力を遙かに上廻る産生があったと推定される⁴¹⁾。この点は血管硬化度の逐齡的消長においても同様の傾向がみとめられ, 栄養環境のつよい関与が示唆される⁴²⁾。

以上, 田内ら一門の加齢による実質臓器細胞にみられる減数に伴う機能的対応としての細胞の増容, 強いられた増容による予備力の低下, これによる悪循環, 減数の一層の進行といった像が, 細胞レベルでも, 又細胞内小器官レベルでもミトコンドリアにみられることを吾々の得た成績を中心に述べてみた。これらの現象が, 細胞の微妙な分化度, 機能の差を反映しつつ一定のルールにしたがって制御されている事はあきらかであり, 分裂抑制因子 (田内) を中心にした考え方がここでも問題になる点を強調したい。

文 献

- 1) 田内 久: 老人の病理: 現代医学. 4: 80—90, 1954.
- 2) Tauchi, H. and Morikawa, T.: On the nature of senile atrophy of liver and spleen in comparison with nonsenile atrophy. Nagoya Med. J., 2: 1-12, 1954.
- 3) 田内 久: 老性変化の基本的形態像について: 名医学, 81: 975—982, 1960.
- 4) Tauchi, H.: On the fundamental morphology of the senile changes. Nagoya J. med. Sci., 24: 97-132, 1961.

- 5) 田内 久：組織細胞の老化（シンポジウム，主題：老化の機構）第17回日本医学会総会学術講演集，**3**：600—608，1967.
- 6) 田内 久，佐藤秩子：老化，細胞学大系（小川 他編）**5**：316—354，朝倉書店，東京，1971.
- 7) 田内 久：老化の病理，日本医師会医学講座，日本医師会編，昭和47年刊，pp. 474—484，1973.
- 8) 田内 久：老化の病理形態学序説．日病会誌，**63**：3—15，1974.
- 9) 田内 久，佐藤秩子：形態学的老化尺度，老年学（太田，三浦，江上 編），p. 242—271．朝倉書店，東京，1976.
- 10) Tauchi, H., Yoshioka, T. and Kobayashi, H.: Age changes of skeletal muscles of rats. *Gerontologia* **17**: 219—227, 1971.
- 11) Tauchi, H. and Sato, T.: Some micromeasuring studies of hepatic cells in senility. *J. Gerontol.*, **17**: 254—259, 1962.
- 12) 佐藤秩子，田内 久：老化と環境（在ハワイ日本人剖検例の検討を中心として），総合臨床，**23**：453—458，1974.
- 13) Tauchi, H. and Sato, T.: Effect of environmental conditions upon age changes in the human liver. *Mech. Age. Dev.*, **4**: 71—80, 1975.
- 14) Tauchi, H., Tsuboi, K. and Sato, K.: Histology and experimental pathology of senile atrophy of the kidney. *Nagoya Med. J.*, **4**: 71—97, 1958.
- 15) Tauchi, H., Tsuboi, K. and Okutomi, J.: Age changes in the human kidney of the different races. *Gerontologia*, **17**: 87—97, 1971.
- 16) 佐々良次：腎臓の老化過程についての地理病理学的研究（在ハワイ日本人の腎臓を中心として）日老医誌，**13**：308—320，1976.
- 17) 井上淳子：脾臓の老化過程についての地理病理学的研究，日老医誌，**14**：157—169，1977.
- 18) 大杉紀一郎：人甲状腺の老性変化に関する病理組織学的並びに微計測的研究，名医学，**82**：522—534，1960.
- 19) 中村宗平：人副腎の老性変化に関する病理組織学的並びに微計測的研究，名医学，**82**：345—356，1960.
- 20) 牛島 宥，小林久人：睾丸の老性変化，日病会誌，**49**：665，1960.
- 21) 浅井喜久子，田内 久，佐藤秩子：胃の加齢変化についての微計測的検索，日老医誌，**14**：281，1977.
- 22) 丸山邦夫：人子宮の老性萎縮に関する組織学的並びに微計測的研究：名市大医誌，**9**：368—393，1959.
- 23) Andrew, W. 佐藤秩子：人体皮膚細胞成分の年齢的消長，日老医誌，**2**：13—21，1965.
- 24) Tauchi, H.: Effect of nutritional state on the ageing process of the human organs. *Mech. Age. Dev.*, **1**: 111—116, 1972.
- 25) 佐藤秩子，田内 久：老化における環境因子—臓器による影響の差を中心に—，最新医学，**31**：2329—2335，1976.
- 26) Tauchi, H. and Sato, T.: Age changes in size and number of mitochondria of human hepatic cells. *J. Gerontol.*, **23**: 454—461, 1968.
- 27) Sato, T., Kobayashi, H. and Tauchi, H.: Electron microscopic studies on the hepatic cells in aging process with special reference to their enzymatic activity, *Proc. 9 Internatl. Congr. Gerontol.*, **2**: 64—67, Kiev, 1972.
- 28) Kobayashi, H.: Histochemical studies of enzymatic behaviour in the hepatic cells of the senile rat liver. *Nagoya J. med. Sci.*, **27**: 167—183, 1965.
- 29) Sato, T. and Tauchi, H.: On the formation of enlarged and giant mitochondria in the aging process of human hepatic cells. *Acta Path. Jap.*, **25**: 403—412, 1975.
- 30) Tauchi, H., Sato, T. and Kobayashi, H.: Effect of age on ultrastructural changes of cortisone treated mice hepatic cells. *Mech. Age. Dev.*, **3**: 279—290, 1974.
- 31) Tauchi, H., Adachi, F. and Shamoto, M.: Effect of age on the cellular changes experimentally produced in the rat liver. *Proc. 7 Internatl. Congr. Gerontol.*, Vienna, Austria, 127—135, 1966.
- 32) 佐藤秩子，田内 久：人肝細胞 マイクロボディの年齢的消長，日老医誌，**12**：400—404，1975.
- 33) 佐藤秩子：老化の形態学，*Geriatric Medicine*, **13**：461—470，1975.
- 34) Nass, M.M.K., Nass, S. and Afzelius, B.A.: The general occurrence of mitochondrial DNA. *Exp. Cell Res.*, **37**: 516—539, 1965.
- 35) Borst, P. and Kroon, A.M.: Mitochondrial DNA. physicochemical properties, replication and genetic function. *Intern. Rev. Cytol.*, **26**: 107—190, 1969.
- 36) Merker, H.J., Herbst, R. and Kloss, K.: Elektronenmikroskopische Untersuchungen an den Mitochondrien des menschlichen Uterusepithels während der Sekretionsphase. *Z. Zellforsch.*, **86**:

- 139-152, 1968.
- 37) Strehler, B.L., Mark, D.D., Mildvan, A.S. and Gee, M.V.: Rate and magnitude of age pigment accumulation in the human myocardium. *J. Gerontol.*, **14**: 430-439, 1959.
- 38) Brody, H.: The deposition of aging pigment in the human cerebral cortex. *J. Gerontol.*, **15**: 258-261, 1960.
- 39) Nandy, K. and Schneider, H.: Lipofuscin pigment formation in neuroblastoma cells in culture. in *Neurobiology of Aging*, ed. by Terry, R.D. and Gershon, S. Raven Press New York. 1976. p. 245-264.
- 40) 佐藤秩子, 田内 久: ヒト肝細胞内 リポフスチン沈着様相の年齢的消長, 基礎老化研究, **1**: 52-53, 1977.
- 41) Stemmermann, G.N.: Gastric cancer in the Hawaii Japanese. *GANN*, **68**: 525-535, 1977.
-

4. 神経・筋細胞について

朝長正徳

はじめに

神経細胞が人体の他の細胞と異なる点としては、生後分裂のない fixed postmitotic cell であるということのほかに、細胞質内に Nissl 小体というものがみられることが古くからあげられている¹⁾。この Nissl 小体の本態はしかし、電子顕微鏡でみると粗面小胞体の集りであり、他の細胞でもみられる構造である。神経細胞では、この構造が特に発達しているというだけであるが、これは神経細胞の機能と特に深い関係を有するものと思われる。例えば、記憶に関係するとか、軸索流として末梢へ流す物質を製造することなどである。次の特徴は、神経細胞は突起を有しており、神経細胞間で線維的連絡 synaps を形成し、また末梢効果器官に長い軸索突起を出し、手の先き、足の先きまでのびていることである。この様に巨大な構造は他の細胞にはみられない。更に、中枢神経系では、その環境が極めて特殊で、細胞間に結合組織のかわりにグリア組織という特殊装置を有し、また血管の他に第三循環と呼ばれる髄液循環により他部分と区別されている。そして、神経細胞の機能分化は極めて高度で、特にヒトでは著しい。Johnson²⁾によれば、神経細胞の数と寿命とは密接な相関を有するとされ、その生命保持に対する役割は大きいといえよう。

1. 神経細胞の老化

神経細胞の変化に関しては、Korenchevsky にならい、平井³⁾は生理的老化と病的老化に分類している。生理的老化は比較的普遍的にみられる加齢変化で、例えば、細胞数の減少、リポフスチンの沈着、軸索デストロフィーなどであり、病的変化は例えば痴呆などの病的症状と密接に関連したもので、老人斑、アルツハイマー原線維変化などであり、これらの変化には、他の器官の細胞にはみられない変化がある。例えば、アルツハイマー原線維変化は、細胞質内に銀染色でよく染る線維で蓄積する。これは電子顕微鏡でみると、正常でみられ

る neurotubules と異った、不溶性の一見ねじれを有する twisted tubules と呼ばれる異常な線維蛋白の集積であり、老年痴呆でよくみられる変化である。この様な神経細胞に特殊な変化のほかに、他の細胞と同じ変化もみられる。

(1) 細胞数の減少

細胞数の減少は、田内⁴⁾により老化の基本的現象として強調されている。神経系では、この点に関して十分な資料の蓄積がないが、ある部分の神経細胞ではこの変化は明らかである。例えば、大脳皮質および小脳皮質の神経細胞は、明らかに加齢と共に減少する⁴⁾⁵⁾。しかし、この変化は脳のどこでもみられるとは限らない様である。大脳皮質よりもより生命にとって基本的役割を有すると考えられる脳幹についてみると、中脳の黒質⁶⁾、橋の青斑核⁷⁾では加齢とともに著明な減数を示すが、他の神経核ではほとんど減数がみとめられない⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾。黒質、青斑核はいわゆるメラニン色素を含む細胞であり、特殊な機能を有しており、この変化と老人の歩行などの運動障害、睡眠パターンの変化と関連づけている者もある。末梢神経節では、やや減数の傾向を示すが、大脳皮質ほど著明ではない¹¹⁾¹²⁾¹³⁾。この様に、神経細胞の老化現象の検討にあたっては、局在を考慮に入れないと、一方では神経細胞は加齢と共に減数することになり、他方では減数しないことになってしまう (Fig. 1)。

小脳プルキンエ細胞は加齢と共に減数を示すが、種々な疾患でも細胞の脱落することが知られている。有名なものはアルコール中毒や肺癌によるものであるが、老人の小脳虫部では、しばしば肉眼的にこれらと同様な皮質の萎縮がみとめられ、特に前葉に著しい。しかし、この変化は死後の変化であり、特に死後の仰向けの姿勢と関係があるというものもある¹⁴⁾。そこで、第15回本学会シンポジウムで万年、亀山¹⁵⁾と共に発表した方法で、小脳虫部を各小葉ごとに分け、プルキンエ細胞の数を数えて比較した。その結果、前葉の萎縮のないものにも、萎縮のあるものより前葉のプルキンエ細胞数の比率の少ないものがみられ、この所見と前葉のプルキンエ細胞の減数とは一致しなかった。しかしながら、前葉萎縮を示したもの

Fig. 1. Number of Nerve Cells in Various Nuclei

は、いずれもブルキンエ細胞総数の減少の著明なものであり、その場合に死後前葉萎縮の形をとる可能性も考えられる。この小脳虫部の神経細胞減数と老化以外の因子との関係をみてみると、癌を有するもの、動脈硬化の著明なものでは更に減少が著しい。これは亀山の報告¹⁶⁾に一致する。一方、肺癌との関係はみとめられなかった (Fig. 2)。

老人の小脳ブルキンエ細胞では、二核細胞をみることもある。これは加齢と共に増加するといわれる⁴⁾。二核細胞は他の部位にもみられ、末梢神経節でみられたものについては、特に加齢との相関はみとめられなかった³¹⁾。また、二核細胞の中には、時に連続した馬てい形としてみられるものがあり、これが核の変形なのか、無糸分裂により二核になる過程なのか、尚検討を要する。

(2) リポフスチンの沈着

神経細胞は生後分裂しないとされ、従って加齢と共にリポフスチン或は老化色素が細胞質に蓄積して行く。リポフスチンの本態については、諸説があり尚解決に至っていないが、加齢と共に増加する点では諸家の見解は一致している。しかしながら、老人になってもリポフスチンがみられない神経細胞もある。この点に着目したのは Obersteiner¹⁷⁾ で、1903年に、リポフスチンのたまりない lipophobe cell として、小脳ブルキンエ細胞、中脳の瞳孔運動に関連した Edinger-Westphal 核をあげている。この様に神経細胞でのリポフスチン沈着の様子は、脳の部位により極めて多様で、万年¹⁸⁾は詳細なスケッチでこれを示している。

この様なリポフスチン沈着の部位による差は、おそらく神経細胞の機能分化と関連していると考えられる。Friede¹⁹⁾は、リポフスチン沈着の程度と酸化酵素活性との関係をしらべ、酸化酵素活性の強い神経細胞に多量のリポフスチンが沈着することを見出した。ただ、例外はブルキンエ細胞であり、酸化酵素活性は強力なのにもかかわらず、リポフスチン沈着はみられない。沖中²⁰⁾はカテコラミン代謝と関連の深い monoamine oxidase (MAO) 活性との関係を検討したが、やはりブルキンエ細胞を除き、リポフスチン沈着と酵素活性にはほぼ平行な関係をみとめた。末梢自律神経系は、機能的にはっきりと交感神経、副交感神経に分かれるが、MAO 活性の強力な交感神経系の細胞にリポフスチン沈着は高度であり、毛様神経節の如き副交感神経系の細胞では極めて軽度であった¹³⁾。ブルキンエ細胞でリポフスチンが沈着しにくい理由にいつては不明で、未知の機能をこの細胞

が有している可能性もあるが、電顕的にはリポフスチン顆粒は少量ながら証明出来るし、また、神経細胞にリポフスチンの沈着する、いわゆる消耗性疾患ではブルキンエ細胞のまわりのグリア細胞に著明に増加しているのがみとめられる。このグリア細胞は、ブルキンエ細胞のまわりを取り巻き pericellular basket を作っており²¹⁾、何らかの機序により、ブルキンエ細胞のリポフスチン物質を除去していると考えているものもある¹⁹⁾。

このリポフスチンは、一般には細胞の代謝のカスと考えられており、これが大量に細胞内に沈着することは細胞の生存に不利であるとされる。Brody は細胞の減数のみられない脳幹の神経細胞に著明なリポフスチン沈着をみとめ、この沈着の程度は細胞の死と関係がないと述べている⁷⁾。しかし、リポフスチンの沈着と RNA 量減少との関係を Mann²²⁾ はみとめており、我々も神経細胞の酵素活性の減少をみとめている¹³⁾。そこで、リポフスチンを除去して細胞の老化を防ごうという試みが古くからなされて来た。リポフスチンが主として過酸化脂質に由来することより、antioxidant を用いる試みがあるが、最近注目されるのは、1965年以来 Nandy, Bourne²³⁾ らにより行われた centrophenoxine による除去作用である。これは植物の成長ホルモンの auxin と関係のある物質で、植物の落葉をおくらせる作用があるといわれる。我々は老モルモットについて、この薬物の作用をしらべたが、2年齢の動物では、リポフスチンの除去作用は見出されなかった。しかし、リポフスチンの形状が若年齢のものに近くなるなどの変化や、動物の運動機能の改善など、何らかの作用はあると考えられたが、更に高齢の動物について検討する必要がある。

リポフスチンは消耗性疾患で細胞内に増加するといわれるが、癌の患者の大脳皮質が褐色調になることはよく経験するところである。2, 3の例について、神経細胞内のリポフスチンの沈着の程度をみると、特に胃癌で著明な印象をうけた。体重減少即ち cachexia の程度は肺癌でも同様なものが選ばれており、単に cachexia のみにより沈着するとも限らない様である。また、実験的にリポフスチンを沈着させる試みは古くから行われており、これらからリポフスチン沈着の機序が解明される必要がある。

(3) 軸索デストロフィー

神経細胞の突起の一つである軸索は神経細胞と末梢の効果器官或は次のニューロンをつなぎ、神経機能を伝達する役割を有する構造である。この中には軸索輸送

Fig. 2

axonal flowとして伝達物質など種々な物質が流れていることが最近明らかにされた。神経系の生理的老化の一つとしてあげられている軸索ゲストロフィー neuroaxonal dystrophy (NAD) は、この軸索が膨化し球状の spheroid を形成する。この変化ははじめ Hallervorden-Spatz 病や infantile NAD で見出されたものであるが、老人脳に生理的に生ずることを示したのは、Jellinger²⁴⁾ および藤沢²⁵⁾ である。即ち、黒質や基底核のほか特に延髄の後索核に加齢と共にその出現頻度が増すことが知られた。我々の検索でも、高齢者はどその出現が多いという結果を得た (Fig. 3)。老年者のパーキンソン様歩行や知覚とくに振動覚の低下をこれで説明するものもある²⁶⁾。この膨れた軸索の中には、ミトコンドリアや ER、フィラメントなどが増加沈着しており、単純な萎縮と異ったメカニズムで考えられているが、その原因はまだ十分に解明されていない。末端のシナプスの異常、あるいは軸索流の障害と関連した変化が推定されている。

この変化は実験的に作ることが出来る。即ち、ビタミンE欠乏、アクリルアミド、IDPN 投与などである。この中でアクリルアミド、IDPN は軸索流を障害することが証明されている。ビタミンE欠乏による NAD 作製には多くの報告があり、電顕的にヒトのものと同じであると考えられている²⁷⁾。一方、この変化は、種々な病的状態でも生ずる²⁸⁾。老年者と同様に後索核に高頻度にとめられる疾患としては、mucoviscidosis, congenital biliary atresia があり、いずれも高度の胆汁、膵液などの分泌障害を示すものである。我々の検索した老年者後索核における多数出現例を疾患別にみると、特に目立つのは胆のう、膵疾患であり、また胃癌に頻度の高いこ

(1)

Fig. 3

(2)

	Abundant**	Moderate	Negative
Gastric Cancer (9)	5 (25%)	3 (11%)	1 (5%)
Lung Cancer (9)	1 (5%)	6 (22%)	2 (9%)
Liver, Pancreas, Bile Duct Disorders 00	7 (35%)*	2 (7%)	1 (5%)
Pneumonia (8)	2 (10%)	5 (18%)	1 (5%)
CVD (5)	2 (10%)	2 (7%)	1 (5%)
Renal Disease (8)	2 (10%)	2 (7%)	4 (18%)
Cardiac Disease (7)	0	5 (18%)	2 (9%)
Total (Cases)	20 (100%)	27 (100%)	22 (100%)

*Obstructive jaundice 3
Cholelithiasis 1
Chronic pancreatitis 1
Pancreas fat necrosis 1
Liver cirrhosis 1

** Abundant: over 10 spheroids

Fig. 3.

とである (Fig. 3)。前述の報告例と合わせて考えると、後索核での spheroid の出現には、腸における吸収障害が何らかの役割を果している様にみえる。NAD の実験的作製がビタミンE欠乏でみられることから、このビタミンの吸収障害が原因であるという考えも出来るが、現在のところそれは証明されていない。例えば Johnson²⁷⁾ はビタミンEを余分に与えたネズミとふつうに与えたネズミを1年半飼育して比較したが、両者共に NAD をみとめている。しかし、老年者では血中のビタミンEは増加するが、組織中のビタミンE量は減少するといわれており、ヒトにおける NAD とビタミンEとの関係は尚検討を要する問題である。

2. 骨格筋の老化

骨格筋は運動ニューロンに属する効果器官であり、老人になると萎縮して来ることが知られている。そのために日常生活に不自由することはよく経験するところである。この老人性筋萎縮の原因については、従来いろいろの説があるが、我々の検索では²⁸⁾、神経支配の異常による神経原性萎縮が最も多く、次いで type II fiber atrophy といわれる、速い収縮を行ういわゆる白筋に相当する type II 線維に特に萎縮が来る変化がみられ、筋ジストロフィー症にみられる様なミオパチー性変化はむしろ軽度であった。筋線維を機能別のタイプ分けにするには、酵素組織化学、特にミオシン ATPase 活性が用いられる。この様な方法で老人の筋を調べた報告はほとんどないが、老動物については田内の報告²⁹⁾がある。それによれば、白筋線維 (type II に相当) は加齢と共に萎縮し、赤筋線維 (type I に相当) は加齢と共に減数を

Fig. 4. ヒト骨格筋のタイプ別線維数と直径

示すといわれる。老人の場合には、type II atrophy がみられる点は同じであるが、type I 線維は加齢と共に減数することはない。これは動物とヒトとの運動機能の差や、老化に共う末梢神経の変化の相異（ラットでは脱髄が主体で、ヒトでは軸索変性が主体とされる）なども関係がある（Fig. 4）。

Type II fiber atrophy は老人のみにみられる変化ではなく、種々な病的状態でもみられるし、また disuse, cachexia でもみられる。その原因としては、脊髄前角にある運動神経細胞、特に α ニューロンからの trophic factor 供給の減少が考えられている。老人の脊髄前角細胞に関してはデータが極めて少ない。神経細胞数については、ヒトでの報告はほとんどみられず、動物では加齢による減少は軽度であるとされている。我々は各年齢での神経細胞数を計量中であるが、現在のところ高齢者では減少の傾向をみとめており、特に大細胞が落ちている様である。一方、老年者脊髄前角には、しばしば軸索の膨化した spheroid 又は globule がみとめられる。この変化は特に前角神経細胞が変性する ALS に特徴的なものであるが、特に経過の早いものに多数出現する。斉藤によれば³⁰⁾、老年者では ALS に比べるとその出現は軽度であり、前角神経細胞の変性は極めてゆっくりしたものであることを示している。興味あることは、この spheroid が IDPN で実験的に作れることである³¹⁾。この場合、電顕および組織化学的所見より、神経細胞には変化はないが、proximal axon にフィラメントの蓄積および ER の増生などの反応がみられ、その部位での軸索流の停滞 axostasis が考えられている。この場合に、末梢の骨格筋は type II fiber atrophy を示すこと

が最近斉藤により明らかにされた。type II atrophy はアクリルアミド投与動物でもみとめられる³²⁾。即ち、老人性筋萎縮の大きな原因の一つとして、軸索流の障害の可能性があげられる。これは神経細胞が消失する前の、むしろ神経細胞の機能障害、特に Mann³²⁾ が示す様に細胞内 RNA 量の減少などによる蛋白合成能の障害が考えられる。細胞の老化に伴い、神経細胞の有する特徴である Nissl 顆粒で代表される高度な蛋白合成能が、老年者では低下して来る。これにはリポフスチンの蓄積という物理的な障害も関係しているかもしれないが、その裏には更に本質的な分子生物学的老化の問題がひそんでいると思われる。

おわりに

老人の神経細胞および筋について、その機能および機能分化の点より、その特徴の2、3について概説した。

おわりに、発表の機会を与えられた田内久教授、多大な御援助をいただいた東京都老人研臨床病理、養育院附属病院の諸氏および京大老年科亀山正邦教授に深謝する。

文 献

- 1) 時実利彦：脳の話，岩波新書。
- 2) Johnson, H.A. and Erner, S.: Neuron survival in the aging mouse. *Exp. Geront.* 7: 111, 1972.
- 3) 平井俊策：神経系の加齢の組織化学，神経進歩，17: 69, 1973.
- 4) 田内 久：病理形態学における加齢，医学のあゆみ，62: 276, 1967.
- 5) Brody, H.: Organization of cerebral cortex. III. A study of aging in the human cerebral cortex. *J. Comp. Neurol.* 102: 511, 1955.
- 6) 平井俊策：老人性脳退行性変化の組織化学—黒質の老化を中心として，神経進歩，12: 845, 1968.
- 7) Brody, H.: An examination of cerebral cortex and brainstem aging. In: Terry, R.D. and Gershon, S. (eds.): *Neurobiology of aging*, Raven Press, 1976.
- 8) Vijayashankar, N. and Brody, H.: Neuronal population of the human abducens nucleus. *Anat. Rec.* 169: 447, 1971.
- 9) Monagle, R.D. and Brody, H.: The effect of age upon the main nucleus of the inferior olive in the human. *J. Comp. Neurol.* 155: 61, 1974.
- 10) Konigsmark, B.W. and Murphy, E.A.: Volume of ventral cochlear nucleus in man: Its relationship to neuronal population and age. *J. Neuropath. exp.*

- Neurol. **31**: 304, 1972.
- 11) Gardner, E.: Decrease in human neurons with age. *Anat. Rec.* **77**: 529, 1940.
 - 12) Nagashima, K. and Oota, K.: A histopathological study of the human spinal ganglia. 1. Normal variation in aging. *Acta path. jap.* **24**: 333, 1974.
 - 13) 朝長正徳, 田辺 等, 宇尾野公義: ヒト 交感神経節の老年性変化に 関して—形態学的組織化学的研究—, *臨床神経*. **5**: 578, 1965.
 - 14) 平野朝雄: 神経病理をはじめる人のために, 医学書院, 1976.
 - 15) 万年 徹, 朝長正徳, 亀山正邦: 老年者における内科疾患—脳神経疾患. *日老医誌*, **10**: 69, 1973.
 - 16) 亀山正邦: 身体疾患と中枢神経系の 老化. *神経進歩*, **17**: 636, 1973.
 - 17) Obsersteiner, H.: Über das hellgelbe Pigment in den Nervenzellen und das Vorkommen weiterer fettähnlicher Körper im Centralnervensystem. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien Univ.* **10**: 245, 1903.
 - 18) 万年 甫: 脂質含有色素粒子の 分布より見たる人脳の細胞構築について, *解剖学誌*, **30**: 151, 1955.
 - 19) Friede, R.L.: The relation on the formation to the distribution of oxidative enzymes in the human brain. *Acta neuropath.* **2**: 113, 1962.
 - 20) 冲中重雄: 老年病 と 自律神経系, *日本老年医誌*, **2**: 88, 1965.
 - 21) Palay, S.L. and Chan-Palay, V.: *Cerebellar cortex*, Springer, 1974.
 - 22) Mann, D.M.A. and Yates, P.O.: Lipoprotein pigments—their relationship to ageing in the human nervous system. I. The lipofuscin content of nerve cells. *Brain* **97**: 481, 1974.
 - 23) Nandy, K. and Bourne, G.: Effect of centrophenoxine on the lipofuscin pigments in the neurones of senile guinea pig. *Nature* **210**: 313, 1966.
 - 24) Jellinger, K. and Jirasek, A.: Neuroaxonal dystrophy in man: Character and natural history. *Acta neuropath. Suppl.* **5**: 3, 1971.
 - 25) Fujisawa, K.: An unique type of axonal alteration (so-called axonal dystrophy) as seen Goll's nucleus of 277 cases of controls. *Acta neuropath.* **8**: 225, 1967.
 - 26) Seitelberger, F.: Neuropathological conditions related to neuroaxonal dystrophy. *Acta neuropath. Suppl.* **5**: 17, 1971.
 - 27) Johnson, J.E., Mehler, W.R. and Miquel, J.: A fine structural study of degenerative changes in the dorsal column nuclei of aging mice. Lack of protective by vitamin E. *J. Gerontol.* **30**: 395, 1975.
 - 28) 朝長正徳, 万年 徹, 亀山正邦: 老年者における骨格筋の変化, *日老医誌*, **11**: 15, 1974.
 - 28b) Tomonaga, M.: Histochemical and ultrastructural changes in senile human skeletal muscle. *J. Amer. Geriat. Soc.* **25**: 125, 1977.
 - 29) Tauchi, H., Yoshioka, T. and Kobayashi, H.: Age changes of skeletal muscles of rats. *Gerontologia* **17**: 219, 1971.
 - 30) 斉藤光典, 朝長正徳他: 本学会報告.
 - 31) Chou, S.M. and Hartmann, H.A.: Axonal lesions and waltzing syndrome after IDPN administration in rats. *Acta neuropath.* **3**: 428, 1964.
 - 32) Tomonaga, M. et al.: An electron microscopic study of the changes in nervous system by experimental acrylamide intoxication. *J. Clin. Electron Microscop.* **8**: 5, 1975.
 - 33) Mann, D.H.A. and Yates, P.D.: Motor neurone disease: The nature of the pathogenic mechanism. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiat.* **37**: 1036, 1974.

5. 皮膚組織細胞について

山口武雄

1. 老化に伴う皮膚発癌性の変化

実験動物での皮膚組織の老化を、増殖・分化の調節機構の変化という断面から捉えてみようとする、目立ってはっきりした主張は、Ebbesen のそれである。すなわち、彼は¹⁾、BALB/c マウスを用い、2カ月齢または14カ月齢マウスの背中 of 皮膚 (2×3cm) を、2カ月齢のマウスに移植し、12カ月後、すなわち移植片が夫々14および26カ月齢に達した時点で、7, 12-ジメチルベンゾアントラセン (DMBA) のアセトン溶液を1回塗布し、その2カ月後の乳頭腫の発生率を検した。すると老齢の移植片での発生率が有意に高かった。

さらに Ebbesen は²⁾、上と同じ材料で乳頭腫が退行した後、受給者が19カ月齢に達した時点、すなわち老移植片は31カ月齢、若移植片は19カ月齢となった時に、DMBA の3回塗布を行ない、3カ月後の癌腫の発生率を検して、同様に老齢皮膚での発癌率が有意に高いことを認めた。生じた癌腫を他マウスに移植して、その発癌性を確認している。

何れの場合も、受給者の月齢は等しいので免疫監視機構、ホルモン状態などの全身的条件は老若両皮膚群で差がないとみなせる。したがって、化学発癌剤に対する感受性の老化に伴う増大は、専ら皮膚組織そのものに局在した老化現象に基因するというのが彼の主張である。

2. 内因性増殖調節物質 chalone と老化

上述した皮膚の局在性変化の原因として、a) 細胞増殖の恒常性維持調節に働らく局所的な細胞間相互作用の効率の減少、b) 個々の細胞に限局された変化、の何れかあるいは両方の可能性が考えられる。局所的なホメオスタシス調節機構として、物質的に捉えられているものに chalone (キャロンあるいはカロン) とよばれる組織特異性・種非特異性の内因性増殖抑制物質がある。chalone には、細胞周期上 G_1 期から S 期 (DNA 合成期) に入るのを抑制するもの (G_1 -chalone) と、 G_2 期

から M (分裂) 期に入るのを抑制するもの (G_2 -chalone) とがあって、夫々別の物質であるとされている (文献³⁾ 参照)。そこで当然考えつくのは、これらの chalone が老化に伴ない変化しないかということである。

最近 Olsson and Ebbesen は⁴⁾、この可能性を検討し、老齢 (26カ月齢) の皮膚では、若齢 (14カ月齢) の皮膚に比し、表皮の G_1 -および G_2 -抑制物質の何れも含量が減っていて、しかも同齢マウスに移植した老、若両皮膚移植片の抽出物でも同様の年齢による差がみられたことから、局所的な増殖抑制効果の老化に伴う減少が、発癌性の増大と関係すると主張している。

この考えは一見甚だ魅力的である。しかし chalone の含量の検定に用いた方法を検討してみると、今年の Nature 誌上で、Hamblin⁵⁾ が、Houck 編⁶⁾ の “Chalones” に対する書評につけたタイトル “Chalones not proven”, すなわち「chalone という物質の存在は未だ証明されていない」という評価の原因となった検出系の不備が、そのままの形で、彼等の実験方法の中に見出される。

Olsson and Ebbesen⁴⁾ が用いた chalone の検定系は、常用される in vivo の方法で、正常の C3H マウスに、老、若両被検皮膚抽出物 5mg を注射し、 G_2 -抑制作用は、コルセミドによる分裂像蓄積を減少させる効果として、また G_1 -抑制作用は、³H-チミジン標識細胞数の減少効果として検出する。その抑制効果が、 G_1 -、 G_2 -何れの場合も、老齢皮膚抽出物において低かったというわけである。ところが ³H-チミジン標識表皮細胞数の減少効果について、老若で有意差を示すのは、抽出物注射後4時間での結果のみであり、注射後14時間のそれは有意差を示していない。

以上の実験方法 および 結果から、Chalone 含量の変化を結論することの不適当な理由は次の3点に要約できよう。a) 正常動物の組織では既に chalone が十分な抑制作用を行なっている筈であるから、そこに外から chalone を投与することは、その意義を疑わせる。少なくとも検出感度の上での不利は免れない。b) 表皮 G_1 -chalone を、正常な皮膚組織に働かせた場合、³H-チ

第1図 創傷法および培養法による表皮 G_1 -chalone の検出方法 (Yamaguchi et al.¹⁰⁾ および未発表データにより作図。説明は本文参照)

ミジン標識細胞数の減少が顕著になるのは、注射後9—12時間以後で⁷⁾、少なくとも5時間以後でないとは有意に減少しない⁸⁾、というのが定説になっている。注射後4時間で抑制効果があり、しかも老若両皮膚抽出物で差があったとする結果は、 G_1 -chalone 含量の差以外の原因によるものように思われる。意味のある注射後14時間の時点では、両グループに差が認められなかったのは、この批判を支持している。c) さらに、個体に注射して抑制効果が現われても、それは全身的な状態を変化させた結果であるかも知れず、抽出物が組織細胞の局所的な増殖調節機構に直接関与したとの証拠にはならない。以上の批判は多くの表皮 chalone 研究、特に殆どどの G_1 -chalone の研究にあてはまるものである。

したがって、満足すべき検出方法を用いて表皮 chalone 含量の加齢あるいは老化に伴う変化を再検討する必要があると思われる。改良すべき点としては、a) 正常状態で存在する chalone の抑制効果から解放された組織細胞に対し、外から chalone 含有抽出物を投与して増殖抑制効果をみる。b) 細胞周期上の G_2 からM期への移行の抑制は、コルヒチン (又はコルセミド) による分裂像蓄積すなわちM期への流入率の減少として検出できる。一方、 G_1 からS期への移行の抑制を直接証明する手技を開発しなければ G_1 -chalone 活性は検定できない。c) 生体に注射する in vivo の方法では、常に方法論的疑義がつきまとう。適当な in vitro の検出系を作る必要がある、の3点であらう。

以上を踏まえて、我々は、マウス耳殻表皮の、創傷

法⁹⁾および器官培養法¹⁰⁾による chalone 検定系を開発した。その意義は上述の3点に対応して以下の通りである。a) 傷をつけたり、培養に移すことによって増殖を刺激し、想定される chalone 抑制から解放した上で、外から chalone を投与することにより、充分な検出感度で抑制効果を検定できる。b) 増殖が刺激されてDNA合成を行なう細胞数が増加しつつある時点、すなわち G_1 からS期へと表皮基底細胞が移行しつつある時点で chalone を投与し、³H-チミジン標識細胞数の増加の抑制効果をみる。得られた結果を第1図に整理した。創傷法の場合は、傷をつけたマウスに chalone 含有皮膚抽出物を注射し、培養法の場合は、次に述べる培養条件で、培養液中に chalone を添加した。何れも創傷後あるいは培養開始後12時間で ³H-チミジン標識細胞数 (オートラジオグラフ上で算定) が増加し始める (第1図の点々を付した部分—測定値のふれを同時に示している)。これに対し、12時間 (A)、14時間 (B)、あるいは16時間 (C) 後に chalone を注射あるいは添加すると、稿状部分で示すように、S期細胞数の増加が停止する。すなわち G_1 からSへの流入が抑えられたわけで、 G_1 -chalone 作用を始めて直接的に証明することができた。この際、図示するように、chalone 投与後1.5~2時間の間は、S期細胞数はそのまま増え続け、その後に増加が止むことも見出された。つまりDNA合成開始前2時間になると、chalone によるS期への流入の抑制は効かなくなる—合成の準備が完了してしまうと考えられる。c) in vitro の検定系として我々が開発したのは次のような器官培養法である¹⁰⁾。マウス耳殻を小短冊型に切り出し、中央から表裏に剝して軟骨の付いた皮膚片を、表皮を上にして、ガラスフィルター上に載せ、TC-199液を入れたペトリ皿に入れる。培養液は毛管現象で培養片に到達する。全体を95% O_2 (空気では不可) と5% CO_2 の混合ガス通気下に37℃で培養する。この方法で、上述のように12時間以後にDNA合成を行なう細胞が増えるから、これに chalone を投与するわけである。新鮮皮膚抽出物の短時間 (4時間まで) の作用には、アドレナリン添加をしなくても G_1 からSへの移動を抑制する効果がある。しかし、80%エタノール沈澱で純化したものではアドレナリン添加が必要となり、また新鮮抽出物でも4時間以上の処理にはアドレナリンを補う必要がある。したがって、 G_1 -chalone に対しても、本質的にはアドレナリンが必須の co-factor であることが示された。同じ培養系で、コルヒチンによる分裂像蓄

積が chalone により低下することで、 G_2 からMへの移入の抑制効果が検定される。この場合は、アドレナリンの添加が常に必須である。

表皮抽出物のアルコール沈澱を水に再溶解し、Sephadex G-100カラムクロマトで、分子量100,000以上の分画と、100,000～10,000の分画とに分けてみると、前者には G_1 -chalone 活性のみが、後者には G_2 -chalone 活性のみが検出された。両物質は別物で、しかも細胞周期に関し時期特異性 (phase specificity) を示すと結論される。この検定方法によって、加齢あるいは老化に伴う皮膚 chalone 含量の変化を追及することが次の課題となる。

3. 表皮細胞の増殖能力の加齢に伴う変化

我々が、皮膚組織細胞の増殖・分化の調節機構の研究に用いているマウス(C57BL/6J の雄)の生存率曲線は第2図のようである。10—12カ月で生存率が低下し始め、23カ月で50%になった。そこで若齢として4カ月齢をえらび、加齢の始まりとして13カ月齢をえらび、さらに老化の開始として23カ月齢をとった。この3時点での耳殻表皮の増殖活性を、 ^3H -チミジン瞬間標識による DNA

第2図 研究材料としたマウスの生存曲線

第3図 正常(上段)および創傷後1日の創傷部(下段)の表皮の増殖能

第4図 器官培養した耳殻表皮の増殖活性○, ●は別の実験結果を示す。

合成細胞数として測定したのが第3図上段(control)で、3群の間に余り差はみられない。しかし傷をつけて、増殖を刺激すると、第3図下段のように差が出てくる。すなわち、加齢および老化によって、創傷後1日におけるS期細胞数は有意に減少する。しかし、さらに増殖活性の昂まる2, 3日後になると3群の間で再び差がみられなくなる。つまり刺激後の初速において加齢の効果がみられるだけである。このことは、表皮細胞の本質的な増殖活性が加齢によって一少なくとも老化の始まりまでは一変しないのではないかと思わせる。この推論は、培養に移した場合、培地に牛胎児血清(FCS)を加えておくと、月齢に無関係に、同様な昂められた増殖活性を示す(第4図)ことから支持される。

細胞の intrinsic な増殖活性が同じなのに、傷をつけた後の増殖増進の初速が加齢、老化で低下するのは、調節機構の変化に起因するのではないかと思わせる。先の Olsson and Ebbesen⁴⁾の主張と逆に、田内の作業仮説、すなわち分裂抑制因子は、細胞の加齢、老化に伴ない増加すると考えた方が説明に都合が良い。果して、 G_1 - G_2 -chalones が月齢と共にどう変化するか、興味のある所であるが、先述したように検出系が出来上ったばかりの現在、結論には暫くの時間が必要である。

付. その他の変化

間質組織については、体内各所で本質的には均質と考えられる。皮膚を培養して得られた線維芽細胞の DNA 修復能を、色々な種について比較してみると、その種のもつ固有の寿命と良く相関するとの報告¹¹⁾は、極めて注目値するが、加齢・老化によって DNA 修復能が減少

するとの証拠は未だない。寿命との相関の追試を含め、今後検討すべき課題である。

老化の研究にとって結合組織の老化機作が極めて重要であることは論を待たないが、これに関連して、放射線の脱発効果としての fibrosis の成因が良いモデルとなるのではないと思われる。怖らく、毛細血管分布の異常再生が表皮ならびに結合組織の分化異常、すなわち、前者においては永続性肥厚、後者においては fibrosis をもたらすのではないかと推論され¹²⁾、特に老化による毛細管内皮細胞の増殖動態の変化の追及が待たれるところである。

文 献

- 1) Ebbesen, P.: *Nature* **241**: 280, 1973.
- 2) Ebbesen, P.: *Science* **183**: 217, 1974.
- 3) 山口武雄：代謝, **13** : 227, 1976.

- 4) Olsson, L. and Ebbesen, P.: *Exp. Gerontol.* **12**: 59, 1977.
- 5) Hamblin, A.S.: *Nature* **265**: 767, 1977.
- 6) Houck, J.C. ed.: *Chalones*, North-Holland, Amsterdam, 1976.
- 7) Hennings, H., Elgjo, K. and Iversen, O.H.: *Virchows Arch. B. Zellpath.* **4**: 45, 1969.
- 8) Marks, F.: *HoppeSeyler's Z. Physiol. Chem.* **352**: 1273, 1971.
- 9) Yamaguchi, T., Hirobe, T., Kinjo, Y. and Monaka, K.: *Exp. cell Res.* **89**: 247, 1974.
- 10) Yamaguchi, T. and Hirobe, T.: In *Biochemistry of Cutaneous Epidermal Differentiation* (M. Seiji and I.A. Bernstein eds.) Univ. Tokyo Press, p. 181, 1977.
- 11) Hart, R.W. and Sotlow, R.B.: *Proc. Nat. Acad. Sci.* **71**: 2169, 1974.
- 12) 山口武雄：癌の臨床, **21** : 459 (1975)

6. 免疫担当細胞について

廣川勝昱

1. 緒 言

加齢と共に免疫機能が、その全てではないが低下する事が、人、モルモット、ハムスター、ラット及びマウス¹⁾²⁾で知られている。免疫系が老化、または加齢と結びつけられて、関心を集めている理由の1つは、この加齢に伴う免疫能の低下が老人に於ける感染症、癌、及びある種の自己免疫疾患などの発生率増加の原因ではないかと考えられているからであろう。即ち、① 抗生物質による治療が行き渡っている現在でも老人は感染に罹り易く、それで死ぬ事も多いが、これを老人における免疫能低下に帰する事に、無理はない。② ある種の自己免疫疾患、例えば Rheumatoid Arthritis、及び Autoimmune Thyroiditis 等は加齢と共に発生率が増加する。又、病気を引き起こす迄に至らなくても、老人には、各種の自己抗体が検出されている³⁾。これらについては、自己抗体の産生を抑えている Suppressor T cell の活性が老人では低下する為であるという説明がある。③ 悪性腫瘍の発生率が加齢と共に増加する事は周知の事実であるが、これも老人では腫瘍免疫能が低下している為であるという説明が出来よう。④ Mackay ら⁴⁾によれば、動脈硬化症の発生も一部は自己免疫機構によって説明し得るとされている。

いずれにしても、老人に起こる種々の疾患、或いは加齢と共に増加して来る種々の疾患の発生には免疫系の機能低下が重要な引き金となつているという事は云えそうである。

2. 加齢に伴う免疫系の機能低下

免疫系は骨髓から胸腺を経て作られる T cell 系、骨髓に由来する B cell 系、マクロファージ系、及びこれらの細胞にとって重要な Microenvironment となる。胸腺、脾、骨髓、リンパ節の支持組織から構成されている。

a) 免疫系の機能低下が、免疫系を取り囲む humoral

environment の加齢に伴う変化に基づくという可能性がある。例えば、有害な物質が増加して来るとか、必須な物質が減少して来るとい事が考えられるが、マウスをモデルとした実験ではその様な可能性は少く^{5,6)}、機能低下の大部分は、免疫系を構成している細胞に内在する変化によるものと結論されている。

b) 細胞に内在する変化。

イ. 骨髓幹細胞：人では、一般に加齢と共に赤色髓が減少するといわれており、従って各免疫担当細胞の幹細胞が減少する可能性があるが、それを明確にした報告はない。マウスでは、脾のコロニー法で見る限り骨髓幹細胞の総数は生涯を通じて不変であるといわれている⁷⁾。若齢及び老齢の骨髓細胞をX線照射マウスに移入、一定期日後、T cell 及び B cell の形成を見てみると、老齢マウスの骨髓幹細胞が B cell に分化する能力は低下しているが⁸⁾⁹⁾、T cell の前駆細胞を供出する能力には、若齢と老齢との間に有意差は見られない⁹⁾。

ロ. マクロファージ：これは Accessory cell (A cell) とも云われているが、免疫応答反応において、抗原を処理し、T-B cell cooperation を補助する役割を担っているものと考えられている。即ち、大部分の抗原はマクロファージに処理されて、始めてリンパ球に対して有効な抗原として作用し得るようになるらしい。従って、マクロファージの欠陥は直ちに、免疫応答反応の低下に結びつく事になるが、マウスにおける実験では、マクロファージの貪食能力、および T-B cell cooperation を補助する能力は加齢と共に変わる事はないといわれている⁹⁾¹⁰⁾。水解酵素の活性に関しては、加齢と共に寧ろ増大するという報告がある¹¹⁾。

ハ. B cell : B cell の数を人の末梢血¹²⁾、およびマウスの脾リンパ節¹³⁾で見ても加齢に伴う変化は認められていない。マウスの B cell に特異的に働く細菌の Lipopolysaccharide (LPS) で DNA 合成の増強効果を見ても加齢に伴う変化は少ない¹³⁾。マウスでは、ある種の T cell 依存抗原、例えば羊赤血球に対する抗体産生能は加齢と共に著しく低下する事が知られている¹⁴⁾。これは、老齢動物では B cell から抗体産生細胞への分化が

速やかに行われたい為であると説明されている¹⁵⁾。

一方、抗体産生細胞である形質細胞については、逆に、加齢と共に増加する傾向がある¹⁶⁾¹⁷⁾。即ち、B cell については、その総数は加齢と共に不変ではあるが、亜集団によっては、能力の著しく低下するものもあり、また不変のものもあると云えよう。

ニ. T cell : 現在迄の多くの事実から判断すると、加齢に伴う免疫機能の低下及びその異常の大部分は、この T cell 系の変化に帰する事が出来そうである。T cell 系は、それ自体が effector cell として、細胞性免疫を担当する他に、Regulatory T cell (Amplifier, Helper および Suppressor T cell) として広く免疫応答反応の調節に重要な役割を果している。

人の末梢血のリンパ球は加齢と共に減少し、それと共に、T cell の数も減少する¹²⁾¹⁸⁾¹⁹⁾。機能的に見た場合も、皮膚の遅延型過敏反応の低下、T cell に特異的に作用する mitogen, phytohemagglutinin (PHA) に対する反応性の低下が老人において明らかである²⁰⁾²¹⁾。只、当然の事乍ら、図 1 に見られる如く、老人の末梢血リンパ球の種々の mitogen に対する反応性の低下は明らかであるが、個々の偏差の大きい事もあり、人によっては高齢にも拘らず、余り反応性の低下の見られない場合もある。マウスの T cell については、検索の容易な事もある多くの報告がある。細胞性免疫に関しては、PHA 反応性²²⁾²³⁾、mixed leucocyte culture (MLC) における反応性²⁴⁾²⁵⁾、graft versus host reaction (GVHR)²⁶⁾、cell mediated cytotoxicity²⁷⁾ 等において加齢に伴う低下

図2 長寿命の BC₃F₁ マウスの PHA 幼若化細胞の核内 ³H-サイミジン摂取量の分布. 若令に較べて、老令マウスでは ³H-サイミジン摂取量の少ない細胞が圧倒的に多い事に注目。

が明らかにされているが、マウスでは、脾、リンパ節のなかで T cell の占める比率は老若間で余り差がなく、従って、これらの細胞性免疫能の低下は T cell の絶対数の減少によるものではないらしい。この点をより明確にする為に、PHA で刺激されたマウスの脾リンパ球が一定時間内に取り込む ³H-Thymidine の量をオートラジオグラフィーで観察し、老若間で比較して見た。図 2 に示すように、老令マウスの脾リンパ球の核内への ³H-Thymidine の取り込み量は少ない方に偏っている事が判る。即ち、個々の細胞レベルで分裂増殖する能率が低下していると云える。

T cell の免疫応答反応を調節する能力に関しては、T cell 依存抗原である羊赤血球に対する抗体産生時の helper T cell の活性は老令マウスでは低下する²⁸⁾。一方、Suppressor T cell は、NZB マウスの如く自己免疫疾患が自然に発症する系では、その活性は加齢と共に低下するが²⁹⁾、通常の系では Suppressor T cell の活性は、加齢と共に増加し、その為に加齢に伴う抗体産生能の低下が起こるという報告³⁰⁾もある。しかし、抗体産生を抑制する因子については、T cell ばかりでなく、Suppressor B cell の存在も提起され、そのうち、抗原とは無関係に作用する Suppressor B cell は加齢と共に増大するが³¹⁾、抗原に特異的に作用するものは加齢と共に減少する方向にある³²⁾という報告もあり、この方面においては、未だ明解な説明が得られていない。いずれにしても加齢と共に、T cell の調節機構が次第に瓦解しつつ

MITOGENIC RESPONSES OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES
(Hirokawa & Okayasu, 1977)

図1 青年および老人の末梢血リンパ球の種々の Mitogen に対する反応性

ある事は、多くの人の認める处である。

ホ. 胸腺萎縮, 前項で述べた T cell の全般的機能低下の最大の原因は、思春期以後に急速に進行する胸腺萎縮の為に、新しい T cell の供給が激減する為と思われる³⁵⁾。マウスにおいて、思春期以後に胸腺剔出をした場合、すぐには影響は現われないが、6カ月以上を経てから、その免疫能を調べて見ると、その様な操作が、加齢に伴う免疫能の低下を促進すると云われている³⁵⁾。また、老齡マウスの胸腺でも、X線を照射して免疫不全状態に陥ったマウスに移植すると、その免疫能の回復が早くなると云われている³⁴⁾。即ち、萎縮しつつある胸腺でも、ある程度の T cell の供給を行い得る事をこれらのデータは示しているが、新生仔期の胸腺と比較すると圧倒的にその機能が低下している事が次の実験で判る。即ち長寿命の BC₃F₁ マウス (平均寿命、約30カ月) を使用し、先ず人工的に T cell を除いたマウス (adult TXB マウス) を作製する。このマウスに生後1日から33カ月の胸腺を移植し、これらの胸腺の T cell を回復させる能力を比較して見ると、T cell を産生する能力は新生仔期の生後2週迄は良く保たれているが、それ以後は、急激に低下する事が判った³⁵⁾³⁶⁾。只、胸腺の T cell を産生する能力低下の速度は、T cell の亜集団によって異なり、末梢リンパ組織に分布し、PHA に反応する T cell を分化誘導する胸腺の能力は生後1カ月以内に急速に低下するが一方、調節性 T cell の1つである helper T cell を分化誘導する能力の加齢に伴う低下は緩徐で、老齡の萎縮した胸腺でもその能力がある程度保たれている事が示された。

ヘ. 胸腺, 骨髓幹細胞と個体環境 : T cell 系の加齢に伴う機能低下が胸腺の T cell 分化誘導能力の低下のみに帰する事が出来るであろうか?。骨髓由来の T cell の前駆細胞に問題がある可能性もある。その点を明確にする為に、X線照射若齡マウスに若齡、および老齡の骨髓細胞を移入し、一定期日後に、脾の T cell の回復を PHA 反応性で調べてみた。即ち、この場合、胸腺の T cell 分化誘導能は同じだが、T cell の前駆細胞の年齢のみが異なるという条件にしてみた。その結果は、若齡の骨髓細胞を移入した群の方が、やや T cell の回復が良かったが、統計的には、老若間で有意差は得られなかった⁶⁾。また、この実験とは逆に、老齡マウスに新生仔胸腺を移植すると、脾リンパ球の PHA 反応性に著しい改善が認められた⁹⁾。以上の実験結果から、骨髓の T cell 前駆細胞に内在する加齢的变化は少く、従っ

て、T cell 系の加齢に伴う機能低下は、胸腺の T cell 分化誘導能が加齢と共に激減する為である事が確認された。即ち、加齢と共に新しい T cell の補充が急速に減少し、古い疲弊した T cell が増加する為に、T cell 系の機能低下が起こると云えよう。

3. 加齢に伴う免疫系の形態学的変化

さて、以上述べた如く、加齢に伴う免疫系の機能低下は、胸腺萎縮、および T cell, B cell に内在する変化に帰する所が多い事が明らかになった。次に、これらの細胞レベルの変化を形態学的に検索して見た。

a) 胸腺萎縮

胸腺は生後急速に重量を増すが、性成熟と共に急速に退縮し、この傾向は人³⁷⁾でもマウス³⁵⁾でも同様である。平均寿命30カ月の BC₃F₁ マウスでは6週齡頃にピークがあるが、光顯的には、この重量変化は主として皮質のリンパ球の増減による。電顯的には、若い胸腺の基本構造は上皮性細網細胞 (TEC) の網状構造から成り、皮質ではこの網の目が疎でリンパ球が充満しているが、髓質では TEC が主となり、ハッサル小体が点在する。加齢に伴う萎縮と共に、脂肪細胞、マクロファージ、形質細胞が浸潤し、TEC の網状構造は次第に破壊され、老齡マウスの萎縮胸腺では、浸潤細胞の中に TEC が島嶼状に点在し、従って皮髓の区別も失われる³⁸⁾。人の萎縮胸腺では、脂肪浸潤が圧倒的で、脂肪組織の中に、ハッサル小体を伴った TEC が点在する状態になる。さて、機能的には、この様な萎縮胸腺の T cell 分化誘導能の低下、即ち、胸腺ホルモンの分泌低下がある事は既に述べた通りであるが、形態学的にも、上皮性細網細胞 (TEC) 内のホルモン分泌を思わせる像が加齢と共に激減し、TEC が次第に変性に陥っていく過程が認められる。ホルモン分泌を思わせる像は直径0.3~1.0 μ の小胞で、纖毛様あるいは微絨毛様の構造をもち、中等度の電子密度の細顆粒状物質を含んだもので、人胎児またはマウス新生仔の胸腺髓質の TEC 内に認められる⁶⁾³⁸⁾³⁹⁾。電顯組織化学的に見ると、この様な小胞は、時に Alkaline Phosphatase が陽性に染るが、Acid Phosphatase は陰性である。一方、皮髓に広く分布する TEC 内には、Acid Phosphatase 陽性の小胞が認められるが、この様な小胞は胸腺の萎縮と共に増大し、高電子密度の粗大顆粒物質の貯留が認められる様になる³⁸⁾。

b) T cell

人の末梢血リンパ球から、Eロゼット形成法で T cell

図3 マウス脾リンパ球の PHA 幼若化細胞の走査電顕像 (× 7,500) 左が2ヵ月令, 右が24ヵ月令のマウスから採取したもの。

を集め、電顕的に観察し、臍帯血、20歳台の青年、80歳以後の老人で違いがあるか否かを検討して見た。新生児、および青年の T cell は、ほぼ、球型で、細胞膜表面の villi も規則正しく分布しているものが多いが、老人の T cell の中には不整球型のものが散見され、膜表面の villi も不規則な分布を示すものが多い。T cell の2/3には集合性の高密度顆粒 (CDB) が認められると報告されている⁴⁰⁾。しかし、新生児の T cell には、その様なライソゾームの性質を示す小体は少く、逆に老人の T cell では増加する傾向が認められた。

次に人末梢血のリンパ球の PHA で幼若化したものについて、青年および80歳以上の老人の間に差があるか否かを検討して見た。

青年の PHA 幼若化細胞は、ポリライボゾームに富み、ライソゾーム様の小体が散在し、少数の粗面小胞体をもつ。この様な性質は老人の PHA 幼若化細胞でも余り変りがないが、それに加えて、1~2μ の脂肪滴が出現する事が特異的な変化である。

長寿命マウス BC₃F₁ の脾リンパ球の PHA 幼若化細胞

についても老若問の形態学的差を検討して見た。走査電顕で見ると、若齢マウスの PHA 幼若化細胞の表面は均等に分布する villi に覆われているが、老齢マウスでは、villi の数も明らかに少く、不規則に分布したものが大部分で、外形も球状ばかりでなく紡錘状等の不整なものが増加して来る (図3)。透過電顕で見ると、老齢マウスの PHA 幼若化細胞は、老人で見られた変化より明瞭で、脂肪滴の存在の他、ライソゾーム様の小体が著増し、ポリライボームの減少も認められる。

c) B cell

マウス脾の B cell の細胞膜表面の免疫グロブリン (SIg) をペルオキシダーゼを使用した電顕的酵素抗体法で検出し、老若間で比較して見た。この様にして検出される B cell は、かなり heterogenous な集団で形態学的比較をする事は難しかったが、SIg のみについて見ると、若齢 B cell の SIg は細胞表面に均一に分布している事が多いが、老齢 B cell の SIg は、不連続に偏って分布している事が多い傾向が認められた。

d) 形質細胞

図4 抗 Horseradish peroxidase 体産生細胞左が3カ月令, 右が30カ月令のマウスから各々採取したもの。(× 9,300)

Horse radish peroxidase を抗原として, それと Frennd Complete Adjuvant を良く混合したものを若齢および老齢マウスの足蹠皮内に注射した後, 2週目に, 膝窩リンパ節に出現する抗ペルオキシダーゼ抗体産生細胞を電顕的酵素抗体法で観察した。まず, 抗体産生細胞の数は老齢リンパ節では若齢に較べて少い。微細構造を見ると, 若齢の抗体産生細胞では細長い粗面小胞体 (rER) が層板状に並び, 抗体は rER 内に均等に分布しているものが多いが, 老齢の抗体産生細胞では, rER は小囊状で, 抗体の分布も不均等であるものが多い (図4)。老化した細胞の作る抗体は, 抗原との結合が弱いといわれている⁴¹⁾。従って, 老齢の抗体産生細胞内の一部の rER 内に抗体が認められないのは, 産生がないというだけでなく, 抗原との結合力の弱い抗体である為に, 検出出来なかったとも解釈出来る。

e) マクロファージ

マウスの腹腔内に, チオグリレコートを注入後, 3日目に, 腹腔を洗浄して得られた腹腔マクロファージを対

象とし, 走査電顕で細胞外観を, また, 透過電顕では, 微細構造とペルオキシダーゼ活性を観察し, 老若間で比較検討したが, 全般的に大きな差違は認められなかった。

ただ, 老齢マウスでは, ペルオキシダーゼ陽性の喰胞を多数もつ, 極めて大型のマクロファージの増加が認められた。

4. まとめ

加齢に伴い, 免疫機能は一般的に低下するが, その原因は主として, T cell 系の機能低下による事が多く, それは, 更には, 加齢に伴う胸腺の萎縮により, 新しい T cell の補充が減少し, 疲弊した T cell が増加していく為と説明出来る。T cell の細胞レベルの加齢に伴う変化としては, 機能的には, 分裂増殖能力の低下, 形態学的には, 細胞外形の不整化, ライソゾーム様小体の増加, 脂肪顆粒の出現等として観察される。B cell については, 骨髓幹細胞の B cell への分化能力が, 加齢

と共に低下する事が示唆され、形態学的には、膜表面の SIg の平均等な分布、抗体産生細胞内での不均等な抗体分布として観察される。

本研究にご協力いただいた東京都老人研基礎病理部の各位に感謝いたします。

文 献

- 1) Walford, R.L.: The immunologic theory of aging. Munkusgaard, Copenhagen, 1969.
- 2) Siegel, M. and Good, R.A., editors: Tolerance, Autoimmunity and Aging. Charles, C. Thomas, Springfield, Illinois.
- 3) Serafini, U., Torrigiani, G. and Masala, C.: Proc. Vth Int. Congr. Allerg. pp. 527-539.
- 4) Mackay, I.R., Whittingham, S.F. and Mathews, J.D.: In Immunology and Aging (Makinodan, T. and Yunis, E.J. eds.) pp. 35-49, 1977 Plenum Pub. Corp. New York.
- 5) Price, G.B. and Makinodan, T.: J. Immunol., **108**: 413-417, 1972.
- 6) 広川勝昱: 医学の あゆみ, **97**: 519-526, 1976.
- 7) Chen, M.G.: J. Cell. Physiol., **78**: 225-232, 1971.
- 8) Farrar, J.J., Loughman, B.E. and Nordin, A.A.: J. Immunol., **112**: 1244-1249, 1974.
- 9) Perkins, E.H. and Makinodan, T.: Proc. Ist Rocky Mt. Symp. Aging. pp. 80-103, Colorado State Univ., Fort Collins, Colorado, 1971.
- 10) Heidric, M.L. and Makinodan, T.: J. Immunol., **111**: 1502-1506, 1973.
- 11) Heidric, M.L.: Gerontologist., **12**: 28, 1972.
- 12) Diaz-Jouanen, E., Strickland, R.G. and Williams, R.D.: Am. J. Med., **58**: 620-628, 1975
- 13) Makinodan, T. and Adler, W.: Fed. Proc., **34**: 153-158, 1975.
- 14) Makinodan, T. and Peterson, W.J.: J. Immunol., **93**: 886-896, 1964.
- 15) Kishimoto, S., Takahama, T. and Mizumachi, H.: J. Immunol., **116**: 294-300, 1976.
- 16) Good, R.A. and Yunis, E.J.: Fed. Proc., **3**: 2040-2050, 1974.
- 17) K. Hirokawa, Unpublished data.
- 18) Augener, W., Cohnen, G., Reuter, A. and Brittinger, G.: Lancet, **1**: 1164, 1974.
- 19) Alexopoulos, C. and Babis, P.: Lancet, **1**: 426, 1976.
- 20) Hallgren, H.M., Buckley, C.E., Gilbertsen, III. V.A. and Yunis, E.J.: J. Immunol., **111**: 1101-1107, 1973.
- 21) Robers-Thomson, I.C., Whittingham, S., Youngchaiyud, U. and Mackay, I.R.: Lancet, **2**: 368-370, 1974.
- 22) Hori, Y., Perkins, E.H. and Halsall, M.K.: Proc. Soc. Exp. Biol. Med., **114**: 48-53, 1973.
- 23) Mathies, M., Lipps, L., Smith, G.S. and Walford, R.L.: J. Gerontol., **28**: 425-430, 1973.
- 24) Adler, W., Takiguchi, T. and Smith, R.T.: J. Immunol., **107**: 1357-1362, 1971.
- 25) Konen, T.G., Smith, G.S. and Walford, R.L.: J. Immunol., **110**: 1216-1221, 1973.
- 26) Kishimoto, S., Shigemoto, S. and Yamamura, Y.: Transpl., **15**: 455-000, 1973.
- 27) Goodman, S.A. and Makinodan, T.: Clin. Exp. Immunol., **19**: 533-542, 1975.
- 28) Price, G.P. and Makinodan, T.: J. Immunol., **108**: 403-412, 1972.
- 29) Krakaner, R.S., Waldmann, T.A. and Strober, W.: J. exp. Med., **144**: 662-673, 1976.
- 30) Segre, D. and Segre, M.: J. Immunol., **116**: 735-738, 1976.
- 31) Roder, J.C., Duwe, A.K., Bell D.A. and Singhal, S.K.: J. Immunol. in press.
- 32) Hirokawa, K., Hatakeyama, S. and Sado, T.: Proc. Jap. Soc. Immunol. **7**: 247-248, 1977.
- 33) Metcalf, D.: Nature (London), **208**: 1336, 1965.
- 34) Davies, A.J.S.: Transpl. Rev., **1**: 43-91, 1969.
- 35) Hirokawa, K. and Makinodan, T.: J. Immunol., **114**: 1659-1664, 1975.
- 36) Hirokawa, K. and Sado, T.: Mechanism Aging Development, **7**: 89-95, 1978.
- 37) Boyd, E.: Am. J. Dis. Child., **43**: 1162-1214, 1932.
- 38) Hirokawa, K.: The thymus and aging. in "Immunology and Aging (Makinodan, T. and Yunis, E.J. eds.) pp. 51-72. Plenum Pub. Corp. New York, 1977.
- 39) Hirokawa, K.: Acta Pathol. Jap., **19**: 1-13, 1969.
- 40) 浦辺陽之輔: 日本臨床, **33**: 203-210, 1975.
- 41) Goidl, E.A., Innes, J.B. and Weksler, M.E.: J. Exp. Med., **144**: 1037-1048, 1976.