＜シンポジウム：痴呆の病因と対策＞

1. 病因

1) Alzheimer 型老年痴呆

老人斑アミロイドの生化学的および免疫学的性質について

徳武 哲

＜要 約＞ Glenner¹⁾や Masters ら²⁾により Alzheimer 病や Down 症の老人斑(SP)やアミロイド沈着血管から単離された β -タンパク質の分子量は4kDa であったが、 β -タンパク質の cDNA より推定された前駆体の分子量は70～80kDa であった³⁾。4kDa の β -タンパク質は、混在している細胞核等を分解するために用いたタンパク質分解酵素によりできた可能性が考えられるので、本実験では、精製過程でタンパク質分解酵素を用いなかった場合、分子量4kDa 以上の β -タンパク質が得られるかどうかを調べることを目的として行なった。混在物の可溶性成分はまず8M 尿素により可溶化した。次に、不溶性成分は β -構造を持つタンパク質を容易に可溶化するエチレンジアミン-水酸化第二銅 (ED-Cu) 溶液やギ酸溶液により可溶化した。可溶化したタンパク質の免疫学的性質は β -タンパク質に対するポリクローナル抗体を用い、イムノブロット法により調べた。分子量4kDa の成分は、どの可溶化画分にも見出されなかったが、尿素可溶化画分には、前駆体と思われる分子量70kDa のバンドが見出された。このバンドは痴呆のない人の剖検脳や牛の脳からも見出された。ED-Cu 可溶化画分とギ酸可溶化画分にはヒストンのある成分と分子量が同じ成分が見出され、また β -タンパク質に対する抗体と反応した。これらの結果より、Selkoe⁴⁾や Delabar ら⁵⁾により示唆されているように、 β -タンパク質は必ずしも Alzheimer 病に特異的な成分ではなく、異常な分解よりも過剰に作られた結果、蓄積したのではないかと考えられる。また、ヒストンと老人斑の関係についても考察した。

Key words : アルツハイマー病, 老人斑, β -タンパク質, アミロイド

結 言

Alzheimer 病や Down 症患者の剖検脳に見出される老人斑 (Senile Plaque : SP) やアミロイド沈着血管の主要成分の一つとして、分子量4kDa の β -タンパク質が、Glenner¹⁾や Masters ら²⁾により単離された。その前駆物質の全一次構造は β -タンパク質の cDNA より決められ、約700のアミノ酸からなる膜受容体の特徴を持つタンパク質と推定されている³⁾。この低分子量の β -タンパク質は、精製の過程で用いられているタンパク質分解酵素によりできた可能性も考えられるので、脳アミロイドタンパク質の生成機構を知るには脳や血管中に存在する時の分子量を知る必要があると思われる。従って本実験では、SP の精製にタンパク質分解酵素を用いず、アミロイドタンパク質の可溶化には、

β -構造を持ったタンパク質をよく可溶化するエチレンジアミン-水酸化第二銅 (ED-Cu) 溶液とギ酸溶液を用いた⁶⁾。可溶化したタンパク質の免疫学的性質は、 β -タンパク質に対するポリクローナル抗体を用い、イムノブロット用により調べた。

方 法

1) SP の精製。剖検脳は、Alzheimer 病と診断された65歳と86歳で死亡した患者のもので、 -70°C に保存した半球を用いた。他の半球は神経病理学的方法による診断の確認に用いた。まず10g の脳を10mM Na_2HPO_4 , 1mM EDTA, 0.85M sucrose, pH 6.8の溶液50ml で、Polytron を用いて homogenize し、Hitachi RPR 20-2のローターを用い、15,000rpm で15分遠心した。上清画分を捨て、沈澱画分を1.5M sucrose を含んだ緩衝液に懸濁させ再び遠心し、上清画分を捨てた。SP の存在は偏光顕微鏡により行なった。すなわち、沈澱の一部をスライドガラス上にとり、これに1%

S. Tokutake : (財)東京都精神医学総合研究所分子生物学研究室

Congo red の50%エタノール溶液を一滴加え、ガラス棒でよく攪拌し、偏光下で観察した。球形および不定形の老人斑 Core が観察された。アミロイド沈着血管 (Cerebral Vessels with Amyloid deposits: CVA) や、紡錘形や火炎状の原線維変化 (Neurofibrillary Tangles: NFT) も観察された。他の混在物としては細胞核や結合組織が観察された。

2) SP の可溶性。二度目の遠心の沈澱画分は、まず 8M 尿素、1% β -メルカプトエタノール (β -ME) 10ml に懸濁させ、遠心により可溶性成分を分離した。上清画分を本実験では尿素画分とする。偏光顕微鏡により SP、CVA および NFT が沈澱画分に残っていることを確認した。細胞核はもはや確認されず、細胞膜様のものが沢山観察された。次に不溶性の沈澱画分に 4ml の ED-Cu 溶液を加えガラス棒でよく攪拌した。懸濁液をすみやかに遠心し、上清画分に 0.1ml の酢酸を加え中和した。これを蒸留水に對し透析し ED-Cu を除いた。透析後可溶化したタンパク質は沈澱したが、尿素を 8M、 β -ME を 1% になるように加えると再び可溶化した。この溶液を ED-Cu 画分とする。不溶性の沈澱画分にはもはや SP、CVA および NFT は観察されなかったが、さらに 90%ギ酸溶液による可溶化を試みた。沈澱をギ酸溶液に懸濁後遠心し、上清を透析し尿素を 8M、 β -ME を 1% になるように加えた。この溶液をギ酸画分とする。

結 果

図 1 には尿素画分と ED-Cu 画分の SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動の結果を示した (lane 5 と 4)。ED-Cu 画分には分子量の低い領域に濃い 2 本のバンドが見出された。ギ酸画分は ED-Cu 画分とほぼ同様な結果を示した (図省略)。尿素画分は高分子領域から低分子領域まで何本かのバンドが見出された。主要バンドの分子量を推定するため、脳に多量に存在する分子量既知のタンパク質として、粗ニューロフィラメント (lane 2) とヒストン (lane 3) の泳動を行なった。その結果 ED-Cu 画分の 2 本のバンドの分子量はヒストン-3 (H-3, 15kDa) とヒストン-4 (H-4, 11kDa) とはほぼ同じ値であった。尿素画分の低分子領域の濃いバンドの分子量はミエリン塩基性タンパク質 (MBP, 24kDa) に近い値を示した。

次に、 β -タンパク質に対するポリクロナール抗体と反応するバンドの有無を調べた。図 2 に示すように、尿素画分には前駆体の分子量に相当すると思われる 70

図 1 尿素画分と ED-Cu 画分の SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動。Lane 5, 尿素画分。Lane 4, ED-Cu 画分。Lane 1~3 は分子量測定用マーカー。Lane 1, T: soybean trypsin inhibitor (21kDa)。C: horse cytochrome c (12kDa)。Lane 2, 牛脳粗ニューロフィラメント (NF), NF-H (200kDa), NF-M (160kDa), NF-L (70kDa), GFAP: glial fibrillary acidic protein (50kDa), MBP: myelin basic protein (24kDa)。Lane 3, 仔牛脳腺ヒストン。H-3 (15kDa), H-4 (11kDa)。電気泳動は Laemmli 法により 10~20% のゲルを用いて行ない⁷⁾。染色は 0.1% Coomassie brilliant blue 溶液により行なった。

kDa の明確なバンドが見られた (a, lane 3)。この抗体はまた、H-3 と強く、反応し、H-4 と 40kDa の成分と弱く反応した (lane 2)。また、ED-Cu 画分中の H-3 に相当するバンドとも弱く反応した (lane 4)。分子量 4kDa のバンドはどの画分にも見出されなかった (ギ酸画分も含めて)。

この結果からは、 β -タンパク質に対する抗体がヒストンのある成分と反応しているように思われる。すなわち、 β -タンパク質とヒストンの間に構造上あるいは免疫学的性質において何らかの関連性が存在する可能性が考えられた。しかし、一方、ヒストンに対する抗体は β -タンパク質とは関係なくできた可能性も考えられた。その点について検討するため、まず、抗原投与前の血清によりイムノブロットを行なったが、ヒストンとは非常に弱く反応しただけであった (図省略)。

我々はたまたま、何の実験に使われることなく、3 年以上も飼育された兔を持っていたので、その血清を用いて同じ実験を行なった。図 2c に示すように、この

図2 イムノブロット法による尿素画分とED-Cu画分の免疫学的性質の検討。Lane 1, 牛脳粗ニューロフィラメント, Lane 2, 仔牛胸腺ヒストン, Lane 3, Alzheimer 剖検脳の尿素画分, Lane 4, 同 ED-Cu 画分, Lane 5, 非痴呆者剖検脳の尿素画分, Lane 6, 同 ED-Cu 画分, Lane 7, 牛脳の尿素画分, Lane 8, 同 ED-Cu 画分, a, b, 一次抗体は抗 β -タンパク質血清を400 $\times$ で使用, 抗 β -タンパク質抗体は Wong らの方法に基づき, β -タンパク質の N-末端から24番目までを合成し, 最後にシステイン残基を付け, アオガイのヘモニアニンに結合させたものを抗原として兎に投与して作成した⁹⁾, c, 何にも投与しない老齢化した兎血清を400 $\times$ で使用, いずれの場合も, 二次抗体は, アフィニティークロマトで精製し, 西洋ワサビペルオキシターゼを標識した抗兎 IgG ヤギ血清 (Bio Rad) を400 $\times$ で使用し, 発色剤としては4-クロロ-1-ナフトールを使用した⁹⁾。

血清は H-3 と H-2B (14kDa) と強く反応し, 弱くではあるが H-4 と 40kDa の成分とも反応した (lane 2)。この結果は, ヒストンに対する抗体は自己抗体として, 兎が成長するにつれてできた可能性を示している。しかし我々は, 次に述べるように, この抗体が脳組織標本の老人斑 core と反応することから, 老人斑生成とヒストンが全く無関係とは判定できないと考えている。

図 3a は, Alzheimer 病剖検脳の前頭葉組織を β -タンパク質の抗体と反応させたものである。老人斑の core と周辺の ring とともによく反応している。図 3b は老齢兎の血清と反応させたものであり, 老人斑 core とだけ反応している。

さらに, イムノブロット法で検出されたバンドが Alzheimer 病脳に特異的なものかどうかを調べるため, 痴呆を伴わない他の病気で死亡した患者の剖検脳 (心臓病で死亡した87歳の男性および精神分裂病で死亡した62歳の女性) と牛脳より, 尿素画分および ED-Cu 画分を調製し, それぞれのゲル電気泳動パターン (図4) とイムノブロットパターン (図2b) を比較した。注目すべきと思われるのは, 70kDa のバンドが非痴呆患者の脳や牛脳にも弱くではあるが検出されたことである (図2b, lane 5および7)。ED-Cu 画分においては, 非痴呆患者では H-3 ではなく H-4 とと思われるバンドと反応し (lane 6), また牛脳では H-3 と H-4 とと思われるバンドと反応した (lane 8)。Coomassie 染色では, H-3 および H-4 とと思われるバンドは尿素画分に主とし

図3 抗 β -タンパク質血清および老齢化兎血清と老人斑の反応, a, Alzheimer 病剖検脳の前頭葉のパラフィン切片を抗 β -タンパク質血清500 $\times$ で反応させた, 撮影倍率132 $\times$, b, 同クリオスタット切片を老齢化兎血清200 $\times$ で反応させた, 撮影倍率400 $\times$, いずれの場合も切片を0.1%トリプシン溶液で10分間処理後, 10%馬血清によりグロッキングを行なった, 発色は avidin-biotin-complex (ABC) 法により行なった¹⁰⁾。

図4 非痴呆者剖検脳および牛脳の尿素画分およびED-Cu画分のSDS-ゲル電気泳動. Lane 1~4は図1のlane 2~5と同じ. Lane 5~8は図2bと同じ.

て見出されており、ED-Cu画分では弱かった。

考 察

Alzheimer 病剖検脳より調製した尿素画分には β -タンパク質の抗体と反応する分子量70kDaのバンドが見出された。この分子量は β -タンパク質のcDNAより推定された前駆体の分子量の値に近いので、多分前駆体と思われる。このバンドは、非痴呆者剖検脳や牛脳の尿素画分からも弱くではあるが見出された。従って、 β -タンパク質の前駆体はAlzheimer 病脳に特異的とは言えないと思われる。しかし、この結果は必ずしも不可解なものではない。というのは、最近、in situ hybridization 法により、 β -タンパク質の遺伝子の座位は染色体21q21と推定され¹¹⁾、また、制限酵素断片長多型性 (restriction fragment length polymorphism: RFLP) を利用した連鎖解析法により、常染色体優性遺伝形式を持つ家族性 Alzheimer 病における染色体異常の位置は21q 11.2-21の領域にあると推定されているが、その位置は β -タンパク質の位置とは一致しないこと^{12)~16)}、さらにに β -タンパク質の mRNA の人脳の各部位および他の哺乳類中の脳含量の測定結果より、 β -タンパク質は正常人の脳中およびさらに広く哺乳類の脳や他の臓器にも存在し⁴⁾¹⁷⁾、細胞膜受容体として細胞の基本的機能に関与していると考えられているが、Alzheimer 病においては特にその生合成が

過剰になっていると思われるからである⁵⁾。これはDown 症のように、染色体21のある領域に含まれる遺伝子については、その生合成が過剰になっていると考えられるからである。

前駆体と思われるバンドが尿素画分に見出されたことは、この物質が正常状態でもある程度存在していることを示している。ED-Cu 画分とギ酸画分にあまり検出されなかったことは予想外の結果であったが、ED-Cu 溶液やギ酸による可溶化後は、Congo red による特異的な染色が見られなくなるが、SP は完全には可溶化されていないのかも知れない。4kDa のタンパク質だけでは、非常に難溶性の沈澱物を作るとは考えにくく、このバンドはED-Cu 画分やギ酸画分にも検出されていないので、SP 中では、 β -タンパク質は前駆体に近い形で含まれていると考えるのが妥当かも知れない。

ED-Cu 画分やギ酸画分にはH-3およびH-4ヒストンと思われるバンドが見出されているが、現在の段階ではこれがヒストンであるとは断定できない。というのは牛脳の場合に明確のように、ヒストンと思われるバンドはCoomassie 染色法では、主として尿素画分に見出されているが、 β -タンパク質に対する抗体および老齢化に伴い生じたと思われる兎の自己抗体は、ED-Cu 画分のバンドと反応しているし、これらの血清に多量のヒストンを加えて抗体を吸収しても反応性が消失しなかったからである。

全身性紅斑狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus) やリウマチ性疾患では抗核抗体が生じている場合が多いことはよく知られているが、それは主として抗DNA 抗体であって¹⁸⁾、抗ヒストン抗体がある種の病気で明確にできているという例は知られていない。ED-Cu 溶液やギ酸溶液により抽出されたものは、ヒストンの variant である可能性も考えられるので、現在アミノ酸分析や配列解析による確認を試みているが、抗ヒストン抗体が年齢化に伴う生じていることは興味深いことと思う。

本研究は文部省科学研究費 (一般研究 A-61440049) により行なった。本研究に用いた剖検脳は当研究所神経病理研究室の小阪憲司先生の御好意により得られたものである。また、 β -タンパク質に対する抗体および脳組織の顕微鏡標本は、当研究所超微形態研究室の羽賀誠一氏および分子生物学研究室的佐藤磨氏が作られたものを使わせていただいた。御礼申し上げます。

文 献

- 1) Glenner GG, Wong CW : Alzheimer's disease : Initial report of the purification and characterization of novel cerebrovascular amyloid protein. *Biochem Biophys Res Commun* 120 : 885—890, 1984.
- 2) Masters CL, Multhaup G, Simms G, et al : Neuronal origin of a cerebral amyloid : Neurofibrillary tangles of Alzheimer's disease contain the same protein as the amyloid plaque core and blood vessels. *EMBO J* 4 : 2757—2763, 1985.
- 3) Kang G, Lemaire H-G, Unterbec A, et al : The precursor of Alzheimer's disease amyloid A4 protein resembles a cell-surface receptor. *Nature* 325 : 733—736, 1987.
- 4) Selkoe DJ, Bell DS, Podlisny BM, et al : Conservation of brain amyloid proteins in aged mammals and humans with Alzheimer's disease. *Science* 235 : 873—877, 1987.
- 5) Delabar J-M, Goldgaber D, Lamour Y, et al : β Amyloid gene duplication in Alzheimer's disease and karyotypically normal Down syndrome. *Science* 235 : 1390—1392, 1987.
- 6) Tokutake S : Isolation of the smallest component of silk protein. *Biochem J* 187 : 413—417, 1980.
- 7) Laemmli UK : Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* 227 : 680—685, 1970.
- 8) Wong CW, Quaranta V, Glenner GG : Neuritic plaques and cerebrovascular amyloid in Alzheimer's disease are antigenically related. *Proc Natl Acad Sci USA* 82 : 8729—8732, 1985.
- 9) Towbin H, Staehelin T, Gordon J : Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheet : Procedure and some application, *Proc Natl Acad Sci USA* 76 : 4350—4354, 1979.
- 10) Hus S-M, Raine L, Fanger H : Use of avidin-biotin-peroxidase complex (ABC) in immunoperoxidase technique : A comparison between ABC and unlabeled antibody (PAP) procedures. *J Histochem Cytochem* 29 : 577—580, 1981.
- 11) Robakis NK, Wisniewski HM, Jenkins EC, et al : Chromosome 21q21 sublocalization of gene encoding beta-amyloid peptide in cerebral vessels and neuritic (senile) plaques of people with Alzheimer's disease and Down syndrome. *Lancet* I : 384—385, 1987.
- 12) George-Hyslop PH, Tanzi RF, Podlinsky RJ, et al : The genetic defect causing familial Alzheimer's disease map on chromosome 21. *Science* 235 : 885—890, 1987.
- 13) Tanzi RE, Gusella JF, Watkins PC, et al : Amyloid β protein : cDNA, mRNA distribution, and genetic linkage near the Alzheimer locus. *Science* 235 : 880—884, 1987.
- 14) Goldgaber D, Lerman MI, McBride OW, et al : Characterization and chromosomal localization of a cDNA encoding brain amyloid of Alzheimer's disease. *Science* 235 : 877—880, 1987.
- 15) Brockhoven CV, Genther AM, Vandeherghe A, et al : Failure of familial Alzheimer's disease to segregate with the A4-amyloid gene in several european families. *Nature* 329 : 153—155, 1987.
- 16) Tanzi RE, George-Hyslop PH, Haine JL, et al : The genetic defect in familial Alzheimer's diseases is not tightly linked to the amyloid β -protein gene. *Nature* 329 : 156—159, 1987.
- 17) Bachamanyar S, Higgins GA, Goldgaber D, et al : Localization of amyloid β protein messenger RNA in brains from patients with Alzheimer's disease. *Science* 237 : 77—80, 1987.
- 18) 金井芳之 : 抗DNA抗体と疾患. *代謝* 20 : 253—261, 1983.

Abstract

Biochemical and Immunological Properties of Senile Plaque Amyloid

Satoshi Tokutake

The β -protein which was isolated by Glenner et al and Masters et al from senile plaques (SP) and angiopathy in brains of the patients with Alzheimer's disease and Down's syndrome has a molecular weight (M.W.) of 4 kDa, but the M.W. of its precursor is estimated to be about 70–80 kDa from cDNA clone encoding β -protein. Since there is a possibility that the β -protein is produced by protease used to degrade contaminated materials such as nuclei, this experiment was performed to examine whether β -protein having a M.W. larger than 4 kDa is obtained from SP or not, when protease is not used in the process of purification. Soluble proteins of contaminated materials were extracted by 8 M urea solution. Then insoluble materials were solubilized by ethylenediamine-cuprichydroxide (ED-Cu) solution which solubilize easily the proteins with β -structure, and formic acid. The immunological properties of solu-

bilized proteins were examined with a polyclonal antibody to the β -protein by immunoblotting method. A band having a M.W. of 4 kDa was not found in any fraction solubilized by 8 M urea, ED-Cu and formic acid. A band in urea fraction having a M.W. of about 70 kDa which is an approximate value of presumable precursor reacted with the antibody. This band was also detected from brains of persons with no dementia and bovine. Several bands which have same M.W.s with some components of histon were detected by SDS-PAGE in ED-Cu and formic acid fraction, and reacted with the antibody. From these results it is estimated that the β -protein is not specific to Alzheimer's disease but deposits in SP as result of excessive production rather than abnormal degradation as suggested by Selkoe et al and Delabar et al. In addition, a possibility of relationship of histon with SP is discussed.

key words: *Alzheimer's disease, senile plaques, amyloid, β -protein*

(Jpn J Geriat 25: 352–357, 1988)

Department of Molecular Biology, Psychiatric Research
Institute of Tokyo

＜シンポジウム：痴呆の病因と対策＞

1. 病因

1) Alzheimer 型老年痴呆

神経伝達物質

中村 重信 中野 智 越村 邦夫

＜要 約＞ アルツハイマー型老年痴呆 (ATD) にみられる種々の症状の発現に神経伝達物質の異常が関係すると思われる。そのため、ATD 患者における神経伝達物質の動態異常を知ることによって、診断や治療方針の手がかりにすることが可能と思われる。神経伝達物質の中でもアセチルコリンが最も注目されている。アセチルコリン合成酵素 ChAT の髄液内活性は加齢とともに低下した。ATD 患者剖検脳内の ChAT の最大活性は低下し、低下の程度は初老期発症のアルツハイマー病で、高齢発症の老年痴呆より顕著であった。大脳皮質諸部位とマイネルト基底核での ChAT 活性の低下度は相関した。ChAT の基質である choline や acetyl CoA に対する Km は ATD 剖検脳で有意に上昇し、基質に対する親和性の低下、効率の低下を示唆していた。アセチルコリン分解酵素 (AChE) G4アイソザイム活性は髄液では加齢により上昇したが、血漿では加齢による変化は認められなかった。ATD のうち初老期発症患者で髄液、血漿とも AChE 活性の低下がみられ、高齢発症のものでは髄液 AChE 活性は有意差が認められなかった。アセチルコリン以外にも dopamine や serotonin の分解産物の髄液内濃度や norepinephrine 合成酵素の髄液、血清中の活性も ATD 患者では低下していた。その中でも、dopamine の分解産物の髄液内濃度や norepinephrine 合成酵素の血清中の活性は初老期アルツハイマー病では低下していたが、高齢発症の ATD 患者では対照群との間に有意差は認められなかった。神経ペプチドのうち、vasopressin の大脳皮質における濃度も ATD 患者で低下していた。ATD 患者では多数の神経伝達物質の異常が認められるが、それらが ATD の一次的原因というよりは、DNA 異常などによりもたらされたものと考えられる。これら種々の神経伝達物質や受容体の異常の組合せにより、ATD にみられる多彩な症候が発現するものと想定される。

Key words : アルツハイマー型老年痴呆, アセチルコリン, ドパミン, ノルエピネフリン, セロトニン

結 言

神経刺激が伝播する場合、刺激が神経細胞の軸索を伝播する速度は速く、その機序も NaK-ATPase を介する単純なものである。しかし、刺激がシナプス間隙を通して次の神経細胞に伝播されるのには時間がかかり、その機序も単一なものでない。すなわち、シナプスの伝達は神経伝達物質を介して行われるが、刺激を促進的に伝えるもののほかに、逆に伝達を抑制するものや、前シナプスに働いて、刺激伝達に feed back をかけるものなど、その様式は多彩である。そのため、

神経機能の調節は神経伝達を介して行われることが少なくない。また、外部より神経機能を薬剤などにより調節する場合も、神経伝達物質を通じて行われることが多い¹⁾。

Alzheimer 型老年痴呆患者における神経伝達物質の異常を明らかにして、その異常を診断上用いたり、治療方針の手がかりにする試みが多くなされている²⁾。

本報告では、種々の神経伝達物質のアルツハイマー型老年痴呆患者における異常を述べ、神経伝達物質の異常がアルツハイマー型痴呆の病因における位置づけについて考察する。

方 法

アルツハイマー型痴呆は精神医学的所見および神経学的所見により診断し、CT, MRI, PET, SPECTなどの放射線学的所見を参考にした。アルツハイマー型痴呆を便宜的に65歳以前に発症したものをアルツハイマー病とし、65歳以後に発症したものを老年痴呆とした。

血管性痴呆も同様にして診断したが、Hachinskiのischemic score⁹⁾を参考にした。mixed typeやまぎらわしい症例は今回の検討からは除外した。

髄液は1週間前より神経伝達物質に影響を与えるような薬剤の投与を中止した後採取した。採取当日は起床時より安静、仰臥位で絶食させた。午前9時に腰椎穿針を行い、最初の3mlを一般検査に、次の3mlを活性アミンの代謝産物の測定に、次の3mlをDBH, acetylcholinesterase, choline acetyltransferase 活性の測定に用いた。細胞成分を冷凍遠沈にて除去した後、上清を-80℃に保存し、1カ月以内に解凍して測定した。

剖検脳は死後8時間以内に脳半球を2分し、一方を病理検索用に10%ホルマリン中に固定し、他方は生化学検索用に-80℃で保存した。脳皮質標品としてBrodmann 4, 7, 10, 17, 22野を氷冷下の剖検脳より採取した。また、前交連と視神経路を指標にして、マイネルト核に相当する部分⁴⁾を採取し測定した。

choline acetyltransferase (ChAT) 活性はFonnum⁵⁾の方法によって測定した。髄液中のChAT活性の測定の際には、髄液中の低分子物質によるnonspecificな反応を除外するため、髄液1mlをコロジオンバッグにて限外濾過した後、0.05mlに濃縮してChAT活性を測定した。

髄液中acetylcholinesterase (AChE) 活性はNakanoら⁶⁾の方法により比色定量した。血漿中AChEのG4アイソザイムの活性測定は、ディスクゲル電気泳動後⁷⁾、Tagoら⁸⁾の方法により染色し、デンシト・メーターにより定量した。

髄液中のhomovanillic acid (HVA) および5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) 濃度は高速液体クロマトグラフィーによって分離し、電気化学検出器によって定量した⁹⁾。

髄液中のdopamine- β -hydroxylase (DBH) 活性の測定は2波長による吸光法により行い¹⁰⁾、血清DBH活性はNagatsuら¹⁰⁾の方法により測定した。

脳内の vasopressin 濃度は Fujiyoshi ら¹²⁾の方法により radioimmunoassay により測定した。

結 果

1. アルツハイマー型痴呆患者における choline acetyltransferase (ChAT) の異常

髄液中のChAT活性は加齢とともに低下する傾向が認められた(図1)。高齢発症の老年痴呆患者剖検脳では脳皮質のBrodmann 10, 17, 22野、マイネルト基底核では有意に低下していた。4野、7野ではChATの最大活性の低下傾向は認められたが、同年齢の対照群との間に有意差は認められなかった。一方、初老期発症のアルツハイマー病剖検脳のChAT最大活性は脳皮質のすべての領域で低下しており、低下の程度も高齢発症の患者と比較して顕著であった。

マイネルト基底核(nbM)と脳皮質のChAT活性の間の相関を検討した。脳皮質 Brodmann 4, 7, 10, 17, 22野とnbMのChAT活性には、有意の正相関がみられた。中でもBrodmann 10, 17, 22野とnbMのChAT活性の相関は高く、22野(側頭葉)と最も高い相関関係にあった。

ChATのcholineに対するKmは対照群の前頭葉および側頭葉ではそれぞれ $1.90 \pm 0.07 \text{mM}$ および $1.38 \pm 0.28 \text{mM}$ であった。アルツハイマー型痴呆群の前頭葉および側頭葉では $2.11 \pm 0.15 \text{mM}$ および $2.26 \pm 0.38 \text{mM}$ であり、いずれも有意に上昇していた。一方、acetyl CoAに対するKmは対照群の前頭葉および側頭葉でそれぞれ $67.6 \pm 4.9 \text{mM}$ および $93.3 \pm 8.4 \text{mM}$ であった。アルツハイマー型痴呆のacetyl CoAに対するKmは前頭葉および側頭葉でそれぞれ

図1 対照群髄液 choline acetyltransferase (ChAT) 活性の加齢による変化

95.3±3.5mM および206.8±34.9mM であった。acetyl CoA に対する Km もアルツハイマー型痴呆で有意に上昇していた。すなわち、アルツハイマー型痴呆では、choline および acetyl CoA に対する親和性が低下していた (図2)。

2. アルツハイマー型痴呆患者における acetylcholinesterase (AChE) の異常

脳実質内には AChE の G4 および G1 アイソザイムが存在し、脳の微小血管には巨大分子のアイソザイムが存在する。髄液中の AChE は G4 アイソザイムが主体であった。血漿中には AChE G4 アイソザイムのほかに赤血球由来の AChE G2 アイソザイムが認められた。

髄液中の AChE は正常者でも加齢とともに上昇した ($r=0.46$, $p<0.02$)。アルツハイマー型痴呆のうち、65歳以前発症の初老期アルツハイマー病では全例平均値以下であった。一方、65歳以上で発症した高齢者老年痴呆患者では低下しているもののほかに、高値を示すものもあった。したがって、初老期アルツハイマー病では髄液 AChE 活性は有意に低下していたが、高齢者老年痴呆ではバラツキが大きく、対照群との間に有意差は認められなかった。

図2 高齢者アルツハイマー型痴呆 (老年痴呆) 患者剖検脳の最大活性と Km の変化, 統計処理は Mann-Whitney test による。

血漿中の AChE G4 アイソザイム活性は対照群では加齢による変化は著明でなかった。65歳以前発症のアルツハイマー病では髄液 AChE と同様、著しく低下していた ($p<0.005$)。一方、高齢発症の老年痴呆では血漿 AChE 活性は低下していたが、初老期発症のものより軽度であった。血管性痴呆では有意な差は認められなかった。

3. アセチルコリン受容体のアルツハイマー型痴呆における異常

アセチルコリンの受容体にはムスカリン性受容体とニコチン性受容体が存在する。QNB 結合により測定されるムスカリン性受容体はアルツハイマー型痴呆剖検脳のうち、海馬とマイネルト基底核で減少していた。一方、ニコチン性受容体は被殻やマイネルト基底核で減少していた。

4. アルツハイマー型痴呆におけるドパミン作動系の異常

ドパミンは運動機能の調節や自発性と関係すると考えられる。ドパミン合成時の補酵素還元型ビオプテリン (H_4BP) やドパミン分解産物のホモヴァニリン酸 (HVA) の濃度が髄液中で測定されている。髄液中の H_4BP 濃度と HVA 濃度はよく相関する ($r=0.48$, $p<0.02$)。髄液 HVA 濃度は年齢と逆相関し、加齢によって低下する ($r=-0.287$, $p<0.05$)。髄液中 H_4BP 濃度も加齢によって低下する ($r=-0.35$, $p<0.05$)。

髄液 HVA 濃度は初老期発症のアルツハイマー症で有意な低下を示したが、高齢発症の老年痴呆では対照群と差は認められなかった。髄液 H_4BP 濃度は HVA 濃度とよく相関し、アルツハイマー型痴呆で低下していた。

5. アルツハイマー型痴呆におけるノルエピネフリン作動系の異常

ノルエピネフリンは意識、覚醒、自律神経機能に関

図3 アルツハイマー型痴呆の発症に対する一つの考え方 (仮説)

表1 加齢およびアルツハイマー型痴呆（初老期アルツハイマー病・高齢発症老年痴呆）における神経伝達物質合成酵素・分解酵素，補酵素，分解産物の変化

作 動 系	酵素，補酵素，代謝産物	材 料	加齢	アルツハイマー病	老年痴呆
アセチルコリン	choline acetyltransferase(ChAT)	剖検脳	↓	↓↓	↓
	〃	髄液	↓		
	acetylcholinesterase(AChE)	髄液	↑	↓	→
ドバミン	〃	血漿	→	↓	↓↓
	homovanillic acid(HVA)	髄液	↓	↓	↓↓
	tetrahydrobiopterin(H ₂ BP)	髄液	↓	↓	
ノルエピネフリン	dopamine- β -hydroxylase(DBH)	髄液	→	↓↓	↓
	〃	血清	↓↓	↓	↓↓
	5-hydroxyindoleacetic acid(5-HIAA)	髄液	→	↓	↓
セトロン	arginine-vasopressin	剖検脳	→		↓

与するとされている。ドバミンより dopamine- β -hydroxylase (DBH) によって合成される。髄液 DBH 活性は中枢神経系ノルエピネフリン作動系活性を反映すると考えられている。髄液 DBH 活性は70歳までは加齢による変化は認められなかった。アルツハイマー型痴呆では同年齢の対照群と比較して、有意に ($p < 0.05$) 低下していた。血管性痴呆では低下傾向は認められたが、対照群と比較して有意差は認められなかった。

血清 DBH 活性は自律神経系とくに交感神経機能を反映すると考えられる。正常対照群では70歳台まで、軽度上昇し、80歳以上になると有意な低下が認められた。65歳以下発症のアルツハイマー病では 11.5 ± 5.8 nmol/ml/min であり、同年齢の対照群 (16.6 ± 10.9) より有意 ($p < 0.05$) に低下していた。しかし、高年発症の老年痴呆の血清 DBH 活性は同年齢の対照群と比較して有意差は認められなかった。また、痴呆の程度の高いものではとくに低値であった。

6. アルツハイマー型痴呆におけるセロトニン作動系の異常

セロトニンの減少は睡眠障害や幻覚を発現させることがある。トリプトファンが還元型ビオプテリンとトリプトファン水酸化酵素の存在下に5-オキシトリプトファンに転換され、脱炭酸を受けてセロトニンになる。分解されて5-オキシインドール酢酸 (5-HIAA) となる。

髄液5-HIAA 濃度は加齢により、減少傾向を示した。アルツハイマー型痴呆では、初老期のものも、高齢発症のものもいずれも有意に ($p < 0.05$) 低下していた。

7. アルツハイマー型痴呆における vasopressin 濃

度の異常

抗利尿ホルモン作用を持つ vasopressin は正常対照群の大脳皮質の種々の部分で50%以上に検出された。アルツハイマー型痴呆患者では、大脳皮質諸部位における vasopressin の検出率は低下しており、検出された例における vasopressin 濃度も減少していた。血管性痴呆においても同様の傾向が認められた。

考 察

神経伝達物質のアルツハイマー型痴呆患者における異常を表1にまとめた。これらの異常が病因上どのような位置づけにあるかを考察する。アルツハイマー型痴呆は加齢を基盤にして起こると考えられるが、表1にもみられるように必ずしも、加齢の延長上にあるとは考えられない。恐らく、何らかの誘因が加わって発症すると思われる。その障害はまず DNA の異常として現れる可能性が強い。とくに、ダウン症との類推、家族性アルツハイマー病¹³⁾や β -アミロイド蛋白の遺伝子座¹⁴⁾との関係より第21遺伝子の異常を想定するものもあるが、まだ決定的でなく、今後検討される課題と思われる。このような DNA の異常が脳内蛋白質の異常をきたし、神経細胞構築や軸索流を障害して、神経伝達物質や受容体の異常を起こすと考えられる。これらの種々の神経伝達物質や受容体の異常の組合せにより、アルツハイマー型痴呆にみられる多彩な精神・神経症候が出現するものと思われる。その際、アルツハイマー型痴呆の発症年齢、経過などもこれらの異常の発現に影響するものと考えられる。

文 献

- 1) 中村重信 : 神経伝達物質. 脳神経 37 : 410—411, 1985.
- 2) Nakamura S, Miyata S : Aging and neuro transmitters. Jap J Med 25 : 87—89, 1986.
- 3) Hachinski VC, Iliff LD, Zilhka E, DuBoulay GH, McAllister VL, Marshall J, Russel RWR, Symon L : Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol 32 : 632—637, 1975.
- 4) Koshimura K, Kato T, Tohyama I, Nakamura S, Kameyama M : Correlation of choline acetyltransferase activity between the nucleus basalis of Meynert and the cerebral cortex. Neurosci Res 4 : 330—336, 1987.
- 5) Fonnum F : A rapid radiochemical method for determination of choline acetyltransferase. J Neurochem 24 : 408—409, 1975.
- 6) Nakano S, Kato T, Nakamura S, Kameyama M : Acetylcholinesterase activity in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease and senile dementia. J Neurol Sci 75 : 213—223, 1986.
- 7) 中野 智, 川嶋信吾, 加藤智信, 中村重信, 亀山正邦 : 痴呆疾患における髄液 acetylcholinesterase 活性の検討および血漿 acetylcholinesterase の同定について. 神経化学 25 : 163—165, 1986.
- 8) Tago H, Kimura H, Maeda T : Visualization of detailed acetylcholinesterase fiber and neuron staining in rat brain by a sensitive histochemical procedure. J Histochem Cytochem 34 : 1431—1438, 1986.
- 9) Nakamura S, Koshimura K, Kato T, Yamao S, Iijima S, Nagata H, Miyata S, Fujiyoshi K, Okamoto K, Suga H, Kameyama M : Neurotransmitters in dementia. Clin Therap 7 : 18—34, 1984.
- 10) Kato T, Wakui Y, Nagatsu T : An improved dual-wave length spectrophotometric assay for dopamine- β -hydroxylase. Biochem Pharmacol 27 : 829—831, 1978.
- 11) Nagatsu T, Udenfriend S : Photometric assay of dopamine- β -hydroxylase activity in human blood. Clin Chem 18 : 980—983, 1972.
- 12) Fujiyoshi K, Suga H, Okamoto K, Nakamura S, Kameyama M : Redaction of arginine-vasopressin in the cerebral cortex in Alzheimer type senile dementia. J Neurol Neurosurg Psychiat 50 : 929—932, 1987.
- 13) St George-Hyslop PH, Tanzi RE, Polinsky RJ, Haines JL, Nee L, Watkins PC, Myers RH, Feldman RG, Pollen D, Drachman D, Growdon J, Bruni A, Foncin J-F, Salmon D, Frommelt P, Amaducci L, Sorbi S, Piacentini S, Stewart GD, Hobbs WJ, Conneally PM, Gusella JF : The genetic defect causing familial Alzheimer's disease maps on chromosome 21. Science 235 : 885—890, 1987.
- 14) Kang J, Lemair H-G, Unterbeck A, Salbaum JM, Masters CL, Grezesckik K-H, Multhaup G, Beyreuther K, Müller-Hill B : The precursor of Alzheimer's disease amyloid A4 protein resembles a cell-surface receptor. Nature 325 : 733—736, 1987.

Abstract

Changes in Neurotransmitters in Alzheimer-type Demantia

Shigenobu Nakamura, Satoshi Nakano and Kunio Koshimura*

Abnormalities in neurotransmitters might be related to the manifestation of various symptoms which appear in Alzheimer-type dementia (ATD). The investigation into the change in neurotransmitters in ATD could lead to a novel diagnostic or therapeutic method. Among various neurotransmitters, much attention has been focussed on abnormalities in acetylcholine. The activity of acetylcholine synthesizing enzyme (ChAT) could be accurately measured in the cerebrospinal fluid (CSF) after filtration through a collodion bag. ChAT activity in the CSF showed age-dependent decrease. ChAT activity in autopsied brains from patients with ATD was significantly lower in various parts of cerebral cortex and in the nucleus basalis of Meynert than that of control subjects. The decrease in ChAT activity was more prominent in presenile Alzheimer's disease than in late onset senile dementia. A significant correlation was found between ChAT activities in the nucleus basalis of Meynert and those in Brodmann's area 4, 7, 10, 17 and 22. The affinity for choline or acetyl-CoA was significantly decreased in the frontal and temporal cortex of patients with ATD, indicating the decrease in efficiency of ChAT in ATD brain. Acetylcholine degradative enzyme, acetylcholinesterase (AChE) increased in the CSF of control subjects with advancing age ($p < 0.02$). AChE activity in the CSF was significantly lower in patients with presenile Alzheimer's disease, compared with age-matched control subjects ($p < 0.001$). However, AChE activity in the CSF showed a wide variation among patients of ATD with a late onset (senile dementia). The G4 isozyme of plasma AChE was measured after the electrophoresis. Plasma G4 isozyme activity did

not show an age-dependent change, but decreased in patients with presenile Alzheimer's disease ($p < 0.005$). The abnormality in ATD patients was also observed in dopaminergic, noradrenergic, serotonergic neurotransmitter system, which was less remarkable and less constant, compared with cholinergic system. The concentration of homovanillic acid, dopamine metabolite in the SCF was significantly decreased in the presenile Alzheimer's disease, but the decrease was not significant in the late onset ATD patients. Tetrahydrobiopterin, cofactor of dopamine synthesis was also decreased in the CSF of ATD patients. The activity of dopamine- β -hydroxylase (DBH), norepinephrine producing enzyme was decreased in the CSF of ATD patients. Serum DBH activity was significantly lower in patients with presenile Alzheimer's disease than age-matched control subjects ($p < 0.05$). No significant decrease was observed in patients with senile dementia. The concentration of 5-hydroxyindoleacetic acid, serotonin metabolite was significantly lower in the CSF of patients with Alzheimer's disease and senile dementia than in that of control subjects. Arginine-vasopressin (AVP) was detected in 60% of the cerebral cortex of autopsied brains from control subjects. AVP was detected less frequently in the cortex of ATD patients. ATD patients show abnormalities in various neurotransmitters. Changes in neurotransmitters might not be the primary cause of ATD, but be derived from the changes in DNA or structural proteins. However, the combination of changes in neurotransmitters or receptors may probably introduce various symptoms observed in ATD patients.

key words: *Alzheimer-type dementia, acetylcholine, dopamine, norepinephrine, serotonin*

(Jpn J Geriat 25: 358—363, 1988)

* Department of Neurology, Faculty of Medicine, Kyoto University

＜シンポジウム：痴呆の病因と対策＞

1. 病因

1) Alzheimer 型老年痴呆

PHF をめぐって

井原 康夫

＜要 約＞ アルツハイマー病脳内の特定の神経細胞内には paired helical filaments (PHF) と呼ばれる異常線維が進行性に蓄積する。この PHF の大きな特徴は種々の溶媒に溶けないことである。この性質のためその構成成分の同定は遅々としてすすまない、われわれは PHF を直接分析するのではなく、PHF に対する抗体を作製しその抗体と反応するポリペプチドを可溶性画分中に搜した。このようにしてこれまでリン酸化された tau および ubiquitin が成分として同定された。しかしながら抗体の分析から tau 以外の抗原決定基が存在することが判明しており、ubiquitin の結合しているポリペプチドも同定されていない。このように PHF 内には未だ未同定の成分が存在する。

Key words : アルツハイマー病, PHF, タウ, ユビキチン

1. アルツハイマー病の脳では Paired Helical Filaments (PHF) が進行性に蓄積する。

アルツハイマー病の脳は、肉眼的には萎縮するのが大きな特徴であるが、その脳内には異常な（正常脳ではみられない）線維が蓄積してくる。1つは老人斑（変性した神経突起の集簇）の中心に位置するアミロイド線維（細胞外間隙に存在する）である。第2は、老人斑内に存在する変性神経突起および神経細胞（主として錐体細胞）体内に蓄積してくる paired helical filaments (PHF)¹⁾である。PHF は電顕上、2本の10 nm フィラメントが160nmの周期で互いによりあわさったユニークな形態をしており¹⁾²⁾、正常神経細胞内の線維状構造物、微小管（直径24nmの管状構造物）、ニューロフィラメント（神経細胞特有の10nm フィラメント）とは容易に区別がつく。またこのユニークな構造物は、類人猿を含めて多くの実験動物の脳で検索されたが発見されず、ヒト脳に特異的な構造物と考えられている。

2. 脳内の PHF の濃度は臨床的痴呆度と関連する？

Tomlinson ら³⁾⁴⁾は、一連の定量的神経病理学の仕事で、大脳皮質内の老人斑の密度が生前の痴呆度と関連することを示した。最近になって、Wilcock & Esiri⁵⁾

はアルツハイマー神経原線維変化（神経細胞体内に PHF が密に存在する状態をさす）の数が痴呆の程度と相関すると報告した。先に述べたように、老人斑は変性しつつある神経突起の集簇からできており、その中には多量の PHF が含まれている。またアルツハイマー神経原線維変化も PHF から成っており、以上の2つの報告はどちらかが正しいのにせよ、PHF の脳内の濃度が生前の痴呆度と相関することを示唆している。したがって、PHF を分子レベルで解明することによってアルツハイマー病の発症機序に関する重要な手掛りが得られるかもしれないと期待される。

3. PHF は種々の溶媒に溶けない。

さて PHF の分子レベルでの解明は、PHF の構成成分の同定からはじまる。すなわち、われわれの目標はまず PHF の構成成分を同定することである。

PHF を部分精製する過程で、PHF が SDS, urea, Gu HCl（グアニジン塩酸）等に溶けない⁶⁾という驚くべき性質が明らかになった。この不溶性の性質を利用してはじめて PHF の高度の精製が可能となった。しかし PHF の精製が可能になってもこの不溶性の性質のため、構成成分同定において通常の生化学的手法、とくに SDS 電気泳動の適用はできなかった。ここに、PHF の構成成分の同定が遅々としてなかなか進まない原因がある。

不溶性の理由は今もって明瞭でない、この性質が発

見されたとき crosslinking の可能性, とくに transglutaminase による ϵ lysyl- γ glutamyl linkage⁷⁾ が考えられたが証明はされていない。

4. 免疫化学的アプローチでリン酸化された tau と ubiquitin が同定されたがこれが全てではない。

通常の生化学的アプローチが困難であるので免疫化学的アプローチを試みた。strategy としては, PHF を直接分析するのではなく, PHF 特異抗体が強く反応する可溶性画分に存在するポリペプチド(PHF の前駆体と考えられるだろう)を分析しようとするものである。

表 1 Tau

1. is a neuron-specific microtubule-associated protein (MAP).
2. is a family of closely spaced several polypeptides with mw of 45-65 kd.
3. stimulates tubulin assembly into microtubules.
4. is heat stable.
5. has binding sites for calmodulin.
6. can be phosphorylated.

図1 抗 PHF は tau を認識する。ラット (5 週齢) 脳微小管を電気泳動し, 一部は Coomassie 染色し (中央), 一部は blot し, 抗 PHF (1 : 500) で免疫染色した (右)。中央で上にみえる高分子量成分がそれぞれ MAP1 および MAP2, 主要なバンドはチューブリンである。抗 PHF の免疫染色では 50kD ~ 70kD の間に 3 つの主要なバンドが染まっている (これはラット 5 週齢の tau の特徴である)。左は分子量のマーカーで上から順に myosin (200,000), phosphorylase b (97,400), bovine serum albumin (68,000), ovalbumin (43,000)。

抗 PHF (ポリクローナル)⁸⁾ が胎児脳ホモジェネートの immunoblot で, 50kD のポリペプチドを強染することが見出され, これが契機となって抗 PHF が tau (表 1 参照) を認識することがわかった (図 1)⁹⁾。tau は *in situ* ではリン酸化されているもの, されていないものの 2 種類が存在する。抗 PHF がどちらに対してより親和性をもっているかを調べた。5 種の抗 PHF のうち 1 種がリン酸化 tau とは反応するが非リン酸化 tau とはほとんど反応しなかった。さらに他の 4 種においてもリン酸化 tau 特異抗体が多量存在することが判明した。この結果から PHF 内の tau はリン酸化していると考えられた¹⁰⁾。

ラットを免疫動物として PHF に特異的に結合するモノクローナル抗体 (DF2) を得た。脳の可溶性画分に DF2 と強く反応するポリペプチドを探したところ, 見掛けの分子量約 5,000 のポリペプチドが見つかった (図 2)。DF2 が結合するエピトープをさらに分析するために, その分子量 5,000 のポリペプチドを精製しその部分一次構造を決定した。データベースの検索からこ

図2 対照 (N) および AD 脳の可溶性画分 (左) および Sarkosyl 不溶性画分 (右) の immunoblot。可溶性画分には DF2 と反応する約 5kD のポリペプチド (ubiquitin) が存在する。Sarkosyl 不溶性画分では, 対照例では, DF2 と反応するものは存在しないが, AD ではゲル外の物質 (おそらく PHF) が染色されると同時にゲル全体がスミア状に染色される。

表 2 Ubiquitin

1. is an element required for an ATP-dependent proteolytic system.
2. is involved in heat shock response.

れらはヒト ubiquitin に完全に一致することがわかった(表2)¹¹⁾。つまり DF2は ubiquitin を認識する。また, ubiquitin の conjugated form に特異的なポリクローナル抗体¹²⁾は, DF2と全く同様に PHF に結合した。

以上から PHF 内にはリン酸化された tau と ubiquitin が存在すると考えられた。しかしこれらが PHF の成分のすべてではない。抗 PHF (ポリクローナル) の解析によれば tau 以外の抗原決定基が存在する⁹⁾。また PHF 内で ubiquitin が結合しているタンパク質も同定されていない (ubiquitin は PHF 内では conjugated form として存在する)¹¹⁾。

5. PHF と生化学的に解明したとしてもそれはほんのわずかな一歩にすぎない。

PHF はそれ自体が神経細胞を死滅に導く原因ではなく死滅しつつある神経細胞の結果の産物と考えるのが妥当であろう。PHF の生成は, 死滅への過程をすすんでいるある特定の神経細胞 (皮質錐体細胞) 内の代謝異常を間接または直接的に反映していると考えられる。変性しつつある神経細胞内ではある根本的異常から派生した種々の代謝変化が生じているであろう。PHF を分子レベルで解明しその結果神経細胞内で生じている代謝変化の 1 つが明らかにされれば基本的異常を探る上で大きな助けとなるであろう。

References

- 1) Kidd M: Paired helical filaments in electron microscopy of Alzheimer's disease. *Nature* 197 : 192—193, 1963.
- 2) Wisniewski HM, Narang HK, Terry RD: Neurofibrillary tangles of paired helical filaments. *J Neurol Sci* 27 : 173—181, 1970.
- 3) Roth M, Tomlinson BE, Blessed G: Correlation between scores for dementia and counts of

"senile plaques" in corebral grey matter of elderly subjects. *Nature* 209 : 109—110, 1966.

- 4) Tomlinson BE, Blessed G, Roth M: Observations on the brains of demented old people. *J Neurol Sci* 11 : 205—242, 1970.
- 5) Wilcock GK, Esiri MM: Plaques, tangles and dementia. A quantitative study. *J Neurol Sci* 56 : 343—35., 1982.
- 6) Selkoe DJ, Ihara Y, Salazar F: Alzheimer's disease: Insolubility of partially purified paired helical filaments in sodium dodecyl sulfate and urea. *Science* 215 : 1243—1245, 1982.
- 7) Selkoe DJ, Abraham C, Ihara Y: Brain transglutaminase: in vitro crosslinking of human neurofilament proteins into insoluble polymers. *Proc Natl Acad Sci USA* 79 : 6070—6074, 1982.
- 8) Ihara Y, Abraham C, Selkoe DJ: Antibodies to paired helical filaments in Alzheimer's disease do not recognize normal brain proteins. *Nature* 304 : 727—730, 1983.
- 9) Nukina N, Ihara Y: One of the antigenic determinants of paired helical filaments is related to tau protein. *J Biochem* 99 : 1541—1544, 1986.
- 10) Ihara Y, Nukina N, Miura R, Ogawara M: Phosphorylated tau protein is integrated into paired helical filaments in Alzheimer's disease. *J Biochem* 99 : 1807—1810, 1986.
- 11) Mori H, Kondo J, Ihara Y: Ubiquitin is a component of paired helical filaments in Alzheimer's disease. *Science* 235 : 1641—1644, 1987.
- 12) Haas AL, Bright PM: The immunochemical detection and quantitation of intracellular ubiquitin-protein conjugates. *J Biol Chem* 260 : 12464—12473, 1985.

Abstract

Biochemistry of Paired Helical Filaments (PHF)

Yasuo Ihara

Since 1980, the nature of PHF has been heavily focused in several laboratories. The most unexpected observation was that PHF are insoluble in harsh denaturants or detergents including SDS, urea and guanidine HCl. This unusual insolubility of PHF made possible high grade purification of PHF, but prevented the application of analytical biochemical methods to the identification of the PHF components. Therefore, we took an immunochemical approach using specific antibodies to PHF, which were prepared by immunization of purified PHF. Our strategy was to search for soluble polypeptides reactive with antiPHF, instead of analyzing PHF directly. Polyclonal antibodies to PHF were found to label tau, a neuron-specific microtubule-associated phosphoprotein. The analysis of PHF antisera showed that there are two populations of tau antibodies; one is reactive with both phosphorylated and nonphosphorylated forms of tau, the other is specific for phosphorylated tau. In addition, antibodies specific for nonphosphorylated tau could not be detected in the PHF antisera. From these observations, one of the antigenic deter-

minants of PHF has been considered as phosphorylated tau. A hybridoma producing a monoclonal antibody to PHF (DF2) was obtained by the fusion of mouse myeloma cells and rat spleen cells immunized with PHF. DF2 was confirmed to specifically bind to PHF. In the blot of the soluble fraction of brain homogenates, DF2 labeled a small polypeptide $M_r \sim 5$ kD, which was identified as ubiquitin by its purification and subsequent protein sequencing. Moreover, five ubiquitin fragments were identified in the PHF digest. Thus ubiquitin is a component of PHF. Two components, tau and ubiquitin, have been identified in PHF immunochemically and protein chemically, respectively. Two lines of evidence suggest that PHF contain the components other than tau or ubiquitin: first, ghost tangles (extracellular tangles) are not stained with antiPHF or tau antibodies, although they appear to be made of PHF. Second, the staining activity of antiPHF cannot be absorbed out with excess amount of tau. These strongly suggest that PHF contain as-yet-unidentified components.

key words: *Alzheimer's disease, PHF, tau, ubiquitin* (Jpn J Geriatr 25: 364—367, 1988)

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

＜シンポジウム：痴呆の病因と対策＞

1. 病因

2) 血管性痴呆の成因をめぐって

松下 正明 和田 義明* 安原 浩** 伊藤 淑子***

＜要 約＞ 血管性痴呆の成因の解明の一つとして、痴呆を呈するに必要な脳病変の特徴を形態学的立場から論じた。

対象は、一般総合病院における100剖検例、老人病院における100剖検例、精神病院における血管性痴呆10剖検例で、それぞれの脳に肉眼的、組織学的に詳細な検索を加えた。その結果、

- 1) 加齢や脳底部動脈の硬化症と相関して、基底核や脳幹に多発性の小梗塞巣が出現する
 - 2) これらの小さい多発梗塞巣のみでは痴呆を呈するに至らない
 - 3) 心疾患や呼吸器系疾患によって、大小の急性循環不全巣が生じやすく、それらが慢性化することによって、血管性痴呆の原因となることがある
 - 4) 血管性痴呆には種々のタイプや程度があって、それぞれの形態学的背景が異なる
 - 5) 軽度の痴呆あるいは典型的な血管性痴呆では皮質型梗塞巣が多い
 - 6) 痴呆の程度が強い例に白質型梗塞巣や Binswanger 型髄鞘淡明化巣が多くみられる
 - 7) 老人病院や精神病院での入院例には Binswanger 型痴呆が多い
- などのことを明らかにした。

Key words：血管性痴呆，多発梗塞巣，Binswanger 型痴呆，半球白質病変

はじめに

血管性痴呆とは血管由来の脳病変によって生じる痴呆のことをいう。血管由来という意味は脳内の血管だけでなく頭蓋骨内外の血管や心臓自体の疾患をも含めてのことである。さらにそれには全身の血液循環の障害や無酸素症をも含める。そのような障害による脳病変には梗塞巣，出血巣，循環不全巣，髄鞘淡明化巣など種々の性質のものがある。

したがって、血管性痴呆の成因を論じる場合、3つの側面を分けて考える必要があろう。第1は血管性疾患や循環障害の本態，第2は脳病変の成り立ち，第3は痴呆をきたすに足る脳病変の特徴の3側面である。

また、血管性痴呆の成因を解明するには種々の方法によるアプローチのあり方がある。とくに最近注目されている分野として生化学的研究，レオロジー，血液成分との関連，動物モデルを使つての研究などがある。

しかし、本論では、私自身の仕事や関心に従って、

古典的な形態学的方法による知見を述べるに止める。また、上に述べた3つの側面のうち第1の血管自体の疾患の本態と第2の脳病変の成り立ちについては言及を避け、第3の側面にのみ焦点をあてて論ずることにしたい。

研究対象

対象は3群に分けられる。第1群は、一般総合病院（鬼子母神病院）における連続100剖検例（精神疾患や神経疾患は除く）（1978. 6～1982. 11）（表1）。この群の特徴は臨床的に精神・神経症状がみられない症例の集まりで、ここでは内科的疾患で脳にどのような偶発的な所見がみられるか、またその所見が基礎疾患や年齢といかなる関連をもつかを明らかにする。第2群は、老人病院（浴風会病院）における連続100剖検例（1986. 3～1987. 4）（表2）で、専門病院入院のとくに高齢者でいかなる精神・神経疾患がみられるかを明らかにする。さらに、血管性痴呆の症例をとりあげ、その病理像を詳細に検討する。第3群は、精神病院（都立松沢病院）入院者の解剖例（1973. 6～1982. 11）から血管性痴呆10例を取り出し、個々の症例を詳しく検討しその特徴を明らかにする。本研究は以上の3群

M. Matsushita：横浜市立大学医学部精神医学講座

*Y. Wada：浴風会病院神経内科

**H. Yasuhara：京都大学医学部神経内科

***Y. Ito：王子生協病院神経内科

表1 100剖検例の年齢構成

年 齢	男	女	計
39歳以下	3例	1例	4例
40～44	2	1	3
45～49	1	3	4
50～54	4	2	6
55～59	8	3	11
60～64	8	5	13
65～69	3	10	13
70～74	5	6	11
75～79	11	8	19
80～84	6	6	12
85～	1	3	4
計	52	48	100

(鬼子母神病院, 1978. 6—1982. 11)

表2 100剖検例の年齢構成

	男	女	計
64歳以下		1	1
65～69	1	1	2
70～74	5	8	13
75～79	3	9	12
80～84	14	13	27
85～89	8	15	23
90～94	4	11	15
95～99	3	2	5
100～		2	2
	38	62	100

(浴風会病院, 1986. 3—1987. 4)

から成る。

なお、神経病理学的には、型どうりの技法を用いて、肉眼のおよび顕微鏡の検索を行った。組織標本は可及的多数の、しかも出来るだけ大型の切片をつくり、染色は主として HE, KB, Bodian, Hirano-Zimmerman, Elastica-Masson, PAS などの染色法を施行して、鏡検を行った。

結 果

I. 一般総合病院における100剖検例について

表1にみるように、男52例、女48例でやや男性が多く、死亡時平均年齢は男64.5歳、女68.3歳であった。30歳代から85歳代までまんべんなく分布しているが、中年から初老期に比較的多くの症例が集まっていた。患者を死に至らしめた主要な基礎疾患名を各例につき一つ取り出して分類したのが表3である。悪性腫瘍が圧倒的に多く(61例)、次いで心疾患15例、呼吸器系疾患10例、肝臓・胆のう疾患7例などであった。

100例の脳にみられた病変は、梗塞巣、出血巣、急性循環不全巣(蒼白化巣)、悪性腫瘍転移巣、その他に分けることができ、病変の多寡に関係なく一つでも病変が存在する例を数えると、100例中63例に何らかの病変がみられた(表3)。

梗塞巣は、肉眼的にはせいぜい大豆大までの lacunes 以下の大きさで、microscopical なものも数多く、被殻、尾状核、橋底部、視床、小脳皮質が好発部

表3 基礎疾患と多発梗塞巣

疾 患 名	梗塞巣	乏血変化	出 血	転 移	その他	変化なし
悪性腫瘍 (61例)	23例	4例	1例	13例	1例	24例
心疾患 (15)	10	2				4
呼吸器系疾患 (10)	5	1			1	3
肝臓疾患 (7)	2				1	4
腎臓疾患 (4)	4					
その他 (3)			1			2
計	44	7	2	13	3	37

(鬼子母神病院, 1978. 6—1982. 11)

表4 Willis 環の動脈硬化症と多発梗塞巣

Willis 環動脈硬化症	多発梗塞巣(+)	多発梗塞巣(-)
な し	25例	47例
軽 度	12	4
中 等 度	11	0
	48	51

(鬼子母神病院, 1978. 6—1982. 11)

位であった。急性循環不全巣は、microscopical な病巣から肉眼で分かるほどの大きさと拡がりをもつものでいろいろであった。出血巣は数が少なくごく限られた部位にみられるのみであった。これらの三病変は、それぞれ44例、7例、2例にみられた。

これらの病変は、加齢とともに増加し、とくに小梗塞巣を対象とすると、表4にみるように、Willis 環の

動脈硬化症とは正の相関を示した。基礎疾患との関連では、心疾患や呼吸器系疾患において病変の出現が高く、とくに大きな急性循環不全巣が比較的多くみられた。

II. 老人病院における100剖検例について

表2にみるように、男38例、女62例で、女性が男性に比し1.6倍と多く、平均死亡時年齢も男82.9歳、女83.6歳で、第1群とくらべ女性が多く、またかなり高齢者層に傾いているのが特徴である。

表5 100剖検例の神経病理学的診断

	男	女	計
血管性痴呆	7例	12例	19例
脳梗塞症	3	5	8
多発小梗塞	6	12	18
急性循環不全	0	6	6
老年痴呆	4	7	11
混合型	1	3	4
脳出血、脳出血後遺症	1	3	4
変性疾患(Parkinson病など)	6	5	11
所見なし	10	9	19
	38	62	100

(浴風会病院, 1986. 3—1987. 4)

この100例の神経病理学的診断を表5に示す。血管性痴呆は19例、Alzheimer型老年痴呆が11例、混合型4例であり、この比率は私がかつて松沢病院の症例で報告したデータと比べると混合型の頻度は同様であるものの老年痴呆の比率が高くなっている点で相違がみられた¹⁾²⁾。なお、脳出血や脳出血後遺症は4例と少なく、Parkinson病を主体とした変性疾患は11例であった。主として心疾患による急性循環不全は6例にみられた。ここでいう脳梗塞症とは神経症状を伴った梗塞巣のことで、多発小梗塞とは臨床的に精神・神経症状がなく、脳に梗塞巣のみがみられた症例を意味する。したがって、多発小梗塞巣18例と所見なしの19例を合わせた37例がいわゆる正常の老化脳ということになる。

さて、血管性痴呆は男7例、女12例で、老年痴呆同様女性に多かった。19例の臨床所見と神経病理所見をまとめて表に示す(表6、7)。平均死亡時年齢は男性で85.0歳、女性で85.8歳であった。臨床症状の特徴としては、高血圧の既往歴や運動麻痺などの神経症状を伴う症例が多いこと、痴呆の程度は種々様々であったこと、痴呆の症状としては健忘、失見当識、自発性減退、せん妄状態、徘徊、異常行動などが目立つことが挙げられる。

神経病理学的所見としては、平均脳重量は男性で

表6 血管性痴呆—臨床所見

年齢	性	高血圧	神経症状	痴呆	精 神 症 状
88歳	男	+	右麻痺	++	意欲低下, 言語障害
83	女	+	右麻痺	+	意欲低下つよい
82	男	+	右麻痺	+	
92	女	—		++	健忘, 作話, せん妄, pseudodialogue
82	女	+		++	自発性減退, 徘徊, せん妄, 異常行動
102	女	+	右麻痺	+	意識障害あり
95	男	+		+	
82	女	+	パーキン	++	健忘, 失見当, 自発性減退, 言語崩壊
85	女	+	左麻痺	++	失見当, 自発性減退
88	女	+		++	妄想, 徘徊
84	男	+		+	徘徊, 不穏
77	女	+	右麻痺	++	健忘, 失見当, 運動失語, 失算
100	女	+		++	健忘, 失見当, 会話不能, 意欲低下
93	女	+	左麻痺	+	発語減少, 意識消失発作
70	男	—	右麻痺	+	
91	男	—		++	健忘, 人物誤認, 徘徊, 異常行動
79	女	—	パーキン	++	異常行動, 不潔, 緘黙
72	女	+		++	健忘, 妄想, 異常行動
81	女	—	左麻痺	++	健忘, 自発性減退, 発語消失

男6例(平均年齢85.0歳)、女13例(平均年齢85.8歳)

(浴風会病院, 1986. 3—1987. 4)

1,164g, 女性で1,092g で, Alzheimer 型老年痴呆にみられる脳重量の減少と比べて軽度であった。2 例の Binswanger 型を除き, 17例に肉眼的に何らかの梗塞巣がみられた。多発小梗塞の例と同様, 線条体や視床など好発部位にみられたほか, 全脳の白質に種々の梗塞巣が認められた。組織学的所見としても, 全脳の至るところに大小の梗塞巣と髄鞘淡明化巣がみられるのが特徴であった。それらの梗塞巣の主たる部位によって, 症例を組織学的に, 1) 皮質梗塞型(4 例), 2) 白質梗塞型(2 例), 3) 皮質-白質梗塞型(6 例), 4)

表 7 血管性痴呆—神経病理所見

年齢	性	脳重量	肉眼所見(梗塞巣)	組織学的所見
88歳	男	1320g	基底核などに多発梗塞 古い出血巣	皮質梗塞型
83	女	985	基底核, 歯状核	皮質梗塞型
82	男	1210	古い出血巣	皮質梗塞型
92	女	1010	(-)	Binswanger 型
82	女	1170	線条体, 視床, 前頭一側頭一後 頭白質	白質梗塞型
102	女	1040	線条体, 視床, 前頭白質, 後 頭皮質	皮質-白質大梗塞型
95	男	1030	基底核, 海馬, 白質出血性梗 塞	皮質-白質梗塞型
82	女	1140	前頭白質, 基底核	皮質梗塞型-Binswanger 型
85	女	965	線条体, 白質	皮質-白質梗塞型
88	女	1065	線条体, 視床	皮質梗塞型
84	男	1160	脳梁, 前頭白質	Binswanger 型
77	女	1070	脳梁, 線条体	皮質-白質梗塞型
100	女	1055	線条体, 前頭白質	白質梗塞型
93	女	1170	前頭一頭頂白質, 線条体, 視 床	Binswanger 型, 多発梗塞型
70	男	1185	後頭葉, 線条体	皮質-白質大梗塞型
91	男	1080	出血性梗塞	皮質-白質大梗塞型
79	女	1200	(-)	Binswanger 型
72	女	1240	脳梁, 線条体, 視床	Binswanger 型
81	女	1090	前頭一頭頂白質, 線条体	Binswanger 型

平均脳重量：男-1164g, 女-1092g
(浴風会病院, 1986. 3 -1987. 4)

表 8 血管性痴呆—臨床所見

氏名	姓	年齢	経過	既往	高血圧	初発症状	精神症状	死 因
H S	女	57	2		-	抑うつ状態	感情失禁, 発語なし locked-in 類似	胃潰瘍 出血
O T	男	72	13	分裂	+	卒中発作	痴呆, 強迫泣, 原始 反射	肺炎
MT	男	72	4		?	卒中発作	譫妄状態	冠不全
O C	女	74	7		+	異常行動	棍妄状態, 運動失語?	冠不全
S T	男	76	8	大酒	?	卒中発作	記憶障害, 妄想	心筋梗塞
E K	男	78	8		?	卒中発作	高度の痴呆, 運動 失語?	胃潰瘍 出血
M T a	女	83	10	分裂	-	徐々に 運動麻痺	軽い痴呆	気管支 肺炎
K M	女	83	4	分裂	-	パーキンソ ニスム	軽い痴呆	肺炎
O S	男	86	6		+	譫妄状態	記憶障害, 感情失禁, まだら痴呆	肺炎
T H	女	88	2		+	構音障害	記憶障害, 感情失禁, 譫妄状態	大腸癌

(松沢病院, 1973. 6 -1982.11)

表 9 血管性痴呆—神経病理学的所見

	脳重 (G)	脳 病 変	脳底部動脈 硬化	脳内動脈 硬化	脳内小動脈 硝子変性	組織学的型
H S	1200	橋底部, 前頭葉白質	—	—	—	白質梗塞型
O T	1040	脳梁, 被殻, 尾状核, 視床, 内包,	++	+	++	白質梗塞型
M T	1370	右後頭葉白質—皮質>前頭葉 白質, 被殻, 視床, 橋底部	++	++	++	皮質—白質梗塞型
O C	?	左前頭—頭頂—後頭葉の皮質— 白質(mediaの領域)	+	+	—	皮質—白質梗塞型
S T	1090	右側頭—後頭葉>右視床, 左 小脳	—	—	+	皮質梗塞型
E K	1300	後頭葉白質>前頭葉白質, 側 頭葉幹, 被殻, 橋底部	++	++	+	白質梗塞型
M T a	890	半卵円中心, 前頭葉白質, 後 頭葉白質>視床, 被殻	+	—	++	白質梗塞型
K M	1185	前頭葉白質>尾状核, 小脳	+	+	++	Binswanger 型
O S	1220	前頭—側頭—後頭葉白質, 橋 底部	++	+	++	Binswanger 型
T H	1160	右後頭葉白質>前頭葉, 脳梁, 被殻	++	—	++	Binswanger 型

(松沢病院, 1973, 6—1982, 11)

Binswanger 型(7例)のように4型に分けた, 半球白質に病変が多くみられ, とくに Binswanger 型が最も多く, 次いで皮質—白質梗塞型が多いのが目立った。また, Binswanger 型や皮質—白質梗塞型に高度の痴呆を示す例が多くみられた(表 6, 7)。

III. 精神病院における10剖検例について

臨床所見と神経病理学的所見の要約を表 8, 9 に示す。男女比は 5 : 5, 平均死亡時年齢は男性で 76.8 歳, 女性で 77.0 歳。老人病院での血管性痴呆例よりは年齢層が若い。痴呆の程度が様々であること, せん妄状態や感情失禁が多くみられることなどの特徴がある。

神経病理学的所見としては, 平均脳重量は男性で 1,204g, 女性で 1,108g であった。肉眼的には大小の梗塞巣がみられ, とくに白質における病変が目立った。組織学的には, 皮質梗塞型 1 例, 白質梗塞型 4 例, 皮質—白質梗塞型 2 例, Binswanger 型 3 例に分けることができた。老人病院での血管性痴呆例と同様 Binswanger 型や白質梗塞型に高度の痴呆例がみられている。

それぞれの症例において, 梗塞巣や髄鞘淡明化巣あるいは脱髄巣がどのような機転によって生じたのか, 病理組織学的に検討し, 著者なりに推測したのが表 10 である。心臓性の塞栓によると思われる例が 2 例, その疑い例が 2 例, Binswanger 型にみられるような白質内の小動脈の硝子変性によると考えた例が全例の半数である 5 例を占めた。

表 10 梗塞巣の原因

1	H S	心臓性塞栓
2	O T	小動脈の硝子変性>脳内動脈のアテローム
3	M T	脳内動脈のアテローム, 心臓性塞栓の疑いあり
4	O C	中大脳動脈のアテローム, 心臓性塞栓の疑い
5	S T	心臓性塞栓
6	E K	中大脳動脈のアテローム
7	M T a	小動脈の硝子変性>脳内動脈のアテローム
8	K M	小動脈の硝子変性 (Binswanger 型)
9	O S	小動脈の硝子変性 (Binswanger 型)
10	T H	小動脈の硝子変性 (Binswanger 型)

(松沢病院, 1973, 6—1982, 11)

考 察

一般の総合病院で脳神経系以外の疾患で死亡した症例で脳を検索したところ, 半数以上の 63 例の脳に病変がみられたことは注目される。症状がなくとも脳の詳しい検索が必要であることを示唆している。精神・神経症状を呈さないほどの小さな梗塞巣がみられ, それらは線条体, 視床, 橋底部などが好発部位であり, 単発のこともあり, 多発性のこともあった。一般にこれらの所見は多発性梗塞と総称されているが, われわれの結果によれば, 痴呆のない症例でもかなりの頻度で多発性梗塞がみられることから, 逆に多発性梗塞のみでは痴呆を呈しないと結論することができる。

しかし, このような多発性梗塞が脳幹の範囲を越え, 大脳皮質や白質にまで分布するようになると, 臨床的に痴呆が出現し, いわゆる血管性痴呆の状態となる。

したがって、多発性梗塞と血管性痴呆との間には移行例があって、必ずしも両者の境界が明瞭というわけにはいかない例がみられた。

血管性痴呆と一口に言うもののその状態像は多様である³⁾。痴呆の程度からいっても、ごく軽いものから、老年痴呆や Alzheimer 病に匹敵するほどの高度のものまでいろいろである。痴呆の程度が多彩である理由は、おそらく、形態学的病変の多様さによるとと思われる。したがって、血管性痴呆の成因の問題は脳病変の多様性を抜きにして論ずることはできない。

われわれの結果から言えることは、皮質梗塞型の病変では、比較的軽度の痴呆がみられるのが常であった。この軽度の痴呆は従来からいわれている血管性痴呆の典型像(まだら痴呆、軽度の痴呆、人格の保たれなど)に相当するといえる。さらに、梗塞が白質に及ぶにつれ、痴呆の程度は強くなり、その最極端が Binswanger 型痴呆となると考えられる。したがって、われわれのデータで、老人病院であれ精神病院であれ、入院して死亡した血管性痴呆の症例に白質梗塞型や Binswanger 型の病変が多くみられたということは臨床的により強い痴呆を持つ症例が入院しているという事実に対応している。

血管性痴呆の症例に白質病変が多いことは古くからよく知られていることである。組織像の記載がないことから、その後概念上数多くの混乱を巻き起こし、人によってはそのような名称は捨て去った方がいいとまでいわれている Binswanger 型痴呆の原著である 1894 年の論文⁴⁾が、やはり、血管性痴呆における白質病変の意義を初めて記載したものとして記憶に値するであろう。その後、1895年から1902年までの間の論文によって、血管性痴呆の概念(当時の言葉でいえば、動脈硬化性精神障害)を確立させたのが Alzheimer であった。彼は、Binswanger の研究を高く評価し、血管性痴呆の概念のなかに Encephalitis subcorticalis chronica を早々と取り入れ、白質病変の意義を強調し

たのであった⁵⁾。さらに、1912年の Ladame⁶⁾や1926年の Kodama⁷⁾など多くの研究者が血管性痴呆を皮質型、白質型に分け、白質型こそが血管性痴呆の中心をなすものであると主張している。この考えはその後多くの研究者が強調し、現在においてはすでに確立した理念であるとしてよいであろう⁸⁾。

白質病変型が何故痴呆を呈しやすいかという問題は重要である。おそらく、その理由としては、1) 皮質と白質との解剖学的対応からいって、小さい白質病変であっても、より広い皮質領域の障害に換算されること、2) 白質内の連合線維がもろに障害を受けること、などが考えられる。

文 献

- 1) 松下正明, 石井 毅: 多発梗塞性痴呆をめぐる 2, 3 の問題. 精神医学 21: 613—624, 1979.
- 2) 松下正明: 老年期における痴呆とその形態学的背景. 精神医学 21: 823—834, 1979.
- 3) 松下正明: 脳血管性痴呆の臨床とその分類. Geriatric Medicine 22: 1255—1261, 1984.
- 4) Binswanger O: Die abgrenzung der allgemeinen progressiven Paralyse. Berl Klin Wochenschr 31: 1103—1137, 1180, 1894.
- 5) Alzheimer A: Die Seelenstörungen auf arteriosclerotischer Grundlage. Allg Z Psychiat 59: 695—711, 1902.
- 6) Ladame Ch: Encéphalite sous-corticale chronique. Un cas de psychose d'origine artério-scléreuse. Encéphale 2: 13—39, 1912.
- 7) Kodama M: Die regionäre Verteilung des arteriosclerotischen Veränderungen im Grosshirn. Z Ges Neurol Psychiat 102: 595—619, 1926.
- 8) 松下正明: 脳血管性精神障害. 現代精神医学大系, 第18巻, 老年精神医学, 黒丸正四郎(編), 中山書店, 東京, 1976, 144—184.

Abstract

On Pathogenesis of Vascular Dementia

M. Matsushita*, Y. Wada**, H. Yasuhara*** and Y. Ito****

We reported characteristics of neuropathological lesions of vascular dementia. Our subjects were 1) 100 autopsied patients of a general hospital without neuropsychiatric disorders, 2) 100 autopsied aged of a geriatric hospital, and 3) 10 autopsied patients with vascular dementia of a mental hospital. Results as follows: 1) Multiple microinfarcts were seen at the basal ganglia and brain stem closely related with aging and atherosclerosis of Willis' circle, 2) Those multiple microinfarcts did not cause vascular dementia, 3) Acute lesions due to circulatory disturbances were often observed in vasculo-cardiac and respiratory diseases, 4) There were

many types and various degrees of vascular dementia with each different morphological background, 5) Slight and moderate dementia was related with infarcts of cortical type, 6) Marked dementia was related with infarcts of white matter type and patchy demyelination of Binswanger's type, and 7) Autopsied inpatients in geriatric and mental hospitals frequently revealed neuropathological findings of Binswanger's type. From findings of our results, we discussed the significance of white matter lesions in vascular dementia and emphasized that the importance of the lesions has been claimed by several authors since the end of the nineteenth century, such as Binswanger, Alzheimer, Ladame, Kodama, and so on.

key words: *vascular dementia, multiple infarcts, Binswanger's type dementia, white matter lesions*
(Jpn J Geriatr 25: 368—374, 1988)

* Department of Psychiatry and Neurology, Yokohama City University School of Medicine

** Department of Neurology, Yokuhukai Hospital

*** Department of Neurology, Kyoto University

**** Department of Neurology, Ooji Seikyo Hospital