第30回日本老年医学会総会記録

＜シンポジウム：老年者薬物治療の問題点＞

司会のことば

蔵本 築* 海老原昭夫**

厚生省の国民栄養調査の成績によると70歳以上の老年者の6割は何らかの疾病を持っていることが示されている。また一般に老年者は多病であり、一人でいくつかの疾患を持つことが多い。従って薬剤を服用している人も多く、しかも多剤を併用していることが多い。

一方老年者では生理的な諸機能が低下し、予備力、代償能力も低下しているが、これが疾患、合併症による機能障害と相俟って薬による医原性の病態を惹起することも稀でない。老年者の薬物治療に際して老年者に於ける薬物動態、薬力学の特徴を考慮して、副作用を起すことなく、十分な治療効果を上げることが必要である。すなわち薬物の吸収 absorption, 分布 distribution, 代謝 metabolism, 排泄 excretion という薬物動態と共に薬に対する反応の差異、薬力学的特徴を理解した上で治療に当ることが大切である。

本シンポジウムの目的は老年者の薬物動態の変化に焦点をおいて、老年者の薬物治療の問題点を討論することである。そこで老年者に於ける pharmacokinetics

と pharmacodynamics の特徴、また老年者と薬物コンプライアンスという総論的な問題から始め、老年者に用いられることの多い薬剤として向精神薬、抗血栓薬、降圧薬、抗菌化学療法剤、消炎鎮痛剤を取り上げ、老年者に於ける臨床薬理学的特徴をふまえて、実際の臨床の場での効果、副作用、問題点について討論することとした。

老年者によく効く薬剤は何か、逆に老年者にすすめられない薬はあるか、老年者に起り易い副作用は何か、薬の用量についての注意等具体的な問題も討論されると思われる。薬物の薬理作用、老年者に於ける薬物動態、個々の患者の病態、予備能力等を十分理解した上で薬剤を選択し、しかも細心の注意をもって効果を追跡することが重要であろう。老年者は薬剤の効果に対する調節能力も低下しているが、その個人差も大である。老年者の quality of life を高めるためにも細かい配慮をした適切な薬物治療が行われる為にこのシンポジウムが役立つことを期待している。

* K.Kuramoto：東京都老人医療センター

** A. Ebihara：大分医科大学臨床薬理

1. 老年者の薬物動態

海老原昭夫

＜要 約＞ dilevalol や atenolol の成績から老年者では若年者に比し、肝代謝型の薬物の吸収速度、最高血中濃度は大であり、腎代謝型の薬物の除去半減期は延長することが考えられた。

Key words : pharmacokinetics in the elderly, hepatic metabolism, renal excretion, propranolol, dilevalol, atenolol

(Jpn J Geriat 26 : 112—114, 1989)

はじめに

老年者への薬物投与に当っては加齢による薬物感受性の変化とともに加齢による薬物動態の変化についても十分な考慮が必要である。薬理作用は、主作用（薬効薬理）も副作用（有害反応）も含めて、一般に血中薬物濃度と密接な関係を有する。この血中薬物濃度を規定するのは吸収(Absorption)、分布(Distribution)、代謝(Metabolism)、排泄(Excretion)の4つ（それぞれの頭文字をとってADMEと総称されている）であり、つぎにこれらのおのおのについて述べる。

1. ADME の加齢による変化 (図1)

(1) 薬物吸収の加齢による変化

薬物を静脈内投与あるいは動脈内投与など血管内投与(intravascular administration)を行ったときには吸収の過程はないが、経口投与や筋肉注射などの血管外投与(extravascular administration)を行ったときには薬物吸収の過程が存在する。

ヒトは加齢とともに胃酸の分泌量が低下し、高齢者では無酸症の頻度が増加することが知られている¹⁾。また胃腸管血流、胃腸管運動などが低下し、このために薬物の吸収が遅延するとされている。

(2) 薬物分布の加齢による変化

ヒトは加齢とともに細胞内水分量が減少し、その代りに脂肪分が増加し、このためにアルコールやmorphineの分布容量(volume of distribution)が減少する。またこのため一般に同じ投与量でも血中濃度が增大することが多い。血清タンパク、とくに血清アルブミン濃度は加齢とともに低下し²⁾、そのために老年者

ではサルチル酸, sulfadiadine, phenylbutazone などの多くの薬物の非結合型(unbound form)の血中濃度が増大する³⁾。

(3) 薬物代謝の加齢による変化

ヒトは加齢とともに肝血流量が低下し、チトクロームP-450などの肝薬物代謝酵素の活性が低下するため、肝における薬物の代謝速度(肝クリアランス)が遅延し、血中薬物濃度が上昇する。phenylbutazone, dihydrostreptomycin, penicillinなどの半減期は老年者において若年者に比し長いことが知られている⁴⁾。

(4) 薬物排泄の加齢による変化

薬物は腎から糸球体濾過(glomerular filtration)や尿管分泌(tubular secretion)などの過程を経て排泄される。腎から薬物が排泄される速度(薬物の腎クリアランス)は一般にクレアチニン・クリアランスとよく相関することが知られている。一般にクレアチニン・クリアランスは加齢とともに低下する⁵⁾ので、薬の腎からの排泄は加齢とともに減少する。たとえば

図1 加齢によるADMEの変化

digoxin, cimetidine, captopril などの半減期は老年者では若年者に比し著しく延長する。

II. 肝代謝型の薬物と腎排泄型の薬物

体内に入った薬物の体内からの除去 (drug elimination) は、腸管壁や腎で代謝されて行われることもあり、また肺を介して呼気中に排泄されたり、胆汁を介して腸管内に排泄されたりすることもあるが、主として肝における代謝 (hepatic metabolism) と腎からの排泄 (renal excretion) によって行われる。そこですべての薬物は、肝代謝型の薬物 (主に肝代謝によって除去される薬物)、腎排泄型の薬物 (主に腎排泄によって除去される薬物) および中間型の薬物の 3 種に大別することができる。

(1) 肝代謝型の薬物

antipyrene, lidocaine, propranolol, nifedipine などは肝代謝型の薬物としてよく知られている。これらの薬物の尿中未変化体排泄率は、ほとんどゼロである。このような薬物の代表的なものは antipyrene であるが、antipyrene の代謝は肝薬物代謝酵素、チトクローム P-450 の活性に依存していることが知られており、antipyrene のクリアランスは加齢とともに減少する⁶⁾。propranolol は主として肝において代謝される薬物であり、その代謝速度は肝血流量に大きく依存している。前述のごとく、肝血流量は老年者では若年者に比し低下しており、このためこれらの薬物のクリアランスは老年者において低下する。

(2) 腎排泄型の薬物

cimetidine, atenolol, captopril などは肝ではほとんど代謝されず、大部分が腎から尿中に未変化体のまま排泄される。このような薬物の腎からの排泄には糸球体濾過、尿細管再吸収、尿細管分泌などの過程が関与しているが、腎から尿中への排泄速度、すなわち腎クリアランスは糸球体濾過値 (glomerular filtration rate, GFR) とよく相関することが知られている。ところがこの糸球体濾過値は一般に加齢によって著しく減少し、これらの腎排泄型薬物のクリアランスは加齢とともに著しく低下する。たとえば強心薬の digoxin は腎排泄型薬物の代表的なものであるが、この薬物の老年者における半減期は若年者のそれに比し、著しく延長する⁴⁾。

III. 初回肝通過効果の加齢による変化

dilevalol や propranolol などは経口投与したとき

図2 Dilevalol 100mg 1回経口投与後の血漿中濃度曲線—老年者と若年者との比較

図3 Propranolol (40mg) 1回投与時の血漿中濃度曲線—若年者, (—●—) と老年者, (—○—) の比較 (Castleden, 1979)

腸管からの吸収は良好であるが、腸管から吸収された薬物は門脈を経て肝を通過する間にかなりの部分が除去され、循環血液中への出現率はかなり低い。この循環血液中へ入る前に肝で行われる薬の除去は初回肝通過効果 (first-pass hepatic elimination effect) と呼ばれている。著者らは β 遮断薬 dilevalol 100mg を 7 名の老年者 [年齢: 78.7 ± 9.4 (M $\pm$ SD) 歳] と 6 名の若年者 [年齢: 30.5 ± 7.1 (M $\pm$ SD) 歳] に 1 回経口投与し、その後経時的に採血し、血漿中 dilevalol 濃度の時間的推移について検討し、図 2 に示すような曲線を得た。これをみると吸収相において血漿中濃度の立上りは、老年者において若年者に比し速やかで、最高血漿中濃度は老年者において若年者に比し大であるが、除去相においては両曲線はほぼ平行して減衰し、両者の半減期はほぼ同様であった。このことから dilevalol の初回肝通過効果は老年者では若年者に比し小なること

が示唆された。同様に初回肝通過効果が大きい *propranolol* についても経口投与後、末梢循環血中 *propranolol* 濃度の立上り速度および最高血漿中濃度は老年者においては若年者に比し大であることが示されている (図3)⁷⁾。この成績も *propranolol* の初回肝通過効果は老年者で若年者に比し小であることを示唆するものである。また、これには加齢に伴う分布容量 (*Vd*) の低下が関与することも否定はできない。

β 選択性 β 遮断薬の *atenolol* は腎排泄型薬物の代表的なものであるが、Barber らによれば、*atenolol* 経口投与後の最高血中濃度到達時間 (*t max*) および最高血中濃度 (*Cmax*) は老年者でも若年者とほとんど変りがないが、老年者では若年者に比し *atenolol* のクリアランスが50%も低下しているために血中濃度曲線下面積 (*AUC*) は約2倍であったと報告している⁸⁾。

おわりに

以上に老年者における薬物動態の一般的特徴を述べたが、老年者では薬物動態をも含めて多くの点で個体差が大であり、一概に論ずることは難しい。一般に老年者では若年者に比し薬物の吸収、代謝、排泄いずれの機能においても若年者に比し低下しているものとされている。確かに薬物の代謝、排泄は老年者において若年者に比し遅延し、半減期が延長していることが多いが、それはとくに腎排泄型薬物において顕著であり、肝代謝型の薬物では半減期は老年者でも若年者とほとんど変りないことが多い。ところが薬物の吸収についてみると、血中薬物濃度の立上り速度は老年者において若年者に比し大であり、最高血中濃度も大であることが多い。このような現象はとくに肝代謝型の薬物で

初回肝通過効果の大きな薬物について顕著である。この初回肝通過効果は肝薬物代謝能と密接な関連を有するが、通常の肝機能検査からは必ずしも推定し得ない。この初回肝通過効果と加齢との関連については、なお今後の検討が必要である。

文 献

- 1) Vanzant FR, Alvarez et al: The normal range of gastric acidity from youth to old age. *Arch InternMed* 49 : 345, 1932.
- 2) Greenblatt DJ, Shader RI, et al: Pharmacokinetics and bioavailability of intravenous, intramuscular and oral lorazepam in humans. *J Pharm Sci* 68 : 57, 1979.
- 3) Wallace S, Whiting B: Factors affecting drug binding in plasma of elderly patients. *Br J Clin Pharmacol* 3 : 327, 1976.
- 4) Bender AD, Post A, et al: Plasma protein binding of drugs as a function of age in adult human subjects. *J Pharm Sci* 64 : 1711, 1975.
- 5) Vestal RE: Drug use in the elderly: A review of problems and special considerations. *Drugs* 16 : 358, 1978.
- 6) Vestal RE, Norris AH, et al: Antipyrine metabolism in man: Influence of age, alcohol, caffeine and smoking. *Clin Pharmacol Ther* 18 : 425, 1975.
- 7) Castleden CM, George CF: The effect of aging on the hepatic clearance of propranolol. *Br J Clin Pharmacol* 7 : 49, 1979.
- 8) Barber HE, Hawksworth GM, et al: Pharmacokinetics of atenolol and propranolol in young and elderly subjects. *Br J Clin Pharmacol* 11 : 118, 1981.

<シンポジウム：老年者薬物治療の問題点>

2. 循環器疾患患者の薬物コンプライアンス

関 頭

<要 約> 面接調査により服薬成績を調査し、これに影響をおよぼす諸因子について検討した。

循環器疾患患者674例を対象とした。

服薬成績は、A（95%以上服薬）441例（65.4%）、B（75～94%服薬）193例（28.6%）、C（50～74%服薬）29例（4.3%）、D（50%未満服薬）11例（1.6%）であった。

虚血性心疾患（251例）、不整脈（58例）、高血圧（356例）では、服薬成績は、ほぼ同様であり、A 約65%、B 約30%であったが、心臓弁膜症（60例）では、A 83.3%、B 15.0%と良好であった。

虚血性心疾患であっても、冠拳縮性狭心症（28例）と冠動脈・大動脈バイパス術後（53例）と、性質の異なる疾患では服薬成績も異り前者が後者より有意に良好であった。

抗凝固薬 Warfarin 服用者では、Warfarin のみならず、他の薬剤の服薬成績も良好であった。心臓弁膜症患者を Warfarin 服用者（37例）と非服用者（23例）に分けると、前者の服薬成績が有意に良好であった。

服薬成績に及ぼす加齢の影響を検討したが、少なくとも、外来定期通院患者においては、70歳台までは、加齢により服薬効果は影響されなかった。しかし、80歳台では服薬成績は低下する傾向があった。

薬剤投与法の服薬成績に及ぼす影響をみると、服薬時刻のそれが大きく、朝の服薬が、昼・夕のそれより有意に良好であった。

一部の患者（273例）に Quality of life（QOL）についてのアンケート調査を行い、これの成績と服薬成績の関連を検討した。QOL の調査法には未だ問題があり、これと服薬成績の関連については結論は得られなかった。

服薬状況の変化による臨床症状の変化について症例を呈示して論じた。

服薬成績改善のためには、まず医師がその重要性を認識し、それに基づいて十分な患者教育を行う必要があると考えられた。

Key words：服薬成績、循環器疾患、Quality of life.

I. 結 言

循環器疾患の多くは治療が長期に亘る慢性疾患であり、治療効果をあげるためには、コンプライアンスを良好に維持することが極めて重要である。そこで循環器疾患患者を対象に、薬物コンプライアンス（服薬成績）を調査し、その問題点と改善策を検討した。さらに、服薬状況の変化によって生ずる臨床上的の問題点につき症例を呈示し論じた。

II. 対象と方法

対象は当院循環器外来を定期的に受診している患者のうち、虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈、高血圧

のいずれかを有し、これに対し薬剤投与が行われており、しかも最近薬剤が変更されていない者とした。調査担当者の都合等により、全患者の約半数を任意に選択し服薬成績調査を行い、その一部には、Quality of life（QOL）についてのアンケート調査を行った。

服薬成績は、薬剤師による面接調査によって行った。循環器用薬剤を対象とし、各薬剤毎、各服薬機会毎、さらに全体として服薬状況を聴取した。成績の判定は、投与薬剤の95%以上を服用したと申告したものを服薬成績 A、75%以上95%未満と申告したものを同 B、50%以上75%未満と申告したものを同 C、50%未満と申告したものを同 D とした。

服薬調査は674例に行った（表1）。虚血性心疾患200例、心臓弁膜症60例、不整脈58例、高血圧305例、虚血性心疾患と高血圧の合併51例である。なお、ここで不

表 1 年齢, 疾患別患者数 n=674

年 齢	CHD	VD	ART	HT	CHD+HT	計
～39	5	5	4	10	0	24
40～49	13	14	6	31	2	66
50～59	65	23	13	117	12	230
60～69	82	12	18	100	22	234
70～	35	6	17	47	15	120
計	200	60	58	305	51	674

CHD : 虚血性心疾患 VD : 心臓弁膜症
ART : 不整脈 HT : 高血圧

整脈とした例は, 他に原因疾患の無い者であり, 他疾患のある者は, その群に入れた. 各疾患の年齢別例数を表 1 に示した. 弁膜症がやや若年者に多い. 他の 3 疾患は, ほぼ同様であり, 50歳台34%, 60歳台35%, 70歳以上18%である. 当院の性格および定期的な外来通院患者という制約から, 70歳以上の例は多くない.

QOL の調査は, 荻原¹⁾の調査表を改変したものをを用いアンケート調査を行った. ①自覚症状 (8 項目, 頭痛, 頭重; めまい; 動悸, 息切れ; しびれ; むくみ; 疲労; 口渇; 食欲) ②睡眠 (5 項目, 寝つき; 夜間排尿; 深さ; 目醒め; 悪夢) ③仕事, 家事, 趣味 (4 項目, 満足感, 疲れ; 意欲; 問題解決) ④気分 (4 項目, そう快さ; いらいら, 不安; 落ち込み; 感情抑制) ⑤生活 (4 項目, 物忘れ; 性生活; 人づきあい; 生きがい) 以上の 5 群, 25 項目の各項目について, 良い (例えば頭痛なし), 中等度 (例えば軽い頭痛), 悪い (例えば, ひどい頭痛) のいずれであるかを判定させ, 各々 0 点, 1 点, 2 点の点数を与え, 各群毎に合計点を出し, その少ない者を QOL が良い者と判定した. なお投与薬の副作用に対する不安感も調査し, 全くなし 0 点, 少しあり 1 点, 大いにあり 2 点とした. アンケート調査は 273 名から解答を得た.

III. 成 績

1. 服薬成績 (図 1) : 全例 627 例の服薬成績は図 1 下段の如くであり, 服薬成績 A の者 441 例 (65.4%), B の者 193 例 (28.6%), C の者 29 例 (4.3%), D の者 11 例 (1.6%) であった.

2. 疾患別服薬成績 (図 1) : 虚血性心疾患, 不整脈, 高血圧の服薬成績は, 図 1 の如く, ほぼ同様であったが, 弁膜症では, A 83.3%, B 15.0% であり, 有意 (χ^2 検定) に良好であった.

3. 特別な疾患の服薬成績 : 同じく虚血性心疾患で

図 1 疾患別服薬成績

図 2 年齢別, 服薬成績 (合併疾患のない高血圧例)

あっても, 疾患の性質によって服薬成績が異っている. ここでは冠拳縮性狭心症 (28 例) と, 冠動脈・大動脈バイパス術後 (53 例) をとりあげた. 前者では服薬成績, A 23 例 (82.1%), B 3 例 (10.7%), C+D 2 例 (7.1%) であったのに対し, 後者では, A 26 例 (49.1%), B 21 例 (39.6%), C+D 6 例 (11.3%) と, 前者で有意 ($p<0.05$) に良好であった.

4. Warfarin の服薬成績への影響 : 循環器用薬剤の中でも, 服薬状況に最も注意が払われる薬剤である Warfarin をとりあげた. Warfarin 服用者 51 例の, Warfarin の服薬成績は, A 50 例 (98.0%), B 1 例 (2.0%) であり, この 51 例の Warfarin 以外の薬剤も含

めた服薬成績は、A47例(92.2%)、B 4例(7.8%)であった。

弁膜症患者(60例)を、Warfarin服用者(37例)と非服用者(23例)に分け、その服薬成績をみると、前者では、A34例(92.0%)、B 3例(8.1%)、C+Dなし、後者ではA16例(69.6%)、B 6例(26.1%)、C+D 1例(4.3%)と、前者で有意($p<0.05$)に良好であった。

5. 服薬成績におよぼす年齢の影響：全例の年齢別の服薬成績は、39歳以下(24例)ではA15例(62.5%)、B 8例(33.3%)、C+D 1例(4.2%)、40~49歳(66例)では各々、41例(62.1%)、21例(31.8%)、4例(6.1%)、50~59歳(230例)では各々144例(62.6%)、76例(33.0%)、10例(4.3%)、60~69歳(234例)では、各々164例(70.1%)、51例(21.8%)、19例(8.1%)、70~79歳(96例)では、各々68例(70.8%)、24例(25.0%)、4例(4.2%)、80歳以上(24例)では、各々11例(45.8%)、12例(50%)、1例(4.2%)であった。70歳台で最も良好であり、80歳台で最も不良の傾向があった(両群間 $p<0.1$)。

年齢の服薬成績に及ぼす影響を検討するさい、年齢による構成疾患の違いをなくすため合併疾患のない高血圧患者243例を用いたものが図2である。全体と同様に70歳台まではほとんど服薬成績に差はないが、80歳以上では服薬成績は低下する傾向がみられた。

6. 薬剤投与方法と服薬成績：疾患による差をなくすため、合併疾患のない高血圧243例を用いた。服薬々剤数別に服薬成績をみると、1剤投与(79例)では、A53例(67.1%)、B21例(26.6%)、C+D5例(6.3%)、2剤投与(104例)では、各々65例(62.5%)、33例(31.7%)、6例(5.8%)、3剤以上投与(60例)では、各々37例(61.7%)、21例(35.0%)、2例(3.3%)であり、この3群間に差はなかった。

服薬回数別に服薬成績をみると、朝1回服用(96例)では、A72例(75.0%)、B21例(21.4%)、C+D 3例(3.1%)、朝、夕2回服用(41例)では、各々21例(51.2%)、15例(36.6%)、5例(12.2%)、朝、昼、夕3回投与(106例)では、各々62例(58.4%)、39例(36.8%)、5例(4.7%)であり、朝1回が良好な傾向(2回、3回に対し $p<0.1$)があった。

服薬時刻別に服薬成績をみると、朝の服薬(243例)では、A202例(83.1%)、B35例(14.4%)、C+D 6例(2.4%)、昼の服薬(106例)では、各々56例(52.8%)、30例(28.3%)、20例(18.9%)、夕の服薬(147例)では、各々94例(63.9%)、33例(22.4%)、20例(13.6%)であり、朝が昼、夕に比べ有意(いずれも $p<0.01$)に良かったが、夕と昼では、夕に良い傾向が認められた($p<0.1$)のみであった。

7. QOLと服薬成績：QOLのアンケート調査の解答の得られた273例の服薬調査成績は、A 177例

図3 服薬成績とアンケート調査結果

(64.8%), B85例(31.1%), C+D11例(4.0%)であった。例数の少ないC+D例を除きQOLの各群について、服薬成績Aの者とBの者との差があるか否かを検討した。①自覚症状、③仕事、趣味、④気分、⑤生活の諸群については、A,B群間に差はなかった。しかし、②睡眠の群のに統計的に有意差($p<0.05$)があった。副作用の不安感によって服薬成績に差はなかった(図3)。

IV. 服薬状況の変化と臨床症状

服薬状況が変化すると、それにより臨床症状の変化がみられる。これについて症例を呈示し、問題点を述べた。

1. 服薬状況悪化によるもの。①薬剤の効果の減弱と臨床症状の悪化、②はね返り現象：薬剤の中止により、症状が薬剤服薬前よりもむしろ、より悪化してしまうものである。降圧剤中止により著明な高血圧を生ずることがあり、稀に脳出血等の重篤な合併症が見られる。 β 遮断薬の中止による虚血性心疾患の増悪は有名であるが稀である。抗凝固薬中断による血栓形成もある。クロニジン中断による著明な高血圧を呈した症例を呈した症例を呈示した。2. 服薬状況改善によるもの。③薬剤の効果の過度の発現。利尿効果が大きすぎるための脱水、電解質異常、降圧薬による低血圧、ジギタリス製剤や抗不整脈薬による徐脈や伝導障害、抗凝固による出血などがあり、特に高齢者では問題になることが多い。④薬剤中毒。服薬状況の改善により、薬剤過量からさらに中毒となることがある。多源性心室性期外収縮にプロカインアミド投与中の患者が、入院後、服薬成績が改善したため、これの中毒となり、心室頻拍を生じたが、血液透析により改善した症例を呈示した。

V. 考 察

今回得られた服薬成績は、その調査法が面接による自己申告であるため、やや過大評価されている可能性を考慮に入れても、かなり良好なものと言える。

疾患の性質により服薬成績が、いかに異なるかを検討するべく、同じく虚血性心疾患ではあるが、かなり性質の異なるものとして、冠狭窄性狭心症と冠動脈一大動脈バイパス術後例とをとり上げ、服薬成績を比較した。この結果、前者の服薬成績が後者より明らかに良好であった。これは、前者では、薬剤の効果が明瞭であり、

また患者自身それを明確に自覚できること、さらに、医師も服薬の重要性を強調し、より十分の教育が行われていることが、その理由と考えられる。

Warfarin服用者においては、Warfarinのみならず、他の薬剤の服用成績も良好なことは、やはり、医師が服薬成績を良好に維持することの重要性を認識し、患者にそれを、十分に伝えていることの現れであると考えられる。

これらの成績は、上記以外の疾患、薬剤についても、患者の教育を十分に行えば、服薬成績は、さらに向上する余地があることを示している。

服薬成績に及ぼす加齢の影響を検討したが、定期的外来通院者という制約はあるものの、少なくとも、70歳台までは、加齢によって服薬成績が低下していくものではないことが示された。しかし、80歳以上では服薬成績は低下する傾向があった。

薬剤投与法について、従来の成績²⁾と同様、朝服薬の成績が良いことが示され、投薬法に工夫を要することが解った。しかし、今回の成績では、朝・夕2回投与と、朝・昼、夕3回投与の服薬成績に差がなく、患者によく説明、納得してもらえば、3回投与もさして支障はないものと考えられた。

QOLの評価法には、未だ問題が多く、今回の我々の調査も、予備的と言うべきものである。QOLと服薬成績の関連性につき、ある見解を導き得るものとは言い難い。

最後に、医師自身がコンプライアンスの重要性を十分認識することが、コンプライアンス改善の道であることを強調した。

本研究は朝日生命成人病研究所の研究助成金を受けて行った。

文 献

- 1) 荻原俊男, 三上 洋, 中丸光昭, 真杉文紀, 大塚篤弘, 檜垣実男, 片平克俊, 斎藤裕之, 小原克彦, 桑木宏実, 波多 丈, 熊原雄一: 高齢者高血圧の変換酵素阻害薬による治療とQuality of Lifeに関する研究. Geriatr Med 26 : 291, 1988.
- 2) Fujii J, Seki A: Compliance and compliance-improving strategies in hypertension: The Japanese experience. J Hypertens 3(Suppl. 1): 19, 1985.

Abstract

Medication Compliance in Cardiovascular Disease

Akira Seki

The medication compliance of 674 patients with cardiovascular disease was evaluated by interview. Of all 674 patients, 441 (65.4%) reported taking over 95% of prescribed drugs, 193 (28.6%) took 75 to 94%, 29 (4.3%) took 50 to 74% and 11 (1.6%) took under 50%. The medication compliance of patients with valvular disease (n=60) was better than that of patients with coronary heart disease (n=251), arrhythmias (n=58) or hypertension (n=356). Among patients with valvular disease, the medication compliance of those taking Warfarin was better than that of those not taking it. Among patients with coronary heart disease, the medication compliance of vasospastic angina pectoris was better than that of patients after aorto-coronary bypass surgery. The level

of medication compliance was not influenced by age under 79 years old, but it was slightly decreased over 80 years old. The level of medication compliance remained about the same regardless of the number or drugs, but it was closely related to the timing of dosing. The medication compliance was best with dosing in the morning. A questionnaire form about "quality of life", revealed no significant association between "quality of life" and the medication compliance. In conclusion, it was emphasized that it is the physician's responsibility to teach, motivate, and encourage patients to maximize compliance.

Key words: *medication compliance, cardiovascular disease, quality of life*

(Jpn J Geriat 26: 115—119, 1989)

Toranomon Hospital, Cardiovascular Center

＜シンポジウム：老年者薬物治療の問題点＞

3. 老年者における向精神薬療法の問題点

小 椋 力

＜要 約＞ 老年者における向精神薬療法上の問題としては、有害反応が生じやすく重症化の傾向があり、併用薬が多く相互作用が起こりやすく、ノンコンプライアンスが生じやすい。これらの問題は、他の薬物療法の場合でも老年者に目立つが、向精神薬療法のさいには、対象となる患者の精神症状などのためにとくに顕著となりやすいので、より慎重な対応が必要となる。そのためには治療効果が最大となり、有害反応を最小に止めるような、いわゆる合理的な薬物療法が強く求められていることになる。

合理的な薬物療法のためには、治療計画を立てる必要がある。それには治療効果・有害反応の予測に必要なデータの収集が求められる。治療開始後には治療効果と有害反応の厳密な評価、難治例対策、治療終結の決定、再発の予防などが問題になる。有害反応の評価のためには、自覚症状のみに依存せず客観的な指標を用いることが望まれる。綿球法による唾液流量、重心動揺計による重心動揺、フリッカー値による vigilance level などは比較的有用であると考えられる。

痴呆関連疾患治療薬の治療効果の評価は、知能テストなどの心理テストが主として使用されているが、認知機能の生理学的指標とされている事象関連電位は、これらの薬物の影響を客観的に、そして比較的感受度よく把握できる可能性がある。idebenone, meclonoxate などについての結果を紹介した。いずれにしても真の抗痴呆薬の出現が待たれているといえる。

Key words : psychotropic drug, elderly, side effects

(Jpn J Geriatr 26 : 120—123, 1989)

老年者に対して向精神薬療法を実施する場合、他の薬物療法を行うさいに問題になることが、そのまま当てはまる。例えば、老年者の場合、若年成人（以下、若年者と略す）に比較して薬物療法の有害反応が現れやすく、重症化しやすく、治療効果も少量で得られることが多い。さらに、服薬が指示通りに行われ難い傾向がある。

向精神薬療法の場合、他の薬物療法に比較して上記の問題がより大きくなりやすい。すなわち、向精神薬は有害反応が生じやすい薬物であること、向精神薬療法の対象となる精神病理状態は、薬物療法を実施するさい患者の協力を得にくくさせやすい。したがって老年者に対する向精神薬療法は、他の年齢層の患者に対する場合に比べ、また他の薬物療法の場合に比較して、より慎重な薬物療法が必要となる。

老年痴呆など痴呆関連疾患が注目されるとともに、治療薬の開発が盛んであり、「抗痴呆薬」の名称も使用されているが、現在のところ真に「抗痴呆薬」と呼べ

る薬物があるかどうか疑わしい。また、知的機能に及ぼす影響を厳密に、客観的に評価する方法があれば、この種の薬物の開発、治療効果の評価に有用であろう。

1. 老年者における向精神薬療法上の問題点

老年者における本療法上の問題点は、薬物の有害反応の出現率が高くなり、重症化しやすく併用が多くなるため相互作用が現れやすく、ノンコンプライアンスが生じやすい¹⁾。

演者は、抗うつ薬 dothiepin, amitriptyline²⁾³⁾, Y-8894⁴⁾の血圧、唾液流量、フリッカー値などに及ぼす影響の年齢差を調べた。その結果、老年者の場合、若年者に比較して薬物の影響が強く現れた。同時に薬物動態に関する検討を行ったところ、老年者では他に比較して T_{max}, T_{1/2}は長く、AUC, K_a, Cl などの値が大きく、薬物の影響が強く現れる理由の一部は、この薬物動態の差が考えられるなどを報告した²⁾。

治療効果についても、老年者の場合、若年者に比較してより少ない量で有効であることを経験しているが、これが薬物動態の差によるのか、あるいは他の原因に依存するのか十分に解明されていない。Castleden

ら⁹⁾ (1979) は、睡眠薬 nitrazepam の精神運動作業、自覚症状に及ぼす影響の年齢差を調べている。その結果、高齢者の場合、若年者に比較して薬物の影響は強く現れたが、血中濃度に差はなかったとしている。

Reidderberg ら⁹⁾ (1978) は、抗不安薬 diazepam がある一定の薬理作用を示した時点での血中濃度を調べた結果、その血中濃度は年齢とともに低くなっており、高齢者では diazepam に対して sensitive であるとしている。したがって薬物動態以外に pharmacodynamics などの年齢差が薬理作用の差の原因と考えられ、今後の検討が必要な領域であろう。

高齢者の場合、身体疾患も含めて合併症が多くなり、それだけ併用・使用される薬物の種類も多くなりやすい。その結果、交互作用が生じやすく、有害反応の出現率も高くなるとの報告がある。高齢者は、若年者に比較して服薬指示を守りにくいことを経験する。その理由は、忘れ、誤解、知識不足、不信、面倒などが考えられる。したがって、高齢者の場合、的確に服薬させる工夫、指導が必要となる。この点については河野の総説が参考となろう⁸⁾。

2. 高齢者に対する合理的な向精神薬療法

薬物療法を合理的に実施するには、治療計画を立てることである。そのためには治療効果・有害反応の予測に必要な患者についての情報を収集する必要がある。まず患者の病態、状態、合併精神疾患の有無、精神疾患の遺伝負因の有無、薬理遺伝学的情報、アレルギー体質の有無、脳器質異常の有無と程度、既使用薬物の種類と量などである。

薬物動態に関しては、性、年齢、一般健康状態、栄養、身体疾患の合併の有無、肝機能、腎機能、心循環機能、アルブミン値などであり、ノンコンプライアンスについては、患者の知能、治療者・患者関係、家族などの協力の程度などの情報が必要である。

薬物側の情報としては、使用を検討している薬物の薬理作用の概略、消失半減期、蛋白結合率などの薬物動態値、有害反応、相互作用などが必要となる。そのさい、「臨床薬物ハンドブック」⁹⁾などの単行本が役立つと思われる。

薬物療法が開始された後に重要なことは、治療効果と有害反応の評価である。治療後に状態が改善された場合、薬物の効果がまず考えられるが、同時に併用されている精神療法、生活療法の効果、あるいは薬物との併用効果、さらには自然の経過である可能性も否定

できない。常に何が効いているかを考える必要があり、このことは無意味な長期と薬を防ぐに役立つ。

治療効果が認められ完全寛解の状態に至った場合、治療の終結の時期と方法が問題になる。とくに高齢者、精神疾患の場合、判断に苦慮することが少なくないが、継続して使用したさいに予測される有害反応の種類、程度、薬価、そして治療を終結したさいの再発の可能性、再発の仕方、再発時の状態を病歴などをもとに予測し、患者・家族の考えを十分に取り入れ判断することになる。

3. 有害反応の客観的評価

合理的な薬物療法を行うためには、有害反応の厳密な評価も欠かせない。高齢者の場合、有害反応は出現しやすく、重症化しやすいにもかかわらず、知的機能の低下、刺激に対する反応の減弱、性格の変化などの理由で、有害反応が当然に自覚されてよいと考えられる場合でも、それが訴えられないことを経験する。慢性分裂病患者の場合、角膜・水晶体の混濁があるため、明らかに視力障害が存在しているにもかかわらず、視力障害の存在を自覚しないことを演者は報告した¹⁰⁾。これに似た現象が高齢者の一部には見られる。したがって、有害反応の早期発見、早期対策のためには、患者の自覚症状のみに依存せず、できるだけ客観的な評価が必要となる。

向精神薬の有害反応を客観化するための方法論については、現在のところ「ねむけ」などの vigilance level の低下に関する指標としてフリッカー値、「口渇」の指標として綿球法による混合唾液流量の測定、「ふらつき」の指標として重心動揺計による評価、片足立ち試験などが有用であると考えている¹¹⁾。

演者は、先ほど述べた各種の指標を用いて、各種抗うつ薬の及ぼす影響を検討した²⁾⁻⁴⁾、健常者 (N=10) を対象にし、double blind, cross-over 法を用い、与薬前から与薬後24~48時間までの影響を調べた。得られた結果について、与薬前値に比べ与薬後、薬物の効果が最大であった時点の値を最大変化率とし、それを図1のように座標としてプロットした。

左側には vigilance level, body sway, salivation に及ぼす影響の強い薬物、右側に比較的影響の弱い薬物を示した。強い薬物には、いわゆる第1世代の抗うつ薬 imipramine, amitriptyline が含まれるほか第2世代でも mianserin は影響が強いことがわかる。弱い薬物には第2世代の薬物と第1世代でも二級アミンであ

Fig. 1 Effects of 7 antidepressants on physiological parameters

る nortriptyline が含まれていた。与薬量は、臨床用量からしてほぼ equivalent であると考えているが、1 用量であること、対象が病者ではなく健康者であること、慢性投与ではなく単回投与であることなどのために、臨床の実際とは同じではなく、問題は残る。しかし、かなり厳密な比較が行えており、有害反応の起こしやすさの目安にはなろう。今後、薬物の持つ特徴がこのようなかたちで示されると、特徴を理解しやすく、治療計画を立てるさい有益であろう。

4. 痴呆関連疾患治療薬

脳血管障害にみられる痴呆などに対する治療薬の名称には、脳循環改善剤、脳代謝改善薬、脳代謝賦活剤、脳賦活剤、脳神経賦活剤、精神症状改善剤、脳機能改善剤、脳神経細胞保護・機能改善剤などがある。

薬物の持つ薬理作用、治療効果を的確に表現できる名称を見出すことは、現在のところ容易ではないので、痴呆関連疾患治療薬といった名称で用いてはどうかと考えている。その中で薬理作用に特徴があれば、それを下位の名称にしてはどうであろうか。

痴呆関連疾患治療薬の治療効果の評価は、主として知能テストなどの心理テスト、精神症状評価尺度、日常生活動作能力評価尺度などが使用されているが、知的機能に関する客観的で感度の高い評価法は乏しい。事象関連電位は、情報処理過程（認知機能）の生理学的指標と考えられており、本電位のうち P300 成分の潜時は、加齢と共に延長するが、痴呆患者の場合、健康老年者に比較してさらに延長することが明らかになっており¹²⁾、また本潜時と短期記憶能力との間には負の相関が見出されたとの報告もある。

本電位に及ぼす痴呆関連疾患治療薬の影響を、演者らは調べているが、これらの薬物が P300 潜時を短縮さ

せたり、N200 振幅を増大させる症例を見出している。現在のところ症例数が少なく、確定的なことは言えないが、本電位の各成分にみられる認知心理学的な意味は少しずつ明らかにされてきているので、本電位に及ぼす薬物の影響を検討することにより、効果の特徴を客観的に詳細に知ることが可能ではないかと考えている。

文 献

- 1) Greenbratt DJ, Allen MP: Toxicity of high dose flurazepam in the elderly. *Clin Pharmacol Ther* 21 : 355—361, 1977.
- 2) Ogura C, Kishimoto A, Mizukawa R, et al: Age differences in effects on blood pressure, flicker fusion frequency, salivation and pharmacokinetics of single oral doses of dothiepin and amitriptyline. *Eur J Clin Pharmacol* 25 : 811—814, 1983.
- 3) Ogura C, Kishimoto A, Mizukawa R, et al: Comparative study of the effects of 9 antidepressants on several physiological parameters in healthy volunteers. *Neuropsychobiology* 17 : 139—144, 1987.
- 4) Ogura C, Kishimoto A, Kunimoto N, et al: Clinical pharmacology of a new antidepressant, Y-8894 in healthy young and elderly volunteers. *Br J Clin Pharmacol* 23 : 537—543, 1987.
- 5) Castleden CM, George CF: Increased sensitivity to benzodiazepines in the elderly. In: *Drugs and the Elderly Perspectives in Geriatric Pharmacology*. Crooks J and Stevenson IH (eds), Macmillan Press, London, 1979, 169—178.
- 6) Reidenberg MM, Levy M, Warner H, et al:

- Relationship between diazepam dose, plasma level, age and central nervous system depression. Clin Pharmacol Ther 23 : 371—374, 1978.
- 7) 小椋 力：老年期精神障害の治療。図説臨床精神医学講座，第7巻，老年精神医学，島園安雄，他（編），メジカルビュー社，東京，1987，158—169.
 - 8) 河野友信：薬物療法の効果に影響を与える薬物以外の要因。臨床老年医学大系，19巻，中野重行（編），情報開発研究所，東京，1984，113—133.
 - 9) 神代 昭，西岡幹夫：臨床薬物ハンドブック，医歯薬出版，東京，1986.
 - 10) Ogura C, Tamai A, Kuda K, et al : Relationship between physical findings and related subjective symptoms in neuropsychiatric patients with somatic complications. With specific reference to ophthalmologic observations. Comprehensive Psychiatry 18 : 347—355, 1977.
 - 11) 小椋 力，挾間秀文，岸本 朗ら：向精神薬の自覚的副作用を客観化する方法に関する研究—抗うつ薬の場合—。精神薬療基金研究年報 14 : 274—279, 1983.
 - 12) Goodin DS, Squire KC, Starr A : Long latency event-related components of auditory evoked potential in dementia. Brain 101 : 635—648, 1978.

＜シンポジウム：老年者薬物治療の問題点＞

4. 抗血栓薬

松田 保

＜要 約＞ 加齢とともにフィブリノゲンは増加し、60歳以後アンチトロンビンIIIは低下し、このことは血栓の発現を促進すると思われるが、老年者において、血栓症の頻度の増加することの主因となるほどの変化とは思われない。老年者の血栓傾向の原因としては、あくまでも血管の変化が主因と思われる。抗凝血薬の投与に際しては、若年者の場合同様、凝固検査によって凝血能をいわゆる「治療域」内に維持するのであるが、老年者の場合、出血、ことに頭蓋内出血の頻度の高いことが指摘されている。副作用としての出血を比較的生じ難いとされる抗血小板薬や血栓溶解薬の老人への投与に際しても、このことは時に経験される。老年者に対するアスピリン投与については、消化性潰瘍の発現が問題であるが、著者らは volunteers 10例に対し、1日40mgのアスピリンを投与し、1週後、人工的に血液を凝固させるという大きな刺激を血小板に加えて生ぜしめた thromboxane B₂の量は、アスピリン投与前の7%に低下した。一方、PGI₂の代謝産物である6-keto-PGF_{1α}は、アスピリン投与後、前値の72%程度に低下したにすぎず、この点、少量のアスピリンの方が有利である可能性がある。教室の魚谷らは、このような少量のアスピリンの投与後、血中の白血球のガラス・ビーズへの粘着能も低下することを認めており、このことも血液レオロジー的には血栓の発現を阻害する方向に作用すると思われる。このほか、1日1mgのワーファリンによるいわゆる fixed-dose Warfarin therapy や、フィブリンに選択的な親和性をもつ tissue-type plasminogen activator、フィブリノゲン分解作用のない pro-urokinase なども、出血の副作用が少ないという点で老年者に対して使用する際有利かも知れない。また、血液の側での血栓症発現を予知するような要因(たとえばフィブリノゲン、 β -thromboglobulin、または thrombin-antithrombin III complex の増加)のみられる例に、選択的に抗血栓薬を投与するような方法を今後考えるべきかも知れない。

Key words : 抗血栓薬, アスピリン, ジレンマ, 白血球粘着能, β -thromboglobulin, Thrombin-antithrombin III complex

I. はじめに

加齢とともに血栓症の発現頻度が増加することは良く知られている。この点、老年者においては、抗血小板療法、抗凝固療法、血栓溶解療法を含めた広義の抗血栓療法が適応となる場合が多いと思われるが、一方、老年者においては、一般に抗血栓療法ことに抗凝固療法に際しての出血事故が多い¹⁾²⁾ことが指摘されており、老年者は抗血栓療法の対象から除外される場合が多い。したがって、老年者における抗血栓療法の問題点について論ずることは困難と思われるが、今回はこの点につき、総説的に論じて著者の責を果たしたい。

II. 老年者の血液凝固性亢進

血栓の原因としては、血管壁の変化、血流の速度または性質の異常、広義の血液凝固性の亢進がすでに19世紀、Virchowによってとりあげられている。

加齢とともに、動脈硬化のような血管の異常が進行することはもちろんであるが、血液凝固性の変化に関して一致して認められているのは、老年者においてフィブリノゲンが増加することである³⁾。図1は、著者の東京都老人総合研究所在籍中の成績であるが、若年者に比し、老年者においてフィブリノゲンが増加している。フィブリノゲンは凝固に必要であるが、血小板膜の glycoprotein IIb/IIIa と結合することにより、血小板と血小板との結合(血小板凝集)を生ぜしめ、また血液の粘度を亢進させる⁴⁾。フィブリノゲンの増加は血小板の凝集を亢進させる⁵⁾との報告もあり、また、

図1 加齢に伴う血漿中フィブリノゲン量の変動（平均と標準偏差を示す）

図2 加齢に伴う血漿中アンチトロンビンIII濃度の変動（平均と標準偏差を示す）

最近の Framingham Study⁶⁾はフィブリノゲンの増加を心筋梗塞の危険因子の一つとしてとり上げている。この点、老年者はフィブリノゲンに関する限り、広義の凝固性亢進状態にあると言ってよいかも知れない。

III. 血管の変化と抗血栓療法の効果

一般に、抗血栓薬により、血小板機能や凝血能を低下させるほど、血栓の発現率は低下し、また線溶能を亢進させるほど血栓の溶解率は上昇すると考えられる。一方、それとともに出血の危険は多少とも増加する。

抗血栓療法の対象となる老年者では、若年者に比べ動脈硬化が強く、その分、抗血栓薬が効きにくい例が増加する可能性が考えられる。また、老年者では一般に薬剤の代謝速度が遅くなるとすれば、同じ量でも薬剤の効果が強くなる可能性も考えられる。この場合には、副作用としての出血の頻度が増加するかも知れない。また、老年者において腎機能障害のため、血中の尿素窒素が上昇していれば、このことは血小板の機能を低下させ、出血の危険を増加させる可能性がある。また、老人性紫斑のように、老年者にみられる血管脆弱性の亢進は、一般には全身性の出血の原因とはならないと考えられているが、一旦出血を生じた時には、大出血を生ずる方向に作用し、抗血栓薬の安全性を低下させる方向に作用するかも知れない。

IV. 老年者の抗血栓療法と出血

一般に抗凝固療法については、以前より老年者においては出血の危険が高い¹⁾²⁾といわれている。ただし、ワーファリンやヘパリンの標準的な使用法は、凝固検

査を行い凝固能を一定の範囲（治療域）内におさまるように薬剤をコントロールするものなので、老年者では、薬剤が「効きすぎて」出血を生ずるということとはなさそうに思われる。しかし、Whisnant ら⁷⁾は、経口抗凝固薬投与中の脳出血はほとんど65歳以上の例に限られていることから、65歳以下の例が経口抗凝固療法には適しているとしている。また、経口抗凝固療法を受けている166例を対象に、頭蓋内出血の危険因子について検討した最近のオランダの報告⁸⁾では、この危険は抗凝固薬による凝固能の低下が強いほど増加するが、脳出血を生じた時の死亡率は、対照群に比べ年齢が高くなるほど高くなるとされている。

ヘパリンについては、老年者の女性に出血を生じやすいとの報告⁹⁾があるが、あるいはヘパリンの抗凝固作用と密接に関連するアンチトロンビンIIIの血中濃度は60歳以後、加齢とともに低下するが、一般に老年者では女性が男性より高い（図2）ことと関連する可能性がある。また、脳梗塞急性期の510例にヘパリンを投与した最近のアメリカの報告⁹⁾では、このうち16例に脳出血を認めているが、出血に関連する要因としては、年齢が60歳以上であることのみが有意で、脳梗塞の重症度、血圧、糖尿病の合併などは無関係とされている。また、脳以外の部位を含めての出血の頻度は、推計学的には有意ではないが、女性は男性の2倍であった。

抗血小板薬は、副作用の出血という点では、抗凝固薬に比べはるかに安全な薬剤と考えられている。しかし、山之内ら¹⁰⁾は、平均年齢71歳の老年者52例に対し、脳梗塞の再発予防の目的でアスピリンを約14カ月投与し、うち3例に脳出血の発現をみている。通常、脳梗

塞の例に脳出血を生ずることは少ないので、この脳出血は、アスピリンによる血小板機能の低下と関連しているのかも知れない。ただし、脳出血を生じた3例は、55歳から63歳とむしろ比較的若年の例であり、アスピリンの投与量は1日300mg~600mg、いずれも高血圧症を合併していて、必ずしも老年者に出血を生じやすいという成績ではない。

40歳~84歳の内科医20,000人以上を対象に、アスピリンを隔日に325mg 宛投与したグループと、プラセボとして β カロチンを投与したグループを5年間にわたって比較した最近のアメリカの検討では、アスピリン投与群に急性心筋梗塞の発現と、それによる死亡の有意の低下がみられている。ただし、推計学的には有意ではないが、アスピリン投与群では脳出血の発現が軽度増加している。この報告¹¹⁾は予報であるので詳細は不明であるが、どのような例に脳出血を生じたのか気になるところである。

なお、血小板機能の低下している尿毒症¹²⁾や骨髄増殖性疾患¹³⁾にアスピリンを投与した場合、異常な出血時間の延長を生ずる可能性があることが指摘されており、もし、簡単かつ迅速に血小板機能の低下を知ることができれば、抗血小板療法の安全性はさらに増加すると考えられる。

なお、老年者に抗血小板薬としてアスピリンを使用する場合、ことに1日500mg以上の量のアスピリンを使用する場合の問題は、むしろ胃腸障害であろうと思われるが、この点については、本シンポジウム別項で詳述されるはずである。

なお、抗血小板薬としては、アスピリンの他、血小板活性化経路のさまざまな段階を阻害する数多くの薬剤が開発されつつある¹⁴⁾が、何れの薬剤についても現在のところ出血の副作用については問題となっていない。しかし、今後作用機序の異なる複数の抗血小板薬を併用して抗血栓効果の増強を狙う際には、若年者に対する使用であっても出血の危険について考慮する必要があるかも知れない。

血栓溶解薬は、ウロキナーゼについては現在、急性心筋梗塞に対しては1日1,000,000単位以上もの量を使用され、しかも、出血の副作用に関しては比較的安全と考えられている。しかし、著者らは85歳の閉塞性動脈硬化症の症例に対し、240,000単位のウロキナーゼを投与した後、活性化部分トロンボプラスチン時間の延長、第XIII因子活性の低下、血中 α_2 -plasmin inhibitor(α_2 -antiplasmin)濃度の低下をみるとともに脳

表1 閉塞性動脈硬化症の1例(85歳女)に対しウロキナーゼ24万単位を投与した前後の凝血学的検査成績、右の投与後の成績は、脳出血惹起後のものの。

ASO 85-year-old woman	before UK	UK 240,000IU (acute cerebral hemorrhage)
APTT	33.4sec	50.7sec
prothrombin time	12.4sec	12.8sec
factor IX	66 %	135 %
factor VII	62 %	125 %
factor X	76 %	105 %
prothrombin	96 %	82 %
vWF: Ag	82 %	125 %
fibrinogen	505 mg/dl	362 mg/dl
factor XIII	100 %	25 %
F XIII subunit a	81 %	88 %
F XIII subunit b	88 %	116 %
plasminogen	10.7mg/dl	8.7mg/dl
α_2 -plasmin inhibitor	5.3mg/dl	3.4mg/dl
α_2 -macroglobulin	184 mg/dl	160 mg/dl
FDP	20 μ g/ml	20 μ g/ml
blood viscosity	14.7cp	9.4cp
hematocrit	48 %	41 %

出血を生じた経験を有している(表1)。この例の α_2 -plasmin inhibitorの濃度は、plasminとの複合体を反映している可能性もあり、さらに活性は低下しているのかも知れないが、ウロキナーゼの投与により著しい線溶亢進を生じたと考えられる。あるいは、この例ではウロキナーゼの血中における半減期が延長していたのかも知れないが、高齢者に対する血栓溶解療法は薬剤の量が少なくても必ずしも常に安全ではないのかも知れず、海外における血栓溶解療法に際しても、老年者に出血の頻度が高いとの報告¹⁵⁾がみられる。

V. 抗血栓薬の少量投与

なお、もし、老年者に対する抗血栓薬療法に際して、出血の危険が高いとするならば、薬剤の有効性が多少低下することを覚悟の上で、抗血栓薬の少量投与を行うのが良いのかも知れない。

アスピリンは、抗血小板薬として使用する場合、血小板のcyclo-oxygenaseを阻止することにより、トロンボキサンA₂(TXA₂)の生成を阻害して血小板の機能を低下させる。しかし、これとともに血管壁の細胞のcyclo-oxygenaseの作用もアスピリンによって阻止される可能性がある。このような場合、血管壁にお

図3 アスピリン 1日40mg を2週間経口投与した前後の血清中トロンボキサン B₂ (TXB₂) および血漿中6-keto-PGF_{1α} 濃度の変動(平均と標準偏差を示す。アスピリン投与開始後1および2週後の TXB₂の低下は推計学的に危険率0.1%以下で有意)

けるプロスタサイクリン (PGI₂) の産生が低下する。TXA₂が血管の収縮, 血小板の凝集など, 止血または血栓の発現を促進する方向に作用するのに対し, PGI₂はこれと反対の血管拡張, 血小板凝集阻止作用を有するので, PGI₂の産生低下は血栓促進の方向に作用する。この点, アスピリンは「両刃の剣」的な作用をもつことになる。これが「アスピリン・ジレンマ」と呼ばれる問題点である。アスピリン・ジレンマの解決策はいくつか考えられているが, 最も簡単なものはアスピリンの投与量を低下させるもので, この方法は, 老年者においては, アスピリンによる消費性潰瘍の発現の頻度を多少とも低下せしめる効果をもっているかも知れない。

図3は, 従来より血小板機能低下の目的で用いられた量の1/10以下の, 1日1回40mg という極めて少量のアスピリンを volunteers 10例に対して2週間内服せしめ, その前後, また内服中止後1週間の血小板のTXA₂産生能と血中のPGI₂濃度の変動を示したものである。

血小板はトロンビンに対して極めて鋭敏で, フィブリンゲンをフィブリンに転化し得ないほど微量のトロンビンの存在下でも凝集する。TXA₂の産生能の測定

については, このことを利用し, ガラス試験管に採取した血液を37℃ 1時間加温して完全に凝固させ(十分量のトロンビンを生じ, 血小板は完全に活性化されたと考えられる), 分離した血清中のTXB₂ (TXA₂は不安定で迅速に安定な代謝産物であるTXB₂に変化する)を測定することにより, 生じたTXA₂の量を推定し得る)を測定した。アスピリン投与前の測定値を100%とし, これに対する変動の平均値と標準偏差をプロットしたが, このような極めて強い刺激が血小板に加わった条件下でのTXA₂の産生は, このような刺激の加わらない血漿中に自然に存在する量の約7,000倍に達するが, アスピリン1日40mgの投与の1週間後には投与前値の6.5%, 2週間後には投与前値の13.8%と著しく低下した。なお, アスピリン投与中止の1週間後には, 投与前の67.3%と回復している。一方, PGI₂も血中では不安定なので, その比較的安定な代謝産物である6-keto-PGF_{1α}の測定が一般に行われている。ただし6-keto-PGF_{1α}の場合, 上記のように血清について測定することは, 血清中に6-keto-PGF_{1α}と交叉免疫性を有するさまざまなプロスタノイドを大量に生ずるため問題があり, 血漿について測定を行った。その結果, 6-keto-PGF_{1α}の血中濃度は, アスピリン投

与1週後は投与前の72.2%, 2週後は80.2%, 中止の1週後には89.7%と, TXB_2 の低下に比し軽度である。この程度の TXA_2 産生能と血中 PGI_2 濃度の低下が, アスピリン・ジレンマの解決になるかどうかについては臨床的な裏づけが必要であるが, このことによって, アスピリン・ジレンマをある程度回避し得る可能性があり, また, 老年者において問題となる消化管に関する副作用をある程度軽減し得る可能性があるかも知れない。

なお, 教室の魚谷は, このようなアスピリン40mgの投与に際し, 血液中の白血球のガラスビーズ管への粘着能の変動について検討し, TXA_2 産生能低下とともに, 白血球の粘着能も有意 ($p < 0.01$) に低下することを見出した(1988年日本血栓止血学会に発表)。このことの機序, 臨床的意義についてはさらに検討が必要であるが, 白血球の血管壁への粘着を低下させることにより, レオロジー的には血栓の発現を阻止する方向に作用する可能性が考えられる。

ヘパリンに関しては, 1回5,000単位程度の少量を1日2回腹壁に注射する, いわゆる mini-dose heparin therapy が開発されているが, この方法での長期投与には問題がある。

むしろ, ワーファリンについて, 手術後, 毎日1mg という極めて少量を内服させ, 術後の血栓予防に有効であったとする報告¹⁶⁾がみられ, 今後の発展が注目される。

血栓溶解薬については, PTCRのような冠動脈への, また脳動脈への¹⁷⁾局所的な投与法と, 経静脈的な比較的大量投与とが行われる傾向にあるが, 近年, 従来より用いられたウロキナーゼよりもフィブリンの親和性の高い t-PA (tissue-type plasminogen activator), 流血中ではフィブリンノゲンを分解しない pro-urokinase (scu-PA), また t-PA よりさらにフィブリンへの親和性が高く血中半減期の長い t-PA の mutant, t-PA と pro-urokinase との hybrid などが開発され, 全身性の出血性素因の発現に関しては, より安全な血栓溶解が可能となるかも知れない。

VI. 抗血栓療法の必要な症例の選択

また, 広義の血栓傾向にあるような症例を抗血栓療法の対象として選び出すことができれば理想的と考えられる。

井藤ら¹⁸⁾は, 糖尿病患者について血中での血小板の活性化の程度を反映する血漿中の β -thromboglobulin

を測定した著者の成績をもとにこれらの症例を5年間にわたって追跡し, β -thromboglobulin が高値を示す例では5年以内に心筋梗塞または脳梗塞を生じやすいことを報告している。

また, 齊藤ら¹⁹⁾は, 血中における凝固系の活性化によって生ずるトロンビンと, その阻害物質であるアンチトロンビンIIIの複合体を測定し, それが, 健常者ならびに脳出血後遺症例に比べ, 脳梗塞後遺症の例で増加することを認めている。

このような血漿中の β -thromboglobulin やトロンビン・アンチトロンビンIII複合体の増加している例が今後血栓症を生じやすいとするならば, このような例に抗血栓薬を投与することは, より合理的, 経済的であるかも知れない。

いずれにしても, 老年者に対する抗血栓療法に際しての出血の副作用の頻度が特に高いという証拠については, 現在のところ決定的なものはない²⁰⁾が, 慎重な症例の選択が必要と思われる。

文 献

- 1) Sise HS, Moloney WC, Guttas CG: Studies on the anticoagulant phenindione. *Am Heart J* 53: 132-144, 1957.
- 2) Mant MJ, O'Brien BD, Thong KL: Hemorrhagic complications of heparin therapy. *Lancet* 1: 1133-1135, 1977.
- 3) 松田 保: 加齢, 老化と血液. *臨床血液* 28: 1085-1092, 1987.
- 4) Matsuda T, Murakami M: Relationship between fibrinogen and blood viscosity. *Thromb Res (suppl 2)*: 25-33, 1976.
- 5) Meade TW, Vickers MV, Thompson SG, Stirling Y, Haines AP, Miller GJ: Epidemiological characteristics of platelet aggregability. *Br Med J* 290: 428-432, 1985.
- 6) Kannel WB, Wolf PA, Castelli WP, D'Agostino RB: Fibrinogen and risk of cardiovascular disease: The Framingham Study. *JAMA* 258: 1183-1186, 1987.
- 7) Whisnant JP, Cartlidge NEF, Elveback LR: Carotid and vertebral-basilar transient ischaemic attacks: effect of anticoagulants, hypertension, and cardiac disorders on survival and stroke occurrence—a population study. *Ann Neurol* 3: 107-115, 1978.

- 8) Wintzen AR, de Jonge H, Loeliger EA, Bots GTAM: The risk of intracerebral hemorrhage during oral anticoagulant treatment: A population study. *Ann Neurol* 16 : 553—558, 1984.
- 9) Ramirez-Lassepas M, Quinones MR: Heparin therapy for stroke: Hemorrhagic complications and risk factors for intracerebral hemorrhage. *Neurology* 34 : 114—117, 1984.
- 10) 山之内博, 東饒英夫, 名倉博史, 深沢俊男, 松田保: 虚血性脳疾患例に対する抗凝固療法とアスピリン治療の予防的効果と合併症. *脳卒中* 3 : 387—394, 1981.
- 11) The Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group: Preliminary report: Findings from the aspirin component of the ongoing Physicians' Health Study. *N Engl J Med*. 318 : 262—264, 1988.
- 12) Livio M, Benigni A, Viganò G, Mecca G, Remuzzi G: Moderate doses of aspirin and risk of bleeding in renal failure. *Lancet* 1 : 414—416, 1986.
- 13) Barbui T, Buelli M, Cortelazzo S, Viero P, de Gaetano G: Aspirin and risk of bleeding in patients with thrombocythemia. *Am J Med* 83 : 265—268, 1987.
- 14) 松田 保: 抗血小板剤, 動脈硬化, 投稿中.
- 15) Morbidity and mortality, in Urokinase Pulmonary Empolism Trial, A National Cooperative Study. American Heart Association, monograph 39. *Circulation* 47 (suppl 2) : 66—72, 1973. (cited from Walker AM, Jick H: Predictors of bleeding during heparin therapy. *JAMA* 244 : 1209—1212, 1980.)
- 16) Poller L, McKernan A, Thomson JM, Elstein M, Hirsch PJ, Jones JB: Fixed minidose warfarin: A new approach to prophylaxis against venous thrombosis after major surgery. *Br. Med. J* 295 : 1309—1312, 1987.
- 17) del Zoppo GJ, Ferbert A, Otis S, Brückmann H, Hacke W, Zyffoff J, Harker LA, Zeumer H: Local intra-arterial fibrinolytic therapy in acute carotid territory stroke: A pilot study. *Stroke* 19 : 307—313, 1988.
- 18) 井藤英喜, 白木正孝, 中野忠澄, 中尾純子, 高橋龍太郎, 松田 保: 内分泌と早老症候群—特に糖尿病と早期老化について—. *日老医誌* 21 : 328—332, 1984.
- 19) 斉藤正典, 朝倉英策, 魚谷和佳, 定梶裕司, 熊走一郎, 松田 保: 慢性期脳血管障害例における血中トロンビン・アンチトロンビンIII複合体およびエラスターゼ・ α_1 -プロテアーゼインヒビター複合体の検討. *日老医誌* 25 : 430—431, 1988.
- 20) Levine MN, Hirsch J, Kelton JG: Hemorrhagic complications of antithrombotic therapy. In: *Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice*. Second edition. Colman RW, Hirsch J, Marder VJ, Salzman EW (ed), Lippincott, Philadelphia, 1982, 873—885.

Abstract

Antithrombotic Drugs

Tamotsu Matsuda

An increase in plasma fibrinogen content and a decrease in level of antithrombin III in plasma with ageing may cause a thrombotic tendency in the elderly, although the main cause of thrombosis in the aged is atherosclerotic change seen in these subjects. Coagulability of blood is maintained in the so-called therapeutic range in aged patients receiving oral anti-coagulant, as well as in younger subjects, however, it has been pointed out that there is an increasing risk of hemorrhage, especially of intracranial hemorrhage, with advancing age. Intracranial hemorrhage is not necessarily a rare complication of anti-platelet or thrombolytic therapy in the aged. Another hazard of aspirin therapy in the aged is the abrupt development of peptic ulcer. The authors administered 40 mg of aspirin per day to ten volunteers. In these subjects, platelets in the venous blood taken in a glass tube were strongly stimulated by coagulating whole blood in the tube for 60 minutes at 37°C. Under this condition, arachidonic acid in platelets was converted to thromboxane B₂, which is a stable metabolite of thromboxane A₂ that causes platelet aggregation and vasoconstriction to accelerate thrombus formation. After ingestion of the minidose aspirin for one week, the concentration of thromboxane B₂ in the serum (not in the plasma) of the volunteers decreased to

7% of the values determined before the administration of the drug, because of inhibition of cyclo-oxygenase in the platelets by aspirin. However, concentration of 6-keto-PGF_{1α}, which is a stable metabolite of prostacyclin that originates from arachidonic acid by cyclo-oxygenase in the vessel wall, did not markedly decrease after the treatment with aspirin. Leukocyte adhesiveness to glass beads also decreased in these subjects after the ingestion of aspirin, which may rheologically improve micro-circulation in some extent. From these results, it is suggested that mini-dose aspirin may be effective as an antithrombotic drug and solve the so-called aspirin dilemma. Efficacy and safety of fixed-dose Warfarin therapy (1 mg, daily) and thrombolytic therapy with newly developed agents, such as tissue-type plasminogen activator (t-PA), pro-urokinase (scu-PA), mutant of t-PA and hybrid of t-PA and scu-PA in the aged are discussed. If antithrombotic therapy is always safe in the aged, it may be rational and economical to select subjects predisposed to thrombosis among patients with atherosclerosis. Determination of levels of fibrinogen, β-thromboglobulin and/or thrombin-antithrombin III complex in plasma may be useful to predict thrombosis.

key words: *antithrombotic drug, aspirin dilemma, leukocyte adhesiveness, β-thromboglobulin, thrombin-antithrombin III complex*

(Jpn J Geriatr 26: 124—130, 1989)

Department of Internal Medicine (III), Kanazawa University School of Medicine

5. 老年者における降圧薬の薬物動態

桑島 巖 蔵本 築

＜要 約＞ 老年者における降圧薬の薬物動態を検討するために、腎機能、肝機能が正常な老年者および若年者高血圧患者において、アンジオテンシン変換酵素阻害薬（カプトプリル）、 Ca^{2+} 拮抗薬（ニフェジピン持効錠）、 α -遮断薬（ブナゾシン）および β -遮断薬（アロチノロール）の4種類の降圧薬を服用させ、1回経口投与後の血圧、脈拍変化とともに血中濃度について経時的に測定した。

降圧効果に関しては、カプトプリルは老年者、若年者ともほぼ同等の下降率をしめしたが、ニフェジピン、ブナゾシンでは老年者で降圧率が大きい傾向がみとめられた。アロチノロールでは両群とも有意な降圧を示さなかった。

薬物動態では、いずれの薬剤も老年者の最高血中濃度、曲線下面積とも若年者に比し、大きい傾向がみとめられた。

老年者におけるニフェジピン、ブナゾシン降圧効果の増大に血中濃度の増加が一部関与している可能性が示唆された。

しかし、カプトプリル、アロチノロールでは老年者で血中濃度が高いにも拘わらず、降圧効果は若年者とはほぼ同等であることから、血中濃度以外の要素が降圧効果に関与していることが示唆された。

Key words：降圧薬の薬物動態、カプトプリル、ニフェジピン、ブナゾシン、老年者高血圧

緒 言

近年、新しい機序を有する強力な降圧薬が次々と開発され、最近では難治性高血圧症や悪性高血圧症の症例をみることが非常に少なくなった。しかしこうした降圧薬の選択が広まった一方において副作用も多種多様となり、これらを患者の病態に応じて使い分ける必要がでてきた。特に肝、腎機能などは加齢により低下を示すために、老年者においては降圧薬の選択に当たってはその薬物動態を把握した上で用いることが肝要と思われる。我々は老年者における降圧薬の薬物動態と降圧効果の関係をみるため、現在用いられている主な降圧薬について、老年者の経口一回投与後の降圧効果および薬物動態を若年者との対比において検討した。

I. 対象と方法

腎および肝機能障害を有しない若年者および老年者の高血圧患者に対し、以下の降圧薬を経口的に服用させ、1, 2, 4, 6時間後に血圧および脈拍を測定し、

薬物血中濃度測定のための採血をおこなった。

① アンジオテンシン変換酵素阻害薬としてカプトプリル25mgを若年者4例（平均年齢 44.3 ± 7.2 歳）および老年者7例（ 79.1 ± 4.3 歳）に経口投与、血中濃度のほかに、アンジオテンシン変換酵素活性についても測定をおこなった。

② Ca^{2+} 拮抗薬としてニフェジピン（Retard）錠20mgを若年者5例（平均 45.2 ± 7.4 歳）、老年者6例（ 74.3 ± 4.3 歳）に経口投与した。

③ α_1 -遮断薬としてブナゾシン2mgを若年者4例（ 46.0 ± 6.7 歳）、老年者5例（ 73.0 ± 4.5 歳）に経口投与した。

④ β -遮断薬としてアロチノロール10mgを老年者（ 75.7 ± 6.9 歳）6例に投与した。

ただしニフェジピン錠服用後の採血は2, 4, 6および8時間において施行した。

成 績

① カプトプリル1回経口投与

カプトプリル25mg服用後、収縮期血圧は老年者、若年者とも有意な下降を示し、その下降率には両群間の差はなかった。拡張期血圧も両群とも有意に下降し、やはり下降率に両群間の差はなかった（図1）。脈拍は

図1 カプトプリル25mg 1回経口投与後の血圧変化

図2 カプトプリル25mg 経口投与後の血中濃度 (a) とアンジオテンシン変換酵素活性 (b) の変化

両群ととはほぼ不変であった。

血中濃度は1, 2, 4, 6時間後のいずれの時点においても老年者群で高い傾向をしめした。またアンジオテンシン変換酵素活性は老年者でより長時間抑制される傾向を示した (図2a, b)。

薬物動態指標では半減期 $T_{1/2}$, 最大血中濃度 C_{max} , 最高血中濃度到達時間 T_{max} には両群間で有意差はなかったが曲線下面積 AUC は若年者 $186.7 \pm 79.9 \text{ hr} \cdot \text{ng/ml}$ ($m \pm SD$), 老年者 335.4 ± 98.6 と老年者で有意に高値であった ($p < 0.05$)。

② ニフェジピン 1回経口投与

Ca^{2+} 拮抗薬の1つである、ニフェジピン錠20mg 1回投与後、血圧は両群とも収縮期、拡張期血圧いずれ

も服薬後約6時間にわたっての有意の下降をしめしたが、収縮期血圧の2時間後における下降率は老年者で若年者より有意に大であった ($p < 0.05$) (図3)。

ニフェジピン服用後の血中濃度の検討では、いずれの採血ポイントにおいても老年者で高い血中濃度をしめした (図4)。薬物動態指数では、 $T_{1/2}$ は若年者 $2.47 \pm 0.85 \text{ hr}$ ($m \pm SD$), 老年者 2.52 ± 0.51 , C_{max} は各々 134.0 ± 73.0 , $214.3 \pm 136.0 \text{ ng/ml}$, AUC は 725.1 ± 292.5 , $1258.9 \pm 668.7 \text{ hr} \cdot \text{ng/ml}$ で両群間に有意差は認められなかったもののいずれも老年者で高い傾向をみとめた。

③ プナゾシン 1回経口投与

α_1 -遮断薬であるプナゾシン2mg 経口投与後、収縮

図3 ニフェジピン錠20mg 1回経口投与後の血圧変化率

図4 ニフェジピン錠20mg 服用後の血中濃度の変化

図5 プナゾシン2mg 1回経口投与後の坐位血圧変化

期血圧は高齢者群、若年者群ともほぼ同様の低下を示したが、拡張期血圧において高齢者群で若年者に比し、より大きい下降率を示した(図5)。

服用後の血中濃度はやはり高齢者でより高値を示す傾向が認められ、AUCは若年者の $105.9 \pm 19.8 \text{ hr} \cdot \text{ng/ml}$ は高齢者の 65.3 ± 14.5 に比し有意に高値であった($p < 0.05$)。

④ アロチノール1回経口投与

β -遮断薬の1つであるアロチノール10mg 傾向投与後、血圧は両群とも有意な下降を示さなかった。し

かし、高齢者における血中濃度曲線は、会社資料による若年者の値に比し、いずれの時点においても高値をしめした(図6)。Cmaxは若年者 $136.9 \pm 10.1 \text{ ng/ml}$ 、高齢者 220.8 ng/ml で、高齢者で有意に高値であった($p < 0.05$)。

考 察

今回、我々は高齢者における降圧薬の薬物動態と降圧効果の関係について、4種類の降圧薬について検討したが、いずれの薬剤も最高血中濃度、AUCとも老年

図6 アロチノロール10mg 1回経口投与後の血中濃度の変化(破線は会社資料による)

者で大きい傾向が認められ、その急性降圧効果に関してはニフェジピン、ブナゾシンでは老年者でより大きく、カプトプリルでは老年者で血中濃度がより高いにも拘わらず若年者とはほぼ同等の下降度をしめた。

Robertson ら¹¹⁾はニフェジピン10mgを老年者および若年者に経口摂取させ、その薬物動態を検討し、やはり老年者の C_{max} 、AUC が若年者に比し有意に高値であったことから、老年者における薬剤の初回通過効果の減弱による血中濃度の増加と、圧受容体機能の減弱が老年者での降圧効果の増強となって現れるのであろうと推定している。

しかし、Scott ら²¹⁾はニフェジピン持効錠の薬物動態を、老年者と若年者と比較したところ、収縮期血圧の下降度はやはり老年者で大きかったが、 C_{max} は両年齢群間に差が無く、むしろ $T_{1/2}$ が老年者で有意に延長していることをみとめたことから、老年者では腸管からの吸収が低下しているためであるとしている。さらに老年者で降圧効果が大きかったことには、血中濃度では説明出来ず、血管拡張に対する反射が低下しているか、持効錠であるために、resetting が低いレベルでおこってしまった可能性を述べている。

今回我々が検討した4種類の薬剤はいずれも最高血

中濃度、曲線下面積が老年者の方が若年者よりも高い傾向がみとめられ、このことが老年者での降圧効果の増強の一因となった可能性もある。

近年、降圧機序の異なる新しい降圧薬が開発、実用化され、臨床家にとってその選択幅がひろまったが、Bühler ら³¹⁻⁵¹⁾はこれらの機序の異なった各種降圧薬も年齢によって使い分けが可能であるとの見解を示している。すなわち、 β 受容体機能が亢進し、血漿レニン活性も高値である若年者高血圧患者では、 β -遮断薬あるいはアンジオテンシン変換酵素阻害薬が好ましく、 α -交感神経による血管収縮の亢進やNa貯留傾向のある老年者では Ca^{2+} 拮抗薬または利尿降圧薬が第一選択薬として望ましいとしている。

また、Freis ら⁶¹⁾はVA studyの成績をreviewし、年齢を55歳で区切った場合、 β -遮断薬とアンジオテンシン変換酵素阻害薬は年齢間に降圧効果の差はみとめなかったが、サイアザイド系利尿降圧薬では老年者が若年者に比し、降圧効果がより大きかったことから、老年者におけるサイアザイド系利尿降圧薬の有用性を述べている。また、かれらは年齢を60歳で区切った場合には、 β -遮断薬は老年者で若年者に比し降圧効果が減弱したことを報告しており、Bühlerの見解を裏づける成績を示した。

蔵本ら⁷¹⁾は60歳以上の本態性高血圧患者353例に対し、カプトプリルの降圧効果を検討した結果、60歳代55.5%、70歳代59.0%、80歳代59.0%と老年者のいずれの年代においても良好な降圧が得られたことを報告している。またJenkins ら⁸¹⁾も65歳以上と65歳未満との間に降圧効果が同程度であったことを報告している。このように血漿レニン活性が低下傾向にある老年者においても、若年者とはほぼ同等の降圧効果がみられることには、老年者でのより高い血中濃度がレニン-アンジオテンシン系の低下を補っている可能性もある。

α_1 -遮断薬であるブナゾシンも老年者で拡張期血圧の下降度が若年者に比べ大きかったが、この傾向はブナゾシンの二重盲検試験の長期投与の成績でもみられており、年齢と収縮期血圧の降圧率との間には $R=0.267$ で有意の正相関がみられている。

このような α_1 -遮断薬の加齢にともなう降圧効果の増強に関する報告は少ないが、その原因として、1つは老年者では β 受容体機能が減弱しているため α -受容体機能が代償的に亢進しており、それを α -遮断薬によりブロックするため老年者で降圧がより強く現れ

る。あるいは血管拡張に対して、それに拮抗して血圧を維持しようとする baroreceptor 機能が減弱している、などが考えられる。Mc-Neil⁹⁾は α 、 β -遮断薬である labetalol の年齢別の薬物動態を検討し、30~40歳での bioavailability は30%であったのに比し、80歳では65%にも達していたことから老年者では肝臓での初回通過効果が減弱しているためであるとしている。また Kelly ら¹⁰⁾も同様な成績をしめし、老年者で labetalol のように肝代謝性の薬物を使用する際には、このような薬物動態の念頭において使用すべきことを主張している。

β -遮断薬に関しても、Bühler³⁴⁾がいうように加齢により降圧効果が減少するという報告がある一方で、bunitrolol での成績のごとく、必ずしも老年者での減弱を認めないという成績もある¹¹⁾。 β -遮断薬の降圧機序に関してはいまだ一定の結論が得られていないが、少なくとも一回経口投与では、降圧効果はみられず、急性効果と慢性効果とは同一には論じられないが、慢性効果においてはアンジオテンシン変換酵素阻害薬とおなじく、老年者における β -受容体機能の減弱を、血中濃度の増加で補っている可能性もある。しかしこの点に関しては未解決の点が多く、今後の検討が必要であらう。

文 献

- 1) Robertson DRC, Waller DG, Renwick AG, George CF: Age-related changes in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of nifedipine. *J Clin Pharmacol* 25 : 297—305, 1988.
- 2) Scott M, Castleden CM, Adam HK, Smith RP, Fitzsimons TJ: The effect of ageing on the disposition of nifedipine and atenolol. *Br J Clin Pharmacol* 25 : 289—296, 1988.
- 3) Bühler FR: Age and cardiovascular response adaptation: Determinants of an antihyperten-

sive treatment concept primarily based on beta blockers and calcium entry blockers. *Hypertension* 5 : III—94—III—100, 1983.

- 4) Bühler FR, Bolli P, Kiowski W, Erne P, Hulthén UL, Block LH: Renin profiling to select antihypertensive baseline drugs: Renin inhibitor for high renin and calcium entry blocker for low renin patients. *Amer J Med* 77(2A) : 36—42, 1984.
- 5) Kiowski W, Bühler FR, Fadayomi MO, Erne P, Mühler FB, Hulthén UL, Bolli P: Age, race, blood pressure and renin: Predictors for antihypertensive treatment with calcium antagonists. *Am J Cardiol* 56 : 81H—85H, 1985.
- 6) Freis ED, for the VA cooperative study group on antihypertensive agents: Age and antihypertensive drugs (Hydrochlorothiazide, bendroflumethiazide, nadolol and captopril). *Am J Cardiol* 61 : 117—121, 1988.
- 7) 蔵本 策, 熊原雄一, 荻原俊男: 老年者本態性高血圧に対するカプトプリルの有用性. *Geriatr Med* 26 : 1217—1228, 1988.
- 8) Jenkins AC, Knill JR, Dreslinski GR: Captopril in the treatment of the elderly hypertensive patients. *Arch Intern Med* 145 : 2029—2031, 1985.
- 9) McNeil JJ, Louis WJ: Clinical pharmacokinetics of labetalol. *Clin Pharmacokinet* 9 : 157—167, 1984.
- 10) Kelly JC, McGarry K, Omalley K, O'Brien ET: Bioavailability of labetalol increase with age. *Br J Clin Pharmacol* 14 : 304—305, 1982.
- 11) 蔵本 策, 池田正男, 荒川規矩男, 稲垣義明, 金子好宏, 増山善明, 山崎 昇, 土屋雅之: 老年者および壮年者本態性高血圧に対する β -遮断薬の有用性の比較. *日老医誌* 22 : 20—25, 1980.

Abstract

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antihypertensive Drugs in the Elderly

Iwao Kuwajima and Kizuku Kuramoto

In order to study pharmacokinetics and pharmacodynamics of antihypertensive drugs in the elderly, plasma concentration and blood pressure response to 4 antihypertensive drugs with different modes of action (captopril, nifedipine retard tablet, bunazosin, arotinolol) were measured in young and elderly hypertensive patients without liver or renal dysfunction after oral administration of each drug. Systolic and diastolic blood pressure fell after 25 mg of captopril in both groups and the rate of decrease in each group was similar. Plasma concentration of captopril at 1 and 2 hours after administration in the elderly group tended to be higher than in the young group. Suppression of angiotensin-converting enzyme activity persisted longer in the elderly group than in the young group. The area under the curve (AUC) of captopril in the elderly group (335.4 ± 98.6 hr $\cdot$ 2ng/ml) was significantly greater than in the young group (186.7 ± 79.9) ($p < 0.005$), while no significant differences in Cmax, Tmax and T1/2 were observed. The percent decrease in systolic blood pressure in the elderly group ($25.2 \pm 10.2\%$) after 1 hour of nifedipine tablet (20 mg) was significantly higher than in

the young group ($16.6 \pm 1.5\%$) ($p < 0.05$). Cmax and AUC of nifedipine in the elderly tended to be higher than in the young group (303.5 v.s. 210.0 ng/ml and 1258.9 v.s. 725.1 hr $\cdot$ ng/ml, $p < 0.1$, respectively). The percent decrease of diastolic blood pressure after 2 mg of bunazosin was also significantly higher in the elderly group than in the young group ($p < 0.05$). The AUC of bunazosin in the elderly group (105.9 ± 19.8 hr $\cdot$ ng/hr) was significantly greater than in the young group (65.3 ± 14.5). No significant change of blood pressure was observed after 10 mg of arotinolol in both groups, while Cmax in the elderly group (220.8 ± 52.7) was significantly higher than in the young group (136.9 ± 10.1) ($p < 0.05$). In conclusion, higher plasma concentration of nifedipine tablet and bunazosin may contribute to greater antihypertensive effect in the elderly group. However, the higher plasma concentration in the elderly group could not explain the similar antihypertensive response after captopril and arotinolol in two groups.

key words: *pharmacokinetics of antihypertensive drugs, angiotensin converting enzyme, captopril, Ca²⁺ antagonist, nifedipine, α_1 -blocker, bunazosin, elderly hypertension*

(Jpn J Geriatr 26: 131—136, 1989)

Department of Cardiology, Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital

6. 高齢者における抗菌化学療法剤の体内動態

山本 俊幸 鈴木 幹三 山本 和英 足立 暁

＜要 約＞ 高齢者における適切な抗菌化学療法剤の投与方法を知る目的で、各種化学療法剤（ベータ・ラクタム5剤、マクロライド、アミノ配糖体各1剤、新キノロン2剤）の体内動態を投与方法別に検討し、日本化学療法学会で検討された健康成人の成績と比較し、以下の結果を得た。

- 1) 高齢者のクレアチニン・クリアランス値は加齢とともに有意（ $p<0.02$ ）に低下していた。
- 2) いずれの投与方法においても、潜在性腎機能障害を反映する成績であり、加齢とともに血中半減期の延長、血中濃度時間曲線下面積の増大がみられた。
- 3) 低体重の高齢者への静脈内投与時には、投与量、投与間隔の面で配慮が必要と考えられた。
- 4) 経口投与時の腸管吸収は一定の傾向はみられなかった。
- 5) 尿中移行は健康成人に比しいずれも低率であった。
- 6) 特に、非経口投与時には単位体重当たりの投与量の設定が必要と考えられた。

Key words：抗菌化学療法剤，薬動力学，高齢者

I. 緒 言

高齢者に化学療法を行う場合、高齢者における感染症の特殊性、病原微生物の問題、薬剤の体内動態、即ち吸収、分布、排泄、代謝について、化学療法効果を妨げる宿主側の諸要因、副作用などは、若年者と異なり注意すべき点が多い¹⁾。

高齢者は低体重で、基礎疾患、合併症を複数で持つものが多く、感染症そのものが難治になり易く、十分な臨床効果が得られない場合がある。さらに、化学療法剤の静脈内投与が困難な場合もあり、筋肉内投与および経口投与時の体内動態についても理解しておく必要がある。

また、多くの化学療法剤は腎排泄型であり、高齢者の持つ潜在性腎機能の低下は、薬剤の体内動態に大きな影響を与えるものと考えられる。

本稿では、抗生物質のみでなく、合成抗菌剤を含めた化学療法剤の体内動態、特に血中濃度推移及び尿中移行から、その問題点について、当院で観察した成績を中心に述べる。

II. 方 法

1. 検討薬剤

表 1 検討した化学療法剤

	投与量	投与経路
ベータ・ラクタム剤		
Cefotiam(CTM)	1g	静注
Ceftriaxone(CTRX)	1g	点滴
Ceftizoxime(CZX)	500mg	坐剤
Cefpodoxime proxetil(CPDx-PR)	200mg	経口(食後)
Carumonam(CRMN)	500mg	静注、筋注
マクロライド剤		
Clarithromycin(CAM)	200mg	経口(食前)
アミノ配糖体財		
Amikacin(AMK)	4mg/kg	筋注
新キノロン剤		
Ofloxacin(OFLX)	200mg	経口(食後)
Lomefloxacin(LFLX)	200mg	経口(食後)

体内動態を検討した化学療法剤ならびに投与量、投与経路を表1に示す。ベータ・ラクタム系5剤(セフォチアム、セフトリアキソン、セフトゾキシム、セフトキシム・プロクセチル、カルモナム)、マクロライド系1剤(クラリスロマイシン)、アミノ配糖体系1剤(アミカシン)、新キノロン系2剤(オフロキサシン、ロメフロキサシン)の計9薬剤である。

2. 測定方法

アミカシンについては酵素イムノアッセイ法、クラリスロマイシンはディスク法により測定したが、他の薬剤はすべて高速液体クロマトグラフィ法で測定した。

T. Yamamoto, K. Suzuki, K. Yamamoto, S. Adachi：名古屋市厚生院内科

III. 成 績

1. 観察症例の腎機能

体内動態を観察した高齢者は血清尿素窒素値、血清クレアチニン値が正常範囲内の症例を選んでであるが、年齢とクレアチニン・クリアランス（以下 Ccr と略す）の関係をみると、加齢とともに Ccr が低下している（図 1）。

2. 静脈内投与時の体内動態

1) セフォチアム

セフォチアム（以下 CTM と略す）1g 静注時の血中

図 1 クレアチニン・クリアランスと年齢との関係

濃度推移について、平均年齢83歳、平均体重36.6kg、平均 Ccr 47ml/min の高齢者18例と健康成人14例とで比較し、これを、各年代別にみると、成人に比して、70代、80代、90代、いずれの年代においても、その濃度曲線は高値を示し、6時間後においても2.4~9.5、平均5.8μg/ml の濃度を維持していた。また、その傾向は加齢に伴い、より顕著であった（図 2）。

薬動力学的係数の比較では、何れも高齢者群で有意の最高血中濃度（以下 Cmax と略す）、血中半減期（以下 t_{1/2} と略す）の延長および血中濃度時間曲線下面積（以下 AUC と略す）の増加を示していた（表 2）。

さらに、年齢と t_{1/2} ならびに年齢と AUC の間にはい

図 2 Cefotiam 1g 静注時の血中濃度推移（*新薬シンボジウム）

表 2 静注、点滴静注および筋注時の体内動態

			平均年齢 (歳)	C max (μg/ml)	T1/2 (hr)	AUC (μg・hr/ml)	尿中移行
静注	CTM 1.0g	高齢者	83	123	1.85	202	—
		成人*	37	58	0.95	82	—
点滴静注	CTRX 1.0g	高齢者	76	166	13.9	4334	46.3% (72hrs)
		成人*	—	156	7.0	1027	50.1% (48hrs)
	CRMN 0.5g	高齢者	80	48.1	1.9	118	61.0% (6hrs)
		成人*	—	31.4	2.1	57.2	72.1% (6hrs)
筋注	CRMN 0.5g	高齢者	80	34.9	3.8	233	57.1% (6hrs)
		成人*	—	28.1	1.7	89	63.2% (6hrs)
	AMK	高齢者 4mg/kg	75	10.7	3.9	70.5	93.7% (24hrs)
		成人** 200mg	—	10.0	2.2	33.7	61.2% (6hrs)

*新薬シンボジウム **Chemotherapy 誌

表 3 経口および坐剤投与時の体内動態

			平均年齢 (歳)	C max ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	T1/2 (hr)	AUC ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{ml}$)	尿中移行
経口	CPDX-PR 200mg 食 後	高齢者	83	3.29	3.3	41.1	25.6% (24hrs)
		成人	33	3.00	1.6	20.6	51.5% (24hrs)
	CAM 200mg 食 前	高齢者	72	3.72	4.2	19.2	29.5% (12hrs)
		成人*	—	0.97	3.6	7.2	39.4% (12hrs)
	OFLX 200mg 食 後	高齢者	80	5.86	10.3	89.7	52.1% (24hrs)
		成人*	—	1.75	4.2	15.4	92.0% (24hrs)
口	LFLX 200mg 食 後	高齢者	78	4.00	8.9	39.7	64.7% (24hrs)
		成人*	—	1.57	8.3	12.6	74.2% (24hrs)
坐 剤	CZX-S 500mg	高齢者	73	1.16	3.02	5.90	2.15% (6hrs)
		成人**	38	4.16	1.14	9.68	17.2% (8hrs)

*新薬シンポジウム **CZX 坐剤資料概要

図 3 Ceftriaxone 1g 点滴静注時の血中濃度推移
(*新薬シンポジウム)

ずれも有意の正の相関を示していた。しかし、年齢と体重には明らかな相関は認めなかった²⁾。

2) セフトリアキソン

高齢者 3 例(平均年齢76歳, 平均体重31kg, 平均 Ccr 43ml/min)にセフトリアキソン(以下 CTRX と略す) 1g 点滴静注時の血中濃度推移を平均値で成人例と比較すると, Cmax はほぼ同程度であったが, t_{1/2}は約 2 倍に延長し, AUC は約 3 倍に増加していた(図 3, 表 2)。また, 高齢者においては72時間後にも数 $\mu\text{g}/\text{ml}$ の濃度が維持されていた。

尿中移行は成人の48時間50.1%に対し, 高齢者では72時間で46.3%と低率であった³⁾。

3) カルモナム

高齢者 3 例(平均年齢80歳, 平均体重30kg, 平均 Ccr 45.5ml/min)にカルモナム(以下 CRMN と略す) 500 mg 点滴静注時の血中濃度推移の成人例との比較では, Cmax は高齢者でやや高く, t_{1/2}はほぼ同程度で, AUC は 2 倍に増大していた。

尿中移行は 6 時間で成人72.1%, 高齢者61%と大きな差はなかった(表 2)⁴⁾。

3. 筋肉内投与時の体内動態

1) カルモナム

高齢者 3 例(平均年齢80歳, 平均体重30kg, 平均 Ccr 45.5ml/min)に CRMN 500mg 筋注時の血中濃度推移の成人例との比較では, 高齢者において Cmax は 1.2倍, t_{1/2}は2.2倍, AUC は2.6倍の成績であった。

6 時間までの尿中移行は成人で63.2%, 高齢者で 57.1%と大きな差はみられなかった(表 2)⁴⁾。

2) アミカシン

高齢者 5 例(平均年齢75歳, 平均体重40kg, 平均 Ccr 52.5ml/min)にアミカシン(以下 AMK と略す)4mg/kg 筋注時の血中濃度推移と200mg 投与の成人例との比較では, Cmax は差がなかったが, t_{1/2}および AUC は高齢者においてそれぞれ1.8倍, 2.1倍と延長あるいは増大していた(表 2)。

4. 経口投与時の体内動態

1) セフポドキシム・プロクセチル

新しいエステル型の経口セフェム剤セフポドキシム・プロクセチル (以下 CPDX-PR と略す) 200mg の高齢者 3 例 (平均年齢 82 歳, 平均体重 31kg) での食後投与時の血中濃度推移は, 個体差が著しく, かなりのバラツキがみられた。健康成人との比較では, Cmax はほぼ同程度であったが, 高齢者において $t_{1/2}$ は 2 倍に延長, AUC は 2 倍に増大していた。

また, 尿中移行は健康成人で 51.5% (24 時間) であったのにたいし, 高齢者では 25.6% (24 時間) と低率であった (表 3)⁵⁾。

2) クラリスロマイシン

新しいマクロライド剤であるクラリスロマイシン (以下 CAM と略す) 200mg を高齢者 3 例 (平均年齢 72.2 歳, 平均体重 31.7kg, 平均 Ccr 60.6ml/min) に 200mg を空腹時に経口投与したときの血中濃度推移は個体間に軽度のバラツキを認めた。健康成人との比較では $t_{1/2}$ は僅かに延長し, Cmax は 4.5 倍, AUC は 2.7 倍の高値をとっていた。

また, 12 時間までの尿中移行は成人の 47.5% に対し 29.5% と低値であった (表 3)⁶⁾。

3) オフロキサシン

新キノロン剤であるオフロキサシン (以下 OFLX と略す) 200mg を高齢者 4 例 (平均年齢 80 歳, 平均体重 33.7kg, 平均 Ccr 35.6ml/min) に食後経口投与したときの血中濃度推移は高濃度群 2 例と低濃度群 2 例にわかれた。健康成人との比較では, Cmax は 3.3 倍, $t_{1/2}$ は 2.6 倍, AUC は 5.8 倍であった。

24 時間までの尿中移行は成人で 92% にたいし 52.1% とかなり低率であった (表 3)⁷⁾。

4) ロメフロキサシン

新キノロン剤であるロメフロキサシン (以下 LFLX と略す) 200mg を高齢者 3 例 (平均年齢 78 歳, 平均体重 37kg, 平均 Ccr 44.2ml/min) に食後投与したときの血中濃度推移の健康成人との比較では Cmax は 2.5 倍, AUC は 3.2 倍の高値であったが, $t_{1/2}$ はほぼ同程度であった。

24 時間までの尿中移行は成人で 74.2% にたいし 64.7% とやや低率であった (表 3)⁸⁾。

5. 坐剤投与時の体内動態

1) セフチゾキシム

セフチゾキシム坐剤 (以下 CZX-S と略す) 500mg を高齢者 4 例 (平均年齢 73 歳, 平均体重 30kg, 平均 Ccr 33.2ml/min) に経肛門投与時の血中濃度推移は健康

成人に比し明らかに低値を示し, Cmax は約 1/3, AUC は約 1/2 であったが, $t_{1/2}$ は 2.7 倍に延長していた。

また, 尿中移行は成人の 17.2% にたいし 2.15% と著しく低率であったが, 尿中濃度では 6 時間目まで 40~90 μ g/ml の濃度を維持していた (表 3)⁹⁾。

IV. 考 察

基礎疾患, 合併症をもつ易感染宿主である高齢者の感染症にたいする化学療法は, 感染臓器の掌握, 原因菌の決定および感受性, 化学療法剤の体内動態, 副作用などを勘案して選択されるべきであることは当然のことである。

しかし, 既に述べたごとく高齢者は低体重で, その上, 全身循環動態, 肝・腎機能に障害を持つことが多く, 薬剤の投与量, 投与方法, 投与期間等への配慮が必要である。特に, 高齢者の持つ潜在性腎機能の低下を念頭において治療されることが重要である。

静脈内投与時の成績についてみると, 比較的個体差は少なく, CTRX における Cmax および CRMN における $t_{1/2}$ には差をみなかったが, 概ね高齢者において Cmax は高く, $t_{1/2}$ は延長し, AUC は増大していた。しかし, その程度は各薬剤間で一定の傾向はなく, 尿中移行はいずれも高齢者で低率であり, 単位体重当たりの投与量および潜在性腎機能障害による結果と考えられた。

また, CTM の血中濃度の年代別比較においても加齢に従い Cmax, $t_{1/2}$, AUC の高値あるいは延長があきらかであった。このことは, Ccr が加齢により低下することと相関する成績と考えられる。

近年, セフォテタン, セフピラミド, CTRX など $t_{1/2}$ の長い抗生剤が開発されてきた。高齢者においては $t_{1/2}$ が更に延長することが予想される。私達の CTRX の成績でも成人の約 2 倍の 13.9 時間を示し, 本剤が成人では 1 回 1g 1 日 1~2 回が標準の投与回数とされているが, 低体重の高齢者では, 隔日投与で十分効果が期待できることを示唆する成績であった。

筋注 2 剤についてはともに Cmax に差を認めなかったが, $t_{1/2}$ および AUC は高齢者で約 2 倍の延長あるいは増大を認め, 尿中移行は高齢者で低率であった。

とくに, CRMN の点滴静注時と筋注時との比較 (クロス・オーバー) をすると, 筋注時で Cmax はやや低く, $t_{1/2}$, AUC は約 2 倍に延長あるいは増大していた。このことは, 高齢者が低体重であり, 単位体重当たりの投与量が成人の約 2 倍であったことを考慮すると,

高齢者に於ける筋注局所での吸収性はやや低下し、 $t_{1/2}$ とAUCは全身循環動態や潜在性腎機能低下の影響を反映した成績と考えられた。

経口投与時の成績では、CmaxはCPDX-PR以外は2倍以上の高値を示し、 $t_{1/2}$ はCAM, LFLXでは著しい差を認めなかったが、CPDX-PR, OFLXでは約2倍の延長を示し、AUCはいずれもかなりの増大を認めた。また、尿中移行はすべて高齢者で低率であった。とくに、CAMにおけるCmaxの増大は単位体重当たりの投与量が多かったこととともに、高齢者における胃液の低酸傾向により、本剤の酸安定性が増加し、腸管吸収が増大したためと考えられる。

OFLXにおいて、その血中濃度が高濃度群と低濃度群に分かれたが、各症例の背景因子に差はみられず、その理由は不明であった。

これらの事は既に述べたごとく、薬剤の吸収、単位体重当たりの投与量及び潜在性腎機能障害等が複雑に絡み合った結果と考えられた。

最後に坐剤については、小児において坐剤による薬物の投与は広く使用され、高齢者においても消炎鎮痛剤、抗癌剤などはよく用いられているが、抗菌剤ではほとんど使われていない。小児用のCZX坐剤の開発にともない、高齢者において検討したところ、血中濃度推移は健康成人に比して明らかに低値であり、AUCも低値を示したが、 $t_{1/2}$ は約3倍の延長がみられた。尿中移行についても同様に、高齢者で明らかに低値であった。しかし、尿中濃度では500mg 1回投与後6時間目まで40~90 μ g/mlの濃度を示しており、中等症以下の尿路感染症に対しての適応が示唆される成績であった。

以上、我々が検討した抗菌化学療法剤の体内動態に関しては、高齢者の持つ潜在性腎機能障害を反映する成績であり、加齢にともない、 $t_{1/2}$ の延長、AUCの増大する結果を得た。従って、高齢者とくに低体重の患者に対しての静脈内投与に際しては、投与量、投与間隔の面で配慮が必要であると考ええる。しかし、経口剤で

は健康成人との間に腸管吸収の面では一定の傾向はみられず、また、直腸からの吸収は低率であった。

アミノ配糖体系抗生物質の場合、腎障害患者にたいする薬用量は設定されており、小児においても小児薬用量は定められている。従って、高齢者においても高齢者薬用量という考え方が確立されるべきであると考ええる。

文 献

- 1) 木谷健一：高齢者の薬理学、その基礎と臨床、老人科診療 3：161—163, 1982.
- 2) Kishimoto A, Suzuki K, Yamamoto T, Kato M, Takeuchi T: Pharmacokinetics of cefotiam in the elderly. Recent Advances in Chemotherapy, Antimicrobial Section 1, University of Tokyo press, Tokyo, 1985, p648—649.
- 3) 山本和英, 足立 暁, 鈴木幹三, 山本俊幸：Ceftriaxoneの高齢者における基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 36：480, 1988.
- 4) 山本和英, 足立 暁, 鈴木幹三, 山本俊幸：Carumonamの高齢者における体内動態と臨床的検討。Chemotherapy 35：264, 1987.
- 5) 鈴木幹三, 山本和英, 足立 暁, 山本俊幸：CS-807 (Cefpodoxime proxetil)の基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 36(S-1)：492—501, 1988.
- 6) 足立 暁, 山本和英, 鈴木幹三, 山本俊幸：TE-031 (Clarithromycin)の高齢者における基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 36(S-3)：660—666, 1988.
- 7) 足立 暁, 山本和英, 鈴木幹三, 山本俊幸：Ofloxacinの高齢者における基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 36：267, 1988.
- 8) 鈴木幹三, 山本和英, 足立 暁, 山本俊幸：NY-198 (Lomefloxacin)の基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 36(S-2)：639—646, 1988.
- 9) 鈴木幹三, 岸本明比古, 山本和英, 足立 暁, 山本俊幸：Ceftizoxime坐剤(CZX-S)の基礎的・臨床的検討。Chemotherapy 34：1004—1010, 1986.

Abstract

Pharmacokinetics of Antimicrobial Agents in the Elderly

Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Kazuhide Yamamoto and Satoru Adachi

The elderly can be easily infected by certain organisms due to underlying diseases and complications. The pharmacokinetics of cefotiam, ceftriaxone, ceftizoxime, cefpodoxime proxetil, carumonam, clarithromycin, amikacin, ofloxacin and lomefloxacin in the elderly should be considered when choosing antibiotics for elderly patient with regard to infected site, causative organisms, pharmacokinetics and side effects. Phar-

macokinetics in the elderly reflect potential renal dysfunction, so that $t_{1/2}$ was elongated and AUC increased with age. Intravenous administration in the elderly, especially in the subjects with low body weight, the administered dose and intervals must be considered. With oral administration there was no constant tendency of the intestinal absorption.

key words: *antimicrobial agents, pharmacokinetics, elderly*

(Jpn J Geriat **26**: 137—142, 1989)

Internal Medicine, Nagoyashi Kosein Geriatric Hospital

7. 高齢者における消炎鎮痛剤

水島 裕

＜要 約＞ 消炎鎮痛剤にどのような副作用があり、高齢者ではどのような問題点があるかを述べた。高齢者に副作用が出やすい一般的な理由のうち、重要なものは薬物代謝の変化である。とくに半減期の長い薬剤は、代謝異常を受けやすく、高齢者では注意して使用することが大切である。また、高齢者では抱合よりも酸化が低下するので、酸化などの代謝を経て排泄される薬剤も高齢者に使用するときには注意が必要である。さらに、高齢者に対する消炎鎮痛剤投与の注意を詳細にわたって解説した。

Key words：高齢者，消炎鎮痛剤，非ステロイド抗炎症剤，副作用

緒 言

消炎鎮痛剤は決して副作用の少ない薬剤ではなく、とくに高齢者へ投与する場合は、それぞれの薬物の性質、副作用、薬物動態をよく知り、投与しなければならない。以下、消炎鎮痛剤の副作用、とくに高齢者に多発するもの、どのような薬剤が代謝その他の点で高齢者に問題があるか、高齢者に消炎鎮痛剤の副作用が出やすい理由は何か、実際の臨床で消炎鎮痛剤を投与する場合、どのような注意が必要か等について述べる。

1. 消炎鎮痛剤の副作用と高齢者

消炎鎮痛剤の副作用として問題になるのは、胃腸障害、腎障害、肝障害、アレルギー等であるが、高齢者では一般に副作用が多い。表1に消炎鎮痛剤の副作用の種類を挙げ、また表2になぜ高齢者に副作用が出やすいかを示した。

まず、高齢者では潜在的なものも含め、臓器障害が多い。それゆえ、副作用が出やすくなる。また、この臓器障害は後述の薬物代謝にも影響を及ぼす。高齢者は予備力がなく、一度臓器障害等の副作用が出ると、それが急速に進む。外界適応が悪く、若年者では副作用が出なくとも高齢者では副作用が出る場合がある。薬物代謝については後述するが、高齢者では体重の約30%が脂肪組織であると言われる。それゆえ、水溶性薬剤の場合は、実質的に体重が減り、kgあたりで薬剤を投与すると血中濃度が上昇する。逆に、脂溶性の薬剤は、血中濃度が低下する場合がある。高齢者の compliance は決して悪いわけではない。しかし、一部、健

表1 消炎鎮痛剤の副作用

1. 消化器	悪心、嘔吐、胃痛、胃重、口内炎、逆行性食道炎、腸潰瘍、下痢、劇症腸炎、膵炎
2. 腎・泌尿器	腎機能障害、浮腫、乳頭壊死、腎炎
3. 肝	transaminitis、肝炎
4. 心・血管	高血圧、血管炎、虚血性心疾患の悪化、動脈管の早期閉塞
5. 呼吸器	アスピリン喘息、急性肺水腫、間質性肺炎、肺結核の活性化
6. 中枢神経	無菌性髄膜炎、視神経炎などの眼障害、難聴、筋攣縮、頭痛、目まい、うつ、躁、健忘症などの精神障害
7. 皮膚	多形滲出性紅斑、光線過敏症、種々の型の薬疹
8. 骨・筋肉	ふっ素沈着症、無菌性骨壊死
9. 血液	再生不良性貧血、赤血球癆、血小板機能抑制（出血）、血小板減少、好中球減少、自己免疫性溶血性貧血
10. 全身性	アナフィラキシー、発熱、薬剤誘発性ループス、リンパ腺腫、感染症の誘発

表2 高齢者に副作用が出やすい理由

1. 臓器障害（潜在的も含む）がある
2. 余備力がなく、副作用が急速に進む
3. 外界適応が悪い
4. 薬物代謝が低下する
5. 脂肪沈着で、薬物分布が異なる
6. コンプライアンスが悪い事がある
7. 合併症・併用薬剤がある
8. 自覚症状が出にくい

忘症、痴呆症などの老人は、むしろまちがって過剰服用することがあるので注意が必要である。高齢者では一般に合併症が多く、そのため併用薬剤も多い。既によく知られていることであるが、併用薬剤の数により、薬剤の副作用の頻度があがる。とくに、消炎鎮痛剤との併用が問題とされている薬剤がある場合には注意が

必要である¹⁾。最後に、老年者では反応が鈍く、例えば感染症などがあっても自覚症状が出にくいことがあり、また白血球増多なども起こらないことがあるので注意が必要である。

以上の副作用が出やすい理由は、消炎鎮痛剤の副作用についても当てはまる。最近、新聞紙上を賑わしたような消炎鎮痛剤の副作用も、主として老年者に起きたものである²⁾。

2. 薬物代謝と老年者

上に述べた、老年者に副作用が出やすい理由のうち、最も重要なもののひとつは、薬物代謝が老年者では低下することである。薬物代謝は、肝、腎で行われるが、腎からの排泄がとくに重要である。また、消炎剤には腎障害があり、血圧上昇、浮腫、腎機能障害などが起こるので、腎への影響はさらに大切となる。消炎鎮痛剤は大きく分けると、半減期の短いもの、長いものがある。半減期の短い薬剤の場合は、多少の薬物代謝の低下はあまり強い影響を及ぼさないが、半減期の長い薬剤は、老年者と若年者との差が明らかとなる。例えば、ベノキサプロフェンの半減期は長く、老年者、若年者でその差が著しいが、最近開発されている480156-Sの消炎鎮痛剤も老年者と若年者で血中濃度の推移が異なり、老年者では半減期が著しく増す³⁾。一方、半減期が長くともテノキシカムのような薬剤は、腎からの排泄が容易なためか、老年者、若年者でその血中濃度の推移があまり変わらない⁴⁾。しかし、いずれにせよ、老年者に消炎鎮痛剤を投与するときは、半減期の短いものを投与することを原則としたほうがよい。

次に、もう少し薬物代謝を突っこんで考えてみよう。表3に示したが、消炎鎮痛剤の排泄のパターンは4つに大きく分けられる⁵⁾。腎から未変化体が多く排泄されるものは、とくに老年者では腎障害が起こりうる。その理由は、老年者では腎PGの役割が高いためである。一方、グルクロン酸抱合は老年者でも比較的十分行われるので、ケトプロフェンのような薬剤は老年者、若年者で、その血中濃度の推移が変わらないことが認められている。このように、代謝が簡単であり、未変化体の、つまり活性型の、腎からの排泄の少ない薬剤が老年者には適している。

3. 老年者に対する消炎鎮痛剤投与の注意

老年者では腎障害に限らず、胃腸障害などの副作用

表3 NSAIDの排泄のパターン

	老年者の場合	例
1. Unchanged	腎障害おこり得る	Oxyphenbutazone
2. Metabolised	血中濃度上昇・持続	Diclofenac Na Piroxicam
3. Conjugated	特に影響ない	Ketoprofen
4. 2+3	2と同じ	Indomethacin

表4 老年者に対する非ステロイド剤（消炎鎮痛剤）投与の注意

1. 非ステロイド剤がはたして適応か否か十分検討し、不必要な投与は避ける。
2. 長期使用にあたっては、時々、はたして有効であるか、自覚的副作用がないかをよくチェックする。
3. 半減期の長い非ステロイド剤の投与は避ける。
4. プロピオン酸、スリンダック（クリノリル）など腎PGへの影響の少ない薬剤をなるべく投与する。
5. 投与量は常用量の2/3から1/2の少なめから始め、必要に応じて漸増する。
6. 肝・腎機能を前もって十分検査をし、投与量、投与の是非を決める。なお、投与中にはしばしば腎・肝機能を中心に臨床検査を行う。
7. 合併症、併用薬剤（薬物相互作用があるので）に十分注意する。
8. 特に健忘症などを合併した老人について、間違えて過剰服用しないように注意をする。

も若年者に比べ、明らかに投与しやすくなる⁶⁾。それゆえ、半減期の長い薬剤、腎集中性のもの、あるいは代謝として酸化などが必要な薬剤をなるべく避けると同様、胃腸障害を起こしやすいものも老年者にはなるべく投与しないことが必要である。

以上、消炎鎮痛剤の副作用と老年者における代謝、老年者の副作用が出やすい理由などを総合し、老年者に対し消炎鎮痛剤を投与する場合の注意は何であるかを表4に示した。とくに、副作用の出やすい薬剤については、若年者に比べ、投与前、あるいは投与中頻回にわたり臨床検査を行い、また、自覚症状が出にくいことも良く考え、副作用の早期発見に十分注意すべきである。

おわりに

以上、消炎鎮痛剤を老年者に投与する場合には、多くの注意が必要である。老年者に消炎鎮痛剤を投与し、副作用が出た場合をあとで振り返ってみると、これらの配慮が足りなかったことが多い。消炎鎮痛剤の副作用は、決して少ないものではなく、とくに老年者では

重篤なものが出やすいので、十分注意をして使うことが大切である。

文 献

- 1) 水島 裕, 柏崎禎夫: 抗炎症剤の選び方・使い方, 第2版, 医学書院, 東京, 1986.
- 2) 水島 裕: 非ステロイド抗炎症剤療法の進歩, 日本医事新報 3163: 3—11, 1984.
- 3) 小林真一, 小口勝司, 内田英二, 他: 老人における480156-Sの体内動態, 臨床薬理 18: 667—672,

1987.

- 4) 小林真一, 大庭忠弘, 小口勝司, 他: 健康成人および老人における Tenoxicam の薬物動態, 臨床薬理 15: 399—405, 1984.
- 5) Kendall M, Roden S: NSAIDs. Therapaeia, November, 1983, 19—21.
- 6) Author unknown: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and serious gastrointestinal adverse reactions-1. Brt J Med 292: 614, 1986.

Abstract

Nonsteroid Anti-Inflammatory Drugs in Elderly Patients

Y. Mizushima

Incidence of side effects of nonsteroid anti-inflammatory drugs is greater in elderly patients. The author describes the reason why these drugs cause frequent and serious side effects. Particularly important is the difference between elderly and young patients in terms of metabolism and excretion of nonsteroid anti-inflam-

matory drugs. In general, nonsteroid anti-inflammatory drugs with a long half-life should not be given to elderly patients. The author also describes guidelines for non-steroid anti-inflammatory drugs treatment in elderly patients.

key words: *elderly patient, anti-inflammatory analgesic, nonsteroid anti-inflammatory drugs, side effects* (Jpn J Geriat 26: 143—145, 1989)

First Department of Internal Medicine, St. Marianna University School of Medicine