第40回日本老年医学会学術集会記録
〈シンポジウムⅡ：高齢者の薬物療法〉

司会のことば

荻原 俊男* 中野 重行**

高齢社会を迎え、治療を必要とする疾患を有する患者は益々増加の傾向にある。高齢者は多病性という特徴があり、当然のことながら使用する薬剤数が増えてくる。多剤投与による薬剤相互作用の問題や、薬剤起因性疾患は老年症候群のなかで重要な一角を占めるものとなっている。高齢患者の治療に当たっては生理的および病的な老化を含めた加齢現象を背景とした身体諸機能の変化に伴う薬物動態、薬力学の特徴を理解し、QOL (quality of life)、コンプライアンスの面からも高齢者における個々の病態に配慮したきめ細かい治療方針をたてる必要がある。また、老人医療は保健診療の上になりたっており、めまぐるしく変化しつつある老人医療制度の面からも高齢者の治療法を考える必要がある。本シンポジウムではこれら高齢者の薬物療法に関する最近の進歩、問題点について論ずるべく企画されたものである。

高齢者は薬物反応に敏感で、副作用頻度も高い。この重要な原因の一つは腎機能や肝機能の生理的变化に伴う機能低下によるクリアランスの低下であり、さらに老化による薬力学的変化が加わるものと考えられる。高齢者の治療にあたっては薬物動態理論に基づく治療計画と、治療薬物のモニタリングによる投与計画の再調整が重要で、これらをいかに実際の老年医療に取り入れていくかが今後の課題である。

コンプライアンスについては、高齢者では一般に良好であるが、多剤投与による服薬の勘違いや、飲み忘れの問題が生じる場合が少なくない。従って高齢者ではなる

べく処方単純化、少量化に努めるべきであり、介護者の協力要請など、全人的医療の立場に立った、チーム医療が今後益々重要となることが本シンポジウムでも強調されている。

多剤投与時の副作用発現も高齢者の治療上重要な問題である。多剤併用の重積により、副作用は増え、予想もしない新しい副作用も起こる可能性すらある。さらにこれらが患者のQOLを悪化させることにつながる。薬剤師から医師に対する副作用の「生きた情報」の提供はこの副作用回避に重要であり、より適正な薬品情報構築と能動的提供法の確立が求められており、本シンポジウムでも具体的な取り組みが紹介された。

多剤投与による薬物有害作用は薬剤起因性老年症候群とも呼ばれている。多剤投与は高齢者の多病性という特徴に起因するが、高齢者の薬物有害作用を減少させるためには、患者の総合的機能評価による薬の優先順位を考え、より効果的なものから治療計画を立てるべきである。またこのような高齢者薬物療法に関する老年医学の教育体制の整備の必要性が本シンポジウムでも提唱された。

高齢者の薬物療法で最も重要なことは限られた余命をいかに有意義に過ごせるかを考慮したQOLの保持、改善である。薬物療法に伴う副作用はQOLを低下させる。従って可能な限りQOLの影響が評価された薬物で処方計画をたてることが望ましい。高齢者においては、残された生活の「量」と「質」とのバランスを考慮して診療、ケアにあたる必要がある。

*Toshio Ogihara：大阪大学医学部加齢医学

**Shigeyuki Nakano：大分医科大学臨床薬理学