第42回日本老年医学会学術集会記録

〈シンポジウムⅣ：寝たきり予防とリハビリテーションの進歩〉

司会のことば

田中 信行¹⁾ 岩谷 力²⁾

今回のシンポジウムでは「寝たきり」の最大の原因となる脳卒中と痴呆、骨折について、それぞれのエキスパートに語っていただいた。

脳卒中については石神先生は早期リハの重要性について、JCSで一桁、バイタルサインが安定し、麻痺進行がなければ2～3日目からベッドサイドリハ開始すべきことを強調された。その後はクリティカルパスに従って、座位保持機能、阻害因子、FIMなどを考慮して到達ゴールを予測しつつ進めることが重要とされ、会場からの賛意も大きかった。

川平先生は、従来の診療報酬に定められている1日45分の訓練時間では脳卒中後の下肢筋力、またより高位の分離運動の十分な回復はえられないことを示した。すなわち1日200～300回の立ち上がり訓練や、300～400回のPNFにもとづく下肢訓練（集中訓練）が筋力や下肢随意性を大きく改善するデーターを提示した。今後その機序について、筋肥大および脳の可塑性からの研究が期待される。

中村先生は高齢者やAlzheimer痴呆患者の転倒機序を、特殊な足台あるいは背景動揺装置（Equi test）、および歩行中に記憶課題を負荷するDual-taskを用いて検

討された。その結果年齢の進行と共に、また転倒の経験者でこれらの立ち直り反応が著明に低下することを示し、深部覚、視覚、迷路、そして中枢における統合、運動遠心路の意義を強調し、Dual-taskのリハ応用可能性も示唆された。

関先生は種々の統計や老人医療センターの多数の症例を解析し、大腿骨頸部骨折が年間 男約2万人、女約7万人、計約9万人も発生しており、それは80～90歳代の高齢者の増加によるものと推測された。また、術後の早期離床、早期リハが寝たきり防止には最も重要で、骨折の治療には保存的療法より十分な管理下での積極的手術を推奨された。受傷後の歩行能力は低下することが多く、痴呆はその増悪因子であり、1年後の生命予後は治療後の歩行能力に依存する。早期の手術とリハビリテーションにより1996年には平行棒内立位～歩行時期は術後9～14日であったが、現在は術後3～6日には離床、立位、歩行訓練を開始し良い結果を得ていると結論された。

以上を通して、脳卒中も骨折も、早期の、そして十分な量のリハを転倒に注意して進めるという原則が確認され、有意義なシンポジウムであった。

1) Nobuyuki Tanaka：鹿児島大学医学部リハビリテーション科

2) Tsutomu Iwaya：東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学