《会長講演》

脳 と 老 化

相 澤 豊 三*

はじめに

誰でもが長生きをし、しかも生きている間は生き甲斐のある生活をし、死ぬるときは苦しみもなく老木がおのずから朽ち果てて枯れるように静かに倒れ逝く、いわば自然死でありたいことを願わない人はないであろうし、それがまた人生そのものに対する生き方の問題にもつらなるものといえる。生命現象を自然科学的に研究するのが医学という学問とするならば、生物体の基礎物質や、その現象をただ自然認識の立場から研究するだけではなく、その研究分野は疾病の治療・予防から健康の保持・増進を目的とする領域にまで及ぶはずである。不老不死というわけにはゆかない現在、人はいかに生をして生たらしめるか、またいかに死をして死たらしめるかが問題となるのであり、つまるところ生理的定年を延長して有為の高年者が増えることによって世の福祉が一層高まるように工夫が払われなければならないことになる。かくして老年病学の占める役割が、最近とみに重要となってきたのはけだし当然の帰結といわざるをえない。これはいうまでもなく、基礎医学、社会科学の裏づけを得て発展すべき性質のものではあるが、その性格上、まずはとりあえず各科臨床領域における知識と技術とを絶えず総合して、中・高年者の最善診療に役立ててゆく具体的な面に歩を進めてゆかざるまいと思う。さて、老いて死にいたるまでの過程現象を老化とするならば、それは程度の差こそあれすべての人に現われ、かつ全身的に起こってくるものである。形態学的には実質組織の萎縮と間質組織の絶対的または相対的増加というべきであろう。

神経系ことに脳においても、それは例外ではなく、年令増加とともにまずその重量を減じて萎縮を示す。老化に伴う脳の形態学的変化として、そのほか神経細胞数の減少およびその変性などがあげられ、さらに生化学的に

は水分と固形成分との割合、脂質・アミノ酸・蛋白・酵素・核酸・酸性粘液多糖類等の推移が重視されていることはご承知のとおりである。一方、脳における血管老化の問題は加齢の研究の中で、とくに臨床的意義の大きい重要な問題であり、老化は狭義には、その生理的变化を意味するものと解釈されているが、血管のように生理的老化と動脈硬化性変化とが密接に関連している部分では、それらを含めて広義の老化として、まとめてゆかざるをえないのではないかと考える。したがって私のこれからのべる脳と老化という問題については、臨床家としての立場から、脳循環系に基盤をおいて血管壁因子、体液性因子および血行動態因子に問題をしばって話を進めてゆくわけである。

表 1. 年代別脳循環諸量

年 令	例数	平均年令	脳血流量	脳血管抵抗	脳 O ₂ 消費量
29才以下	48	23	61.2	1.61	3.52
30 ～ 39	44	34	56.1	1.69	3.40
40 ～ 49	18	44	53.5	1.76	3.34
50 ～ 59	19	54	50.7	1.94	3.18
60才以上	19	64	51.7	1.93	3.04

図 1. 年令と脳血流量との相関

*T. Aizawa : 慶応大学名誉教授・立川共済病院長。

表 2. 内頸動脈硬化度と脳循環諸量

硬化群	例数	平均年齢	脳血流量	平均血圧	脳血管抵抗	脳O ₂ 消費量
I	18	41.2	52.6±6.2	107.9	2.08±0.37	3.42±0.69
II	32	57.6	44.0±5.5	115.1	2.65±0.49	2.83±0.81
III	19	59.5	42.1±7.7	123.3	3.10±1.11	2.61±0.78

表 3. 内頸動脈の脂質

	総コレステロール*	トリグリセライド*	エステル型コレステロール**
20 才 以下	16.8	3.3	25.3
21才〜40才	17.9	3.3	37.1
41才〜60才	20.0	3.4	33.3
61 才 以上	25.5	3.0	33.5
粥状硬化巣	36.8	2.0	42.6

*総脂質に対する% **総コレステロールに対する%

表 4. 血清脂質と脳循環代謝諸量

	血清コレステロール		血清中性脂肪		血清磷脂質	
	200mg/dl 以上	199mg/dl 以下	100mg/dl 以上	99mg/dl 以下	200mg/dl 以上	199mg/dl 以下
年 令	55	53	54	54	53	54
脳 血 流 量 cc/100g brain/min	47.6±8.0	48.9±6.4	45.9±7.7	51.7±8.7	49.0±6.7	48.4±9.6
平 均 動 脈 血 圧 mmHg	114±19	113±17	113±20	113±14	117±19	111±16
脳 血 管 抵 抗 mmHg/cc/100g brain/min	2.46±0.62	2.38±0.56	2.53±0.60	2.26±0.50	2.43±0.53	2.38±0.58
脳 酸 素 消 費 量 cc/100g brain/min	3.22±0.81	3.30±0.65	3.06±0.67	3.52±0.63	3.22±0.65	3.30±0.78

脳循環の年令変化

この問題は老年になって、頭の働きが鈍くなってくることを俗に頭の血のめぐりが悪くなったといっているが、それはたして医学的根拠があるのか、脳循環の変化は老化現象の一つの原因になっているのか、という老化の根本問題に科学的根拠を与えるものである。

表1、図1は脳循環の年令変化を観察したもので、人は年を経るにしたがって、脳を通る血液の流れを妨げるすべての因子の総和であるところの脳血管抵抗は上昇を示し、脳血流量は減少し、脳動静脈血酸素較差は増大の傾向をとって脳酸素消費量を正常に保持せんとつとめるのであるが、50 才以上の老年期になると、脳血流からさらに多くの酸素を摂取することが不可能になり、脳酸素消費量も明らかな減少を示すにいたる。このことは中年以降では循環性因子が年令変化の一因であることを示唆するものであるが、このような壮・老年期における緩徐な脳循環減少は真の老化にもとづくものかどうかの問題に関係してくるものである。これはすでにいささかふれた老化定義の問題にもからんでくるわけであるが、老化を純粹に生理的現象として動脈硬化その他いっさいの

病的因子を除外したものと考えer場合には、Sokoloff らの成績が参考になる。すなわち、脳動脈硬化その他あらゆる老人性疾患を注意深く完全に除外したまったくの健康老人では、脳血流・代謝にも、健康青年とほとんど変化がないというのである。もしそれに従うならば、脳血流量および脳酸素消費量の減少は、年令増加とともに減少するけれども、これは生理的老化現象によるというべきではなく、むしろ成熟現象あるいは潜在性 sub-clinical な動脈硬化が加わった老化現象であるということになる。いずれにしても、こうなると、話は生理的のものから病的の面に移行せねばならなくなり、ここに動脈硬化の問題を無視するわけにはゆかなくなってくる。

動脈硬化と脳循環

表2は、動脈硬化と脳循環との関係を示したものである。脳血管の形態的变化をもっとも端的に表現しうる脳血管写によって、脳血管とくに内頸動脈の硬化度をその強さが増すにつれて I II III とし、これと脳循環との関係をみたのであるが、内頸動脈の硬化が強度となるにしたがって、脳血流量の減少が著明となっていることが如実

表 5. 血清中性脂肪と脳循環（年代別変化）

	49 才 以 下		50 才 以 上	
	高中性脂肪群	正常中性脂肪群	高中性脂肪群	正常中性脂肪群
年 令	41	41	59	60
脳 血 流 量 cc/100g brain/min	47.2±3.6	52.4±9.2	45.5±7.8	51.3±9.2
平 均 動 脈 血 圧 mmHg	117±22	107±14	111±19	116±14
脳 血 管 抵 抗 mmHg/cc/100g brain/min	2.50±0.55	2.10±0.42	2.54±0.50	2.33±0.52
脳 酸 素 消 費 量 cc/100g brain/min	3.09±0.47	3.73±0.86	3.05±0.73	3.39±0.63

図 2. 加齢と血清脂質濃度

に現わされている。

内頸動脈の脂質分析

表 3 は、さらに内頸動脈の脂質分析を示したものであるが、表の示すごとく、加齢とともに血管壁コレステロールは増加するが、加齢によるトリグリセライドの蓄積は明らかではない。エステル型コレステロールも同様な傾向をとっている。粥状硬化巣では、コレステロールことにエステル型のものが著しく増加するが、トリグリセライドはむしろ相対的減少を示している。これらの所見

は加齢による動脈硬化の様相を著しく増加させていることを物語っているものであり、血流障害要因の主たる役割を占めるものがそれであることを示している。このような病変は、さらに細動脈硬化の病態解釈にも及んでいると考えられている現在、動脈硬化という存在はいよいよ容易ならぬものである感を深くする。すなわち、動脈の生理的加齢と動脈硬化症とは高血圧性血管変化と相まって、相互に関係してヒトの血管変化を規定していると考えられるが、さらに動脈硬化と脂質代謝異常との関係に注目することとしよう。

動脈硬化と脂質代謝

最近、血清コレステロールに次いで血清中性脂肪の態度が脳血管疾患時においても問題となってきた。表 4 は、脳循環諸量が脳動脈硬化により影響されるとの立場から、脳循環と血清脂質諸量との関係を検討したものである。血清脂質の中で、脳循環諸量との関連性が認められたのは血清中性脂肪のみであり、脳血流量および脳酸素消費量と血清中性脂肪値との間には負の相関が示され、血清中性脂肪 100 mg/dl 以上の高中性脂肪群の脳血流量および脳酸素消費量は、血清中性脂肪 99 mg/dl 未満の正常中性脂肪群の脳血流量および脳酸素消費量に対して推計学的に有意の減少を示すことが明らかにされた。表 5 は、血清中性脂肪と脳循環の年代別変化を示したものである。

また図 2 は、加齢と血清脂質濃度との関連をコレステロール、トリグリセライドにおいて観察したものである。コレステロールについては 40~50 才以後において増加を示しているが、女子では少数例のため十分その姿をとることができない。

トリグリセライドでは 60 才以後においてその減量が

目だっている。

終わりに

脳と老化の問題にとりくむべく、私および共同研究者の業績をもって、これにたち向かったわけであるが、結局は老化による病態を脳の血行動態中心としての部分的観察結果に終わってしまった。老化の本態については、それを広い意味に解しても、わずかにその外濠にかじりついたにすぎなかったことを反省せずにはいられない。初めにのべたように、老年学の目的は有意義な人生をいかに長くするかにあって、あわよくば不老不死の夢を追っているのかもしれない。ヒトは脳というものが、すべての臓器の中でもっとも大切であるといえ、脳独点のないいかたになるので、全身的にくまなく血管をはりめぐらせて、全身体を適切に機能させている血管生物であるといったほうが無難であるといえよう。かくてヒトは

血管とともに老いるといい、血管の老いが不老長寿の道を立ちふさいでいる大きな壁であると考えられている。いうまでもなく、このような病変だけが唯一のものではないにせよ、他の多くの因子についての解決が可能となり、不老不死の夢がもし実現したとしたらヒトは一体どうなることであろうか。もしそうなった場合には、ヒトは子供を生むことを必要としなくなるであろうし、また期限を切って専心、物事に努力する必要もなくなってしまおう。久遠の宇宙にヒトがとけ込んでしまえば、ヒトは生物という生の字を失い、ヒトとしての特性をもなくしてしまうであろう。

老化の究明という外濠さえも埋めることのできない現況の中にあって、それに近づこうとし、あがいている姿をこの会長演説でお目に掛けてしまったが、これは只今申しのべたような夢まばろしにまどわされて、心のゆるみに気がつかなかったためかもしれない。

* * * * *