二三の觀賞植物の遺傳

特に常變因子による花靑素條斑に就て*

神 名 勉 聰
東京帝國大學農學部植物學教室

目 次

緒 言

第一章 ホウセンクゝの遺傳

第一節 花 型

第二節 花 色

A. 單色花の行動

- I. 紅色莖同志の交配實驗
- II. 紅色莖對綠色莖の交配實驗
- III. 白色花に關する交配實驗
- IV. 極淡色花に關する交配實驗
- V. 距色の遺傳

B. 條斑花の行動

- I. 條斑花の純型
- II. 條斑花の後裔吟味
- III. 條斑花の後裔に現はるゝ異常花に關する考察
- IV. 芽條變異及びその性狀
- V. 條斑花の遺傳

第三節 白 斑

第四節 「缺け」

第五節 白 子

第六節 石 化

第七節 結 尾

第二章 オシロイバナの遺傳

緒 言

第一節 實驗材料

第二節 芽條變異とその自精成績

- I. 白色條斑型に就て
- II. 黃色條斑型に就て

第三節 白色條斑型對黃色條斑型の交配 實驗成績

第四節 條斑色に關する因子の性狀

第五節 條斑量に關する因子の性狀

第六節 條斑色と條斑量との關係

第七節 白色及び黃色個體の出現に就て

第八節 芽條變異に關する考察

第九節 結 尾

第三章 ケイトウの遺傳

緒 言

第一節 實驗材料

第二節 高 さ

第三節 穗 色

第四節 條斑性

- I. 自精成績
- II. 交配實驗成績

第五節 結 尾

第四章 常變因子に關する一般的考察

緒 言

第一節 常變因子の性能

第二節 轉化の方向

第三節 轉化頻度

第四節 轉化時機

第五節 轉化に及ぼす諸因子

第六節 轉化部位

第七節 條斑花の地色

引用文 獻 圖 版 解 說

緒 言

ホウセンクゝ・オシロイバナ・ケイトウは、我が國に於ける最も普通の花卉園藝植物なり。ホウセンクゝは花型・花色に種々の變異を有するに拘らず、遺傳學的研究の對照となれるは一二の例に過ぎず。オシロイバナ及びケイトウも亦共に條斑性に富むを以て屢々遺傳學者の注意を喚起せしも、前者は外國にのみその業績を見、而かも總て稍々舊時代の事に屬せり。而して後者に就ての研究は近時日本にのみ限られて數度の興味

* KANNA, Benso, The Genetics of Some Ornamental Plants, with Special Reference to Anthocyanin Variegation. (to be continued.)

ある報告に接せり。

著者は 1923 年先づハウセンク^ツの研究に着手し、之が因子分析を試み、更にその連鎖(linkage)関係の一端を窺へり。該植物の豊富なる條斑種を有する點より、續いて之が探究に入り、オシロイバナ・ケイトウによる條斑性の研究と相俟つて、茲に常變因子の性能に関し一般的考察を試みんことを企てたり。

本研究は茲に報ぜんとする處を以て完璧を得たるものとは稱し難きも、過去十二年間の實驗結果は、先人の貴重なる業績を借りて、大體該方面の事情を探明し得たりと信ずるを以て從來試みたる數次の報告を整理し、更に其の後に得たる成績を加へて一括して茲に之を報告せんとす。

本研究を遂行するに當りては恩師三宅驥一教授並に今井喜孝博士によりて、終始懇篤なる指導を受けたるものなり。茲に記して深甚なる謝意を表す。

第一章 ハウセンク^ツの遺傳

1923 年内外の種苗商より集めたるハウセンク^ツ *Impatiens Balsamina* L. の諸系統を以て着手したる研究結果の一部は既に報告する所ありたり。之等既報の成績に、その後得たる結果を補足し、茲にハウセンク^ツに関する總括的報告をなさんとす(神名 1926, 1927, 1933)。

ハウセンク^ツは庭園に栽培されて觀賞される最も普通の一年生草本にして、花型・花色に關して多くの變異を有せり。RASMUSON(1920)は、夙に之が報告を試みたれども、草丈・花色・花型に關する極めて簡單なる報文にして數字的根據を缺けり。萩原博士(1926)は八重咲・花色並に花色素條斑性に就て報ずる所ありたり。吾人のハウセンク^ツに就きての知識は、之等先覺諸家の業績によりて啓蒙される處ありしと雖も、著者の得たる成績は必ずしも常に之等と一致せざりき。

第一節 花 型

ハウセンク^ツの花型としては次の四型を基本となす。

- I. 普通咲 翼瓣の發達不完全(挿畫第 1 圖, 第 I 圖版第 17 及び第 22 圖)なるものにして、外見極めて貧弱の觀を呈す。
- II. 長翼咲 兩側の翼瓣の完全なる發達を遂けたるものなり(第 I 圖版第 1 乃至第 16 圖及び第 18 圖乃至第 21 圖)。
- III. 八重咲 八重咲は petalody(第 I 圖版第 1 圖及び第 5 圖)並に petalomany(挿畫第 2 圖, 第 I 圖版第 8 圖・第 17 圖・第 18 圖及び第 22 圖)に依るものなれども、兩者の區別は往々困難を感ず。更に之等各型は發育期及び環境の影響によりて表現狀態に少か

らざる變異あり。

IV. 椿咲 通常一株の總ての花が八重咲にして、莖頂には完全若しくは完全に近き petalomany に屬する peloric の八重花を有す（挿畫第3圖、第I圖版第6圖・第7圖及び第21圖）。この peloric double は、八重咲の椿の花を想起せしむるに依りこの名を得たり。環境により頂上花は往々不完全なる八重咲となり、或は葉と花瓣との分界不充分となれり（挿畫第4圖）。本種は全植物體の幾分剛壯の觀を呈するを特徴とす。

1. 長翼咲

普通咲及び長翼咲は自精により夫々純殖せり。之等二型の交配によりて得

第1圖 普通咲

たる F_1 は普通咲にして、長翼花の劣性形質なることを示せり。

その F_2 に於ては、第1表に掲げたる成績を得たり。

第1表 長翼咲×普通咲の F_2 成績

交配番號	普通咲	長翼咲	合 計
1	109	32	141
2	11	6	17
3	34	6	40
4	15	7	22
合 計	169	51	220
理 論 數	165	55	220

兩形質は單性雜種比を以て分離せしこと明瞭なり。更に F_2 植物11本を採つて F_3 吟味を行ひしが、第2表に示す如き成績を得たり。

第2圖 八重咲

第 3 圖 椿 咲

第 2 表 長翼咲×普通咲交配 (1) の F_2 成績

F_2 の 性 状	系 統 数	普 通 咲	長 翼 咲	合 計
普 通 咲	2	103	—	103
	7	98	28	126
長 翼 咲	2	—	46	46

こゝに於て長翼咲に對する因子を *wg*(winged) の記號を以て現はすことゝなす。

2. 八 重 咲

八重咲中の一型たる *petalomany* は完全不稔なりし爲に實驗に供し難かりき。*petalody* にも亦強性のものと弱性のものとありて、大體自殖に依りて夫々の型に純殖せるを知れり。更に之を一重咲に交配したるに、何れも劣性形質なりき。今強性八重對一重の交配によりて得たる一重咲 F_1 植物を自精せしめしに、その F_2 に於て第 3 表

の如き成績を得たり。

第 4 圖 椿咲の花

第 3 表 一重咲×強性八重咲に於ける F_2 成績

交 配 番 號	一 重 咲	八 重 咲 (*)	合 計
1	55	17	72
2	66	23	89
3	36	10	46
4	67	20	87
5	157	48	205
6	26	15	41
7	15	8	23
8	20	9	29
9	35	18	53
10	78	18	96
11	15	6	21
12	30	8	38
合 理 論 計 數	600	200	800
	600	200	800

(*) 多少弱性八重咲を混入したる強性八重咲

上表の合計に於ては、よく單性雜種分離の豫期數に一致せしも、各交配に於ては八重咲の分離比に可成り著しき高低を示せり。よつて各交配より若干宛を選びて F_3 を吟味したるに第 4 表の如き成績を得たり。

第4表 一重咲×強性八重に於ける F_3 成績

交配番號	F_2 の性状	系 統 數	一 重 咲	八 重 咲	合 計	八重咲の分離率
1	一 重	{ 4	139	—	139	0.0%
	八 重	{ 4	61	33	94	35.1
	一 重	4	4	95	99	96.0
• 2	一 重	{ 11	311	—	311	0.0
	八 重	{ 13	233	62	295	21.0
	一 重	3	—	35	35	100.0
3	一 重	{ 2	56	—	56	0.0
	八 重	{ 5	101	63	164	38.4
	一 重	2	—	42	42	100.0
4	一 重	{ 18	464	—	464	0.0
	八 重	{ 1	3	15	18	83.3
	一 重	{ 25	411	132	543	24.3
5	一 重	3	5	68	73	93.2
	八 重	{ 6	115	—	115	0.0
	一 重	{ 1	10	42	52	80.0
• 6	八 重	{ 13	237	61	298	20.5
	一 重	8	23	254	277	91.7
	八 重	5	6	63	69	9.0
• 7	一 重	{ 4	89	—	89	0.0
	八 重	{ 7	84	23	107	21.5
	一 重	5	6	63	69	91.3
• 8	一 重	{ 6	190	—	190	0.0
	八 重	{ 7	107	38	145	26.2
	一 重	4	12	100	112	98.3
• 9	一 重	{ 1	27	—	27	0.0
	八 重	{ 2	21	6	27	22.2
	一 重	2	61	—	61	0.0
• 10	八 重	{ 4	61	19	80	38.8
	一 重	8	11	121	132	27.7
	八 重	{ 22	364	—	364	0.0
11	一 重	{ 17	301	111	412	26.9
	八 重	3	7	41	48	85.4
	一 重	{ 6	127	—	127	0.0
• 12	八 重	{ 7	131	35	166	21.1
	一 重	2	—	53	53	100.0
	八 重	{ 2	32	—	32	0.0
12	一 重	{ 3	63	16	79	20.3
	八 重	1	2	20	22	90.9

第4表に於て・印を施せるものは、 F_2 に於て八重咲を分離すること25%以上に及びたるものなり。而して夫等以外のものは總て25%以下なり。即ち八重咲分離率に現はれたる高低の變異は、何等因子的説明を與へ得るものに非ざること明かなり。

更に又當然 F_3 にて純殖を豫期されたる八重咲が屢々多少の一重咲を混生すること、及び F_2 にて一重咲のものが F_3 にて八重咲を分離せること80%を超えたるもの

あり。

之等は一見不可解の感を抱かしむれども、次の如く説明することを得べし。即ち八重咲は環境に支配さるゝこと大にして、時にその表現能力を失ひて完全なる一重咲の表型を以て終ることあり。従つてこの種の八重咲が一重咲として記帳さるゝこと屢となるべし。

強性八重咲の外に弱性八重咲も亦實驗に供せられたり。かゝる弱性八重と一重との交配にて、その F_2 に於て分離する八重咲の大部分は親の型に近き弱性なりき。尙その分離比は、豫期より低きが常なり。之前記の理由に基くものにして、殊に發育の末期に八重咲の一重咲に化するは最も普通の現象なるを認めたり。尙 F_2 に於ける實驗數は第5表の如し。

第 5 表 一重咲×弱性八重咲に於ける F_2 成績

交 配 番 號	一 重 咲	八 重 咲	合 計	八 重 咲 の 分 離 率
1	68	13	81	16.0%
2	14	3	17	17.7
3	33	3	36	8.3
4	77	6	83	7.2
5	36	7	43	16.3
合 計	228	32	260	12.3

是等の中、四交配に就きて F_3 を吟味し得たる成績は第6表に示すが如し。

第 6 表 一重咲×弱性八重咲に於ける F_3 成績

交 配 番 號	F_2 の 性 狀	系 統 數	一 重 咲	八 重 咲	合 計	八 重 咲 の 分 離 率
1	一 重	12	207	—	207	0.0%
	八 重	11	255	52	307	16.9
		2	20	7	27	25.9
2	一 重	5	52	—	52	0.0
	八 重	2	8	22	30	73.3
		3	47	13	60	21.7
3	一 重	1	11	11	22	50.0
	八 重	5	54	—	54	0.0
		3	50	7	57	12.3
4	一 重	1	37	15	52	28.8
	八 重	4	46	—	46	0.0
		1	12	31	43	72.1
	一 重	1	41	8	49	16.3
	八 重	1	9	4	13	30.8

本表の成績に於ても、八重咲分離率の高低の大體系統的に非ざることを明示せるが、特に八重の不純殖状態は一層顯著なるものあり。又注意すべきは、一重型中、固定系統数の分離系統数を凌駕せることなり。更に錯亂せる分離成績を現せる他の二交配を示せば第7表の如し。

第7表 弱性八重咲對一重咲の異常分離成績

交 配	F ₁	F ₂ の分離	吟味系統數	F ₃ の 分 離			
				一 重 咲	八 重 咲	合 計	八重咲分離率
一重×八重	一 重	{ 13 一重	{ 7 2	88	—	88	0.0%
				52	3	55	5.5
		{ 26 八重	{ 2 6	—	22	22	100.0
八重×八重	八 重	{ 7 一重	{ 4 5	51	15	66	22.7
				131	17	148	11.5
		{ 15 八重		99	26	125	20.8

以上掲げたる諸成績を通覽するに、一重咲對八重咲の分離狀況は外見的には複雑を極むるものと云ふべし。然れども少くも本研究に於て取扱ひたる ホウセンクゝの八重咲は次の如く解説せらるべし。

(1) 八重咲は一重咲に對し單なる劣性形質にして、之が allelomorphs を *Pt*, *pt* (petaloid) とすれば、*Pt* は常に環境に支配されその表現不確實なり。故に一重との雜婚の後裔に於ては、八重の分離比は一定ならず。

(2) 本研究に扱ひたる八重咲は、その程度に特に強きものと極めて弱きものとあり。後者に於ては一株の花は總て全く一重咲なるにも拘らず、只一花中一個の萼にのみ僅かに petalody に依る一小片を有する程度の極端なるものをも混す。従つて(1)の事情の下に弱性八重系は偽一重咲となるべき機會特に多し。これ一重との交配 F_3 に於て、或は一重咲 F_2 植物が八重咲に純殖し、或は固定系統數が分離系統數を超える等の異常現象を惹起したる這般の消息を語るものに外ならず。

(3) 三宅・今井兩博士(1927)は *Papaver somaniferum* の研究に於て、優性八重型と劣性八重型の二種あるを指摘し、更に少くも一對の八重性を阻止する modifiers の存在を明かにせり。ホウセンクゝに於ても、強弱兩型の存する事は、單に彷徨變異のみによつて説明し去り得べきものにあらず(第4表成績並に第6表成績の比較)。こゝに於ても、petalody の程度を左右する形容因子の存在が許容さるべきならん。

3. 椿 咲

椿咲を自精すれば、八重咲の場合に類し、系統に依りその表現力に微弱なるものあ

りしも、大體に於て椿咲に純殖せり。殊に椿咲の程度の高きはその純殖度も亦高し。

強性椿咲と強性八重咲とを交配したる結果は F_1 にて八重咲となり、 F_2 にては 41 八重咲・12 椿咲となりて單性雜種比を示せり。尙 F_2 植物中、5 本の八重咲と 3 本の椿咲とを採つて F_3 吟味を行ひ、第 8 表に示すが如き結果を得たり。

第 8 表 強性八重咲對強性椿咲に於ける F_2 成績

F_2 の 性 狀	系 統 數	八 重 咲	椿 咲	合 計
八 重 咲	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 3 \end{array} \right.$	25 31	— 10	25 41
椿 咲	3	—	98	98

次に一重咲に椿咲を交配したるに F_1 は總て一重咲にして、その F_2 に於ては第 9 表に示す如く兩性雜種の分離を行へり。

第 9 表 一重咲×椿咲に於ける F_2 成績

交 配 番 號	一 重 咲	八 重 咲	椿 咲	合 計
1	18	4	6	28
2	63	6	10	79
3	54	3	14	71
4	25	4	4	33
合 理 論 計 數	160 118.69	17 39.56	34 52.75	211 211

椿咲に對して ca (Camellia) 因子を想定すれば、この交配は ca 及び pt の兩性雜種となるべし。従つて F_1 因子構成は $Pt\ Ca \times pt\ ca = Pt\ pt\ Ca\ ca$ となるべく、この兩性ヘテロ接合体なる F_1 より當然豫期さるべき F_2 は次の如し。

$$\begin{aligned}
 &1\ PtPt\ Ca\ Ca + 2Ptpt\ Ca\ Ca + 2Pt\ Pt\ Ca\ ca + 4Pt\ pt\ Ca\ ca \dots\dots 9 \quad \text{一重咲} \\
 &1\ pt\ pt\ Ca\ Ca + 2pt\ pt\ Ca\ ca \dots\dots\dots 3 \quad \text{八重咲} \\
 &1\ Pt\ Pt\ ca\ ca + 2Pt\ pt\ ca\ ca + 1pt\ pt\ ca\ ca \dots\dots\dots 4 \quad \text{椿 咲}
 \end{aligned}$$

第 9 表の分離比は、この豫期數に對し些か速きに過ぐるの感あれども、前述の如き八重性表現の不確性がこゝにも禍ひしたるものと解せらるべし。而してこの事情を認容すれば、第 10 表に掲げたる F_3 成績もよく期待に添ひ得たるものと認め得べし。

4. 各花型相互の關係

八重咲又は椿咲を一重咲に配して得たる成績中、長翼型に關する分離を併發せる

第10表 一重咲對強性椿咲に於ける F_3 成績

交配番號	F_2 の性狀	系統數	一重咲	八重咲	椿咲	合計
1	一重咲	4	174	—	—	174
		7	245	—	58	303
		4	204	58	—	262
		11	154	42	59	255
	八重咲	4	—	68	—	68
		6	—	219	61	280
2	椿咲	2	—	—	125	125
		2	105	—	—	105
		3	55	—	17	72
		4	66	15	—	81
	一重	6	100	23	54	177
		2	—	26	—	26
3	八重	4	—	97	27	124
		6	—	—	85	85
		4	175	—	—	175
		7	213	—	62	275
	一重咲	5	182	59	—	241
		20	454	118	145	717
4	八重咲	3	—	97	—	97
		7	2	128	57	187
		3	—	—	174	174
		2	50	—	—	50
	一重咲	5	102	—	30	132
		5	80	24	—	104
5	椿咲	5	154	46	56	256
		3	—	82	23	105
	八重咲	4	—	—	102	102

ものあり。即ち交配 (60) 及び (42) に於けるが如し。前者は普通型一重咲×長翼型八重咲にして、 F_1 は普通型一重咲となり、 F_2 にては 9 普通型一重咲・2 普通型八重咲・5 長翼型一重咲・1 長翼型八重咲の分離を示せり。實驗數寡少なれども大體兩性雜種の分離と認むべく、從つて交配 (60) は $WgPt \times wgpt$ なりしこと明かなり。後者は普通型一重咲×長翼型椿咲にして、普通型一重咲の F_1 の自精により第11表の如き成績を挙げ得たり。

第11表 交配 (42) の F_2 成績

	普通型 一重咲	普通型* 八重咲	普通型 椿咲	長翼型 一重咲	長翼型* 八重咲	長翼型 椿咲	合計
實驗數	49	4	8	16	2	2	81
理論數	34.17	11.39	15.19	11.39	3.80	5.06	81

* 挿畫第5圖參照

實驗數甚だ少數なれども、三性雜種の分離と認むべし。従つて交配(42)は $Wg Pt Ca \times wg pt ca$ の三性雜種なりしことを知る。第11表にて一重咲の分

第5圖 普通型八重咲(左)と長翼型八重咲(右)

離數の過多なりし理由は、第12表に掲げたる F_3 成績に徴して明瞭なる如く、何等特別の事情に依るものに非ずして、分離せし八重咲に petalody の程度の弱きものありしに依る。尙 $F_2 \cdot F_3$ 成績を通じて $wg \cdot pt \cdot ca$ 三因子は、互に無關係的分離をなせしことを首肯すべし。

第12表 普通型一重咲對長翼型椿咲交配(42)に於ける F_3 成績

F_2 の性狀	因子組成	系統數	普通型 一重咲	普通型 八重咲	普通型 椿咲	長翼型 一重咲	長翼型 八重咲	長翼型 椿咲	合計
普通型 一重咲	$WgWgPtPtCaCa$	2	27	—	—	—	—	—	27
	$WgWgPtPtCa ca$	2	56	—	13	—	—	—	69
	$WgWgPt ptCaCa$	2	45	24	—	—	—	—	69
	$WgwgPtPtCaCa$	6	91	—	—	23	—	—	114
	$WgWgPt ptCa ca$	3	68	17	25	—	—	—	110
	$WgwgPtPtCa ca$	3	45	—	16	16	—	3	80
	$WgwgPt ptCaCa$	2	51	15	—	12	3	—	81
	$WgwgPt ptCa ca$	11	117	31	32	38	8	19	245
	$WgWgpt ptCa ca$	1	—	10	4	—	—	—	14
普通型 八重咲	$Wgwg pt pt CaCa$	1	—	40	—	—	15	—	55
	$Wgwg pt pt Ca ca$	4	—	59	11	—	14	4	88
	$WgWgPtPt ca ca$	2	—	—	37	—	—	—	37
普通型 椿咲	$Wgwg PtPt ca ca$	3	—	—	79	—	—	19	98
	$wg wg Pt ptCaCa$	2	—	—	—	23	6	—	29
長翼型 一重咲	$wg wg FtPtCa ca$	3	—	—	—	23	—	14	37
	$wg wg Pt pt Ca ca$	4	—	—	—	97	33	42	172
	$wg wg pt pt Ca ca$	1	—	—	—	—	11	2	13
長翼型八重咲	$wg wg pt pt Ca ca$	1	—	—	—	—	—	15	15

5. 花型に関する考察

萩原博士(1926)はハウセンクゝの花型を論ずるに當り、その種類として一重・普通八重及び椿咲を以てせり。然し博士の普通八重は寫眞並に記載から推して著者の長翼瓣に相當するものと思はる。又野生種のツリフネソウ *Impatiens Textori* Miq. 及びキ

ツリフネ *Impatiens noli-tangre* L. 等同屬近縁植物が翼瓣の發達不完全なる一重咲なるに想到すれば、ホウセンク、に於ては 不完全翼を以て原始型となし、從つて之が呼稱を普通咲となすが最も妥當とせざるべからず。又博士は所謂普通八重型と椿咲との交配に於て、その F_2 に 3 普通八重咲:1 椿咲の單性分離を得たるも、著者の同種交配の F_2 にては、一重咲・八重咲及び椿咲を 9:3:4 の比に得たり。この兩結果の差は使用せられし兩親の genotype の差にあらずして、花型類別の標準を異にしたる點に歸せらるべし。因に Rasmuson は花型に關しては何等報告する所なかりき。

第二節 花 色

ホウセンク、の花色は 紅色莖群と綠色莖群との二群に大別せらる。而して後者には、苗の時代に hypocotyl にのみ淡き色を有するものあり。二群は 又夫々次に掲げたる花色の種類を包含す。

紅 色 莖 群			綠 色 莖 群		
呼 稱	第 I 圖版	色 種 別*	呼 稱	第 I 圖版	色 種 別*
赤 紫 色	(第 1 圖)	Tyrian Rose	淡 紫 色	(第 5 圖)	Rose-Purple
紫 色	(第 2 圖)	Rhodamine Purple	極淡紫色		Pale Vinaceous-Lilac
赤 色	(第 3 圖)	Spectrum Red	淡 赤 色**	(第 6 圖)	Eosin Pink
桃 色	(第 8 圖)	Geranium Pink	極淡赤色	(第 9 圖)	Hermosa Pink

* 色種別は Ridgway (1912) に依る。

** 稍濃き鮭肉色 (第 I 圖版第 7 圖) 及び稍淡き淡々赤色 (第 I 圖版第 4 圖) を含む。

A. 單 色 花 の 行 動

I. 紅色莖同志の交配實驗

1. 赤 色 對 桃 色

兩者の交配に依りて得たる F_1 の赤色花を自精して第 13 表に示す如き單性雜種比の分離をなせる F_2 成績を得たり。

第 13 表 赤色花×桃色花に於ける F_2 成績

交 配 番 號	赤 色 花	桃 色 花	合 計
1	46	21	67
2	18	7	25
3	46	28	74
4	44	15	59
5	13	5	18
6	121	31	152
7	73	19	92
8	47	24	71
合 理 論 計 數	408 418.5	150 139.5	558 558

從つて本交配に使用したる花色の差は allelomorphs P, p に基因す。更に之が F₃ の成績を第 14 表に示す。

第 14 表 赤色花×桃色花に於ける F₃ 成績

交配番號	F ₂ の性狀	系 統 數	赤 色 花	桃 色 花	合 計
1	赤 色 花	{ 3	414	—	414
	桃 色 花	9	710	192	902
2	赤 色 花	{ 3	98	—	98
	桃 色 花	14	439	151	590
3	赤 色 花	{ 3	64	—	64
	桃 色 花	6	102	34	136
		7	—	230	230

第 13 表に於て交配 (6) は赤色一重咲×桃色椿咲にして、又交配 (1)・(7)・(8) は赤色八重咲×桃色椿咲なりき。從つて今之等四交配に就きて、花型を伴ふ花色の分離成績を示せば第 15・16 表の如し。

第 15 表 花型及び花色の分離を示す交配 (6) の F₂ 成績

	+	ca	P	ca p	合 計
實 驗 數	94	27	24	7	152
理 論 數	85.5	28.5	28.5	9.5	152

第 16 表 花型及び花色の分離を示す交配 (1) (7) (8) の F₂ 成績

交配番號	+	pt	ca	pt ca	P	p pt	p ca	p pt ca	合 計
1	31	6	9		12	4	3		65
7	45	15	13		11	2	6		92
8	32	13	12		9	5	10		81
實 驗 數	108	34	34		32	11	19		238
理 論 數	100.5	33.5	44.6		33.5	11.2	14.8		238

こゝに於て p 及び ca の間には特殊關係なく獨立の行動をとること明かなり。

椿咲の花は本來八重咲の性質を有するが故に、八重咲性の椿咲 (pt ca) と一重咲性の椿咲 (ca) とを區別することは困難なり。從つて第 16 表に於ては、兩者を一緒に記帳せざるを得ざりき。尚かゝる條件の下に本表を通覽する時は、p・pt 及び ca の間には連鎖關係の存在せざること明瞭なり。尙別に長翼型桃色×普通型赤色の交配あり。そ

の結果は第 17 表に示すが如く單純なる兩性雜種比を示し、 p と wg との間にも、何等特殊の關係なきことを知れり。

第 17 表 p と wg との關係を示す F_2 成績

	+	wg	p	$p\ wg$	合 計
實 驗 數	163	54	48	14	279
理 論 數	156.9	52.3	52.3	17.5	279

2. 桃 色 對 紫 色

この交配によつて得たる紫色花の F_1 植物より、第 18 表に示すが如く、紫色と桃色とに就き單性雜種比と見るべき分離成績を挙げたり。

第 18 表 桃色花×紫色花に於ける F_2 成績

支 配 番 號	紫 色 花	桃 色 花	合 計
1	60	23	83
2	33	10	43
3	30	13	43
4	89	33	122
5	101	41	142
合 計	313	120	433
理 論 數	324.8	108.2	433

即ち紫色と桃色とは一因子の差に基くものなること明かにして、之が *allelomorphs* を R, r とす。 F_3 成績は第 19 表に示すが如し。

第 19 表 桃色花×紫色花に於ける F_3 成績

交 配 番 號	F_2 の 性 狀	系 統 數	紫 色 花	桃 色 花	合 計
1	紫色花	{ 3	38	—	38
		{ 4	38	10	48
	桃色花	3	—	31	31
2	紫色花	{ 2	10	—	10
		{ 3	22	7	29
	桃色花	5	—	36	36

交配 (2)・(5) は一重咲桃色×八重咲紫色にして、交配 (3) は一重咲紫色×八重咲桃色なりしを以て、今花型を伴ふ花色の分離比を示すべき成績を挙げれば第 20 表の如くにして、 r 及び pf は獨立的の遺傳をなせり。

第20表 r 及び p^l の關係を示すべき F₂ 成績

交配番號	+	r	p ^l	r p ^l	合 計
2	22	8	10	2	42
3	19	7	6	2	34
5	74	31	27	10	142
實驗數	115	46	43	14	218
理論數	122.6	40.9	40.9	13.6	218

3. 赤 色 對 紫 色

赤色花と紫色花とを交配すれば F₁ は赤紫色花を開き, F₂ に於ける分離は 第 21 表に掲げたる如く兩性雜種比を示せり。

第21表 赤色花×紫色花に於ける F₂ 成績

交配番號	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	合 計
1	20	4	7	2	33
2	15	4	4	2	25
3	47	11	14	5	77
合 計	82	19	25	9	135
理論數	75.9	25.4	25.4	8.4	135

この交配に使用したる兩親は夫々桃色に對して異なる allelomorphs に於て一因子の差を有するものなるが故に、その遺傳組成は、赤色が Pr にして紫色は pR なり。兩者の交配に際しては、優性因子を持ち合ひ兩性的優性の F₁ を生じ赤紫色花を開くに至る。即ち赤紫色は二優性因子の共働によるものなることを知り得べし。果して F₂ に於ては赤紫色・紫色・赤色・桃色を兩性雜種比に分離し、更に二交配より F₃ を吟味したる處、第 22 表に示す成績を得て、よくその意を充たせり。尙之等の成績は r 及び p の間に何等特殊の關係の存せざることを明かにしたるものといふべし。

第22表 赤色花×紫色花に於ける F₃ 成績

交配番號	F ₂ の性状	因子組成	系統數	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	合 計
1.	赤紫色花	RRPP	1	25	—	—	—	25
		RrPP	6	99	—	33	—	132
		KrPp	5	166	28	39	10	243
	紫色花	RRpp	1	—	12	—	—	12
	赤色花	rrPp	2	—	—	151	—	151
		rrPp	4	—	—	155	46	201
	桃色花	rrPP	2	—	—	—	28	28

交配番號	F ₂ の性状	因子組成	系統數	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	合 計
2.	赤紫色花	$\{ RrRP$	1	32	—	12	—	44
		$\{ RrPp$	2	45	9	23	11	88
	紫色花	$RRpp$	1	—	15	—	—	15
	赤色花	$\{ rrPP$	1	—	—	16	—	16
		$\{ rrPp$	1	—	—	30	8	38
	桃色花	$rrpp$	1	—	—	—	42	42

次に交配(3)は一重咲赤色×椿咲紫色なりしを以て、之等花型と花色との関係を知るべき調査資料を整理せるに第23表を得たり。

第23表 p, r 及び ca 相互の関係を知るべき F₂ 成績

	+	r	p	ca	pr	rca	pca	$prca$	合 計
實驗數	37	12	9	10	4	2	2	1	77
理論數	32.5	10.8	10.8	10.8	3.6	3.6	3.6	1.2	77

實驗數寡少なれども $p \cdot r$ 及び ca 相互の間には、特に連鎖關係の存在するを認め得ざるなり。こゝに於て前記赤色對桃色は $rrpp \times rpp$ にして、桃色對紫色は $rpp \times RRpp$ なりと認むべし。

4. 赤色對赤紫色

この交配は理論上 $rrPP \times RRPP$ なるが、果して F₁ は赤紫色花を開き、F₂ にては第24表に示すが如く赤紫色と赤色とを單性雜種比に分離したり。

第24表 赤色花×赤紫色花に於ける F₂ 成績

交 配 番 號	赤 紫 色 花	赤 色 花	合 計
1	42	9	51
2	38	9	47
3	39	13	52
實 驗 數	119	31	150
理 論 數	112.5	37.5	150

又交配(2)より得たる F₃ 成績も第25表に示せる如く、この事情を確證し得たりといふべし。

第25表 赤色花×赤紫色花に於ける F₃ 成績

F ₂ の 性 状	系 統 數	赤 紫 花 色	赤 色 花	合 計
赤 紫 色 花	$\begin{cases} 7 \\ 11 \end{cases}$	$\begin{matrix} 150 \\ 131 \end{matrix}$	$\begin{matrix} — \\ 38 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 150 \\ 169 \end{matrix}$
赤 色 花	3	—	81	81

更に又交配 (3) は花色の分離と同時に花型の分離をも伴へり。その内譯は、28 一重咲赤紫色、9 一重咲赤色、11 八重咲赤紫色、4 八重咲赤色にして、實驗數充分ならざれども r 及び pt の間には連鎖關係なく大體獨立的に遺傳するものと認め得べし。

5. 桃 色 對 赤 紫 色

本交配の兩親は兩性的劣性と兩性的優性なるを以て F_1 は赤紫色にして、 F_2 に於ては、赤紫色・紫色・赤色・桃色の四種を兩性雜種の比に分離をなすべく豫期せらる。實驗の結果 F_1 は赤紫色花を開き、 F_2 は第 26 表の如き成績にして大體之を證したりと雖も、 F_2 の實驗數は餘りに少なりしを以て F_3 を吟味したるに、第 27 表の如き成績を得て之を確證することを得たり。

第 26 表 桃色花×赤紫色花に於ける F_2 成績

	赤 紫 色 花	紫 色 花	赤 色 花	桃 色 花	合 計
實 驗 數	11	5	2	0	18
理 論 數	10.13	3.38	3.38	1.23	18

第 27 表 桃色花×赤紫色花に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	系 統 數	赤 紫 色 花	紫 色 花	赤 色 花	桃 色 花	合 計
赤 紫 色 花	1	46	—	—	—	46
	3	49	—	15	—	64
	2	55	13	27	6	101
紫 色 花	2	—	41	—	15	56
赤 色 花	1	—	—	23	—	23
	1	—	—	12	3	15

6. 紫 色 對 赤 紫 色

この交配に依りて得たる F_1 植物は赤紫色花を開き、 F_2 に於ては第 28 表に示せる如く單性雜種の分離比を示せり。

第 28 表 紫色花×赤紫色花に於ける F_2 成績

交 配 番 號	赤 紫 色 花	紫 色 花	合 計
1	57	11	68
2	41	11	52
實 驗 數	98	22	120
理 論 數	90	30	120

交配 (2) は花型の分離をも伴ひたるを以て第 29 表に再録すべし。

第29表 p 及び wg の關係を示すべき交配(2)の F₂成績

	普通咲赤紫色花	長翼咲赤紫色花	普通咲紫色花	長翼咲紫色花	合 計
實 驗 數	31	10	8	3	52
理 論 數	29.3	9.7	9.7	3.3	52

前記の如くこゝに於ても p 及び wg は無關係的遺傳をなすこと明かなり。

II. 紅色莖對綠色莖の交配實驗

以上掲げたる諸交配實驗は紅色莖同志間にその材料を選びたるが、こゝに之が綠色莖群との交配實驗を述ぶべし。

1. 赤 色 對 淡 赤 色

本交配に依つて得たる F₁ 植物は赤色花を開き、F₂ に於ては第30表に示す如く單性雜種比の分離をなせり。

第30表 淡赤色花×赤色花に於ける F₂成績

交 配 番 號	赤 色 花	淡 赤 色 花	合 計
1	23	6	29
2	27	8	35
實 驗 數	50	14	64
理 論 數	48	16	64

赤色花と淡赤色花との濃度は、莖色に關與する一因子の差に基因するものと認めらる。この allelomorphs を S, s (stem-green) の記號を以て示さん。即ちこの因子は莖色を紅色若くは綠色ならしむると同時に、花色の濃度を決定するものなり。

2. 桃 色 對 淡 赤 色

前交配實驗にて明かなる如く、淡赤色花は綠色莖の赤色花、即ち遺傳組成を以て示せば *rrPPss* なり。この交配に用ゐたる片親の遺傳組成は *rrppSS* なるが故に、その F₁ は P 及び S・を共有して赤色花となるべし。而して F₂ は兩性雜種の分離比を示すべく、こゝに16分の1丈け生ずべき兩性的劣性は綠色莖の桃色花にして、その色調は他因子の影響によりて淡桃色となるべきことを豫想せらる。實驗によりて得たる F₁ は赤色花を開き、その F₂ に於て第31表に掲げたる成績を得たり。

第 31 表 桃色花×淡赤色花に於ける F_2 成績

交配番號	赤 色 花	桃 色 花	淡 赤 色 花	淡々赤色花	合 計
1	46	14	9	3	72
2	45	24	18	2	89
3	47	14	9	4	74
4	60	25	19	6	110
實 驗 數	198	77	55	15	345
理 論 數	194.1	64.7	64.7	21.5	345

第 31 表の成績は大體豫期を裏書きしたるものと雖も偏差又小ならず。故に之が F_3 を吟味したる處、第 32 表に示したる如くよくその期待を充し得たり。

第 32 表 桃色花×淡赤色花に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	因子組成	系 統 數	赤 色 花	桃 色 花	淡 赤 色 花	淡 赤 々 色 花	合 計
赤 色 花	$PP SS$	6	141	—	—	—	141
	$Pp SS$	8	243	83	—	—	326
	$PP Ss$	3	78	—	25	—	103
	$Pp Ss$	4	121	40	46	15	222
桃 色 花	$pp SS$	5	—	190	—	—	190
	$pp Ss$	7	—	131	—	39	170
淡 赤 色 花	$PP ss$	1	—	—	26	—	26
	$Pp ss$	6	—	—	110	41	151
淡々赤色花	$pp ss$	2	—	—	—	41	41

本表に於ては、兩性的劣性型が綠色莖である處より淡々赤色花と呼べり。而して前掲二表を通覽することによりて、 p と s との間には何等特殊關係を有することなく獨立して分離すること明かなり。

又第 31 表の交配(3)及び(4)は花色と共に、花型の分離をも伴ひたるを以て、第 33 表に之が關係を示すべき成績を重ねて掲げん。

第 33 表 p, s 及び p' の關係を示すべき交配(3)・(4)の F_2 成績

交配番號	一重咲 赤色花	八重咲 赤色花	一重咲 桃 色	八重咲 桃色花	一 重 咲 淡赤色花	八 重 咲 淡赤色花	一 重 咲 淡々赤色花	八 重 咲 淡々赤色花	合 計
3	36	11	11	3	7	2	3	1	74
4	45	15	16	9	14	5	5	1	110
實 驗 數	81	26	27	12	21	7	8	2	184
理 論 數	77.7	25.8	25.8	25.8	25.8	8.8	8.8	3.6	184

この成績よりすれば、 $p \cdot s$ 及び p' の間にも連鎖のなきとを證し得たりといふべし。

3. 赤紫色對淡赤色

この交配は $RRPPSS \times rrPPss$ なるが故に F_1 は赤紫色花を開き、 F_2 に於ては兩性雜種比の分離が豫期せらるゝが、實驗結果 F_1 は果して赤紫色花を開き、 F_2 及び F_3 は夫々第 34 表並に第 35 表に示せる如く、何れもよく豫期に合致する成績を得たり。

第 34 表 淡赤色花×赤紫色花に於ける F_2 成績

交配番號	赤紫色花	赤色花	淡紫色花	淡赤色花	合計
1	30	14	4	3	51
2	10	3	5	2	20
3	7	3	4	2	16
實驗數	47	20	13	7	87
理論數	48.94	16.31	16.31	5.44	87

第 35 表 淡赤色花×赤紫色花交配 (1) の F_3 成績

F_2 の性状	因子組成	系統數	赤紫色花	赤色花	淡紫色花	淡赤色花	合計
赤紫色花	$RRPPSS$	2	35	—	—	—	35
	$RrPPSS$	2	58	18	—	—	76
	$RRPPSs$	3	115	—	42	—	157
	$RrPPSs$	6	104	43	33	18	198
赤色花	$rrPPSS$	1	—	79	—	—	79
	$rrPPSs$	1	—	32	—	8	40
淡紫色花	$RRPPss$	1	—	—	14	—	14
淡赤色花	$rrPPss$	1	—	—	—	57	57

4. 赤色對淡紫色

前記交配實驗の結果によれば、淡紫色の遺傳組成は $RRPPss$ なるを以て、本交配にては F_1 は赤紫色花を開き、 F_2 にては r 及び s に關して兩性雜種の分離比を示すべきなり。

異なる系統より得たる淡紫色花を用ひて二交配を爲したるが、その一は第 36 表に掲げたる F_2 成績に徴して明かなる如く、よくその豫期に添ひ得たり。

第 36 表 $RP_s \times rPS$ に於ける F_2 成績

	赤紫色花	赤色花	淡紫色花	淡赤色花	合計
實驗數	58	17	16	5	96
理論數	54	18	18	6	96

然るに他の一は第 37 表に示せる如くその F_2 に於て、豫想外の分離をなせり。

第 37 表 $RpS \times rPS$ に於ける F_2 成績

	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	淡紫色花	淡赤色花	淡々赤色花	合 計
實 驗 數	24	8	7	2	13	2	0	56
理 論 數	23.63	7.88	7.88	2.63	10.50	2.63	0.88	56

第 37 表にては三性雜種の豫期を以てその理論數を對比せしめしも、實驗數極めて寡少にして、且つ 64 分の 1 丈け豫期さるべき三性的劣性型を一本も得ざりしを以て之が F_3 の吟味を行ふこととせり。その結果は第 38 表に掲げたる如く、この交配に用ひし淡紫色は $RRPPss$ に非ずして $RRppss$ なりしことが明かとなれり。

第 38 表 $Rps \times rPS$ に於ける F_3 成績

F_2 の性狀	因 子 組 成	系統數	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	淡紫色花	淡赤色花	淡々赤色花	合 計
赤紫色花	$Rr PP SS$	1	43	—	13	—	—	—	—	56
	$RR Pp SS$	1	20	8	—	—	—	—	—	28
	$Rr Pp SS$	1	18	8	5	3	—	—	—	34
	$RR Pp Ss$	1	24	9	—	—	11	—	—	44
	$Rr Pp Ss$	5	115	15	20	8	27	4	2	191
紫色花	$Rr pp SS$	2	—	35	—	11	—	—	—	46
赤色花	$rr Pp SS$	1	—	—	10	3	—	—	—	13
淡紫色花	$RR PP ss$	1	—	—	—	—	37	—	—	37
	$Rr PP ss$	2	—	—	—	—	29	8	—	37
淡赤色花	$rr PP ss$	1	—	—	—	—	—	24	—	24
	$rr Pp ss$	1	—	—	—	—	—	18	4	22

綠色莖の赤紫色と紫色とは共に淡紫色にして、表型的にこの二者を判別することは少々困難なることに屬す。従つて淡紫色と稱せらるるものゝ中にはこの二者を包括するを以て、第 37 表並に第 38 表に於て淡紫色の分離數が増大せるなり。即ち第 37 表の理論數は正常の三性雜種分離を少しく變形せしめて $27:9:9:3:12:3:1$ となせるものなり。

III. 白色花に關する交配實驗

之迄述べたる實驗結果によつて、ホウセンク₉の有色花の遺傳關係は略々明瞭となりたり。ここには白色花（第一圖版第 13 圖）の交配實驗を述べて之が遺傳型の探究を試みん。

1. 淡 赤 色 對 白 色

この交配の F_1 は淡赤色となり、 F_2 に於ては第 39 表の如き結果を示せり。

第39表 白色花×淡赤色花に於ける F_2 成績

交 配 番 號	淡 紫 色 花	淡 赤 色 花	白 色 花	合 計
1	40	26	12	78
2	7	1	1	9
實 驗 數	47	27	13	87
理 論 數	48.94	16.31	21.75	87

淡紫色・淡赤色及び白色の分離数は恰も 9:4:3 の比に近きも、之は 9:3:4 の偏差と認めらる。茲に於て白色花は之に關與する w (white) 因子に基因するものとなすべく、之がホモ状の時は假令 $R \cdot P$ の存在あるとも花は白色に終るものならん。

かくてこの交配は $ww RR PP ss \times WW rr PP ss$ と見るべく、果してその F_3 成績は第40表に見る如くよく之を確證し得たり。

第40表 白色花×淡赤色花に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	系 統 數	淡 紫 色 花	淡 赤 色 花	白 色 花	合 計
淡 紫 色 花	1	22	—	—	22
	2	44	15	—	59
	5	66	24	34	124
淡 赤 色 花	4	—	114	—	114
	10	—	213	105	318
白 色 花	14	—	—	306	306

尙 F_3 吟味に於て、白色中には極めて弱き色を有するものありしを以て見れば $ww RR PP ss$ 或は $ww rr PP ss$ は絶対の白色にあらずして、多少表型的の差を有するものに非ざるやの懸念ありしも、是等の見分けは結局不可能にして、一括して白色となさざるを得ざりき。又以上の成績にて r と w との間には特殊關係の存せざること明かなり。

2. 桃 色 對 白 色

本交配の F_1 は桃色花を開き、その F_2 に於ては第41表に示せるが如く單性雜種比の分離を見たり。

第41表 白色花×桃色花に於ける F_2 成績

交 配 番 號	桃 色 花	白 色 花	合 計
1	13	6	19
2	41	14	55
實 驗 數	54	20	74
理 論 數	55.5	18.5	74

前交配にて明かにされたる如く、白色は莖色に關して ss の因子組成を有せしを以て、本交配にては當然淡々赤色乃至極淡色を F_2 に分離すべきを豫想せらる。然るに實際の成績は之を裏切りて斯かる淡色花を出現せざりき。之 w と s との間に高度の Coupling の存するものと見らるべし。この理由の下に本交配が $WWrrppSS \times wwrrPPss$ にして尙よく兩性雜種比に代るに單性雜種比を以て分離したる所以が明かなるべし。

交配 (2) より F_3 を吟味したる結果、第 42 表に掲げたる成績を得たり。こゝに於ては桃色系統に crossing over による僅少の淡々赤色の發現を見、此の間の消息を一層確實に證し得たるものと認めらる。

第 42 表 白色花×桃色花に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	系 統 數	桃 色 花	淡々赤色花	白 色 花	合 計
桃 色 花	$\left\{ \begin{array}{l} 6 \\ 12 \end{array} \right.$	97 154	— 2	— 45	97 201
白 色 花	6	—	—	94	94

F_2 並に F_3 成績中兩性雜種の分離をしたるもの (linkage が強きが故に白色を分離したる桃色系統は全部この條件にあるものと見て差支なかるべし) を總計すれば、208 桃色:2 淡々赤色:65 白色となるべし。

試みに之より recombination を算出すれば約 1.4% なるを以て w と s との間には、強度の linkage の存するものと認めらる。

3. 紫 色 對 白 色

異なる系統より得たる白色花を用ひて二組の交配實驗を行へり。共にその F_1 に紫色花を開き、 F_2 に於ては第 43 表に見る如き分離をなせり。

第 43 表 白色花×紫色花に於ける F_2 成績

交配番號	紫 色 花	桃 色 花	淡紫色花	極淡紫色花	白 色 花	合 計
1.	54	14	10	—	3	81
理 論 數	46.6	15.2	15.2	—	5.0	81
2.	34	9	—	13	13	69
理 論 數	29.1	9.7	—	12.9	17.3	69

交配 (1) の F_3 成績は第 44 表に掲げたり。

第44表 白色花×紫色花(1)のF₂成績

F ₂ の性状	系 統 數	紫 色 花	桃 色 花	淡紫色花	白 色 花	合 計
紫 色 花	3	72	18	—	—	90
	9	163	—	52	—	215
	5	98	30	39	13	180
桃 色 花	3	—	69	—	—	69
	3	—	51	—	18	69
淡紫色花	2	—	—	26	—	26
白 色 花	2	—	—	—	40	40

これによつて見れば、本交配は $ww\ rr\ pp\ ss \times WW\ RR\ pp\ SS$ と見るべく、F₁は當然三性的ヘテロなるべきに、F₂の分離が兩性雜種の分離をなしたるは w と s との間に完全に近き linkage の存在するに依るなるべし。又 R は P と異り w と組合つても稍々明かに紫色を表現し得ること明かなり。

以上の成績にて、 w と r との間には何等特殊の關係なく獨立的に遺傳すること明かなり。

交配(2)に關しては、次の極淡色花の項に於て論ずる處あるべし。

4. 赤紫色對白色

本交配は $WW\ RR\ PP\ SS \times ww\ rr\ pp\ ss$ なりしを以て、F₁は赤紫色花を開き、F₂に於ては第45表の如く分離せり。

第45表 赤紫色花×白色花に於ける成績

	赤 紫 色	紫 色	赤 色	桃 色	極 淡 色	白 色	合 計
實 驗 數	39	9	12	4	17	2	83
理 論 數	35.02	11.67	11.67	3.89	19.45	1.30	83

理論上豫期さるべき $ww\ RR\ PP\ ss \cdot ww\ rr\ PP\ ss$ 及び $ww\ RR\ pp\ ss$ の三性型を表型的に判別することは遂に不可能に終りたるを以て、こゝにはこれを一括して極淡色花となしたり。本交配に於て淡色型の代りに極淡色型を得たる事情に就きては、次項の極淡色の實驗成績と共に論述すべし。

IV. 極淡色花に關する交配實驗

本項には前項の交配實驗に於て屢々現はれたる 極淡色花に就きての解説を試み、更に之が交配實驗成績を合せ論述すべし。

1. 白 色 對 紫 色

本交配の F₂に就きては既に第44表に掲げたり。その F₃を吟味したるに第46表

の如き成績を得たり。

第46表 白色花×紫色花(2)のF₃成績

F ₂ の性状	系統數	紫 色 花	桃 色 花	極淡紫色花	白 色 花	合 計
紫 色 花	3	57	—	—	—	57
	4	60	18	—	—	78
	4	58	—	15	—	73
	3	48	17	16	8	89
桃 色 花	2	—	23	—	—	23
	1	—	16	6	—	22
極淡紫色花	7	—	—	161	—	161
	10	—	—	177	44	221
白 色 花	5	—	—	—	86	86

この成績によつて、極淡色に關與する因子 d (dilute) を想定す。従つてこの交配は *dd ww rr pp ss* × *DD WW RR pp SS* にして、而かも d と s との間には完全に近き linkage 關係の存することを示したり。

2. 赤 紫 色 對 白 色

この交配實驗につきての F₂ 迄は既に記述する所ありたり。更に之が F₃ を吟味したるに第47表の如き成績を得たり。

第47表 赤紫色花×白色花に於ける F₃ 成績

	赤紫色花	紫 色 花	赤 色 花	桃 色 花	極淡色花	白 色 花	合 計
實 驗 數	39	12	9	4	17	2	83
理 論 數	35.02	11.67	11.67	3.89	19.45	1.30	83

F₂ に於て淡色花を得ずして總て極淡色花が之に代れることも亦既に述べたる處なるが、この事情は F₃ に於ても認められたり。之前交配と同じ系統に屬する白色花を使用したため、d 因子の作用が現はる筈なるが故に當然の結果といふべし。

3. 紫 色 對 極 淡 赤 色

本交配の F₁ は紫色花を開き、F₂ に於ては第48表の如き分離成績を得たり。

第48表 極淡赤色花×紫色花に於ける F₂ 成績

	紫 色 花	桃 色 花	極淡紫色花	極淡櫻色花	合 計
實 驗 數	52	15	23	6	96
理 論 數	54	18	18	6	96

此の成績により本交配は *dd WW rr pp ss* × *DD WW RR pp SS* なりし筈なり。素より d 及び s との間に殆ど完全なる linkage 關係の存在せるを認めざるべからず。

4. 赤色對極淡紫色

この交配にて得たる F_1 は赤紫色花を開き, F_2 に於ては第 49 表に掲げたるが如き稍々複雑なる分離成績を挙げたり。

第 49 表 極淡紫色花×赤色花に於ける F_2 成績

	赤紫色花	紫色花	赤色花	桃色花	極淡色花	合計
實驗數	16	6	12	5	12	51
理論數	21.52	7.17	7.17	2.39	12.75	51

本交配を遺傳組成から見て $ddWWRRppss \times DDWWrrPPSS$ とすれば, F_1 は四性的ヘテロなるが d 及び s の間に完全(?)の linkage 關係が存する爲に, F_2 にては次の如く三性雜種の分離をなす筈なり。

因子組成	理論比	表現型	表現型理論比
WDRPS	27	赤紫色花	27
WDRpS	9	紫色花	9
WDrPS	9	赤色花	9
WDrpS	3	桃色花	3
WdRPs	9	極淡紫色花	極淡色花 16
WdRps	3	同上	
WdrPs	3	極淡赤色花	
Wdrps	1	同上	

第 49 表の實驗數は寡少に過ぐれども, この理論比を大體證し得たるものと信ぜらる。

V. 距色の遺傳

距の色の遺傳性狀を明かにする爲に, 有色距(第 I 圖版第 12 圖)白色花(但し極めて淡き色を有し, 特に筒の部には可成り濃き色を呈す, 第 I 圖版第 11 圖)に白色距(第 I 圖版第 10 圖)淡々赤色花を交配したるに, F_1 は有色距の稍々濃き淡赤色花(第 I 圖版第 7 圖)を開きたり。此の F_1 3 本の自精によりて得たる F_2 は, 第 50 表に示せる如く異様なる分離成績を挙げたり。

第 50 表 有色距白色花對白色距淡々赤色花に於ける F_2 成績

	有色距 淡赤色花	白色距 淡赤色花	有色距 淡々赤色花	白色距 淡々赤色花	有色距 白色花	白色距 白色花	合計
實驗數	109	54	29	20	45	17	274
理論數	102.9	51.9	33.4	17.2	51.1	17.5	274

こゝに距色に關與する因子を $Sp \cdot sp$ (spur-white) とすれば、本交配に使用したる白色花の親は系統明かなる wP 型のものなるが故に、この交配は $wwPPSpSp \times WWppspsp$ にして F_1 は $WwPpSpsp$ なり。 F_2 に於ては當然有色距淡赤色花・白色距淡赤色花・有色距淡々赤色花・白色距淡々赤色花・有色距白色花・白色距白色花の六種を三性雜種の比に分離すべく期待せらるゝが、事實はこの豫期を裏切り、一見不可解なる成績を示したり。著者は之が説明の爲に、次の事情の許容さるべきを信ず。

(1) Sp は花色を表現すべき何等かの因子の存在する時にのみ其の作用を現はすものにして、 ww の場合にては同種の色を一段と高き色調にて距の部分に表現し、次に筒の部分に稍々淡く、花冠部には極めて淡く殆ど白色に止らしむ。従つて本交配を假りに正常の三性雜種と認むるも、 F_2 に於て 64 分の 3 だけ生すべき $wPsp$ は白色距白色花となり、之に當然かくあるべき $3wp$ 及び $1wp$ とを加ふれば結局 64 分の 7 が白色距白色花となるべき理なり。

(2) p 及び sp との間には極めて強度の linkage 關係を保有するが故に、上記の 27:9:9:9:3:7 の比は更に異常となれる理なり。實驗數充分ならざれども、前記の吟味數を以て計算を許さるものとせば、 p と sp との間には約 7.0% の linkage を有するものと認むべし。第 50 表に掲記したる理論數はかゝる根據に基きて算定したるものなり。

B. 條斑花の行動

I. 條斑花の範型

ホウセンカには種々の條斑花を有し、此の種の研究には最も好適なる材料と思考さる。本研究に於て取扱ひたる條斑花は次の六範型となすことを得。

系統 I. 細斑型赤色條斑種 (第 I 圖版第 17 圖) 殆ど白色に近きものより淡赤色に至る迄、各種程度の地色に赤色及び淡赤色の條斑が分布せるものなり。

條斑は花冠部に最も著しけれども、子葉・果實及び莖にも表現するを普通とす (之は一般條斑種の通則とす)。條斑は長く幅廣きものあり、又極めて短く且つ小さくして點に近きものあり。前者は少けれども、後者は極めて多く、略々平等に分布せり。

系統 II. 粗斑型赤色條斑種 (第 I 圖版第 18 圖) 地色及び條斑色等總て系統 I に同じきも、只著しき差異は細斑が殆どなく、粗大なる條斑のみに止まれる點なり。

系統 III. 細斑型桃色條斑種 地色は系統 I より稍々淡く、條斑は桃色及びそれより少しく淡色のものなり。條斑量及びその分布の状態は全く系統 I に異ならず。

系統 IV. **粗斑型桃色條斑種** (第 I 圖版第 19 圖) 地色及び條斑色は系統 III に等しく、條斑量及びその分布状態は系統 II に同じ。

系統 V. **細斑型紫色條斑種** (第 I 圖版第 16 圖) 極淡紫色乃至淡紫色の地色に、系統 I に類したる状態に紫色及び淡紫色の條斑を有するものなり。

系統 VI. **細斑型赤紫色條斑種** 殆ど白色乃至淡紫色の地に、赤紫色及び紫色の條斑を、系統 I・III 又は V と同程度の状態に分布す (第 I 圖版第 14 圖及び第 21 圖)。但し本範型には紫色條斑を有せずして赤紫色條斑のみに止まるものをも包含す。かゝるものにありては、その地色は極淡赤紫色乃至淡赤紫色を呈するものの如し (第 I 圖版第 15 圖)。

II. 條斑花の後裔吟味

各系統に就きて之が自精を行ひたる結果、次の如き成績を得たり。

系統 I. 6 本の條斑植物を自精したるに、307 本の苗中に 6 本の紅色莖を發見せり。之等は本條斑種の條斑部の最も濃度の高き部と全く等しき色調の全赤色花を開きたり。之等が突然變異者なることはやがて明瞭となるべし。他の綠色莖 (實は嚴密には大部分條斑莖にして、莖部の條斑は植物體の發育が進むに従ひて益々顯著となる) は、親植物と同様の條斑植物なりき。但しその一部には地色花を開きたる個體をも混生したり。花色を調査せる綠色莖苗は 61 本にして、内 51 本が條斑植物にして 10 本が地色花なりしを以て、赤色花の析出歩合は 1.96 %, 地色花のそれは 16.39 % なり。かゝる地色花植物 1 本を自精して 59 本を得たりしが、之等は總て地色花を開きたり。又赤色花 1 本の自精にて得たる 23 本の内譯は 15 赤色・6 條斑・2 地色なりき。

系統 II. 本系統の條斑花 22 本の自精を行ひたるに、合計 654 本の内赤色莖苗は僅かに 5 本即ち 0.76 % に止まれり。又 234 本の綠色莖 (若くは條斑莖) を開花せしめたるに、内 20 本が地色花にして、残りは全部條斑花なりき。此の際地色花の析出歩合は 8.55 % なり。更に地色花植物 6 本の自精によりて次世代植物 100 本を得たるも、總て之等は地色花を開きたり。又赤色花植物 3 本を自精して得たる苗は合計 73 本にして、内 60 本は紅色莖にして 13 本は綠色莖なりき。即ち單性雜種比に近似す。更にかくて得られし 6 本の赤色莖を開花せしめて次世代を検したるに、内 2 本よりは合計 75 本を得、之等は總て赤色花植物なりき。又 3 本は 136 本を生じ、内譯 112 本赤色・24 本條斑の分離をなせり。今 1 本は僅々 8 本のみを得たるが、内 7 本が赤色花にして 1 本は地色花なりしが故に、之は地色花に對するヘテロ接合体と認めらる。即ち分離したる赤色花 7 本中 5 本をとつてその次世代を検したるに、單性雜種の法式に合致し、内 3

本は合計 112 赤色・24 地色を分離し、残り 2 本は合計 75 本全部赤色花に固定したり。

系統 III. 1 本の條斑植物の自精によりて、52 本の次世代植物を得たるに、内 7 本は紅色莖桃色花にして、8 本は地色花なりき。又残り 37 本は總て條斑花を開きたり。故に紅色個體發現率は 13.46% にして、地色花個體のそれは 17.78% に當れり。

系統 IV. 本系統の條斑植物 3 本を自精して 210 本の後裔を得たるが、その内譯は 5 本の紅色莖に對して 205 本の綠色莖なりき。即ち紅色個體發現率は 2.38% なり。この 5 本の紅色個體を發育開花せしめたるが總て桃色花を開きたり。次に綠色苗の中 121 本を培養せしが、内 111 本は條斑花を開き、10 本は地色花なりき。此の際地色花の發現率は 8.27% なり。

系統 V. 條斑花 3 本の自精を行ひ、内 2 本に就きては 44 本の苗を得しが、その中に 2 本の紅色莖を發見せり。その紅色莖の苗を栽培せしも、1 本は花を見るに到らずして枯死し、1 本は紫色花を開けり。即ち紅色個體發現率は 4.55% なり。残り 42 本の非紅色苗は内 37 本が親と同様の條斑種にして、5 本は殆ど白色に近き花即ち地色花を開けり。この場合地色花の發現歩合は 11.90% なり。又紅色莖紫色花 1 本の次世代は總數 45 本にして、その内譯は紅色莖 33 本、綠色莖 12 本にして、大體 3:1 の單性比に分離せり。

自精を行ひたる今 1 本の株は、次世代に 39 本の苗を得たるが、全部親と同様の條斑花を開き、他型のものは 1 本も得られざりき。

系統 VI. こゝに擧ぐる自精成績は、赤紫色紫色條斑種に就きてなり。5 本の條斑植物を自精して 363 本の後裔を得たるが、内 35 本が紅色個體にして、その發現率は 13.31% なり。残りの紅色莖中實驗圃に移植して栽培を持續したるは 144 本にして、内 6 本は地色花を開き、他は親と同種の條斑植物なりき。こゝに於て地色花個體の發現率は 4.35% となるなり。かくて發現せし地色花個體 4 本を採つて更に自精したるに、77 本の後裔は全部地色花を開きたり。この種の條斑花にて最も濃度の高きは赤紫色にして、又條斑植物の次世代に現はれたる紅色個體も常に赤紫色の花を開けり。かゝる赤紫色花の變異者 2 本を自精せしに、38 本の紅色に對し 13 本の綠色を生じ單性比の分離を示せり。

III. 條斑花の後裔に現はるゝ異常花に關する考察

1. 單色花の出現に就て

條斑種の六系統が、常習的に二種の單色花をその後裔に發現することは既に述べ

り。即ち一は濃色型にして他の一は地色型なり。而して之らが發現する歩合は、各系統によりて可成りの變異を有することも亦前項にて記述したるが如し。今之等の成績を纏めて示せば次の如し。

範	型	紅色個體發現率	地色花發現率
系統 I	細斑型 赤色 條斑種	1.96 %	16.39
系統 II	粗斑型 赤色 條斑種	0.76	8.55
系統 III	細斑型 桃色 條斑種	13.46	17.78
系統 IV	粗斑型 桃色 條斑種	2.38	8.27
系統 V	細斑型 紫色 條斑種	4.55	11.90
系統 VI	細斑型 赤紫色 條斑種	13.31	4.35

系統 VI を除く外は、總て地色花個體が紅色個體よりその發現歩合高し。

從來植物に於て研究されたる條斑種の例は 少からず。 *Antirrhinum* の花冠 (de Vries 1905, Baur 1924), *Mirabilis* の花冠 (Correns 1905, 1910, Marryat 1909, 神名 1933), *Zea* の果皮 (Emerson 1914, 1917, Hays 1917, Eyster 1924), *Celosia* の穗色 (寺澤 1922, 神名 1929, 小島 1930, 木原 1932), 朝顔の花冠 (今井 1925 a, 1927, 1931 a) 等その主なるものなり。之等は總て條斑種の自精次世代に於て常に單色花を發現するものにして、著者のハウセンクも亦この例に入るものなり。

今條斑に關與する遺傳因子を s^v (variegated) な記號を以て表せば、濃全色花はその dominant allelomorph S の作用に基く。條斑植物の後裔に現はるゝ濃全色の突變者は、實驗によれば通常條斑性に關しヘテロなりしを以て、その因子組成は Ss^v なるべし。然してこの突變者の由來を按ずるに、生殖細胞造成に際し又その以前の體細胞に於て劣性の s^v より轉化して S となりし配偶子にその因を發したるものなるべし。故に僅少の機會に於ては、突變配偶子同志の結合によりホモの紅色莖を生ずることも亦期待さるゝなり。又紅色莖突變者が必ず各範型に於ける條斑の最高濃度の色を花色となす理由は、その擔荷する花色因子の組成に依るものなり。即ち系統 I・II は $rrPP$, 系統 V は $RRpp$ 系統 III・IV は $rrpp$, 而して系統 VI は $RRPP$ を夫々擔荷せるものなることは、後述の實驗成績が自ら明かにする處なり。紅色莖濃全色花の外に、今一つの突變者なる地色花の出現に就きては、その發現歩合が可成り高き點より、その由來に就きては先に (神名 1926) 突變説と分離説を建てゝその結論を留保する處ありたり。

分離説に従へば、何か之と連鎖する致死因子の存在の如き特殊事情の伏在を假定せざるべからず。今日迄の實驗に於ては之を證すべき事實を得られざるのみならず、その後の實驗結果は突變説に従はざるを得ざるに至らしめたり。即ち條斑ハウセン

ク、に於ける地色花の出現は、常習的にして且つ前記の如く之等はすべて地色花に純殖するを通則とす。而して後述する如く全濃色・條斑・地色は互に單性比に分離するを以て、地色花に s なる因子記號を與ふれば、この $S \cdot s''$ 及び s の三者は複對性 multiple allelomorphs を形成すること明かなり。この際 s'' は S に轉ずると同時に s にも轉化する。斯かる例は既にオシロイバナ (Correns 1910, 神名 1933), トウモロコシ (Emerson 1917), スキートピー (Punnett 1922), アサガホ (今井・印刷中 a) に求むることを得べし。

s'' の S 又は s への轉化は、前記の如く常習的に gametogenesis に於て起るのみならず、somatogenesis に於ても同様に惹起せらるゝものにして、總ての條斑種の條斑は體細胞に起る $s'' \rightarrow S$ なる突然變異の結果に外ならず。

2. 濃地條斑花の出現に就て

今迄述べたる處は、條斑植物の自精に於て現はるゝ單色花の突變者に就きてのみなるが、各種の條斑花を自精すれば、時々今一つの突變者を發現することあり。濃地條斑型之なり。抑も條斑花の地色の色調は、 W 及び D 因子等の作用によるを普通とす。故に條斑花より析出する地色花も亦かゝる事情の下にありて、その濃淡の程度を決定さるべきなり。

然るに、淡地色の條斑花を自精して得らるべき濃地色條斑個體は、單に W 又は D の存在を以てしては、充分なる説明の與へられざる程度のものにして、一段と際立ちたる濃度の地色を有するものなり。即ち系統 I・II に於ける淡赤色、系統 III・IV に於ける淡桃色、系統 V に於ける淡紫色及び系統 VI に於ける淡赤紫色之なり。是等各種の濃地色を自精したるに、その結果は第 51 表に示すが如く、かゝる發現者は單なる彷徨變異に歸すべきに非らずして、明らかに遺傳的なことを首肯し得るなり。

第 51 表 濃地色條斑花の自精成績

範 型 種 別	吟味株數	全 濃 色	濃地條斑	淡地條斑	濃 地 色	淡 地 色	合 計
細斑赤色 ⁽¹⁾	2	2	24	16	3	0	45
細斑紫色	1	0	13	3	1	1	18
細斑赤紫色	1	0	8	3	0	1	12

(1) 細斑赤色とは細斑型赤色條斑種の意……他も之に做ふ。

實驗數多からざれども、第 51 表の成績を以てすれば、濃地色と淡地色とを單性雜種に近く分離したること明瞭なり。

こゝに於て地色の濃度に關與する因子を E, e (ecru) とすべし。而して e は E に轉化せんとする傾向を有するものにして、第 51 表に掲げたる吟味者は總て親の ee より轉じて Ee となりし mutants なり。

IV. 芽條變異及びその性狀

條斑植物にして屢々單色花の枝變り乃至花變り現象を惹起することは、前記諸種の實驗例を初め、其の他一般に認められたる事實なりとす。ハウセンクッに於ても亦各種範型を通じて、單色花の芽條變異を現はすのみならず、又地色の濃度及び條斑の量等に就きて芽條變異を見ること常なり。次に各範型につきて之が模様を述ぶる處あるべし。

1. 單色花芽條變異

系統 I. この系統に於ては、三種の單色芽條變異を觀察し得たり。即ち (1) 綠莖 (小にしては花梗、或は枝等をも包含す) 紅毛 (果實の表面に生ずる夥しい毛茸の白色なるを白毛とし、紅色なるを紅毛と稱せんとす) 赤色花 (小にしては花、大にしては枝なるも、芽條變異の意を現はすために總括して「花」を用ひたり)、(2) 紅莖紅毛赤色花、及び (3) 紅莖白毛濃桃色花 (第 I 圖版第 22 圖) 之なり。但し (3) は一見赤色花と見誤らるゝも、仔細に觀察すれば赤色より稍々低き濃度にして、それに赤色の條斑を有せることを知り得るなり。従つて之を單色花とするは嚴密なる意に於ては當らざるも、その遺傳性を考察するには本項に包含せしむるを以つて便宜なりと認めたり。

之等三種の芽條變異の頻發程度は (1) を以て最多となし、(3) 之に次ぎ、(2) は最も稀なり。茲に注意すべきは、莖色及び毛茸色と花色との關係なり。三種の芽條變異の本質的の差は、之等の特徴の相違と深き關係を有するものなり。

系統 II. 赤色花及び濃桃色の芽條變異 (後者は稀なり) を生じ、莖色及び毛茸色との關係は系統 I に同じ。

系統 IV. 綠色莖又は紅色莖に、桃色花を着生する二種の芽條變異を有す。又條斑型一般の通則として、屢々全く條斑を缺く芽條變異をも生ずれども、本系統の如く條斑の量少き系統にありては、この傾向特に顯著なり。

系統 V. 本系統に於て觀察し得たる單色型芽條變異に二種あり。一は綠莖紅毛紫色花にして、最も普通に發現せり。他の一は稀に惹起せらるゝものにして、紅莖白毛淡紫色花なり。

系統 VI. この系統に現はるゝ單色芽條變異には、系統 I に相當する三種あり。即

ち綠莖紅毛赤紫色花、紅莖紅毛赤紫色花及び紅莖白毛淡赤紫色條斑花(第 I 圖版第 20 圖)の三種之なり。但し本系統には、今一つの異常なる芽條變異の種類を觀察したり。即ち朦朧としたる淡地色に、褪色の感じを與ふる赤紫色の條斑を有するものにして、莖は綠色、毛茸は白色なり。

以上記述せる處を要約して ホウセンク、の單色芽條變異は次の四群とすることを得。

(A) 綠色莖・紅色毛・濃色花群 系統 I・II の赤色花、系統 III・IV の桃色花、系統 V の紫色花及び系統 VI の赤紫色花等之に屬す。

(B) 紅色莖・紅色毛・濃色花群 各範型に於て(A)と同じき花色を包含す。

(C) 紅色莖・白色毛・濃地條斑花群 系統 I・II に於ける濃桃色、系統 V に於ける淡紫色及び系統 VI に於ける淡赤紫色を包含す。

(D) 綠色莖・白色毛・特殊條斑花 系統 VI に於ける特殊條斑花をいふ。

各範型に屬す是等各種の單色芽條變異の後裔を吟味したるに、第 52 表に掲げたる成績を得たり。

第 52 表 各種條斑範型に現はるゝ單色芽條變異の後裔吟味

範 型	單 色 芽 條 變 異 種 別	吟 味 個 體	紅 色 莖	綠 色 莖	合 計	紅 色 莖 分 離 率
I	• A	3	11	74	85	12.9%
	• B	3	18	13	31	58.1
	• C	4	39	31	70	55.7
II	• A	1	2	21	23	8.7
	• B	1	2	45	47	4.3
	• C	1	3	5	8	37.5
IV	A	1	0	28	28	0.0
V	• C	1	13	4	17	76.5
VI	A	4	15	97	112	13.4
	B	1	25	7	32	78.3
	C	3	30	11	41	73.2
	• C	1	8	6	14	57.1
	D	1	0	28	28	0.0

• 印は被袋によらず自然結實のもの

この成績より考察すれば、A 型及び D 型は總てその後裔は條斑枝と同じく、因子的差異なきものと認めらる。萩原博士(1926)は條斑種に着生する單色花芽條變異は遺傳せざるものと結論したるが、之は著者の A 型に相當するものと思はる。然るに著者の場合に於ては、外に遺傳的の芽條變異をも認めたり。即ち系統 VI に於て B 型及び

C型は明かに 3:1 の單性分離を示し, s^v が dominant allelomorph S に轉化して生じたる芽條變異なることを認め得べし。

而して系統 I の B・C, 系統 II の A・C 及び系統 VI の C は, 系統 V と共に被袋せずして自然の儘に放置したるものなり。ハウセンク_ツを自然に放置する時は, 自精すること極めて稀なり。この事實は之等の供試植物の周圍が殆ど總て條斑種であり, 且つこの種の芽條變異は餘り頻繁に非ざる事實と合せて, 條斑植物の花紛が受精する機會が最も多きは容易に想像し得る處なりとす。

上記實驗成績は, 系統 V を除く外大體 1:1 の戻し雜婚の形式によつて分離したるを以て, 正しく $Ss^v \times s^v s^v$ の結果なりと斷定して誤なからんと信ず。獨り系統 V は自然狀態にしてよく自精し得たる稀有の例と思考せらる。即ち之等の成績に於ても, B・C 型が $s^v \rightarrow S$ の突然變異に由來せるものなることを證せられたる譯なり。

條斑種の枝變りは, 營養體上に起る突然變異に基くものにして, 發生學上より見たる所謂三層の組織原 (histogens) 中, 何れの部に之が惹起せらるゝかによりて色觀及び遺傳性に種々の差異を生ずるものなることは既に諸學者による多くの研究例あり。ハウセンク_ツに於ても, 以上の成績に依りて更によくその間の消息を語り得たるものといふ可く, 特にこの植物に於ては, 外組織原の突變は果實の生ぜる毛茸の色により, 中組織原のそれは莖色によりて之を明らかにすることを得るが故に, 一層此の方面の考察に資するに便多しといふべし。かゝる見地より更に改めて以上掲げたる芽條變異を總括すれば次の如し。

第 53 表 表型と性型との關係を示す芽條變異の總括

	芽條變異種別	花 色	莖 色	毛 色	突變部位	遺 傳 性	頻發程度
I	A	赤	綠	紅	外組織原	非遺傳性	最も普通
II	"	"	"	"	"	"	"
IV	"	桃	"	"	"	"	"
VI	"	赤 紫	"	"	"	"	"
I	C	濃桃斑入	紅	白	中組織原	遺 傳 性	稀
II	"	"	"	"	"	"	"
V	"	淡紫斑入	"	"	"	"	"
VI	"	淡赤紫斑入	"	"	"	"	"
I	B	赤	紅	紅	少クモ外 中組織原	遺 傳 性	極めて稀
VI	"	赤 紫	"	"	"	"	"
VI	D	褪色型斑入	綠	白	内組織原	非遺傳性	最も稀

2. 濃地條斑芽條變異

各種の條斑種に於て、濃地色條斑花の芽條變異も亦常習的現象なり。この濃地色條斑花は、既に條斑花の後裔に現はるゝ異常花として此の種の花を開く個體の出現する事に就きて述べたるが、この花と全く同種のものに屬するなり。かゝる枝變りの遺傳性を探究すべく自精を行ひたるに、その結果は第 54 表に掲げたるが如し。

第 54 表 濃地色型枝變りの自精成績

範 型	吟味枝數	紅 色 莖	濃地條斑	淡地條斑	濃地色花	淡地色花	合 計
I	8	2	4	41	4	2	53
VI	9	5	3	40	0	2	50
VI	1	2	13	6	1	0	22

これによりて察するに、濃地色型の枝變りは多くは表型的に止るものにして、遺傳的のものに非ざるが、細斑型赤紫色條斑種にて只一度丈けその次世代に單性雜種比に近き分離を示したり。然し之は吟味數も少く且つ偏差も稍ゝ過大なりしを以て、充分なる確信は得られざるも、或は遺傳的のものに非ざるか。果して然りとすれば e 因子は營養體上に於ても時折 E に轉化するものにして、多くの場合外組織原に惹起され、極めて稀に中組織原にも起るものと認め得らるべし。

3. 條斑量に關する芽條變異

ハウセンク、の條斑種に於ける條斑量の多少は、範型種別の項にて述べたる細斑型及び粗斑型が之を示すものにして、而して兩者は系統的のものなりき。條斑量の多少といふは、要するに營養體上に於ける突變頻度の強弱を意味することは言を俟たざる處なり。又細粗の差は、實は因子轉化の時期の早晚に由來するものなることは既に他の類例に於て明らかにされたる處なり。本研究に取扱ひたる條斑種にて、線條の粗なるは細斑型並に粗斑型に共通なるも、點狀の細條斑の入り具合に於ては著しき差異を現したる爲め、便宜上細粗の呼稱を以て頻度の強弱を表はすことゝせり。

次に細斑型に於ては、嘗てオンロイバナ (神名 1933) にても觀察したる如く、屢々粗斑型の枝變りを生ずることありしが (粗斑型より細斑型の枝變りを生ずること稀なり)、この枝變りは形容因子の「多」より「少」への轉化により生じたるものには非ざるかの豫想を以て、細斑型赤紫色條斑種のこの種枝變り 3 本より得たる 37 本を吟味したるに、總てが親と同様の細斑型にして、以上の豫想は全く裏切られたり。後述の交配實驗にても判明されたる如く、條斑量の多少は因子的のものなるが、その枝變りに於て

は、上記の吟味数が少く斷定には稍と躊躇せざるを得ざるも、觀察したる範圍を以てすれば、何等遺傳的のものに非ざりしことを認めたり。然し之を以て單なる表面的變化に歸することも亦早論なるべく、寧ろこゝに於ても、突然變異が外組織原にのみ起りたるためかゝる結果を得たるものと解するが至當なるべし。

V. 條斑花の遺傳

前項迄に論述したる處を以て條斑種の自精に關しては略と明瞭となりたり。こゝには更に之が交配實驗成績を擧げて一層條斑性の遺傳性に就きて明瞭ならしめんと欲す。

1. 複對性に就て

赤色對細斑型赤色條斑 F_1 は赤色花を開き、その F_2 に於ては第55表の如き分離成績を得たり。

第55表 赤色花對細斑型・赤色條斑種に於ける F_2 成績

	赤 色 花	條 斑 花	合 計
實 驗 數	59	20	79
理 論 數	59.25	19.75	79

即ち明かに單性比にして、その F_3 成績は第56表に掲げたるが如し。

第56表 赤色花對細斑型赤色條斑種に於ける F_3 成績

F_2 の性狀	系 統 數	赤 色 花	條 斑 花	地 色 花	合 計
赤 色 花	$\begin{cases} 6 \\ 10 \\ 1 \end{cases}$	$\begin{matrix} 97 \\ 157 \\ 65 \end{matrix}$	$\begin{matrix} — \\ 56 \\ — \end{matrix}$	$\begin{matrix} — \\ 3 \\ 28 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 97 \\ 216 \\ 93 \end{matrix}$
條 斑 花	$\begin{cases} 13 \\ 2 \end{cases}$	$\begin{matrix} 10 \\ 5 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 313 \\ 47 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 \\ 13 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 327 \\ 65 \end{matrix}$

こゝに於て、本交配は $DW_r PS \times DW_r Ps^o$ なりしこと明らかなり。素より s^o は常に S(赤色) に又 s(地色) に轉化するものなることを許容せざるべからず。

淡赤色對細斑型赤色條斑 F_1 は赤色條斑にして、 F_2 に於ては、5赤色・63細斑赤色條斑・24淡赤色に分離したり。こゝに於て條斑は地色に對して優性として單性雜種比に分離したるものと認めらるゝが故に、この交配は $DW_r Ps \times DW_r Ps^o$ なりしを知るべし。

淡赤色對赤色 本交配の F_1 は赤色花を開き、かゝる F_1 3本を自精したるに合計にて 133赤色・41淡赤色を得たり。之亦明かに單性比を示すものにして $DW_r Ps$

× *DWrPS* なる交配なりしなり。

以上三組の交配によりて、赤色・赤色條斑・地色の三者は、互に單性雜種の成績を示せることを明かにしたり。尙他範型に就きて類似の實驗成績を擧ぐれば次の如し。

淡赤色對細斑型桃色條斑 F_1 は細斑型桃色條斑花を開き、 F_2 にては 13 條斑・7 地色の成績を得たり。

極淡紫色對細斑型紫色條斑 F_1 は條斑にして、 F_2 にては 62 條斑・26 地色となりたり。

赤紫色對細斑型赤紫色條斑 赤紫色花を開きたる F_1 の自精によりて 84 赤紫色・25 條斑を得たり。之が F_3 成績は第 57 表に示したる如く、全色と條斑は單一因子の差に基くこと明かなり。

第 57 表 細斑型條斑花×赤紫色花に於ける F_3 成績

F_2 の性狀	系 統 數	赤 紫 色 花	條 斑 花	地 色 花	合 計
赤 紫 色 花	$\left\{ \begin{array}{l} 7 \\ 7 \end{array} \right.$	129 242	— 74	— 7	129 323
條 斑 花	7	—	113	2	115

之等の成績を綜合して考察するに、濃單色・條斑・地色の三者が互に單性雜種の關係にあることは、一に赤色條斑種のものに限るものに非ずして、各種條斑種の通性なりと認め得らるなり。従つて S (濃單色)・ s^v (條斑)・ s (地色) は、multiple allelomorphs を構成すること確實なり。

次に條斑の異なる系統間に於ける交配實驗の二三を擧げて、更に條斑性の遺傳性の探明に資せん。

細斑型赤紫色條斑對赤色 赤紫色花を開ける F_1 の自精によりて第 58 表の如き F_2 分離成績を得たり。

第 58 表 細斑型赤紫色條斑花×赤色花に於ける F_2 成績

	赤 紫 色 花	赤 色 花	赤紫色條斑花	赤色條斑花	合 計
實 驗 數	14	7	12	2	35
實 理 論 數	19.69	6.56	6.56	2.16	35

即ち兩性雜種比の分離をなせり。

紫色對細斑型赤紫色條斑 F_1 に於ては矢張り赤紫色花を開き、その自精によりて得たる F_2 は、合計 36 本中 16 赤紫色・10 紫色・10 赤紫色條斑なりき。この實驗數は餘

に寡少なるために、これによりて何等の結論をも望み難きも、或は repulsion を認めてこの不可解なる分離を説明せらるべきか。

細斑型赤色條斑對細斑型赤紫色條斑 細斑型赤色條斑花に、異なる系統より得たる細斑型赤紫色條斑花を配して二組の交配實驗を行ひたるに、 F_1 に於て異なる結果を得たり。即ち一は 4 本を得て全部赤紫色條斑花を開き、他の一は 6 本の中 4 本は赤色條斑花を開き、残り 2 本は赤紫色條斑なりき。又之等の F_2 成績は、前者は第 59 表に後者は第 60 表に掲げたるが如き結果を得たり。

第 59 表 細斑型赤色條斑×細斑型赤紫色條斑(1)に於ける F_2 成績

	赤紫色條斑花	赤色條斑花	赤紫色花	合計
實驗數	20	6	1	27
理論數	20.3	6.7	x	27

第 60 表 細斑型赤色條斑×細斑型赤紫色條斑(2)に於ける F_2 成績

F_1 の表型	F_1 の性型	系統數	赤紫色條斑	赤色條斑	紫色條斑	桃色條斑	赤色花	地色花	合計
赤紫色條斑	$RrPPs^vs^v$	1	5	3					8
	$RrPps^vs$	1	5	4	4	1		7	21
赤色條斑	$rrPPs^vs$	3		34			1	11	46
	$rrPps^vs^v$	1		22		8		3	33
	$rrPps^vs$	4		42		2		13	57

こゝに於て前者の交配は $rrPPs^vs^v \times RRPPs^vs^v$ にして、後者のそれは $rrPPs^vs^v \times RrPPs^vs$ なりしと思考せらる。

細斑型桃色條斑對細斑型赤紫色條斑 3本の F_1 植物を得たるが總て赤紫色花を開き、 F_2 は 3 本の合計數にて 32 赤紫色條斑・7 紫色條斑・15 赤色條斑・5 桃色條斑・2 紫色・2 赤色及び 6 地色を得たり。吟味數寡少の嫌あれども、本交配が $rrpps^vs^v \times RRPPs^vs^v$ なりしことは大體首肯し得らるべきと信す。

2. 地色の濃度に就て

地色の濃度に關し、その交配實驗の結果を擧げてこゝに考察を試みん。

濃地赤色條斑對淡地桃色條斑 濃地色中にも濃淡二種を區別して記帳したるも、こゝには一括して濃地色となす。かゝる地色の赤色條斑に、白色に近き地色の桃色條斑を交配したるに、その F_1 は濃地色の赤色條斑花を開きたり。2本の F_1 を自殖して得たる F_2 は第 61 表に示すが如く、濃地と淡地とを明かに單性比を以て分離したり。

第 61 表 濃地赤色條斑×淡地桃色條斑に於ける F₂ 成績

交 配	赤色花	濃 地 色			淡 地 色			合 計
		赤色條斑	桃色條斑	地 色 花	赤色條斑	桃色條斑	地 色 花	
1	0	208	11	0	13	58	0	290
2	1	48	11	11	10	15	5	100
合 計	1	256	22	11	23	73	5	390
		289			101			

淡紫色對淡地赤紫色條斑 こゝに淡紫色といふは、その色調赤紫色條斑種の持ち得る最高度の地色なり。之に極めて淡き地色の赤紫色花を配したるに、その F₁ は總て濃色地(即ち片親に使用したる淡紫色の色調)の赤紫色條斑花を着生したり。又その F₂ にては第 62 表の如き成績を得たり。

第 62 表 淡紫色花×淡地赤紫色條斑花に於ける F₂ 成績

	濃 地 色				淡 地 色				合 計
	赤紫色條斑	紫色條斑	赤紫色花	紫色花	赤紫色條斑	紫色條斑	赤紫色花	紫色花	
實驗數	98	27	39	37	56	8	2	1	268
	201				67				
理論數	201				67				268

この交配は $DWRpsE \times DWRPs^ve$ なるが、第 56 表と共に、地色因子と花色因子との關係に特殊なるものゝ存在することが明瞭なり。之に就きては後述する處あらんも、こゝに第 61 表中交配 (1) 及び第 62 表の成績に於て、濃單色個體を一本も析出せざりし點に注意を喚起し置くの要ありと信ず。是細斑型紫色條斑種の自精成績に於て、その次世代に濃單色を發現せざりしもの一本ありしといふ前述の事實を想起することによつて、何かその間に興味ある事實の伏在せるやを思はしむるなり。即ち $s^v \rightarrow S$ の常習性が何等かの機構により形容され、時にその生殖細胞造成期に於ける轉化性消失の結果を招來することのあるべきを暗示するものゝ如きも、その解決は將來の研究に譲らざるべからず。

淡紫色對淡地紫色條斑 この交配に用ひたる淡紫色花は前交配のものと同様にし、濃地色花とも稱すべきものなり。片親の條斑花の有する地色は最も低き色調なりき。之が F₁ は濃地紫色條斑となり、4 本の F₁ の自精によりて得たる F₂ は第 63 表に掲げたるが如し。

第63表 淡紫色花×淡地紫色條斑花に於ける F_2 成績

	紫 色 花	濃 地 色		淡 地 色		合 計
		紫色條斑	地 色 花	紫色條斑	地 色 花	
實 驗 數	4	49	26	23	1	103
		75		24		
理 論 數	x	77.2		25.8		103

即ち濃地色と淡地色とを單性比に分離し、本交配が $DWRpsE \times DWRps^ve$ なること明瞭なり。

以上諸交配によりて、條斑花自精成績の項に述べたる E, e 因子の行動を明かにし得たりと信ず。

3. 地色濃度因子と他因子との關係に就て

本項に於ては地色濃度因子 e と他の一二因子との關係に就きて述ぶべし。

e と p との關係 第61表に掲げたる交配は $PE \times pe$ にして、coupling の成績と認めらる。之によりて計算すれば p と e との間に 14.2% の linkage 關係の存することになり。

e と wg との關係 この關係を明かにし得るものは、前掲第61表の交配(1)の成績なるが、此の間の消息を示すべく第64表に之を再録すべし。

第64表 wg 及び e の關係を示す成績

	WgE	Wge	wgE	wge	合 計
實 驗 數	157	54	53	15	279
理 論 數	156.9	52.3	52.3	17.5	279

第64表の成績を以て見れば、wg と e との間には連鎖關係なく獨立的遺傳をなすこと明かなり。

4. 條 斑 量 に 就 て

條斑花の條斑部が榮養體上に惹起されたる突變現象に基因するものなることを想起すれば、條斑量の多少は突變頻度の高低と稱する方が寧ろ正鵠を得たる云ひ方ならん。この事情につきては既に論述したる處によりて明白なり。今赤色條斑種に於て粗斑型と細斑型とを交配したるに、その F_1 は條斑量の多少に關して中間の状態を現したり、而してその F_2 を吟味したるに、種々の程度のものを殆ど連續的に現はして、調査記入に當り少からず困難を感じたるも、大體第65表の如く纏め得たり。

第 65 表 細斑型赤色條斑×粗斑型赤色條斑に於ける F_2 成績

	赤 色 花	粗 斑 型	中 間 型	細 斑 型	地 色 花	合 計
實 驗 數	12	65	142	48	11	278
理 論 數	x	69.5	139.0	69.5	x	278

この成績を以つてすれば、條斑量の多少は一因子の差に基くものにして、之が F_2 に於ては中間遺傳をなし、大體 1:2:1 に分離す。こゝに條斑量に關與する因子對を $V-r$, $v-r$ (variegated—reduced) とす。

尙前述したるが如く、概して細斑型より紅色個體を發現する率が、粗斑型よりの夫より高率なる事實をも之を以てよく氷解し得らるべし。又之に類似したる事情がオンロイバナ (神名 1933) にても觀察されたるを見れば、或は一般條斑花の通則ならんか。

第 三 節 白 斑

白斑の遺傳に就て Rasmuson (1920) は單性的優性形質なりと報告せしも、著者の研究範圍内にては、之と反對に劣性形質にして而かも單純なるものに非ざることを知れり。著者は白斑の表現程度を強性と弱性とに區別して交配實驗に使用したり。強性とは各有色花に漏れなく極めて顯著なる白斑を多數現せるものにして、中には白斑の爲に殆ど白花の如き觀を呈するものあり。弱性は白斑の數甚だ少く一株中白斑を有するものは數花に止まり、時には只一花に一點を有する程度のものもあり。

弱性白斑花に普通花 (白斑のなき花) を交配すれば普通花となり、之を自精して得たる結果は第 66 表の交配 (1) 乃至 (4) なり。同表中交配 (5) は、強性白斑花對弱性白斑花にて得たる F_1 白斑花 (強性に近し) を自精して得たる F_2 成績なり。

第 66 表 白斑花分離に關する F_2 成績

交 配	F_1 の性状	F_2 の 分 離 成 績			
		普 通 花	白 斑 花	合 計	兩 者 の 比
(1) 普通花對白斑花	普 通 花	11	2	13	5.5:1
(2) " "	" "	138	3	141	46:1
(3) " "	" "	72	8	80	9:1
(4) " "	" "	30	3	33	10:1
合 計		251	16	267	15.7:1
(5) 強 性 白 斑 花 對弱性白斑花	白 斑 花	50	70	120	1:1.4

弱性白斑花對普通花の交配の F_2 に於ては、合計して偶然にも 15:1 に近き分離比を示したるも、個々の交配にては不可解なる變異あり。又明かに劣性形質と見るべき白斑同志の交配 (5) の結果は、 F_2 にて全部白斑花を豫想せしに殆ど同數に近き普通花を出したり。之等の事情を開明すべく、交配 (3) 及び交配 (5) に就きて F_3 を吟味したに第 67 表及第 68 表の如くなれり。

第 67 表 弱性白斑花對普通花 (3) に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	普 通 花	白 斑 花	合 計	白斑花分離率
普 通 花	30	4	34	11.8%
"	27	3	30	10.0
"	40	6	46	13.0
"	40	6	46	13.0
"	84	2	86	2.3
"	46	1	47	2.1
"	55	11	66	16.7
白 斑 花	1	6	7	85.7
"	5	13	18	72.2

本表の白斑花は總て親と同程度のものなり。

第 68 表 強性白斑花對弱性白斑花 (5) に於ける F_3 成績

F_2 の 性 狀	普 通 花	白 斑 花	合 計	白斑花分離率
普 通 花	25	30	55	54.5%
"	26	46	72	63.9
"	28	14	42	33.3
"	14	21	35	60.0
白 斑 花	0	22	22	100.0
"	0	34	34	100.0
"	1	12	13	92.3

本表の白斑花は大部分片親と同程度の強性なり。

元來白斑の模様は恰も インキ 消液を一滴落したるが如き感を與ふるものにして、その表現は極めて明瞭なるも、表現の頻度甚だしく不定にして且つ又非常に少き場合あり。極端なるものにては、遂に表現の期を失して普通花に終るものも多かるべく、殊に弱性にては生育の末期に於てかゝる場合の屢々惹起するものゝ如し。然るに又著者は、白斑とは全く無關係の系統に於て、突如一又は二花に一二白斑 (極めて明瞭に) を現はすことに遭遇せしこと稀ならざりき。かゝる白斑花を自精したるに、その次世代には全く白斑を現さざるを常とせり。

かゝる状態の下に、白斑の遺傳性狀を捕捉するは極めて至難のことに屬し、今日迄の實驗成績は次の諸事項以外に出づるを得ざりき。

- (1) 白斑は $w-b$ (white-blotched) 因子の作用に基く劣性形質にして、その表現力は極めて不確定なり。
- (2) 白斑には、少くとも強弱二型ありて、各型は夫々遺傳的なり。

第 4 節 「缺 け」

從來全く普通なりし或る系統より、その自精に依つて得たる苗の中に「缺け」(挿圖第 6 圖)と呼ばんとする畸形を發見したり。而かもその數は恰も 3:1 の劣性比に現は

第 6 圖 「缺 け」

れたること(神名 1927) 第 69 表に掲げたるが如し。

第 69 表 「缺け」の分離を示せる F_2 成績

	普 通	「缺 け」	合 計
實 驗 數	38	11	49
理 論 數	36.75	12.25	49

更に之より F_3 を吟味したる處、第 70 表の如き成績を得たり。

第70表 「缺け」の分離を示せる F_3 成績

F_2 の 性 状	系 統 数	普 通	「缺 け」	合 計	「缺け」の分離率
普 通	8	524	—	524	0.0%
	9	395	120	515	23.0
「缺 け」		—	19	19	100.0

又他の交配 (35) の F_3 を調査するに當り、こゝにも突然「缺け」に就て第71表に示せるが如き分離をなせり。

第71表 交配 (35) に於ける F_3 成績

	普 通	「缺 け」	合 計
實 驗 數	86	19	105
理 論 數	78.75	26.25	105

以上の諸成績を綜合するに、「缺け」は劣性比に従つて分離せること明かなり。元來「缺け」の特徴は子葉、本葉及び莖等の植物體に缺所を生じ、その部が白くなつて一見キメラ性斑入植物を思はしむるが如き歪を植物體各部に生ずるなり。この特徴は生育の進むにつれ一般に不明瞭となれり。植物體は稍と弱く發育の途上に枯死するもの多く、一種の病氣の如く見られるれども、前記の如く遺傳因子の作用に基くものなることは既に明かなり。かゝる例は今井博士 (1925 b) の研究に係はるアサガホに見るを得るなり。こゝに於て本形質に關與する allelomorphs を Df, df (deficient) とすれば、祖母植物の造成したる一配偶子に於て因子の轉化 ($Df \rightarrow df$) が起り、之が普通配偶子と結合して母植物を作りし爲め、このヘテロ母植物體がかゝる分離成績を與へたるものと信ぜらるゝなり。

第五節 白 子

白子の幼苗の出現に就きては、多くの植物にて觀察され、又それが劣性形質として遺傳することもその實驗例に乏しからず。1927年ホウセンクゝに於ける或る交配の F_3 にても、白子の分離せるを見たり。その成績は第72表に掲げたるが如し。

第72表 白子を分離せる F_3 成績

交 配	系 統 数	緑 色 苗	白 子 苗	合 計	白子の分離率
1	5	788	—	788	0.0%
	10	543	154	697	22.1
	理 論 數	522.8	174.2	697	25.0

交 配	系 統 數	緑 色 苗	白 子 苗	合 計	白子の分離率
2	9	792	—	792	0.0%
	13	830	261	1091	23.9
	理 論 數	818.3	272.8	1091	25.0
3	2	22	—	22	0.0
	3	238	71	309	22.9
	理 論 數	231.8	77.2	309	25.0

白子苗は絶對的の白子には非ずして多少の葉綠素を含めども、永く植物の生育を支ふるに足らず。通常發芽後二週間位にして未だ本葉を開叙するに至らざる内に枯死す。前記の成績を合計して、分離系統にては 2097 本中 486 本、即ち 23.18 % の白子を分離せり。之普通の豫期數に對し稍々寡少なれども、そは白子の幼死に基因するものにして、大略綠苗と白苗とは單性比に分離したるものと認め得るなり。又上表にて綠苗固定系統數と分離系統數との比は大體この豫期を充すに足るものと信ぜらる。

こゝに於て著者は、白子に對する allelomorphs を Al , al (albino) の因子記號を以てす。而して本實驗に於ける al の由來を考ふるに、第 72 表掲載の交配は三交配共同一母親なりしを以て、その祖母植物體に $Al \rightarrow al$ の突然變異を惹起して、交配に際しては al 配偶子が之に當りしものならんと信ぜらる。

第 六 節 石 化

ホウセンク₉には稀に石化を現はす。著者はその石化に遺傳的のものと然らざるものとを觀察したり。前者は或交配の F_3 に分離析出したる 1 本の白花個體に現はれたるものにして、その成育の初期には早くも二又、又は三又となりてその徴を現すものあれども、一般には普通植物と何等の差異を認めず、成育末期に入りて初めて莖の頂端部に帶化現象を現はし遂には顯著なる畸形を呈するに至る。斯かる石化の突然變異は約 11 年間の實驗期間中只一回之を觀察したるのみなり。後者は早くより莖の部が扁平となり、それが相當程度の帶化を結果すれども、結局は前者程の畸形に至らずして止む。著者の全實驗期間を通じてこの種の石化を前後八回觀察し、内 3 本を自精し合計 21 本の次世代を得たりしが、1 本も石化を現はさず全く非遺傳性のものなりしこと明かとなれり。然るに前者は細斑型紫色條斑種の普通種 (非石化) と交配して F_1 3 本を得たるが總て普通種となり、 F_2 を檢定したるに第 73 表の如き成績を得たり。

第73表 石化白色花×普通種紫色條斑花に於ける F_2 成績

	條 斑 種		淡 單 色 及 ビ 白 色 種		合 計
	普 通 種	石 化	普 通 種	石 化	
實 驗 數	88	25	35	11	159
理 論 數	89.4	29.9	29.9	9.8	159

本表の條斑種には紫色條斑と桃色條斑とを含み、淡單色は極めて淡き紫色花なりき。今石化に關與する因子を f (fasciated) を以て示すとすれば、この交配は $wrsf \times WRs^pF$ なりしなり。而して f は s と無關係的分離をなすものと認めらる。

第七節 結 尾

本文に取扱ひたる因子は次の16なり。

wg .....長翼咲に關與す。

pt .....八重咲に關與す。

ca .....椿咲に關與す。

p ..... R の共存により紫色花を現はす。

r ..... P の共存により赤色花を表現し、 p と共に桃色を表現し、兩優性因子の共存 (PR) にて赤紫色花を現はす。

s^v .....條斑性に關與す。

s .....條斑花の地色に關與し、 S 及び s^v と共に複對性因子を構成す ($S-s^v-s$)。

w .....白色花に關與す。

d .....花色を極淡色ならしむ。

sp .....距色を白色ならしむ。

e .....條斑花の地色を淡色ならしむ。

$v-r$ ...條斑量を少くす。

$w-b$ .....白斑性に關與す。

df .....「缺け」に關與す。

al .....白子性に關與す。

f .....石化性に關與す。

此の中 11 對の因子相互間の linkage 關係を調査し得たるを以て之を表示すれば別表の如し。即ち s, w, d の三因子を有する s リンケージ群と、 p, sp, e を含む p リ

s^v は R・P・W 又は RP の共存の下に榮養體上に於て S に轉化することに依り、夫と赤色條斑種・紫色條斑種・桃色條斑種及び赤紫色條斑種の四種を生ず。又各種條斑種の次世代に濃單色個體を混生するは、 s^v が或は生殖質に於て S 又は s に轉化することに依るならん。Demerec (1926 a, 1928 b) は *Drosophila virilis* にて, reddish-alpha が mosaic (榮養體偶變者) を出さずして偶變個體のみを出すことを觀察したり。かゝる少數の例にては、明かに gametic mutation を證明し得たりとするも、ハウセンク、その他多數の條斑型に於ける如く、榮養體突變種を混生するものにては、果して確實にそれが生殖質に惹起されたるものなりや否やは速斷を許さざるべし。

各範型の條斑種には、常に濃單色花の枝變りを生ずれども、之は榮養體上に於ける突變者なり。發生學上の所謂三組織原中、何れの部にこの突然變異が惹起さるゝかは、その枝變り、花の色調並に遺傳性の差異を決定す。この間の事情に就きては既に Correns (1910) が之を暗示し、その後小島氏 (1930) 及び木原博士 (1932) 等によりて試みられたる解剖學的所見もよく之に一致したり。最近今井博士 (1934) はアサガホの研究を基礎として之等を總括する所ありたり。ハウセンク、にありては、中組織原に於ける優性轉化を示す莖色と、外組織原のそれを表現する果實の毛茸色とを参照して各種の枝變りを對比し、よく這般の様子を外觀的に觀察するを得たり。

ハウセンク、の條斑量の多少は $V-r$, $v-r$ の作用に依るものにして、 $V-r$ に依りて條斑量の多き細斑型を生じ、 $v-r$ に依りて少き粗斑型を生ず。EYSTER (1928) は *Vervena* に於て、medium は heavy に對し、light は medium に對して夫と dominant なることを報じたるが、ハウセンク、に於ては細斑型と粗斑型とは中間遺傳をなしたり。Correns (1910) は mutability を形容する因子の存在することを述べたるも、確實なる證明を缺きたるを以て Emerson (1922) は之に疑問を附せり。然し著者のハウセンク、に於てはかゝる因子の存在すること確實なり。條斑部の大小が突然變異の時期の早晩に基因することは、先覺諸家 (Demerec 1929, 今井博士 1934) の説ける處なるが、著者の所謂細斑・粗斑の二型を比較するに、粗大の條斑は兩者殆ど共通にして、細小の點斑が前者に多く後者に少きなり。故に $V-r$, $v-r$ は植物體成育の中期頃にその作用を現はし末期に最も強く表現するものと謂ふべし。Baur (1924) は *Antirrhinum* に於て粗斑型より細斑型を生ずる事實を指摘し、それが幾個かの形容因子に依るものなることを説けり。ハウセンク、に於ては、各條斑植物體上に「少」→「多」の枝變りを最も普通狀態として觀察し得たり。

條斑種の地色に關與する諸因子は e に依りてその性能を減じ、E によりて増大し

1

5

9

15

19

2

6

11

16

20

3

7

13

17

21

4

8

14

18

22

10

12

濃色となる。又 e は發生の全期を通じて E に轉化し、この轉化は榮養體上にては通常外組織原に惹起され、稀に中組織原に起る。

上記 $v-r$ 及び e が夫々 $V-r$ 及び E に轉化せることに關する實驗成績は、尙充分ならざるが故に未だ速斷の機には非され共、若しその貧少なる結果を以て之を肯定すとせば、 $v-r$ 及び e も亦條斑種に關與する常變因子となすを得べし。(未完)