品 種 名	耐 病 性	次代に於ける耐病性の分離				遺傳組成
		強	中	弱	計	
U-18	大	52	20	3	75	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> AA Bb 或は Aa BB </div> </div>
C- 3	大	12	3	-	15	
C- 5	大	16	5	1	22	
C- 8	大	12	3	-	15	
U-15	中	72	132	14	218	Aa Bb
U- 7	小	-	1	11	12	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div>aa bb</div> </div>
U- 9	小	-	2	34	36	
U-17	小	-	1	43	44	

厚生省公衆衛生院

第 1 表

[illegible]

* **Ozaki, Y.**, Mathematische Gesetzmässigkeiten der Verteilungen der Weisheitszähne an der rechten und linken Seiten und an der oberen und unteren Kiefern.

報告者	年 代	q 値	α 値	x 値	y 値	備 考
矢野 梶	1919	43.1	1.32	2.2	4.8	山形聯隊區壯丁
千 田	1920	39.7	1.52	2.1	4.4	丸龜聯隊區壯丁
白 井	1921	58.1	0.72	1.7	3.2	臺灣生蕃タイヤル族 21 歳以上の男子
白 井	1921	54.9	0.82	1.8	4.2	同 21歳以上の女子
千 田	1926	43.3	1.35	1.6	4.0	福島聯隊區壯丁
島 峰 金 森	1926	55.2	0.81	2.2	4.6	純粹アイヌ男女
森	1931	30.0	2.37	2.4	4.8	千葉縣下男子 17 歳
森	1931	40.0	1.51	2.4	4.8	同 19 歳

(第3表の續き)

報告者	年 代	φ 値	a 値	x 値	y 値	備 考
森	1931	50.5	0.98	2.4	4.8	同 21 歳
森	1931	52.9	0.89	2.4	4.8	同 23 歳
森	1931	57.5	0.74	1.8	4.4	同 25 歳
森	1931	56.2	0.78	1.8	3.6	同 27 同
森	1931	58.5	0.71	1.8	4.2	同 30 歳
森	1931	56.9	0.75	1.8	3.6	同 33 歳
森	1931	56.1	0.79	2.2	4.0	同 36 歳
森	1931	30.7	2.26	2.4	4.8	千葉縣下女子 17 歳
森	1931	40.5	1.47	1.9	3.8	同 19 歳
森	1931	44.4	1.25	1.9	3.8	同 21 歳
森	1931	52.1	0.90	1.9	3.8	同 23 歳
森	1931	52.9	0.89	1.6	3.2	同 25 歳
森	1931	53.2	0.86	1.4	2.8	同 27 歳
森	1931	53.2	0.86	1.3	2.6	同 30 歳
森	1931	55.6	0.80	1.2	2.4	同 33 歳
森	1931	54.6	0.83	2.1	4.2	同 36 歳
齋 藤	1935	62.5	0.60	2.0	4.0	線診査 7-30 歳男女
丸 山	1936	47.5	1.10	2.4	4.8	臺灣人(福建系支那人) 19-49 歳の男子
丸 山	1936	47.5	1.10	2.4	4.8	同 19-49 歳の女子
齋 藤 尾 崎	1936 1938	44.6	1.24	2.4	4.8	本邦青年男子 満 19 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	44.8	1.13	2.4	4.8	同 満 20 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	47.6	1.10	2.4	4.8	同 満 21 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	49.3	1.03	2.4	4.8	同 満 22 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	50.8	0.97	2.4	4.8	同 満 23 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	52.4	0.91	2.4	4.8	同 満 24 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	54.9	0.82	2.4	4.8	同 満 25 歳
齋 藤 尾 崎	1936 1938	53.2	0.88	2.4	4.8	同 満 26 歳
齋 藤 尾 崎	1938	39.8	1.56	2.2	4.6	本邦青年女子 満 19-30 歳

智齒萌出頻度の平均値なる故今上顎萌出頻度を q_1 , 下顎萌出頻度を q_2 とする。従て $\frac{1-q_1}{q_1}=a_1$, $\frac{1-q_2}{q_2}=a_2$ とすれば次の如き關係となる。 $a^2=a_1a_2$ 此假定(第4假定)を前述の假定に代入する時は次の如くなる(第4表參照)。

第4表

萌 出 型		第 三 假 定	第 四 假 定
$\frac{W}{W} \frac{W}{W}$		x^2y^2	x^2y^2
$\frac{W}{W} \frac{-}{W}$	$\frac{-}{W} \frac{W}{W}$	axy	a_1xy
$\frac{W}{W} \frac{-}{-}$	$\frac{W}{-} \frac{W}{-}$	axy	a_2xy
$\frac{W}{-} \frac{W}{-}$		a^2y^2	$a_2^2y^2$
$\frac{-}{W} \frac{-}{W}$		a^2y^2	$a_1^2y^2$
$\frac{W}{-} \frac{-}{-}$	$\frac{-}{-} \frac{W}{-}$	a^2x^2	a^2x^2
$\frac{W}{-} \frac{-}{W}$	$\frac{-}{W} \frac{W}{-}$	a^2x	a^2x
$\frac{-}{-} \frac{W}{-}$	$\frac{W}{-} \frac{-}{-}$	a^3xy	$a_1a_2^2xy$
$\frac{-}{-} \frac{-}{W}$	$\frac{-}{W} \frac{-}{-}$	a^3xy	$a_1^2a_2xy$
$\frac{-}{-} \frac{-}{-}$		$a^4x^2y^2$	$a^4x^2y^2$

而して此假定により算出したる計算値は第2表に示す如く統計値に一層近似せる結果となつた。

抗 O 凝集素の遺傳に就て (次號に掲載の豫定)

古 畑 種 基

東京帝國大學醫學部法醫學教室