綜 合 抄 録

スゲ属の細胞學的研究

田 中 信 徳

東京帝國大學理學部植物學教室

(TANAKA, N. Cytological studies in the genus *Carex*. A collective review).

昭和 13 年 12 月 30 日受領

緒言 カヤツリグサ科 Cyperaceae は細胞學的には被子植物中特異な地位を占むるものとして注目されて來た科で細胞學的研究も相當古くよりなされて居り現今では 9 属 180 餘種に及んでゐるが未だ解決されぬ多くの問題が残されてゐる。就中花粉粒發育と染色體の異數性とは最も注目されるべきものであらう。花粉粒發育の研究は先づ最初にかヤツリグサ科を細胞學的に特徴づけたもので *Helcocharis paluster* (ヌマハリキ) に於て Elfving 1879, Strasburger 1884 によつてなされた。その後スゲ属にては Juel 1900, Stout 1912, Heilborn 1918, 1922 の研究, *Scirpus* 属に於ては Piech 1924, 1928 a, b の研究が報告せられ、カヤツリグサ科の花粉粒發育は被子植物中全く獨特の經過を迎ることが知られるに至つた。即ち、被子植物では一般に 1 個の花粉母細胞から減數第一、第二分裂によつて 4 個の花粉粒が出来るのであるが、カヤツリグサ科では 2 回の分裂の結果出来る 4 核の中 1 個だけが生き残り、他の 3 核は退化し結局 1 個の花粉母細胞からは 1 個の花粉粒しか出来ぬのである。染色體の異數性は先づ *Carex* 属に就いて Heilborn 1922, 1924 によつて研究され、その後 *Cyperus* 属に於て Hicks 1929, Tanaka 1937, 等、*Scirpus* 属に於ては Hicks 1928, Håkansson 1928, Tanaka 1937 等の研究により被子植物中他の科及び属、例へば Antirrhineae, Orchidaceae 等; *Primula* 属、*Viola* 属等に於て見られる異數性とは異なる事が知られた。即ち、一般の場合には異數性は倍數性と混在するか、或ひは一見異數性と見えるものでも實は異つた染色體基數を有する倍數系が混在してゐるものとか、或は又是等の組合さつた場合であり、何れにしても倍數性に附隨して存在してゐるのであるがカヤツリグサ科の場合は全く倍數性を含まぬ點で獨特なものとされて來た。此著しい異數性の原因に就ては種々の説があるがその解決は將來に残されてゐる。次にも一つカヤツリグサ科の特徴として挙げられる事柄は有絲核分裂時に於る紡錘絲形成が bipolar でなく所謂 'diarch-apolar' と稱せられる型の固定像を示すことである。例外は Hicks 1929 の研究した *Helcocharis obtusa* (Willd.) Schutes のみである。カヤツリグサ科は以上の様に細胞學的には研究さるべき多くの問題を残してゐるのであるが、染色體が一般に小形であつて觀察に餘り便利でない上、多くの場合花穂は珪酸類を含み普通のパラフィン切片法ではプレパラートを作り難いといふ方法的困難の爲にその研究が阻害されて來た。

筆者も最近 カヤツリグサ科の研究を始め多少の資料を得たので從來の結果に自分の結果を加へて簡単に述べる事とする。本文に於ては先づ *Carex* 属のみに就て、それも主として染色體の異數性に就て述べようと思ふ。

Carex 属の細胞學的研究は Juel 1900 の *Carex acuta* L. (= *C. gracilis* Curt.) の研究に始まる。

1. **花粉粒發育：**花粉粒發育に關しては Juel 1900, Stout 1912, Heilborn 1918, 1922 の研究により *Carex* 屬に於ても *Heleocharis* 屬の場合と同様の経過を迎る事が知られた。即ち 1 個の花粉母細胞は 2 回の核分裂をして 4 核となる。Juel 1900, Stout 1912 によつて第一分裂が異型、第二分裂が均等分裂なることが知られた。此 4 つの核は形態的には區別出來ぬが、この内 1 核のみが生き残り他は退化する。若い葯を輪切にして觀ると數個の花粉母細胞が一行に同心的に排列して居り個々の細胞は外に面した方が大きく扇形を呈してゐる。減數第一分裂軸は細胞の長軸に平行又は垂直、或は多少づつ傾斜してゐる。第二分裂は概して長軸に垂直に或は多少傾いて行はれ、生じた 4 核の内細胞の最外側の 1 核が生き残り、他の 3 核は細胞の内方隅に押しやられて段々退化する。生き残るべき 1 核は非常に急速に肥大し始め、やがて核分裂をして精核と營養核となる。營養核は細胞の外方に位し球形で大きい、精核は凸凹レンズ型をなしてゐる。初め楔形をしてゐた花粉母細胞は第二分裂が終り各細胞が遊離してしまふと段々丸味を及びて來て、遂には球形の成熟花粉となる。ここで問題となるのは (a) 4 分核の間に何か仕切りが出来るかどうか、(b) 退化する 3 核の運命、(c) 如何なる原因で 3 核が退化するか等の問題である。先づ (a) に就ては Juel 1900 は *Carex acuta* で四分核の間に薄い plasmatische Zellwandung があると云ひ、Stout 1912 は初期には Zellplatten はないが、暫くすると生き残つた核と他の 3 核との間に plasmatische Membrane が出來ると云ふてゐる。此點に就ては他の屬 (*Scirpus*) では Kallose よりなる膜で完全に境されることが解つてゐるものもあるが (Piech 1924), *Carex* では未だ確定されてゐない。(b) にも關しても種々考へられた。Elfving 1879, Strasburger 1884 は 3 核が吸収されるものと考へたが、Wille 1886 は 3 核は大なる 1 核と融合するものと考へた。*Carex* では Juel 1900 は 3 核は尙分裂をする能力を有するが、狭い隅に入つて、その爲退化するものとし、Stout 1912 は *Carex aquatilis* で退化すべき核が尙分裂を始めたことを報告した。(c) に就て Heilborn 1918 は花粉母細胞が獨特の楔形をなしてゐる爲に生ずる壓力に依つて退化が起るとした。Suessenguth 1921 も退化の原因を花粉母細胞の不規則なプリズム形に歸してゐるが、恐らくは羊齒植物の大孢子形成、顯花植物の胚原細胞に於て分裂の結果出來た 4 細胞の中 3 細胞が退化する場合と同様に主として營養的原因に歸すべきものではあるまいか。カヤツリグサ科に於ては periplasmodium がない故花粉粒はタペート層だけから營養分を攝る譯であるから、その營養分の大部分は最も外側の核のみが受取り、他の 3 核は養分を受けとる量が少く段々壓迫されて退化するのであらう。

2. **染色體の形狀：***Carex* 屬の染色體は一般に小形で核型分析は困難であり、今までの研究は主として花粉母細胞の分裂に就てなされてゐるが、筆者が根端細胞で調査した所によれば $2n=62$ 以上の染色體數を有する種類の染色體はコロコロした球狀で大さは大體直径 $0.2\mu\sim0.6\mu$ 位、 $2n=34$ から $2n=50$ 程度のもものでは球狀乃至橢圓體をなし形は多少大きくなり、長徑 $0.9\mu\sim1.5\mu$ 位、最小の染色體數を有する $2n=12$ のタガネサウ (*Carex siderosticta*) に於ても最長 $4.5\mu\sim5\mu$ 程度で、此場合には染色體は細長い形を示す。Sat-染色體は今まで報告されて居ないが、筆者の調べた材料では *Carex siderosticta* Hance, *C. lasiolepis* Franch., *C. oxyandra* Kudo, *C. japonica* Thunb., *C. satsumensis* Franch. et Savat. で觀察された。染色體數の少い數種の核型は次の如く決定された。

C. siderosticta Hance $n=6=1L^I+3L+2S$

$L=94.95\pm2.02$ ($\sigma=\pm11.4$), $S=58.45\pm1.63$ ($\sigma=\pm6.51$). 但し 100 は 3.18μ に當る。

C. lasiolepis Franch. $n=8=1L^I+2L+5S$

$L=95.11 \pm 0.77$ ($\sigma = \pm 7.33$). $S=51.52 \pm 0.50$ ($\sigma = \pm 6.13$). 但し 100 は 2.58μ に當る。

C. oxyandra Kudo $n=9=1L^t+2L+4M+2S$

$L=99.83 \pm 0.95$ ($\sigma = \pm 6.63$). $M=73.50 \pm 0.21$ ($\sigma = \pm 7.56$). $S=49.31 \pm 1.97$ ($\sigma = \pm 6.976$). 但し 100 は 3.27μ に當る。

C. Reinii Franch. et Savat. $n=13=2L+7M+4S$

$L=98.93 \pm 2.31$ ($\sigma = \pm 8.0$). $M=62.35 \pm 1.21$ ($\sigma = \pm 7.83$). $S=39.1 \pm 1.21$ ($\sigma = \pm 5.93$). 但し 100 は 2.42μ に當る。

C. satsumensis Franch. et Savat. $n=19=1M^t+9M+9S$

$M=100.93 \pm 3.02$ ($\sigma = \pm 15.53$). $S=42.31 \pm 0.85$ ($\sigma = \pm 8.13$). 但し 100 は 1.59μ に當る。

Heilborn 1924 は花粉母細胞に就て染色體数の少ない *C. pilulifera* ($n=9$), *C. panicea* ($n=16$), *C. ericetorum* ($n=15$) の 3 種の染色體の大きさを大 (A), 中 (B), 小 (C) の 3 階級に分けて測定して夫々 $n=9=3A+4B+2C$; $n=16=3A+2B+11C$; 及び $n=15=1B+14C$ と決定した。染色體の大きさと進化との関係は後に述べることにする。

3. 染色體数の變異: *Carex* 屬の染色體数は Juel 1900, Stout 1912, Heilborn 1918, 1922, 1924, 1925, 1932, 1937, Clausen, Wulff 1933, Vuckovic 1928, Nakajima 1937, Tanaka 1937, 1938 によつて報告せられ, 現在 102 種, 3 變種知られてゐる (第 1 表)。既述の如く著しい異數性を示し半數で 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 から 43 までの凡ての數, 及び 54, 56 の 33 通りある。

第 1 表 List of the chromosome numbers in the genus *Carex* L.

植 物 名	染色體數 n $2n$	著者名	植 物 名	染色體數 n $2n$	著者名
Subgenus Primocarex Kükenth.			<i>C. gibba</i> Wahlenb.	$\begin{Bmatrix} 17 & 34 \\ 18 & 36 \end{Bmatrix}$	Tanaka '38
Sect. Microcephalae Th. Holm.			(マスケサ)		
<i>C. capitata</i> Soland.	25	Heilborn '28	Sect. Elongatae Kunth		
Sect. Petraeae O. F. Lang			<i>C. remota</i> L.	31	Heilborn '28
<i>C. rupestris</i> All.	25	Heilborn '24	<i>C. elongata</i> L.	ca. 28	„ '24
Subgenus Vignea Nees			<i>C. Rochebruni</i> Franch.	32 64	Tanaka '38
Sect. Muehlenbergianae Tuckerm.			et Savat. (ヤブスゲ)		
<i>C. contigua</i> Hoppe	ca. 29	Heilborn '24	Sect. Ouales Kunth		
<i>C. divulsa</i> Good.	29	„ „	<i>C. Maackii</i> Maxim.	34	Tanaka '37
Sect. Stenorhynchae Th. Holm.			(ヤガミスゲ)		
<i>C. vulpina</i> L.	34	Heilborn '24	Sect. Heleonastes Kunth		
<i>C. conferta</i> Hochst.	26	„ '28	<i>C. canescens</i> L.	28	Heilborn '24
<i>C. crus-corvi</i> Shuttl.	26	„ „	(ハクサンスゲ)		
Sect. Dioicae Tuckerm.			<i>C. loliacea</i> L.	27	„ '28
<i>C. dioica</i> L.	26	Heilborn '24	(アカンスゲ)		
<i>C. Davalliana</i> Smith	23	„ '37	<i>C. tenuiflora</i> Wahlenb.	31 (32)	„ „
Sect. Arenariae Kunth			(イツボンスゲ)		
<i>C. arenaria</i>	30-32	Wulff '33	Subgenus Eucarex Coss. et Germ.		
<i>C. intermedia</i> Good.	ca. 31	Heilborn '24	Sect. Acutae Fries		
Sect. Multiflorae Kunth			<i>C. rigida</i> Good.	35	Heilborn '24
<i>C. neurocarpa</i> Maxim.	54	Tanaka '37	(= <i>C. concolor</i> R. Br)		
(ミコシガヤ)			(オハゲロスゲ)		
<i>C. stipata</i> Mühlent.	48	„ '38	<i>C. aquitilis</i> Wahlenb.	ca. 37	„ „
(オホカハズスゲ)			(クロアゼスゲ)		
Sect. Paniculatae Kunth			—————	ca. 37	Stout '12
<i>C. paradoxa</i> Willd.	32	Heilborn '24	—————	> 40	Vuckovic '28
Sect. Macrocephalae Kükenth.			<i>C. Goodenoughii</i> Gay	42	Heilborn '24
<i>C. kobomugi</i> Ohwi	84	Tanaka '38	„ var. <i>junceae</i> Fries	ca. 42	
(コウボウムギ)			<i>C. gracilis</i> Curt.	ca. 52	Juel '00
Sect. Gibbae Kükenth.			(= <i>C. acuta</i> L.)		

植 物 名	染色體數 n 2n	著者名	植 物 名	染色體數 n 2n	著者名
-----	42	Heilborn '24	<i>C. insanae</i> Koidz. var.	50	Tanaka '38
<i>C. caespitosa</i> L.	40	" "	<i>papillatculmis</i> Ohwi		
(カブスゲ)			(アヲバスゲ)		
<i>C. Hudsonii</i> A. Benn.	40	" "	Sect. Digitatae Fries		
(× <i>Goodenoughii</i> Gay?)			<i>C. digitata</i> L.	26	Heilborn '24
<i>C. salina</i> Wahlenb. var.			<i>C. ornithopoda</i> Willd.	ca. 23	" "
<i>kategatensis</i> (Fr.) Almq.	42	" "	<i>C. lasiolepis</i> Franch.	8 16	Tanaka '38
<i>C. incisa</i> Boott	68	Tanaka '38	(アヅマスゲ)		
(カハラスゲ)			Sect. Grallatoriae Kükenth.		
<i>C. Thunbergii</i> Steud	78	" "	<i>C. grallatoria</i> Maxim.	9	Nakajima '37
(アセスゲ)			" var. <i>heteroclita</i>	18	Tanaka '38
<i>C. Maximowiczii</i> Miq	74	" "	Kükenth. et Matsum.		
(ガウソ)			(サナギスゲ)		
<i>C. kiotensis</i> Franch. et	74	" "	Sect. Montanae Fries		
Savat. (テキリスゲ)			<i>C. ericetorum</i> Poll.	15	Heilborn '24
<i>C. stricta</i> Lam.	39	Clausen	<i>C. montana</i> L.	19	" "
Sect. Atratae Kunth			<i>C. oxyandra</i> Kudo	9 18	Tanaka '38
<i>C. alpina</i> Swartz.	28	Heilborn '24	(ヒマスゲ)		
<i>C. atrata</i> L.	27	Heilborn '24	<i>C. pilulifera</i> L.	9	Heilborn '24
(クロボスゲ)			Sect. Limosae Tuckerm.		
<i>C. Buxbaumii</i> Wahlenb. ca.	37	" "	<i>C. magellanica</i> Lam.	29	Heilborn '28
(タルマイスゲ)			Sect. Paniceae Tuckerm.		
<i>C. curvicolis</i> Franch. et	28	Tanaka '38	<i>C. sparsiflora</i> Steud.	16	Heilborn '22
Savat. (ナルコスゲ)			<i>C. panicea</i> L.	16	Heilborn '24
<i>C. Tolmiei</i> var. <i>denticulata</i>	62	" "	<i>C. macroglosa</i> Franch. et	50	Tanaka '38
Ohwi (ミヤマクロボスゲ)			Savat. (ムギスゲ)		
Sect. Fuliginosae Tuckerm.			Sect. Siderostictae Franch.		
<i>C. atrofusa</i> Schkuhr	18	Heilborn '28	<i>C. siderostica</i> Hance	12 12	Tanaka '38
Sect. Ferrugineae Tuckerm.			(タガネサウ)	24	
<i>C. stenantha</i> Franch. et	68	Tanaka '38	Sect. Ischnostachyae Ohwi		
Savat. (イハスゲ)			<i>C. ischnostachya</i> Steud.	62	Tanaka '38
Sect. Decoraе Kükenth.			(ジュズスゲ)		
<i>C. Reinii</i> Franch. et Savat.	26	Tanaka '38	Sect. Capitellatae Meinsh.		
(コカンスゲ)			<i>C. hakonensis</i> Franch. et	62	Tanaka '38
Sect. Praecoces Christ.			Savat. (コハリスゲ)		
Subsect. Mitratae (Kükenth.) Ohwi			Sect. Rhizopodae Ohwi		
<i>C. caryophyllea</i> Latourr.	31	Heilborn '24	<i>C. rhizopoda</i> Maxim.	64	Tanaka '38
<i>C. nerrata</i> Franch. et Savat.	76	Tanaka '38	(シラコスゲ)		
(シバスゲ)			Sect. Capillares Aschers. et Graebn.		
<i>C. breviculmis</i> R.Br.	34 64	" "	<i>C. capillaris</i> L.	27	Heilborn '24
(アヲスゲ)			(タカネシバスゲ)		
<i>C. clivorum</i> Ohwi	76	" "	Sect. Molliculae Ohwi		
(ヤマオホイトスゲ)			<i>C. japonica</i> Thunb.	62	Tanaka '38
<i>C. alterniflora</i> Franch.	76	" "	(ヒゴクサ)		
(オホイトスゲ)			<i>C. Doniana</i> Spreng.	31	" '37
<i>C. Duraliana</i> Franch. et Savat.	76	" "	<i>C. planiculmis</i> Komar.	62	" '38
(ケスゲ)			(ヒカゲシラスゲ)		
<i>C. conica</i> Boott	34	" "	Sect. Pacificae Ohwi		
(ヒメカンスゲ)	35	" "	<i>C. satsumensis</i> Franch. et	19 38	Tanaka '37, '38
	38	" "	Savat. (アブラシバ)		
<i>C. Morrowii</i> Boott	38	" "	Sect. Graciles Tuckerm.		
(カンスゲ)			<i>C. brunnea</i> Thunb. var.	62	Tanaka '38
<i>C. multifolia</i> (ミヤマカンスゲ)	30	" "	Nakiri Ohwi (ナキリスゲ)		
Sect. Rhomboidales Kükenth.			Sect. Hymenochlaenae Drejer		
<i>C. Boottiana</i> Hook. et Arn.	31+1f, 62	Tanaka '38	<i>C. silvatica</i> Huas.	29	Heilborn '28
(イソスゲ)					

植 物 名	染色體數 n $2n$	著者名	植 物 名	染色體數 n $2n$	著者名
Sect. Confertiflorae Franch.			<i>C. Dickinsonii</i> Franch. et Savat.	64	Tanaka '38
<i>C. Idzuroei</i> Franch. et Savat.	58	Tanaka '38	(オニスゲ)		
Sect. Dispalatae Ohwi			Sect. Hirtae Tuckerm.		
<i>C. dispalata</i> Boott	78	Tanaka '38	<i>C. hirta</i> L.	56	Heilborn '24
(カサスゲ)			Sect. Spirostachyae Drejer		
Sect. Paludosae Fries			<i>C. punctata</i> Gaud.	34	Heilborn '24
<i>C. pumila</i> Thunb.	41	82 Tanaka '37, '38	<i>C. distans</i> L.	37	" "
(コウボウシバ)			<i>C. Hornschuchiana</i> Hoppe	28	" "
<i>C. riparia</i> Curt.	36	Heilborn '24	<i>C. Oederi</i> Hoffm.	35	" "
Sect. Lupulinae Tuckerm.			<i>C. lepidocarpa</i> Tausch.	34	" "
<i>C. Grayi</i> Carey	26	Heilborn '24	<i>C. pulchella</i> Lönner	35	" '28
Sect. Pseudo-cyperae Tuckerm.			<i>C. Hornschuchiana</i>	34-40	" "
<i>C. pseudo-cyperus</i> L.	33	Heilborn '24	× <i>Oederi</i>		
Sect. Physocarpae Drejer			<i>C. flava</i> L.	33	" '24
<i>C. rostrata</i> Stokes	38	Heilborn '24	× <i>Hornschuchiana</i>		
<i>C. vesicaria</i> L.	41	" "	Sect. Trachychlaenae Drejer		
<i>C. saxatilis</i> L.	40 (41 ?)	" '28	<i>C. glauca</i> Murr.	38	Heilborn '24
<i>C. laevirostris</i> Franch.	41	" "	Sect. Pachystylae Kükenth.		
			<i>C. pallescens</i> L.	32	Heilborn '24
			<i>C. tomentosa</i> L.	24	" "

第 1 表中 Sect. Dioicae より Sect. Hirtae までは Ohwi 氏の分類により、その他は Kükenthal 氏の分類に依つた。各 Sect. 中に於ても染色體數は著しい異數性を示してゐるが、一般に各 Sect. 中に於ては略連續數をなして居り Sect. 中の一種の染色體數が判れば大體その Sect. に屬する種類の染色體數は推測することが出来る。例へば Sect. Heleonastes では $n=27, 28, 31$; Sect. Acutae では $n=34, 35, \text{ca } 37, 37, 37, 39, 39, 40, 40, \text{ca } 42, 42, 42, 42$; Sect. Spirostachyae では $n=28, 33, 34, 34, 35, 35, 37$; 等である。染色體數別の頻度は第 2 表の如くで倍數性に對

第 2 表

染色體數 (半數) n	6	8	9	12	13	15	16	17	18	19	23	24	25	26	27		
頻度 (種類の數)	1	1	3	1	1	1	2	2	2	4	3	2	4	5	3		
染色體數 (半數) n	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	54	59
頻度 (種類の數)	5	5	1	12	5	1	8	3	1	5	6	3	3	3	5	1	1

する有力な指示を示しはしない。Sect. Molliculae 等では $n=31, 31, 31$ で一定してゐる。Subsect. Mitratae では $n=15, 17, 35/2, 19, 19, 31, 31, 34, 38, 38, 38$ で倍數性の存在する形跡がある。次に intraspecific の異數體は少數知られてゐる。即ち *C. gibba* (マスクサ) $2n=34$ 及び 36; *C. breviculmis* (アラスゲ) $n=34$ 及び $2n=62$; *C. conica* (ヒメカンスゲ) $2n=34, 35$ 及び 38; *C. siderosticta* (タガネサウ) $2n=12$ 及び 24 等である。Heilborn も *Carex* に intraspecific の異數體が存在するのではないかと考へて、*C. sparsiflora*, *C. gracilis*, *C. atrata*, *C. lepidocarpa* に就て諸處の材料を研究したがさうゆうものはなかつた。*C. gibba* (マスクサ) では東京附近にて採集せる多くの材料の内只一個體のみが $2n=34$ で他は凡べて $2n=36$ であつた。その後方々のものを調べた處 $2n=34$ のものが普通で $2n=36$ のものは最初東京近郊で得た 10 個體だけであつた。*C. breviculmis* (アラスゲ) は多型であつて様々であるが、房州清澄

山にて採集したものは花粉母細胞の減数分裂で 34 個の染色體が數へられ、伊豆網代附近にて採集したものは根端細胞で $2n=62$ であつた。*C. conica* (ヒメカンスゲ) も外形的に非常に小さくて弱々しいものから非常に大形でコカンスゲに似た様な丈夫なものまであつたが、清澄山にて採集した小形の *conica* は $2n=34$ で減数分裂は正常で I-M で 17II の染色體が見られた。矢張り同處にて採集した大形のもの $2n=38$ で減数分裂は不規則であつた (減数分裂の不規則の項参照)。武蔵伊豆岳にて採集した *conica* には $2n=34, 35$, 及び 38 のものがあつた。*C. siderosticta* (タガネサウ) は最初日光にて採集した材料で調べた所 $2n=24$ であり減数分裂では $n=9$ のもの、 $n=10, 11$, 或は 12 のものも見られたが、材料の不足から充分の研究をすることが出来なかつたのであるが、その後伊豆岳、八ヶ岳、金時山 (箱根)、明神岳 (箱根)、松原湖畔等で採集して研究した所、伊豆岳にて採集したものを除いて他は凡て $2n=24$, 伊豆岳のもの 16 個體は凡て $2n=12$, で二倍性、その他のものは四倍性であることが知られた。

4. 減数分裂に於ける異常: *Carex* 属の如く著しい染色體の異数性の見られる属に於ては正しい染色體数の決定は最も緊要である。この點に於て從來の花粉母細胞のみの研究は不備である。而も染色體が見難いことは Heilborn が 1918 年に 5 種類の *Carex* (*pilulifera* ($n=8 \rightarrow 9$), *ericetorum* ($n=16 \rightarrow 15$), *digitata* ($n=24 \rightarrow 26$), *caryophyllea* ($n=32 \rightarrow 31$), *flava* ($n=32 \rightarrow 35$)) の染色體数を報告したが皆間違つて居り 1922 年に→の如く訂正された事によつても窺ひ知ることが出来る。減数分裂が全く正常であれば根端細胞を調べなくとも正しい染色體数を定めることが出来るが、多少でも不規則がある場合は注意を要する。又一面自由に人工的に種間或は種内雜種をつくる事が出来る、その減数分裂に於ける染色體の行動を研究することが出来れば、本属の異常な異数性の生じた原因の解決に光明を與へ、延いては新種或は新品種等の形成に寄與することが出来る譯である。Heilborn 1924 はこの見地から次の諸種に於て減数分裂の異常を見てゐる。*C. pilulifera* ($n=9$) では $n=18$ (diploid) の染色體数を有する花粉を見た。かかる diploid のものが如何にして生じたか、或は又新形成に對して何が重要な役割をなすものかどうかはわからなかつた。*C. panicea* ($n=16$) では觀察された 36 花粉母細胞中 1 細胞で 17 個の染色體が數へられた。即ち $16=3A+2B+11C$ の代りに $17=4A+2B+11C$ で A が一組接合しなかつたものである。此場合一價の A は I-M で縦裂して $n=17$ の花粉が出来る様である。*C. sparsiflora* ($n=16$) の花粉母細胞では $n=15$ のものが非常に多數觀察され $n=16$ のものが少數觀察されたが、後に $n=16$ が正しい數とされた。 $n=15$ の場合には小染色體が他に附着してゐたのである。*C. glauca* ($n=38$) では $n=33, 34, 35, 36, 37, 38$ と色々の數があつたが四價染色體が出来る爲に數が色々と變化するので後に (1932) 本種は同質四倍性とされた。之が *Carex* 属で倍数性を見付かつた最初である。*C. montana* ($n=19$) の 23 個の PMCs の中 1 個は $n=20$ であつた。是は接合の缺除或は染色體の分斷と解釋された。*C. Goodenoughii* ($n=42$) の 19 個の PMCs の中 1 個は $n=43$ であつた。次に簡単に筆者の得た資料を述べよう。*C. Rochebruni* (ヤブスゲ) は $2n=64$ であるが、PMCs では四價染色體が一個あつたりなかつたりで $n=31$ 或は $n=32$ であつた。此四價染色體は鎖狀又は環狀であつた。*C. gibba* (マスカサ) の $2n=34$ のものでは 162 PMCs の中 $n=18$ のもの 1; $n=17$ のもの 155; $n=16$ のもの 4; $n=15$ のもの 2 で割合に不規則であつた。 $2n=36$ のものでは 194 PMCs 中 $n=19$ のもの 7; $n=18$ のもの 187 で前者より不規則の程度は少なかつた。 $2n=36$ の花粉粒分裂で調査した結果は 36 細胞中 33 細胞は 18 個の染色體を有し残りの 3 細胞が 17 個の染色體を有した。*C. grallatoria* Maxim. var.

heteroclita (サナギスゲ) は $2n=18$ で減数分裂では $n=9$ から 16 まであつた。即ち 149 PMCs 中 $n=9\cdots 1$; $n=16\cdots 4$; $n=11\cdots 10$; $n=12\cdots 11$; $n=13\cdots 41$; $n=14\cdots 40$; $n=15\cdots 29$; $n=16\cdots 13$ といふ様にかんりの變異があつた。然し、今までの材料では凡て $2n=18$ であつてその他の染色體數を有するものは見られてゐない。*C. conica* (ヒメカンスゲ) は $2n=34$ が正常らしく $2n=38$ のものの 51 PMCs を調べた結果は $n=15$ から 20 までの變異があつた: $n=15\cdots 3$; $n=17\cdots 11$; $n=18\cdots 16$; $n=19\cdots 16$; $n=20\cdots 4$ 。*C. siderosticta* では記述の如く $2n=12$ と $2n=24$ のものがあり前者は二倍性後者は四倍性であつたが、この四倍性の 673 PMCs で研究した結果 I-M で $n=5\cdots 3$; $n=6\cdots 24$; $n=7\cdots 65$; $n=8\cdots 155$; $n=9\cdots 163$; $n=10\cdots 151$; $n=11\cdots 78$; $n=12\cdots 32$; $n=13\cdots 1$: 尙この外 $n=17$ で二倍性の PMC が 1 個觀察されたが、是等の染色體の結合状態から本種は同質四倍性と考へられる。*C. Boottiana* (イソスゲ) の花粉母細胞分裂では染色體斷片が 1 個あるが詳しくは未だ調べられて居ない。

5. 染色體數と種分類學的位: 生物界を通じて(a)種の染色體數は一定であり、(b)種を分類學的に排列する時はそれらの染色體數も又何らかの數的關係を有するものであるが、*Carex* 屬ではどうであらうか。先の第 1 表から Sect. 別に既に知られた染色體數(半數)を集めて見る(2 種以上調らばれた Sect. のみ)と次の如くなる。

Sect. Muchlenbergiana	ca. 29, 29.	Subsect. Mitratae	15, 17, 17, 35/2, 19.
„ Stenorrhynchae	26, 26, 34.		19, 31, 31, 34, 38, 38, 38, 38.
„ Dioicae	23, 26.	Sect. Rhomboidales	25, 31 (31+1f)
„ Multiflorae	24, 54.	„ Digitatae	16, ca. 23, 26.
„ Gibbae	17, 18.	„ Montanae	9, 9, 15, 19.
„ Elongatae	ca. 28, 31, 32.	„ Paniceae	16, 16, 25.
„ Heleonastes	27, 28, 31.	„ Siderostictae	6, 12.
„ Acutae	ca. 34, 35, ca. 37, 37, 37, 39,	„ Molliculae	31, 31, 31.
	39, 40, 40, ca. 42, 42, 42, 42.	„ Paludosae	36, 41.
„ Atratae	27, 28, 27, 31, ca. 37.	„ Physocarpae	32, 38, 40, 41, 41.
„ Praecoces		„ Spirostachyae	28, 34, 34, 35, 35, 37.
		„ Pachystylae	24, 32.

(a) に對しては (3) の項で述べた如く大多數の種に於ては一定である。(b) に對しては同一 Sect. に屬する種は略同じ染色體數を有することが判るが、飛びはなれた數もないことはない。一般に同一 Sect. 内に於ても染色體數の變異は少しづゝづつてゐるのが特徴であるが、*Siderosticta* の 6, 12; *Praecoces* の 19, 38 は倍數關係をなすものであり、前者は核型上真正倍數性と認められるものである。即ち分類學的に近い種は略等しい染色體數を有することが言へる。

6. *Carex* 屬に於ける染色體數の起原: *Carex* 屬を通じて今までに研究された種凡ての染色體數は表 2 に集められたが、それによつて直接倍數性の存在を知るとは記述の如く不可能であつたが、倍數性をなすものもあるにはあつた。然しそれはほんの一小部分でしかない。今比較的染色體數の少ないものを撰んで染色體の大 (A), 中 (B), 小 (C) で表はすと:

<i>Carex siderosticta</i>	4A+2B	 ⁿ 6	<i>Carex ericetorum</i>	1B+14C	 ⁿ 15
„ <i>lasiolepis</i>	3A+5B	8	„ <i>panicea</i>	3A+2B+11C	16
„ <i>oxyandra</i>	3A+4B+2C	9	„ <i>sparsiflora</i>	2A+14 (ca. 4B+10C)	16
„ <i>pilulifera</i>	3A+4B+2C	9	„ <i>montana</i>	2 (B?) + 17C	19
„ <i>Reinii</i>	2A+7B+4C	13	„ <i>satsumensis</i>	10B+9C	19

此中 *C. oxyandra*, *pilulifera*, *Reinii*, *panicea* に於ては $A=B+C$ なる關係がある。所が *panicea* と *sparsiflora* とか、*montana* と *satsumensis* 等は共に $n=16$ 或は $n=19$ でありなが

ら、その組成が異なり、 n が倍になつてもその構成が同じ比で倍数になつてゐなければ倍数性に合致するものでないから、一般に *Carex* 属には倍数性はないと言ふてよからう。然らば如何にしてかゝる著しい染色体数列が出来るといつたか。Heilborn 1924, 1925 は *Carex* 属に於ては少い染色体数のものが原始的であり、それから染色体の漸進的變化によつて段々染色体数の多いものが生じたと考へた。この漸進的變化は1個の染色体の重複及び染色体の横斷によつて染色体数の多いものは、それに最も近い染色体数の少い種から由來したとした。前者による増加は減数分裂に於ける不規則、特に接合の缺除によるものとした。

7. *Carex* の雑種、種子の發芽：Heilborn 1928 は *Carex* の交雑を試みたが不成功に終つたので自然雑種を採集してその減数分裂を調べた。*Carex* の交雑は割方六ヶ敷く筆者も多數の交雑を行つてゐるが、未だ報告する迄に到つてゐない。Heilborn の獲た材料は *C. Hornschuchiana* ($n=28$) $\times$ *Oederi* ($n=35$) で形態は両親の中間で減数分裂では I-M で 34-40 個の染色体が見られ、一價染色体は普通 5-8 個在つた。分裂は凡て非常に正常であつた。一價染色体は I-M で縦裂する様である。不幸にして II-M 及び花粉に於ける染色体数は調べられてゐない。故に減数分裂に何かの不規則の爲に生ずる一價染色体の行動が、*Carex* の異数性の解決に何等かの光を與へるだらうとの推測は立證せられなかつた。*Carex* の交雑では外觀正常な種子が得られても發芽しないものが多く、Heilborn 1925 は種子が發芽する爲には一定の休眠期間が必要であるとて次の如き實驗結果を報告した。*C. caryophyllea*, *ericetorum*, *pilulifera* の種子は 2½ヶ月の休眠では全然發芽せぬ。16ヶ月後では *caryophyllea* で 29% 發芽 20ヶ月後は 2.0%; *ericetorum* は 20ヶ月後で 1%, *C. pilulifera*, *C. pallescens* は 20ヶ月後でも 0%; 所が一方 *C. digitata* 等は 2½ヶ月後で 86%; 20ヶ月後では 28% に下がつてゐる。

8. 系統：Heilborn は上述 (6) の建前から *Eucarex* のみについて系統を論じてゐるが、染色体数の少ないものから段々多いものへ；*Siderostictae* $\rightarrow$ *Montanae* $\rightarrow$ *Panicaceae* $\rightarrow$ *Atratae* $\rightarrow$ *Acutae* となつたものであらう。*Acutae* の *distigma* の形質は *tristigma* よりおくれたものとしてゐる。單子葉植物の三心皮性を基礎として。又若し染色体の大きさの差の多少を考慮に入れると *Siderostactae* $\rightarrow$ *Montanae* $\rightarrow$ *Panicaceae* $\rightarrow$ *Trachychlaenae* $\rightarrow$ *Atratae* $\rightarrow$ *Acutae* となる。*Pseudo-cypereae*, *Physocarpaceae*, *Paludosae*, *Hirtae* 等は最も新らしい Sect. であらう。Subgenus *Vignea* は *Eucarex* よりも分類學的に安定とされてゐるが、細胞學的にも割合安定してゐる。

以上 *Carex* 属を染色体を中心として述べたのであるが、今日まで研究された 100 餘種の中、2 種は同質四倍性であり *Carex* 属にも倍数體の存在が確認された。又 Subsect. *Mitratae* には倍数性が存在する様である。又筆者の交雑實驗より在來の異数性に對する新見も得られ相である。減数分裂のみを主とした *Carex* 属の研究も根端細胞の研究を加へて行く時、もつと適當な異数性への理解が得られる事と信ずる。

文 献

- Elfving, F. 1879. Studien über die Pollenkörner der Angiospermen. Jena. Zeits. Natwiss. 13: 1-28.
Håkansson, A. 1927-1928. Die Chromosomen einiger Scirpoideen. Hereditas 10: 277-292.

- Heilborn, D. 1918. Zur Embryologie und Zytologie einiger *Carex*-Arten. Sv. Bot. Tids. **12**: 212-220.
- 1922. Die Chromosomenzahlen der Gattung *Carex* (Vorläufige Mitteilung). ib. **16**: 271-274.
- 1924. Chromosome numbers and dimensions, species-formation and phylogeny in the genus *Carex*. Hereditas **5**: 129-216.
- 1925. Genetic cytology and genetics in *Carex*. Bibl. Genet. **1**: 459-461.
- 1928. Chromosome studies in Cyperaceae. Hereditas **11**: 182-192.
- 1932. Aneuploidy and polyploidy. Sv. Bot. Tids. **26**: 137-146.
- 1937. Notes on chromosome associations. Cytologia Fujii Jub. Vol.: 9-13.
- Hicks, G. 1928. Chromosome studies in the Cyperaceae with special reference to *Scirpus*. Bot. Gaz. **86**: 295-317.
- 1920. Cytological studies in *Cyperus*, *Eleocharis*, *Dulichium*, and *Eriophorum*. ib. **88**: 132-149.
- Juel, H. 1900. Beiträge zur Kenntnis der Tetradenteilung. III. Die Entwicklung der Pollenkörner bei *Carex*. Jahrb. wiss. Bot. **35**: 649-656.
- Nakajima, G. 1937. Cytological studies in some dioecious Plants. Cytologia, Fujii Jub. Vol.: 282-292.
- Ohwi, J. 1936. Cyperaceae Japonicae 1. A synopsis of the Caricoideae of Japan, including the Kuriles, Saghalin, Korea, and Formosa. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. Ser. B, **11**: No. 5 (Art. 9), 229-530.
- Piech, K. 1924. Über die Teilung des primären Pollenkerns und die Entstehung der spermazellen bei *Scirpus palustris* L. Bull. l'Acad. Polon. Sci. et Lettr. Cl. Sc. Math. Nat. Ser. B: 605-621.
- 1928a. Zytologische Studien an der Gattung *Scirpus*. ib. (1928): 1-43.
- 1928b. Über die Entstehung der generativen-Zelle bei *Scirpus uniglumis* Link. durch freie Zellbildung. Planta **6**: 96-117.
- Stout, Ar. B. 1912. The individuality of the chromosomes and their serial arrangement in *Carex aquatilis*. Arch. Zellf. **9**: 114-140.
- Strasburger, E. 1884. Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen als Grundlage für eine Theorie der Zeugung. Jena.
- Tanaka, N. 1937. Chromosome studies in Cyperaceae I. Cytologia, Fujii Jub. Vol.: 814-821.
- 1938. Chromosome studies in Cyperaceae IV. Chromosome numbers of *Carex* species. Cytologia **9**: (in the press).
- Tischler, G. 1935-1936. Pflanzliche Chromosomen-Zahlen. Tab. Biolog. **11**, **12**.
-