総説

低尿酸血症

市田 公美

はじめに

尿酸は、プリン体の最終代謝産物であり、主に腎臓から尿中へ排泄される。血清尿酸値は、尿酸への代謝量（産生量）と腎臓を中心とした排泄能のバランスにより規定されている。高尿酸血症は痛風や尿路結石を引き起こすだけでなく、腎障害や動脈硬化性病変の進行を促進する可能性が指摘されている。したがって、高尿酸血症に関しては種々の研究が行われ、一般診療の場においても高尿酸血症は十分に認知されている。一方、低尿酸血症に関しては、直接的な症状を認めないことから特に関心は払われていなかった。しかし、最近の健康診断の普及により、低尿酸血症を指摘されての医療機関への受診者が増加し、その取り扱いに戸惑うことが増加していた。また、プリン代謝や尿酸トランスポーターの研究の進歩から低尿酸血症をきたす疾患の解析が進み、原因遺伝子が同定され、病態も解明されてきた。その結果、低尿酸血症は臨床面において合併症を認めることも多く、日常生活における指導が必要であることが分かってきた。本稿では、尿酸動態、遺伝性の尿酸産生低下及び尿酸排泄亢進による低尿酸血症についての最近の知見につき概説する。なお、*purine nucleoside phosphorylase*欠損症と*PRPP synthetase*活性低下症も低尿酸血症をきたすが、著しく頻度が低いことから割愛した。

1 尿酸動態

プリン体とはプリン骨格を持つ生体物質の総称で、ヒトでは尿酸が最終代謝産物である。プリン骨格は、プリン塩基（アデニンやグアニン等）、プリンヌクレオシド（アデノシン、グアノシンやイノシン）、ヌクレオシドにリン酸基が結合した物質であるプリンヌクレオチド（AMP, ATP, GMP等）、さらに核酸（DNAとRNA）等に含まれている。プリン代謝には、ホスホリボシルピロリン酸から多くの反応を経て、新規にプリン骨格を生合成するプリンヌクレオチドの*de novo*合成経路、既存のプリン塩基からプリンヌクレオチドを生合成するsalvage経路やATPからAMPへの分解などがあり、複雑な代謝調節機構が存在する（図1）。通常、ヒトの体内の尿酸プールは、成人男性で約700-1700mg、平均1200mgであり、成人女性は550-700mgといわれている。壊れた細胞からのプリン体や新規に合成されるプリン体400-500mgと食事からのプリン体の持ち込みにより、1日あたり700-800mgのプリン体が尿酸プールに流入してくる。それと同じ量の尿酸が体外に排泄されることにより血清尿酸値はほぼ一定に保たれている。この排泄される尿酸の約2/3は腎臓から排泄され、残りのほとんどは消化管から排泄されると考えられている。腎臓において、蛋白と結合していない血漿中の尿酸は、糸球体濾過膜を自由に通過した後、近位尿細管を中心に再吸収と分泌が両方向性に行われ、最終的には糸球体を通過した尿酸の6-10%が尿中

東京薬科大学病態生理学教室 Kimiyoshi Ichida

キーワード：キサンチン尿症、モリブデン補酵素欠損症、腎性低尿酸血症、URAT1、GLUT9（URATv1）

図1 プリン代謝

ATP: アデノシン三リン酸, AMP: アデニル酸, IMP: イノシン酸, GMP: グアニル酸, PRPP: ホスホリボシルピロリン酸, XOR: xanthine oxidoreductase, HPRT: hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase, APRT: adenine phosphoribosyltransferase, PNP: purine nucleoside phosphorylase

図2 近位尿細管における尿酸トランスポーター

MCT9は、発現部位等が不明のため、割愛した。

URAT1: urate transporter 1, OAT1, 3, 4 and 10: organic anion transporters 1, 3, 4 and 10, NPT1 and 4: sodium phosphate transporters 1 and 4, MRP4: multidrug resistance-associated protein 4, ABCG2: ATP-binding cassette transporter 2, GLUT9/ URATv1: glucose transporter 9

図3 Molybdenum cofactorの構造及びmolybdenum cofactor sulfurylaseによる反応

XOR: xanthine oxidoreductase, AO: aldehyde oxidase, SO: sulfite oxidase

に排泄される。有機酸トランスポーターである organic anion transporter 4 の相同体の検索から、2002年にurate transporter 1 (URAT1) が同定された¹⁾。URAT1は、生体内では乳酸等を交換基質として、尿酸の再吸収に働き、尿酸排泄促進薬であるベンズプロマロンやプロベネシドの作用点になっている¹⁾。その後、この報告を契機にいくつかの尿酸トランスポーターが報告され、さらに最近いくつかの尿酸トランスポーターが全ゲノム関連解析 (GWAS) により新たに同定された。GWASにより血清尿酸値と関連がある遺伝子として、グルコーストランスポーターとして分類されていたglucose transporter 9 (GLUT9/URATv1) をコードしている遺伝子SLC2A9が報告され、続いてGLUT9/URATv1が尿酸を輸送することが証明された^{2,3-8)}。また、抗癌剤輸送ポンプで抗癌剤耐性に関与しbreast cancer resistance protein (BCRP) として知られていたATP-binding cassette, sub-family G, member 2 (ABCG2) も、尿酸トランスポーターであることが明らかになった^{9,10)}。これらの中で、尿酸の再吸収に主に関与しているのが管腔側膜のURAT1と基底側膜のGLUT9/URATv1である。GLUT9/URATv1にはア

イソフォームがあり、管腔側膜に発現しているが、この機能の詳細は明らかになっていない。現在までに報告された尿酸トランスポーターを図2に示す。

2 キサンチン尿症

プリン代謝の最終代謝産物である尿酸への最後の二つの反応、すなわちヒポキサンチンからキサンチンへ、そしてキサンチンからの尿酸への反応を触媒する酵素がキサンチン酸化還元酵素 (xanthine oxidoreductase: XOR) である。このxanthine oxidoreductaseは、通常xanthine dehydrogenaseとして働くが、ある条件下でxanthine oxidaseに変換され、反応過程で活性酸素種を産生する。XORが欠損している遺伝性疾患には、キサンチン尿症とモリブデン補酵素 (molybdenum cofactor: MOCO) 欠損症がある。

キサンチン尿症は1954年に初めて報告され、今までに100例以上が報告されているが、比較的稀な疾患である¹¹⁾。キサンチン尿症には、XOR単独欠損のタイプIとaldehyde oxidase (AO) も欠損しているタイプIIが存在する。タイプIとタイプIIは臨床症状及び臨床検査所見がほとんど同じこ

とから、1990年前後になって初めて異なるタイプが存在し、それがAO欠損も認めるタイプIIであることが認識された^{12,13)}。タイプIとタイプIIの比率の詳細は明らかでないが、タイプIの報告数の方が多い。

ヒトのXORをコードする遺伝子 XDH は1993年に単離され、この欠損によりキサンチン尿症タイプIIは発症する^{14,15)}。一方、タイプIIはMOCOへ硫黄原子を組み込む酵素であるMOCO sulfurase (MOCOS) の欠損により発症する¹⁶⁾ (図3)。MOCOを補酵素として必要とする酵素は、XOR、AOとsulfite oxidase (SO) が知られている。しかし、XORとAOで要求されるMOCOは、SOで要求されるものとは異なっており、XOR、AO型MOCOへの硫黄付加反応を触媒するMOCOS欠損によりXORとAOの機能が失われる。この酵素のヒトの遺伝子 $MOCOS$ は、相同体であるDrosophilaのmaroon-like gene ($ma-l$ gene) やAspergillusのhypoxanthine non-utilizers, gene B (hxB gene) を基に同定され、888アミノ酸をコードし、これらと約30%のホモロジーを有する¹⁶⁾。

キサンチン尿症は、常染色体劣性遺伝形式をとり、XOR欠損により、血清尿酸値1mg/dl以下の著しい低尿酸血症を認め、尿中尿酸排泄量は著しい低値(多くの場合30mg/day以下)を示す。そして、尿酸へ代謝されないため、血清及び尿中ヒポキサンチン及びキサンチンの増加を認める。しかし、ヒポキサンチンはhypoxanthine guanine phosphoribosyltransferaseにより基質として利用されるため、ある程度以上は増加しない。なお、本疾患におけるキサンチンはグアニンの代謝によって生じたものである。結果として、血清オキシプリン(ヒポキサンチン+キサンチン)濃度0.1-1.0mg/dl程度の上昇と、キサンチンを主にしたオキシプリン尿中排泄量の著しい増加60-560mg/day(キサンチン:70-90%)とを認める。日本における報告例のほとんどは、タイプIとタイプIIとも無症状であるが、尿中オキシプリン排泄量増加によるキサンチン結石を主とした尿路結石を認めることがある。地中海沿岸部や中東などにおける症例報告では尿路結石の合併が

多く、報告されたキサンチン結石の2/3以上を占めている^{17,18)}。この原因として、食事や気候などの差異が影響していることが推測されているが、詳細は不明である。一方、タイプIIにおいて、AOの欠損に起因する臨床症状と一般臨床検査は報告されていない。AOは生体異物の酸化、すなわち解毒過程の第1相反応に関与し、多くの薬物の代謝過程に働いている。したがって、生体異物に暴露されない環境下では特に身体的にも臨床検査上も異常を認めないものと思われる。最近ではAOが脂肪組織に多く発現し、脂肪細胞の分化や脂質代謝に関与していることや、以前にも増して抗癌剤等の代謝への関与が報告されている¹⁹⁻²²⁾。

タイプIとタイプIIの鑑別はアロプリノール負荷試験、酵素活性測定、遺伝子解析により行うことが可能であるが、アロプリノール負荷試験が最も簡便である。アロプリノールはXORあるいはAOによりオキシプリノールへ酸化されるので、アロプリノールを投与しオキシプリノールに代謝されなければXOR及びAO両方の欠損症、すなわちタイプIIであり、オキシプリノールへ代謝されればタイプIと診断できる^{23,24)}。具体的には、アロプリノールを投与し、数時間後に血中または尿中オキシプリノールが確認されればタイプIである。

キサンチン尿症患者に対する薬物治療は基本的に必要ないが、生活指導として、尿へのキサンチンの溶解度は低いので、尿路結石やそれに伴う腎機能低下を予防するため、患者へ飲水により尿量を増すように指導する。また、酸性尿の場合は尿のアルカリ化を行う。但し、尿へのキサンチンの溶解度は酸性尿の改善により上昇するが、尿酸の場合に比較すると軽度であり、尿のアルカリ化による効果は限定的である。尿路結石や著しいオキシプリン排泄量増加が原因と思われる腎機能低下を認めるような症例には、食事療法として低プリン食を指導する。

現在までAOの単独欠損症の報告はなく、タイプIIのみがAO欠損を認める疾患である。今後、さらに生体におけるAOの機能が明らかになる

分解の最終過程等に働き、亜硫酸から硫酸への酸化を触媒する酵素である。また外部からの亜硫酸や二酸化硫黄の解毒過程にも重要な役割を担っている。SOの欠損により基質である亜硫酸の尿中排泄量の増加、増加した亜硫酸がシステインと反応することによるS-スルホシステイン生成の増加、またシステインの副代謝経路を介しチオ硫酸生成の増加が起こる(図5)。しかしシステインの中間代謝産物であるシステインスルフィン酸からタウリンへの反応経路が増えるため亜硫酸そのものの増加はそれほど多くない。また亜硫酸の増加の結果、チオ硫酸も増加する³⁶⁾。

MOCO欠損症は常染色体劣性遺伝形式をとる疾患である。MOCO欠損症では、出産に特に問題はないがSO欠損により毒性がある亜硫酸の処理が十分に出来ないことから、生後まもなく哺乳困難を認め、数日以内に治療抵抗性の痙攣発作などが出現する。さらに筋緊張低下、末梢性筋緊張亢進や痙攣性四肢麻痺等の多彩な神経学的異常と著しい精神発達遅滞を認める。また半数以上の症例に水晶体偏位を認める。頭部CTでは生後数週で脳浮腫、白質のlow densityや脳室拡大が認められる。

生下後早期より治療に抵抗性の痙攣と低尿酸血症が認められたらMOCO欠損症が疑われる。本疾患は、亜硫酸、チオ硫酸、S-スルホシステインやタウリンの尿中排泄量の増加とキサントシン尿症の検査所見を同時に認めることにより診断できる。MOCO欠損症診断のための亜硫酸の検出方法として、sulfite test等の簡易定性試験がある。この際、亜硫酸は室温ですぐに酸化されるので新鮮尿で行う。MOCO欠損症の臨床症状を認めるものの低尿酸血症を認めない場合、SOの単独欠損症を考慮する。家族歴から胎児がMOCO欠損症の可能性が想定される場合には、絨毛検査(Chorionic Villi Sampling; CVS)により遺伝子解析が行われる。

現時点でMOCO欠損症の有効な治療法は確立されておらず、ほとんどが早期に死亡に至る。MOCO合成の最初のステップの異常を持つ患者に対し、cyclic pyranopterin monophosphateの投与

により症状の改善の報告がされ、今後の治療法の進展が期待される³⁵⁾。

4 腎性低尿酸血症

腎性低尿酸血症は、尿細管障害を認めないにもかかわらず、腎臓における尿酸再吸収の低下または分泌の亢進により尿酸排泄が亢進し、低尿酸血症を示す疾患である。低尿酸血症に関しての明確な基準はないが、血清尿酸値2 mg/dl以下を低尿酸血症としている報告が多い。日本では、日常遭遇する無症状の低尿酸血症のほとんどは本疾患である。他疾患も含んだ低尿酸血症の頻度は、男性で0.14-0.22%、女性で0.25-0.40%である。2次性低尿酸血症を除外すると、日本では無症状の低尿酸血症のほとんどが腎性低尿酸血症である。腎性低尿酸血症は、多くの場合血清尿酸値1 mg/dl以下の著しい低尿酸血症を呈し、常染色体劣性遺伝形式をとることが多い。低尿酸血症自体による臨床症状は、特に認めない。合併症として、尿路結石と運動後急性腎不全が多く、尿路結石は腎性低尿酸血症患者の7-10%程度に、運動後急性腎不全は腎性低尿酸血症患者の10%近くに疑わしい症状の経験または既往を認める³⁶⁾。

近位尿細管において尿酸の再吸収に働く中心的な尿酸トランスポーターである管腔側膜に発現しているURAT1と血管側膜のGLUT9/URATv1の欠損により、尿酸排泄が亢進し腎性低尿酸血症をきたす。日本人の腎性低尿酸血症の80-90%にURAT1をコードしている遺伝子 $SLC22A12$ の変異が認められる。腎性低尿酸血症は日本人に著しく多く、その特徴は遺伝子 $SLC22A12$ においてW258Stopとなる変異G774Aが、 $SLC22A12$ の遺伝子変異の80%近くを占めていることである³⁶⁾。これは、日本人ではG774Aのアレル頻度が2.3-2.37%と高率^{37,38)}であるためである。この原因は、アジア大陸においてG774A変異が起こり、日本に渡ってくる際に創始者効果という現象により日本人にURAT1のG774Aが多くなったためである³⁹⁾。韓国も腎性低尿酸血症の発症頻度が他の国より高いと想定されるが、URAT1のG774A変異

のアレル頻度は1.10%と日本人に比較し低い⁴⁰⁾。これは、ホモ接合体でのみ発症すると仮定すると日本人は韓国人と比較して腎性低尿酸血症の発症率が4.4 - 4.6倍高いことを意味している。

GLUT9/ URATv1の欠損により腎性低尿酸血症を引き起こすことが報告されたのは、比較的最近である⁴¹⁻⁴³⁾。GLUT9/ URATv1欠損による腎性低尿酸血症の血清尿酸値は、URAT1欠損の場合とほぼ同程度である。GLUT9/ URATv1欠損による腎性低尿酸血症の報告は世界的にもまだ数例であり、日本における頻度はURAT1欠損に比し著しく少ない。現時点におけるGLUT9/ URATv1欠損とURAT1欠損による腎性低尿酸血症の臨床上の比較は難しいが、GLUT9/ URATv1欠損腎性低尿酸血症においても、合併症として運動後急性腎不全が報告された⁴²⁾。したがって、合併症などの臨床面における差異はあまり無いと思われる^{8,41-43)}。しかし、尿酸排泄能の指標である尿酸クリアランス/クレアチニンクリアランス (CUA/Ccr) に関しては、GLUT9/ URATv1の完全欠損による腎性低尿酸血症では1.9程度と、URAT1完全欠損による腎性低尿酸血症よりも明らかに高値である^{42,43)}。これは、管腔側膜にはURAT1以外の尿酸再吸収に働くトランスポーターが存在するのに対し、現時点では血管側膜ではGLUT9/ URATv1以外のトランスポーターは想定されていないことに一致している (図2)。すなわち、URAT1欠損では管腔側膜における尿酸再吸収は他のトランスポーターを介してある程度行われるが、GLUT9/ URATv1欠損では血管側膜における尿酸再吸収がほとんど行われなくなる。このため、GLUT9/ URATv1欠損においては、特殊な条件下ではあるが結果的に尿酸分泌を反映していることになると考えられる。また、GLUT9/ URATv1の完全欠損症例のFEUAがこのような著しい高値を示すことは、糸球体で濾過された尿酸の40-50%程度が分泌されるとの今までの想定以上に尿酸分泌が行われている可能性を示している。

尿路結石の合併が多い原因として、腎臓における尿酸排泄効率の上昇により、相対的に尿酸の腎外排泄が減少し、結果的に尿中尿酸排泄量

が増加しているためと考えられる。尿への尿酸の溶解度は高くないため、尿中尿酸排泄量の増加の程度は軽度であるにもかかわらず、尿路結石の発症率が著しく増加していると思われる。

運動後急性腎不全は、運動の数時間後から出現する腰背部痛を主徴とする急性腎不全で、稀に腎性低尿酸血症以外でも発症することがある。運動後急性腎不全は、血清CPKや血清ミオグロビンの上昇は認めない、または軽度であり、横紋筋融解症と異なる疾患である。症状は、比較的強い腰背部痛と嘔気、嘔吐や乏尿である。予後は良く、腎機能は1週間から1ヶ月程度で回復する。運動により必ず起こるわけではなく、短時間でも激しい運動が運動後急性腎不全を誘発しやすいと考えられている。特徴的な検査所見として、造影剤使用による検査の翌日の再検査、いわゆるdelayed CT、MRIや超音波などの画像検査において、造影剤の残存、信号強度やエコー強度がまだらな楔形になることが知られている⁴⁴⁾。また、脱水やNSAID内服などの何らかの促進因子が運動に加わったときに発症すると考えられているが、まだ十分に明らかになっていない⁴⁵⁾。急性腎不全に伴い血清尿酸値は正常になり、腎性低尿酸血症を見逃しやすいが、腎機能の回復に伴い血清尿酸値の低下を認めるため、腎機能に比しての相対的低尿酸血症や血清尿酸値の推移が診断の一助になる。発症機序として、前述の画像検査から、腎臓の血管れん縮が原因であると推定されている。運動により活性酸素が増加し、腎臓の弓状動脈・葉間動脈がれん縮を起こし虚血状態になり、再還流時に活性酸素による虚血再還流障害を来すためであると考えられている。また、腎性低尿酸血症に運動後急性腎不全を合併しやすい理由は、活性酸素のスカベンジャーである尿酸が少ないためであると推定されている。

運動後急性腎不全は再発を認めることが多いので、運動強度に関する指導が必要である⁴⁶⁾。また、ヘテロ接合型のURAT1の欠損でも、時に運動後急性腎不全を認めることがあるので、注意が必要である³⁶⁾。

おわりに

低尿酸血症に関して、多くの知見が集積されてきた。その結果の一部として、日本人に腎性低尿酸血症が多く、合併症も存在することが明らかになった。したがって、日本では低尿酸血症に注意を払い、日本人に合わせた医療を行うことが必要になると思われる。また、低尿酸血症の発症機序の解析は、尿酸降下薬の開発を含む血清尿酸値降下方法に示唆を与えるという点でも重要である。

今後さらに低尿酸血症の研究が進み、尿酸代謝の基礎と臨床への貢献につながるが大いに期待される。

文 献

1. Enomoto A, Kimura H, Chairoungdua A, et al: Molecular identification of a renal urate anion exchanger that regulates blood urate levels. *Nature* 417:447-452, 2002.
2. Li S, Sanna S, Maschio A, et al: The GLUT9 Gene Is Associated with Serum Uric Acid Levels in Sardinia and Chianti Cohorts. *PLoS Genet* 3:e194, 2007.
3. Wallace C, Newhouse SJ, Braund P, et al: Genome-wide association study identifies genes for biomarkers of cardiovascular disease: serum urate and dyslipidemia. *Am J Hum Genet* 82:139-149, 2008.
4. Dehghan A, Kottgen A, Yang Q, et al: Association of three genetic loci with uric acid concentration and risk of gout: a genome-wide association study. *Lancet* 372:1953-1961, 2008.
5. Doring A, Gieger C, Mehta D, et al: SLC2A9 influences uric acid concentrations with pronounced sex-specific effects. *Nat Genet* 40:430-436, 2008.
6. McArdle PF, Parsa A, Chang YP, et al: Association of a common nonsynonymous variant in GLUT9 with serum uric acid levels in old order amish. *Arthritis Rheum* 58:2874-2881, 2008.
7. Vitart V, Rudan I, Hayward C, et al: SLC2A9 is a newly identified urate transporter influencing serum urate concentration, urate excretion and gout. *Nat Genet* 40:437-442, 2008.
8. Anzai N, Ichida K, Jutabha P, et al: Plasma urate level is directly regulated by a voltage-driven urate efflux transporter URATv1 (SLC2A9) in humans. *J Biol Chem* 283:26834-26838, 2008.
9. Matsuo H, Takada T, Ichida K, et al: Common defects of ABCG2, a high-capacity urate exporter, cause gout: a function-based genetic analysis in a Japanese population. *Sci Transl Med* 1:5ra11, 2009.
10. Woodward OM, Kottgen A, Coresh J, et al: Identification of a urate transporter, ABCG2, with a common functional polymorphism causing gout. *Proc Natl Acad Sci U S A* 106:10338-10342, 2009.
11. Dent CE, Philpot GR: Xanthinuria, an inborn error (or deviation) of metabolism. *Lancet* 266:182-185, 1954.
12. Yamamoto T, Higashino K, Kono N, et al: Metabolism of pyrazinamide and allopurinol in hereditary xanthine oxidase deficiency. *Clin Chim Acta* 180:169-175, 1989.
13. Reiter S, Simmonds HA, Zollner N, et al: Demonstration of a combined deficiency of xanthine oxidase and aldehyde oxidase in xanthinuric patients not forming oxipurinol. *Clin Chim Acta* 187:221-234, 1990.
14. Ichida K, Amaya Y, Noda K, et al: Cloning of the cDNA encoding human xanthine dehydrogenase (oxidase): structural analysis of the protein and chromosomal location of the gene. *Gene* 133:279-284, 1993.
15. Ichida K, Amaya Y, Kamatani N, et al: Identification of two mutations in human xanthine dehydrogenase gene responsible for classical type I xanthinuria. *J Clin Invest* 99:2391-2397, 1997.
16. Ichida K, Matsumura T, Sakuma R, et al:

- Mutation of human molybdenum cofactor sulfurase gene is responsible for classical xanthinuria type II. *Biochem Biophys Res Commun* 282:1194-1200, 2001.
17. Al-Eisa AA, Al-Hunayyan A, Gupta R: Pediatric urolithiasis in Kuwait. *Int Urol Nephrol* 33:3-6, 2002.
18. Arikyants N, Sarkissian A, Hesse A, et al: Xanthinuria type I: a rare cause of urolithiasis. *Pediatr Nephrol* 22:310-314, 2007.
19. Neumeier M, Weigert J, Schaffler A, et al: Aldehyde oxidase 1 is highly abundant in hepatic steatosis and is downregulated by adiponectin and fenofibric acid in hepatocytes in vitro. *Biochem Biophys Res Commun* 350:731-735, 2006.
20. Weigert J, Neumeier M, Bauer S, et al: Small-interference RNA-mediated knock-down of aldehyde oxidase 1 in 3T3-L1 cells impairs adipogenesis and adiponectin release. *FEBS Lett* 582:2965-2972, 2008.
21. Linton A, Kang P, Ornelas M, et al: Systematic Structure Modifications of Imidazo[1,2-a]pyrimidine to Reduce Metabolism Mediated by Aldehyde Oxidase (AO). *J Med Chem* 54:7705-7712, 2011.
22. Garattini E, Terao M: Increasing recognition of the importance of aldehyde oxidase in drug development and discovery. *Drug Metab Rev* 43:374-386, 2011.
23. Yamamoto T, Kario K, Suda M, et al: A case of xanthinuria: a study on the metabolism of pyrazinamide and allopurinol. *Jpn J Med* 30:430-434, 1991.
24. Ichida K, Yoshida M, Sakuma R, et al: Two siblings with classical xanthinuria type I: significance of allopurinol loading test. *Intern Med* 37:77-82, 1998.
25. Duran M, Beemer FA, van de Heiden C, et al: Combined deficiency of xanthine oxidase and sulphite oxidase: a defect of molybdenum metabolism or transport? *J Inherit Metab Dis* 1:175-178, 1978.
26. Johnson JL, Waud WR, Rajagopalan KV, et al: Inborn errors of molybdenum metabolism: combined deficiencies of sulfite oxidase and xanthine dehydrogenase in a patient lacking the molybdenum cofactor. *Proc Natl Acad Sci U S A* 77:3715-3719, 1980.
27. Wadman SK, Duran M, Beemer FA, et al: Absence of hepatic molybdenum cofactor: an inborn error of metabolism leading to a combined deficiency of sulphite oxidase and xanthine dehydrogenase. *J Inherit Metab Dis* 6 Suppl 1:78-83, 1983.
28. Johnson JL, Wuebbens MM, Mandell R, et al: Molybdenum cofactor biosynthesis in humans. Identification of two complementation groups of cofactor-deficient patients and preliminary characterization of a diffusible molybdopterin precursor. *J Clin Invest* 83:897-903, 1989.
29. Reiss J, Hahnewald R: Molybdenum cofactor deficiency: Mutations in GPHN, MOCS1, and MOCS2. *Hum Mutat* 32:10-18, 2011.
30. Reiss J, Cohen N, Dorche C, et al: Mutations in a polycistronic nuclear gene associated with molybdenum cofactor deficiency. *Nat Genet* 20:51-53, 1998.
31. Reiss J, Dorche C, Stallmeyer B, et al: Human molybdopterin synthase gene: genomic structure and mutations in molybdenum cofactor deficiency type B. *Am J Hum Genet* 64:706-711, 1999.
32. Reiss J, Gross-Hardt S, Christensen E, et al: A mutation in the gene for the neurotransmitter receptor-clustering protein gephyrin causes a novel form of molybdenum cofactor deficiency. *Am J Hum Genet* 68:208-213, 2001.
33. Hille R, Nishino T, Bittner F: Molybdenum enzymes in higher organisms. *Coord Chem Rev* 255:1179-1205, 2011.
34. Mendel RR, Schwarz G: Molybdenum cofactor biosynthesis in plants and humans. *Coord Chem*

- Rev 255:1145-1158, 2011.
35. Veldman A, Santamaria-Araujo JA, Sollazzo S, et al: Successful treatment of molybdenum cofactor deficiency type A with cPMP. *Pediatrics* 125:e1249-1254, 2010.
 36. Ichida K, Hosoyamada M, Hisatome I, et al: Clinical and molecular analysis of patients with renal hypouricemia in Japan-influence of URAT1 gene on urinary urate excretion. *J Am Soc Nephrol* 15:164-173, 2004.
 37. Iwai N, Mino Y, Hosoyamada M, et al: A high prevalence of renal hypouricemia caused by inactive SLC22A12 in Japanese. *Kidney Int* 66:935-944, 2004.
 38. Taniguchi A, Urano W, Yamanaka M, et al: A common mutation in an organic anion transporter gene, SLC22A12, is a suppressing factor for the development of gout. *Arthritis Rheum* 52:2576-2577, 2005.
 39. Ichida K, Hosoyamada M, Kamatani N, et al: Age and origin of the G774A mutation in SLC22A12 causing renal hypouricemia in Japanese. *Clin Genet* 74:243-251, 2008.
 40. Lee JH, Choi HJ, Lee BH, et al: Prevalence of hypouricaemia and SLC22A12 mutations in healthy Korean subjects. *Nephrology (Carlton)* 13:661-666, 2008.
 41. Matsuo H, Chiba T, Nagamori S, et al: Mutations in glucose transporter 9 gene SLC2A9 cause renal hypouricemia. *Am J Hum Genet* 83:744-751, 2008.
 42. Dinour D, Gray NK, Campbell S, et al: Homozygous SLC2A9 mutations cause severe renal hypouricemia. *J Am Soc Nephrol* 21:64-72, 2010.
 43. Stiburkova B, Ichida K, Sebesta I: Novel homozygous insertion in SLC2A9 gene caused renal hypouricemia. *Mol Genet Metab* 102:430-435, 2011.
 44. Ishikawa I: Acute renal failure with severe loin pain and patchy renal ischemia after anaerobic exercise in patients with or without renal hypouricemia. *Nephron* 91:559-570, 2002.
 45. 石川勲: 運動後急性腎不全 (ALPE) . 金沢, 金沢医科大学出版局, 2006.
 46. Ohta T, Sakano T, Igarashi T, et al: Exercise-induced acute renal failure associated with renal hypouricaemia: results of a questionnaire-based survey in Japan. *Nephrol Dial Transplant* 19:1447-1453, 2004.