多発性嚢胞腎における高尿酸血症関連SNPsと腎予後の検討

花岡 一成¹⁾ 倉重 眞大^{1) 2)} 細谷 龍男¹⁾
西川 元¹⁾ 今村美菜子²⁾ 前田 士郎²⁾
横尾 隆¹⁾

背景と目的

高尿酸血症は慢性腎臓病 (CKD) の原因であり, 同時にCKDの進行は血清尿酸値の上昇と関連する. また近年では血清尿酸値 (sUA) およびCKD関連のSNPが報告されている. 我々は多発性嚢胞腎 (PKD) 患者において, 腎機能障害の早期より排泄低下がおこり高尿酸血症 (HUA) が発症する傾向があることを報告した. しかしsUAには個人差が大きくsUAがPKD患者の腎機能障害の進行に関与するかの解明はされていない. 今回PKD患者を対象にsUA関連およびCKD関連SNPsを用いて腎予後が予測できるかを検討した.

方 法

2011年4月から2013年9月の間に, 東京慈恵会医科大学附属病院および関連病院を受診したPKD患者のうち, 遺伝子検索に同意の得られた患者163名を対象にsUA関連22SNPsおよびCKD関連34SNPsについて, Multiplex PCR invader法により遺伝子型を判定した. また解析に用いた臨床データはsUA, 腎機能 (eGFR), 腎機能低下 (Δ eGFR), BMI, 尿蛋白量 (UP), 随時尿浸透圧 (Uosm (spot)), 血漿ADH, 高血圧の有無, 尿酸降下薬内服の有無である.

結 果

対象患者集団の平均年齢は50.4 $\pm$ 14.1歳. うち80名が男性, 83名が女性. 患者の平均eGFR 53.6 $\pm$ 26.9 ml/min, Δ eGFR -2.93 $\pm$ 1.95ml/min/year,

sUA 6.06 $\pm$ 1.46 mg/dl, UP 222 $\pm$ 371mg/dayであった. Δ eGFRに関与する臨床因子としてsUA, Uosm (spot), ADHを認めた. sUA関連22SNPsについて重回帰分析を行ったところ4SNPsについて既報と同様のsUAとの相関を, 1SNPに相関傾向を認めた ($\beta > 0$, $p < 0.05$). しかしながら, sUA関連SNPsとeGFRおよび Δ eGFRとの関連は認められなかった. またCKD関連SNPsについても Δ eGFRとの関連は認められなかった.

考 察

PKD患者において高尿酸血症が Δ eGFRを指標とした場合の腎機能障害に関連することがわかった. またsUA関連22SNPsのうち5SNPsに高尿酸血症との相関ないしはその傾向を認めた. しかしながら, 今回検討に用いたsUA関連SNPsおよびCKD関連SNPsのいずれも腎機能障害進行に相関を認めなかった. PKDの場合, 嚢胞や間質病変により腎容積が著明に腫大し, 特に嚢胞容積や間質病変の程度が腎機能障害進行に関与していると推定されている. sUAやCKDに関連するSNPsのほか腎容積についても今後検討する必要があると考えられた.

結 果

今回検討したPKD患者では一般集団でsUA関連あるいはCKD関連と報告されたSNPを用いて腎予後を推測することはできなかった.

1) 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

Kazushige Hanaoka, Mahiro Kurashige, Tatsuo Hosoya, Hajime Saikawa, Takashi Yokoo

2) 理化学研究所統合生命医科学研究センター
腎・代謝・内分泌疾患研究チーム

Mahiro Kurashige, Minako Imamura, Shiro Maeda