韓半島*南東部海岸の地形発達

呉 建 煥*

韓半島の南東部海岸に分布する地形面は、高度・連続性などから、高位段丘面(ガムポ Gampo 面; 高度 60~80 m)、中位段丘面(シェッチョンリ Seakcheonri 面; 高度 30~50 m)、低位段丘面(サンハリ Sanhari 面; 高度 10~20 m)、低地、海底平坦面に分けられる。これらの地形、堆積物の特徴などから、調査地域の地形発達は次のように考えられる。高位段丘面は、白亜系および第三系よりなる小起伏の丘陵が沈水して形成された、この地域における最も古い海成段丘面で、段丘面には赤色土が生成しており、構成礫はくさっている。中位段丘面は、その広さ、連続性、高位段丘礫層に不整合にのる段丘堆積物の特徴から、高位段丘面形成後の海退期をはさむ海進期に形成された。高位段丘面上の赤色土はこの時期に生成されたと考えられる。中位段丘面の形成後にブルグッサ(Bulgooksa)断層の活動によってウルサン(Ulsan)湾から北部はその南部より 10 m 余、示差的に隆起した。低位段丘面は、中位段丘面形成後の海退期に海水準の一時的停滞によって形成された海蝕面である。ヴェルム氷期の最盛期には海水準が-70m以下まで低下し、現在の沈水三角州などの海底平坦面が形成された。後氷期には現海水準より 1~3 m の高さに浜堤や低い段丘面が形成された。

I はじめに

ここで韓半島の南東部海岸とは、大韓海峡*の北西岸をなす釜山ちよしやぐしから長響串までの海岸をさす。それより南西に向かっては、リアス式海岸線をなす南海岸となり、北には比較的平滑な離水海岸が連なる。従来、この海岸には海成段丘が連続的に分布していることが知られていたが(立岩, 1924; Oh, 1968)、これに関する詳しい地形学的研究は行なわれていなかった。

最近、Kim(1973)はこの海岸の北部地域バンヨージン—ポハン(Bangeojin—Pohang)で、海成段丘の発達が最もよいバンヨージン、ジュジョンリ(Jujeonri)、ジョンジャリ(Jeongjari)、ハショリーナアリ(Hascori—Na-ari)、ガムポ、ダムポ(Damupo)など 6 つの地域を選び、そこに分布する海成段丘をボホワシェ(Bonghwajae)面(高度 90~130 m)、ヨムポリ(Yeompori)面(70~80 m)、ホワジョンリ(Hwa-jeonri)面(高度 50~60 m)、バンヨージン面(高度 30~40 m)、ジョンジャリ面(高度 10~20 m)、ジュジョンリ面(高度 3~7 m)の 6 段に区分した。そして、そのうち上から 5 段目のジョンジャリ面の構成礫層

を詳しく分析して、古環境を論じている。Kim は、ホワジョンリ面、バンヨージン面をヴェルム氷期の海退期中の一時的海水準停滞と地殻運動の間歇的休止との重合によって形成されたと解釈するとともに、ジョンジャリ面の形成されたアレレード期には海水準は現海水準に達しており、その後地殻運動によってこの面は段丘化したと考えた。また、ジョンジャリ層とジュジョンリ層からそれぞれ採取した炭化木片と泥炭のそれぞれの C^{14} 年代測定値 $12,060 \pm 600$ y. B. P. および $1,730 \pm 100$ y. B. P. から、南東部海岸は年 1.1~1.4 mm の速さで隆起してきたと結論した。しかし、上記の段丘面の認定とその区分には疑問点が多く、とくに段丘形成に関与した原因(氷河性海面変化と地殻運動)についての解釈には理解しがたい点もある。

韓半島の地形は著しい東西の非対称性を示していることが古くから指摘されており、その原因として地背斜撓曲運動または傾動運動が考えられているが(小林, 1931; 多田, 1941; 吉川, 1946; 立岩, 1976)、第四紀の地殻運動の地域的な特徴に関してはよく知られていない。

ところで、海成段丘の詳細な調査による地形発達の解明と旧汀線高度の精密測定は、第四紀地殻変動

* 大韓民国 釜山女子大学

の地域的特徴を明らかにする上で1つの有効な手段である。しかし、いままで知られている限りでは、韓半島には、調査地域以外、海成段丘が連続的に分布するところは少ない。したがって、この方法による第四紀地殻変動の研究は韓国ではその対象地域が限られるが、断片的に分布する海成段丘の相互の対比さえつけば、それぞれの地域の地殻変動の特徴がある程度明らかになる。そこで、筆者はその手はじめとして、南東部海岸のうち、南部の一部地域を除く大部分の地域について地形調査を行ない¹⁾、その地形発達を明らかにして、韓半島の海成段丘の標準編年の確立に役立つ資料を得ようとした。

II 地形および地質概観

調査地域は、大韓海峡に面する北北東—南南西方向の、ヨンイル (Yeongil 迎日) 湾のジャンギゴツ

Fig. 1 Index map of the study area
Boxes (a—f) show areas of Fig. 3—a~f.

(Janggigok) からガンヤンリ (Gangyangri) までの間約 100 km の海岸である (Fig. 1). この海岸線は、南部のウルサン (蔚山) 湾を除くと、おおむね平滑で、高度 100m 前後の丘陵性山地がゆるやかに海岸に迫っている。海成段丘はこれを縁どって発達していることが多い。河川は大部分南東ないし南南東方向の流路をもつ短い川で、沖積低地は河口附近にせまく分布しているにすぎない。

調査地域は、その大部分が第三紀に形成されたポハン構造盆地 (Yoon, 1975) に含まれるので、基盤岩類はジョンジャリ以北では中新世の堆積岩 (礫岩、砂岩、凝灰岩など) と火山岩 (主に安山岩と玄武岩) (立岩, 1924), また南部では白亜紀の花崗岩類と頁岩、泥灰岩などの堆積岩である (Reedman & Um, 1975) (Fig. 2). 地質構造をみると、ヤンサン

Fig. 2 Geological map of the study area and its vicinity

I: Basalt II: Rhyolite and Agglomerate (late Tertiary) III: Yeonil group (Lower Miocene-Pliocene) IV: Yangbug group (Oligocene ?-Lower Miocene) V: Cretaceous sedimentary and igneous rocks VI: Fault. 1. Yangsan fault 2. Ulsan fault 3. Bulgooksa fault (probably) 4. Yeonil-Moriryeong fault
(after A. J. Reedman & S. H. Um, 1975).

Fig. 3 Classification and distribution of terraces in the study area
 1 : High terrace 2 : Middle terrace 3 : Low terrace, 1~79 : locality numbers.

(Yangsang) 断層, ウルサン断層, モリリョン (Mori-ryeong) 断層など北北東—南南西方向の断層(いずれも南東へ落ちる階段断層)が卓越している(立岩, 1924; Reedman & Um, 1975).

III 地形面の記載

調査地域のうち, 海成段丘がよく発達しているのは, ガムボ付近である. ここには3段の海成段丘が堆積物をともなって発達しているので, ここを基準として段丘面の区分を行なった. 3段の海成段丘面のうち, 高位段丘面はきわめて断片的であるが, 中位段丘面と低位段丘面は調査地域のほぼ全域にわたって分布している(Fig. 3). 以下, 高位段丘面から順に記載する.

1) 高位段丘面 (ガムボ面)

この段丘面上の旧汀線高度²⁾(海拔高度, 以下同じ)は60~80 mである. この段丘面は調査地域を通じて断片的に分布し, 堆積物をともなうところが少なく, 大部分が波蝕台起源の段丘面である. 模式地のガムボ(Fig. 3—c, loc. 1)では, 高位段丘面は標高85.5 mの丘陵を取り巻いて分布する. 段丘面(旧汀線高度75 m)は厚さ3 m以上の礫層からなっている(Fig. 4). この礫層は斜交層理の発達した1枚の砂層をはさんで, 層相の異なる上・下部層に分けられる. 上部層はよく水磨された淘汰のよい円礫や扁平礫(径3~5 cm)で構成されているのに対して, 下部層は淘汰の悪い円~亜円礫(最大径10 cm)からなる. 礫は風化を受けていわゆるクサリ礫になっている. 段丘面には赤色土³⁾がみられる. この礫層は, この地域の中位段丘礫層の下にもみられるので(loc. 2), 高位段丘礫層の基底の地形はこの地域では少なくとも30 mの起伏があると推定される.

ガムボ以外のところでは, 厚い堆積物は認められず, 大部分段丘面には基盤が露出しており, ところによって赤色風化殻が観察される(たとえば, Fig. 3—d, loc. 14). しかし, サンハリ(Sanhari)付近で

は, 低位段丘礫層の下に高位段丘礫層に類似した層相を示す風化した礫層がみられる. この礫層は, おそらく高位段丘礫層の一部と考えられるので, その基底面の高さ(12 m)と高位段丘面上の旧汀線高度(80 m)との差から, ここでは高位段丘礫層は70 m以上海水準が相対的に上昇した時期に堆積したと推定される.

2) 中位段丘面(シェッチョンリ面)

中位段丘面は調査地域において最も広く, ほぼ連続的に分布する. 旧汀線高度は30~50 mの範囲にある. 中位段丘面が最も発達するシェッチョンリ(Fig. 3—d, loc. 15)では, この段丘面(旧汀線高度48 m)は基盤の白亜紀の泥灰岩の上にのり, 淘汰のよい円礫や扁平礫(径3~5 cm)よりなる厚さ約5 mの堆積物によって構成されている(Fig. 4). 礫層には全体として明瞭な平行層理が認められるが, 東側の谷に近い露頭では, 表層部を除くと河成の層相を呈する. この段丘面には, 背後の高位段丘面にみられる赤色風化殻は認められず, 表土は淡橙色(5 Y R 8/4)を呈している. また, 構成礫も新鮮である.

北部のデーボーグリョンポ(Daebo-Guryongpo)間(Fig. 3—a)では, 中位段丘面が広く連続的に分布し, 保存もよい. しかし, ここの段丘面は大部分が侵蝕面で, 段丘堆積物はほとんどみられず, ところによって基盤の小さな凹所を埋めている厚さ1 m以下のベニア状の礫層が観察されるにすぎない. loc. 42がその好例で, 礫層は角礫(最大径15 cm)で構成されているが, 径2~3 cmの円礫や扁平礫と粗砂が角礫間を充填している. loc. 44, loc. 46, loc. 47, loc. 49にも同じ層相を呈するうすい堆積物が認められる.

ジャンギルリーヤンポ(Janggilri-Yangpo)間(Fig. 3—b)に分布する中位段丘間では, 隣接する北部地域に比べて, 広さと連続性においては劣るが, 角礫(最大径10 cm)とマトリックスの円礫や扁平礫(径2~3 cm)で構成される段丘堆積物がかなり広く

分布する。層厚は2 m程度であるが、3 mをこえることもある。同様の段丘堆積物がloc. 25, loc. 26, loc. 33でも観察される。

シンチャンリ(Sinchangri, loc. 28, loc. 29)では、小河川の右岸に沿って2段の河成段丘が分布している。上位面は60~50 m, 下位面は40~25 mの高度を示し、それぞれ海成段丘の中位段丘面と低位段丘面のそれに近いことから、これらの河成段丘は各海成段丘形成期の海水準において、それぞれ形成されたと思われる。

ガムポ, ジョンハリ(Jeonhari) (Fig. 3—c)では、小湾を取り囲んで中位段丘が比較的広く分布している。段丘堆積物は、径3~5 cmの円礫を主とする厚さ2 m程度の礫層である。loc. 2では、高位段丘礫層と考えられる風化した礫層(層厚1 m以下)の上に不整合に、厚さ2 m程度の新鮮な礫層(円礫や扁平礫よりなる)がのっている。段丘面には、背後の高位段丘面にみられる赤色土が認められず、淡橙色を呈している(礫層も同じ)。

ナジョンリーボンギルリ(Lajeonri-Bonggilri)間 (Fig. 3—c)の中位段丘は、さらに南のナアリまで続いて連続的に分布し、段丘面の保存もよい。堆積物は円礫や扁平礫(径2~3 cm)からなる層厚2 m余の礫層で、基盤(花崗岩類)の小さい凹所を埋めている。ナアリ(Loc. 12)でも、厚さ3 m余の礫層が段丘面を構成する。しかし、西側の谷に向かって堆積物が厚くなり、その下部は河成の層相を呈する。

パンヨージン—ジョンハリ間 (Fig. 3—e) には、基盤の花崗岩の上に、厚さ2~3 mの礫層ないし礫層・砂層の互層のなる中位段丘面(旧汀線高度42~45 m)が連続的に分布している。堆積物の基底面は波状の小起伏を呈しており、その上にある礫層ないし砂層は平行・斜交層理がよく発達している。ウルギ(Ulgi, loc. 64)では、厚さ3 mの堆積物中、下部の約50 cmの円礫層(粒径5~7 cm)を除けば、全層粗砂層で、斜交層理が明瞭である。loc. 61, loc. 68

においては花崗岩の上に平行層理の発達がよく、2 m余の円礫や扁平礫層がのる。

ウルサン湾口西岸のジャンシェンポ (Jangseang-po, Fig. 3—f)では、小規模の段丘が点在する。段丘面の旧汀線高度は30~33 mで、湾口東岸のパンヨージンに分布する中位段丘面のそれに比べて10 m程度低い。段丘面には大部分基盤(中生層)が露出しているが、基盤の小さい凹所は小円礫からなる厚さ1 m以下の礫層によって埋められていることもある(loc. 72)。同じ地域のガンヤンリでは、中位段丘面は低い尾根上の平坦面となり、段丘面は波状の小起伏を呈する。また、背後の丘陵性山地との比高は小さく、旧汀線を認めることが困難なところもある。堆積物は厚さ1 m以下の角礫(最大径15 cm)とマトリックスの小円礫からなる礫層である。loc. 79では礫層の中にエゾイガイ (*Mytilus grayanus* DUNKER)の破片がみられる。

3) 低位段丘面(サンハリ面)

低位段丘は中位段丘とともに全調査地域にわたって広く、連続的に分布する。この段丘面の旧汀線高度は10~20 mである。段丘堆積物が最も厚いサンハリ (Fig. 3—d)では、中位段丘の前面に海岸線に平行して連続的に分布し、段丘面(旧汀線高度16 m)は厚さ3 m余の礫層からなる (Fig. 4)。この礫層の最下部には、層相や風化度から高位段丘礫層に対比される厚さ1 mの礫層があり、これに不整合にのる礫層はさらに、平行層理の明瞭な径0.5~1 cmの円礫や扁平礫からなる表層部(層厚1 m余)と径3~5 cmの円礫を主とする下部の礫層とに分けられる。下部の礫層は背後の中位段丘の構成層 (loc. 19)に類似した層相を呈するので、中位段丘礫層の一部と考えられ、表層部の細礫層のみが低位段丘の堆積物である。礫種は基盤の泥灰岩が大部分であるが、頁岩、花崗岩類のものもみられる。

北部地域のデーボーグリュンポ間 (Fig. 3—a)の低位段丘は、中位段丘と同様に、調査地域中最も広

Fig. 4 Columnar sections of terrace deposits
R. S.: Red soil W. G.: Weathered gravel
B. R.: Bed rock.

く、連続的に分布する。中位段丘とは比高1~2 mのゆるやかな斜面で境される。段丘面(旧汀線高度12~15 m)には基盤(安山岩)の露出するところと厚さ1 m以下の細粒(径1 cm前後)の円礫や扁平礫からなるベニア状のうすい礫層がみられるところがある(loc. 40, loc. 43, loc. 45, loc. 52)。

ジャンギルリーズウォンリ(Duweonri)間(Fig. 3—b)の低位段丘は主に海岸の突出部に分布し、高さ3~4 mの段丘崖で現海浜に臨んでいる。段丘面の広さ、連続性は隣接の北部地域に比べて劣る。堆積物は径2~3 cmの円礫や扁平礫で構成される礫層で、厚さは2 mをこえないが、基盤の小さい凹所を埋めているところでは多少厚い(loc. 24, loc. 27, loc. 32)。

ガムポーボンギリ間(Fig. 3—c)とナアリージョンジャリ(Fig. 3—d)の低位段丘では、サンハリとともに、調査地域中最も厚い堆積物がみられる。loc. 13では、基盤の泥灰岩の上に2.5 m余の礫層がのり、これは斜交層理の発達がよく扁平礫よりなる表層部(礫径1 cm, 厚さ60 cm)と径3 cm前後の円礫を主とする厚さ2 m余の下部の礫層とに分けられる。loc. 16でも、堆積物は表層部と下部とに分けられ、loc. 13のそれと層厚、礫種(主に泥灰岩)においては変わらないが、表層部の礫径がより細粒化する。

loc. 4, loc. 7, loc. 17でも同様の層相と層厚をもつ段丘堆積物が観察される。これらの下部礫層は、いずれも中位段丘礫層に対比されるので、低位段丘を構成するのは表層部のベニア状の細礫層だけである。

ダンサリ(Dangsari)—バンヨージン間(Fig. 3—e)の低位段丘は、ジュジョンリでは海岸線に平行に細長く、バンヨージンでは突出部に広く分布する。段丘面上の旧汀線高度は12~14 mである。比高3~5 mの段丘崖をつくって、ジョンハリではゆるやかに低地に、それ以外のところでは直接海に降りる。段丘面は厚さ2 m以下の淘汰のよい小円礫層(礫径1~2 cm)からなる。loc. 56, loc. 59, loc. 70の露頭がその好例で、基盤の花崗岩(白亜紀)の上に厚さ1.5~2 mの小円礫層がのっている。基盤岩には赤色風化殻が生成されているところもある(loc. 60)。

ウルサン湾以南のジャンシェンボからガンヤンリにかけて分布する低位段丘(Fig. 3—f)は、調査地域中最も断片的に分布する。段丘面上の旧汀線高度は9~12 mで、ウルサン湾以北に比べてやや低くなる。堆積物は厚さ1~2 mの礫層(礫径1~2 cm)で、その層相はバンヨージンの低位段丘堆積物とよく似ている。

4) 低地

調査地域には低地があまり発達しないが、それらは高度⁴⁾1~3 mの低い段丘面、浜堤、砂丘などに分けられる。ジュジョンリでは低位段丘の前面に幅20~30 m, 延長1 kmの低い段丘が分布する。段丘面の高度は3 m, 低位段丘面とは比高1 m程度の崖で境される。この段丘面は厚さ1.5 mの砂層・礫層の互層よりなり、礫層は径0.5~1 cmの円礫や扁平礫で構成され、砂層には斜交層理が明瞭である。ジュジョンリ以外の地域には低い段丘が認められない。小河川の河口付近には高さ1~2 mの浜堤が点在しているが、その規模はきわめて小さい。ところによっては、浜堤を核にして風成砂をかぶる小規模な砂丘がみられる。

一方、デーボーグリョン間 (Fig. 3—a) では、幅 10 m 内外の隆起ベンチがほぼ連続的に分布している。高度は 1~2 m であるが、北部に向かってやや高くなる。ベンチ上には、角礫 (最大径 20 cm)、円~亜円礫 (径 5 cm 前後)、扁平礫、粗砂などがまじってうすく堆積している。

5) 海底平坦面

調査地域の北部ヨンイル湾の海底には、-10~-30 m と -40~-70 m⁵⁾ の 2 段の平坦面がある (Fig. 5)。後者は、その形態、砂および泥からなる底質などから沈水三角州と思われ、おそらく現在より海水準が低かった時にヒョンサン (Hyeongsan) 江の延長

川が形成したものであろう。

ウルサン湾とジョンジャリ沖の海底に -20~-40 m の平坦面が認められるが、これらが現在の海水の営力によって形成されたものか、あるいは海水準変化に応じて形成されたものかは、わからない。

IV 段丘の特徴

前章で記載したところから、各段丘の特徴について次のような点を指摘しうる。

1. 高位段丘面はきわめて断片的に分布し、低い山地から張り出した尾根や丘陵の頂に残存するところが多い。しかも、堆積物がみられるところは少なく、あってもたいていベニア状の堆積物である。しかし、まれに中位段丘や低位段丘の堆積物の下に高位段丘礫層のみられることがあり、ところによっては 70 m 以上の起伏を埋めて堆積したと考えられる。このように高位段丘礫層の厚いところでは、下部は河成の層相を呈するのに対して、上部は浅海性の層相を呈するので、高位段丘面は海進期に形成された海成面であると考えられる。なお、高位段丘礫層は風化を受けて、いわゆる“クサリ礫”になっており、段丘面には赤色土ないし赤色風化殻が生成されている。

2. 中位段丘は調査地域を通じてほぼ連続的に分布し、とくに北部地域で面の広さ、連続性がまさっている。一般に段丘堆積物の厚さは 5 m 以下で、斜交層理の発達した浅海性の層相を呈する。しかし、ナアリ付近のように、ところによっては下部は河成、上部は海成の層相を示すやや厚い堆積物のみられることもある (loc. 12, loc. 15)。したがって、この段丘面も海進期に形成されたと考えられる。一般に、この段丘の堆積物は新鮮な礫層である。

3. 低位段丘は、中位段丘とともに面が広く、連続性がよいが、とくに海岸の突出部で発生する。低位段丘堆積物はいずれもきわめてうすく、中位段丘礫層の上ののるベニア状の細礫層よりなり、両者の

Fig. 5 Submarine topography and river systems
10~110 : depth (m) G : gravel M : mud S : sand Sh : shell.
(Data on depth and bottom deposits are based on the Japan Hydrographic Office chart 305.)

Fig. 6 Projected profile of former shoreline on terraces
A: terrace surface B: points measured.

間に不整合関係は認められない。したがって、低位段丘面は海退期における海水準の一時的停滞時に形成されたと考えられる。なお、中位段丘や低位段丘の構造は基盤岩石の性質によって地域的に異なる。両段丘面が最も広く、連続的に分布する北部地域では、その基盤は主として火山岩（第三紀）よりなる。ここでは、大部分のところで、段丘面に基盤が露出し、堆積物はほとんどみられない。これに対して、段丘面がやや厚い堆積物よりなる地域では、その基盤は泥灰岩、頁岩など侵蝕に対して抵抗性が相対的に小さい堆積岩からなる。また、花崗岩を基盤とするバンヨージン付近では、段丘面は厚さ2m前後のうすい堆積層からなっている。

V 旧汀線の変位からみた地殻変動

Fig. 6 は調査地域における各段丘面上の旧汀線高度の実測値を現海岸線の一般方向に投影したものである。高位段丘の旧汀線は先に述べたように、きわめて断片的にしか認められないので、その変位を細かく論ずることはむずかしい。Fig. 6 を一見すると、中位段丘および低位段丘の旧汀線はほぼ平行しているが、ウルサン湾を境に中位段丘の旧汀線高度が約10m 急変することが認められる。すなわち、ウルサン湾をはさみ、東側のバンヨージンの旧汀線高度(42m)が西側のジャンシェンボのそれ(33m)に対

して急に高くなる。しかし、低位段丘の旧汀線高度にはここで大きな違いがみられない。

Fig. 7 Summit level of the study area
contour interval: 100 m.

ところで Fig. 7 をみると、ウルサン湾東岸から北北西方向へ延びるブルグッサ山地は非対称的断面を示し、西側の急斜面に対して東側はゆるやかな斜面を呈している。この山地の西側にはドン (Dong) 江が直線状にブルグッサ山地に並走してウルサン湾に注ぎ、その左岸 (ブルグッサ山地の西側) に沿う山麓には、分離丘陵が点在するとともに、扇状地が連続的に分布する。これらの事実から、ブルグッサ山地の西斜面は断層崖であり、ドン江の谷 (ウルサン湾を含む) は構造谷である可能性が考えられる。

調査地域の地質構造は、先に述べたように、大体北北東—南南西方向のヤンサン断層、ウルサン断層などが支配的であって、これらの断層は南東落ちの階段断層である。しかし、非対称的地形を示すブルグッサ山地は、これらの構造方向にやや斜交するとともに、西側が陥没して、ウルサン断層との間に細長い地溝性低地を形成する。これらの断層は白亜紀末期から中新世まで活動したと考えられているが (Son *et al.*, 1968; Yoon, 1975)、中位段丘の旧汀線の変位からみて、ブルグッサ断層は第四紀後半にも活動したと判断され、モリリョン断層とともに、その東側の山地を1つの block として傾動させたと考えられる。

一方、低位段丘の旧汀線は、調査地域の南部から北部に向かってやや波状をなして、しだいに高度をやや増しているだけで、中位段丘を変位させたブルグッサ断層の活動は低位段丘面形成期以後には認められない。

VI 地形発達

いままで述べたことに基づいて、調査地域の地形発達は次のように考えられる。

1. 白亜系～第三系よりなる小起伏の山地が沈水して、高位段丘面が形成された。

2. 高位段丘面形成後、海退をはさんで海進があり、中位段丘面が形成された。この時期に、高位段

丘面には赤色土が生成された。

3. 中位段丘面形成後、ブルグッサ断層の活動により、ウルサン湾より北部の地域はその南部より約10 m 示差的に隆起した。

4. 中位段丘面の形成後の海退の一時的停滞期に、低位段丘面が形成された。

5. ヴェルム氷期の最盛期には海水準が-70m以下まで低下し、沈水三角州などの海底平坦面が形成された。

6. 後氷期には、現海面より1～3 m 高い段丘や浜堤などが形成された。

本研究を行なうにあたって終始ご指導をいただいた東京大学理学部地理学教室の吉川虎雄教授に心より感謝いたします。また、同教室の佐藤 久教授・阪口 豊助教授をはじめとする諸先生方からのご教示、大学院の院生諸氏の討論・助言、在日留学中、研究生生活の過程でお世話になった職員の方々に厚くお礼を申し上げます。本研究は、1977年2月日本第四紀学会研究発表会にて発表されたものである。

(投稿 1977年4月1日)
(受理 1977年10月1日)

注

- 1) 現地調査は1976年7月～8月にかけて行なった。現地調査に先立って、2.5万分の1地形図と2万分の1空中写真を用いて、予察地形学図を作った。
- 2) 旧汀線高度の測定には高度計 (玉屋製) を使用し、1時間以内にすべて海面によって補正しながら、1～2 km ごとに行なった。
- 3) マンセル色名帖の10 R 5/3～10 R 5/6 で、表土とともに礫層も同じ色を呈している。
- 4) 沖積低地の高度はハンドレベルで測った。
- 5) 水深は25万分の1海図 (日本水路部製作) からよみとった。

* 投稿者の呼称による一編集専門委員会。

文 献

- 小林貞一 (1931) : 朝鮮半島地形発達史と近代地史との関係についての一考察。地理評, 7, 523～550, 628～648, 708～733.
- 多田文男 (1941) : 朝鮮の地形 (講演要旨)。地理評, 17, 504～505.
- 立岩 巖 (1924) : 5万分の1地質図幅『延日・九龍浦及朝陽』朝鮮総督府地質調査所。
- 立岩 巖 (1976) : 『朝鮮—日本列島地帯地質構造論

- 考』東京大学出版会, 654 p.
- 吉川虎雄(1946): 朝鮮半島中部の地形発達史. 地質雑, 53, 28~32.
- Kim, S. W. (1973): A study on the terraces along the southeastern coast (Bang-eo-jin-Pohang) of the Korean Peninsula. Jour. Geol. Soc. Kor., 9, 89~121.
- Oh, G. W. (1968): A study on tombolo and lagoon along the coast of Korean eastern sea. M. S. Thesis of Kyeong Pook Univ., 51 p.
- Reedman, A. J. and Um, S. H. (1975): Geology of Korea. Geological and Mineral Institute of Korea, 133 p.
- Son, C. M., Cheong, C. H., Kim, B. K., and Lee, S. M. (1968): Study of the Mesozoic crustal, igneous activities and mineralizations. Minist. Sci. Tech. Korea, 31 p.
- Yoon, S. (1975): Geology and paleontology of the Tertiary Pohang Basin, Pohang District, Korea. Jour. Geol. Soc. Kor., 11, 187~214.
- Yoon, S. (1976): The geological and paleontological study of the Tertiary deposits of the Janggi-Eoil District of Korea. Busan National Univ. Jour., 21, 11~19.

THE GEOMORPHIC HISTORY OF THE SOUTHEASTERN COAST OF THE KOREAN PENINSULA

Geonhwan OH*

The study area, from Janggigok to Dangweol, is located in the southeastern part of the Korean Peninsula (Fig. 1).

Marine terraces distributed along the coast of the area were classified into three levels according to their altitude and continuity (Fig. 3); 1) the high terrace (Gampo surface), 2) the middle terrace (Seakcheonri surface), and 3) the low terrace (Sanhari surface).

The author investigated these terraces in order to clarify the geomorphic history of the area. The main results are as follows;

1) The high terrace (elevation 60 to 80 m) is scattered throughout the area. This terrace surface is mostly an abrasion bench in origin occurring on the top of low hills and ridges which are composed of Cretaceous and Tertiary series (Fig. 2), and are partly covered with highly weathered gravel beds whose facies are of marine origin. At the type locality of Gampo (Fig. 4), its surface consists of weathered gravel beds more than 3 m thick of wellsorted flattish and rounded pebbles. Red soils and red weathered crusts, indicating past warm climatic conditions, are found on the surface of this terrace.

2) The middle terrace is the most widely and continuously distributed among the terraces in the area. The former shoreline on this terrace is 30 to 50 m in height. The terrace surfaces is composed of well-sorted gravel beds filling small relief of bed rocks and in places overlying unconformably the weathered gravel beds of the high terrace. These gravel beds are mainly of marine origin, but at some places, their facies change from fluvial to marine from lower to upper. Soils on this terrace is pale orange in color.

3) The low terrace (elevation 10 to 20 m high) is distributed as continuously as the

middle terrace, especially conspicuous on headlands along the coast. The surface of this terrace is covered with veneers of fine-medium pebbles overlying the lower gravel beds of the middle terrace.

4) From the displacement of the former shoreline on the middle terrace, it was inferred that the Bulgooksa fault, whose axis was NNW-SSE from Bulgooksa to Ulsan Bay, was active after the formation of the middle terrace, which was dislocated by about 10 m at Ulsan Bay. However, it was inactive after the formation of the low terrace (Fig. 6).

The geomorphic history of the study area can be summarized as follows ;

a) The surface of the high terrace was formed during the period when the dissected low hills and ridges were submerged.

b) By the transgression succeeding to the regression, the surface of the middle terrace was formed. Red soils and red weathered crusts on the surface of the high terrace were formed in this period. After the formation of this terrace, the Bulgooksa fault was active and the middle terrace was dislocated at Ulsan Bay.

c) During a temporary cessation of the regression, the surface of the low terrace was formed by marine abrasion.

d) The submerged delta (40 to 70 m deep) located in Yeonil Bay (Fig. 4) was formed by the extended Hyeongsan River when sea level dropped below 70 m deep during the Würm glacial stage.

e) The Holocene terrace and beach ridges (elevation 1 to 3 m) which were distributed poorly along the coast were formed by the post-glacial transgression.