らい菌における菌体内代謝産物の動態解析

宮本友司*

国立感染症研究所ハンセン病研究センター

〔受付・掲載決定：2017 年 8 月 29 日〕

キーワード：らい菌、代謝産物、代謝機構

はじめに

Mycobacterium leprae (らい菌) は、人工培地で培養が不可能である偏性細胞内寄生菌であり、その一回の細胞分裂には約二週間を要する。これらの要因は、偽遺伝子を極めて多く含むそのゲノム構造に起因すると推測されてきた¹⁾。しかしながら、これまで、比較ゲノム解析やプロテオミクス解析がらい菌において数多く行われてきたが、人工培養が不可能である原因の解明には未だ至っていない。一方、らい菌の菌体成分については、Phenolic glycolipid-I (PGL-I) をはじめとした糖脂質類が病原性や免疫原性と関連していることが明らかにされている²⁾。しかし、菌体成分にはもう一つの主要成分として、アミノ酸や有機酸といった代謝産物成分が含まれる。結核菌においては、これらの代謝産物解析による細胞内寄生時の代謝機構が一部明らかになってきているが³⁾、らい菌については解析自体が皆無であり、その動態及び代謝メカニズムは全く不明である。らい菌の代謝機構については、そのゲノム構造からある程度予測することもできるが、複雑に連携した各代謝機構を遺伝子の面からひも解くには限界もある。本研究では、これまでに実施されていないらい菌の代謝産物解析を行うことで、ハンセン病の発症機構解明へと繋がる可能性のある特異的な代謝機構を明らかにすることを試みた。

研究方法

らい菌 (Thai-53 株) をヌードマウスの footpad に接種し、菌を増殖させるため 12 カ月間飼育した⁴⁾。12 カ月後、ヌードマウスの footpad から高坂らの手法に従って菌体を取り出し^{5,6)}、 2.5×10^{10} 個の菌体を 5 ml の Hanks' balanced salt solution (HBSS) に懸濁した。その後、最終濃度が 0.05 % となるように trypsin を添加し、37℃で 1 時間保持した。Trypsin 処理後の菌体を Isopore Membrane Filter (HTTP04700) (Millipore) で回収、Milli-Q water で洗浄後、内部標準物質を含有するメタノールに浸漬させ菌体内代謝産物を溶出させた⁷⁾。菌体内代謝産物を含むメタノール溶液から脂質成分及び高分子産物を除去するため、クロロホルムで洗浄、5-kDa cut-off filter (UFC3LCCNB) (Human Metabolome Technologies) で濾過した後、解析に供した⁷⁾。コントロールとして、らい菌を接種していないヌードマウス由来 footpad (12 カ月飼育) 及び 7H9 broth supplemented with 10% ADC で培養した *Mycobacterium bovis* BCG (2.5×10^{10} 個) も調整し、同様の処理を施した後解析に供した。試料は 3 群 (らい菌、未接種 footpad、BCG) から 3 試料ずつ独立に取得、計 9 試料を解析した。

各試料に含まれる代謝産物の同定及び定量には、capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) 解析を実施した。機器は Agilent 社製の CE-TOFMS System を使用した⁷⁾。各試料から得られたスペクトルは MasterHands ver.2.16.0.15 (Keio University) で処理し、Human Metabolome Technologies のデータベース検索により相当する化合物を同定した⁷⁾。各化合物の相対定量は、得られたピークエリアの内部標準物質に対す

*Corresponding author:

国立感染症研究所ハンセン病研究センター
〒189-0002 東京都東村山市青葉町 4-2-1
Tel : 042-391-8211 FAX : 042-394-9092
E-mail : yujim@nih.go.jp

る面積比から算出した⁷⁾。各化合物の含有量が2群間で統計的有意差があるかどうかは、Welch's t test で検定した。各群で同定された化合物の主成分分析 (Principal component analysis: PCA) には MetaboAnalyst 3.0 を使用した⁸⁾。

結 果

らい菌は footpad から精製するため、それらの代謝産物には footpad 由来のものも混在している。従って、同様に処理した未接種 footpad 群の解析も同時に行い、バックグラウンドとしてらい菌群から差し引き、真にらい菌に由来する化合物の同定及び定量を試みた。CE-MS 解析の結果、らい菌群から 206 種、未接種 footpad 群から 49 種の化合物が検出された。206 種の化合物の内、158 種はらい菌群からのみ検出された。一方で、48 種の化合物がらい菌及び未接種 footpad 群から共通に検出された。その量比を2群間で比較すると、らい菌群の含有量が圧倒的に多かった。従って、らい菌群における48種の含有量から、バックグラウンドとして、未接種 footpad 群の含有量をそれぞれ差し引き、35 種の化合物をらい菌群のものとして算出した。上記の 158 種と併せ最終的に 193 種の化合物をらい菌から抽出した代謝産物として同定した。

らい菌には 193 種の代謝産物が含まれることが判明したが、この結果だけではその特徴は不明である。従って、他の抗酸菌とどのような違いがあるのか、その比較を行うため BCG の代謝産物解析を実施した。らい菌と同様の抽出処理を施し、同一の菌数に由来する抽出物の CE-MS 解析の結果、137 種の化合物が検出された。らい菌と BCG の間で代謝産物の総合的な比較を行うため主成分分析 (PCA) を実施した結果、各試料群はらい菌及び BCG でそれぞれ近接する集団を形成していたが、各試料群はらい菌と BCG の間で離れた集団として認識された。このことは、らい菌と BCG 由来の代謝産物のプロファイルは機能的に別個であることを示唆するものである。

らい菌と BCG からは、共通の代謝産物として 84 種の化合物が同定され、さらに 109 種がらい菌から、53 種が BCG からそれぞれ特異的に検出された。これらの中で、特異的に観察された化合物について、その機能的な分類を行った結果、らい菌の 109 種の内、68% がアミノ酸及びその代謝関連化合物であり、一方、BCG (53 種) ではそれらの割合は 4% であった。逆に、エネルギー産生や核酸関連代謝産物の割合は、らい菌で低く BCG で高い傾向を示した。

さらに、共通に観察された 84 種の化合物について、量的な比較をらい菌及び BCG の間で実施し、らい菌での検出量の多い順番に化合物を並べた上で機能的な分類を行った。その結果、10 倍以上の差が認められる化合物のほとんどがアミノ酸類であった。一方、10 分の 1 以下 (BCG で 10 倍以上多い) の差が検出された化合物群はその多くがエネルギー産生に関連する代謝産物であった。

考 察

らい菌と BCG における代謝産物解析により、それらの総合的なプロファイルが互いに異なっていることが判明した。らい菌でアミノ酸類が偏在していた理由としては、宿主内での偏性細胞内寄生性を維持するために、アミノ酸の生合成を活発化させている、又は宿主からアミノ酸を取り込む能力が亢進している、などの可能性が推測される。一方で、らい菌でその含有量が BCG に比べ極めて低い化合物の大部分が、エネルギー産生に関連する代謝産物であったことは、らい菌ではエネルギー代謝系が低下或いは抑制されていることを示している。この結果は、エネルギー代謝に関わるらい菌ゲノム (遺伝子) の約半数が偽遺伝子化しているという事実からも裏付けられる。らい菌が人工培養出来ない要因の一つは、エネルギー代謝系の不具合ではないかという仮説がこれまで提唱されていた。エネルギー代謝系の不具合は、上記の遺伝子側の特徴からある程度予測されていたが、本研究は形質の面から初めてその証明を行ったものであるといえる。さらに、結核菌等においても代謝産物解析の報告はいくつかなされているが、それらは全て試験管内で増殖した培養菌体を使用したものであり、らい菌のように生体内で増殖した菌体の解析は皆無である。従って、本研究はらい菌に留まらず、生体内で増殖した抗酸菌の代謝産物解析という点においても新たな知見を提示するものである。

本レビューは「Profiling of Intracellular Metabolites: An Approach to Understanding the Characteristic Physiology of Mycobacterium leprae. PLOS Neglected Tropical Diseases 10: e0004881, 2016」及び「第 90 回日本ハンセン病学会学術大会日本ハンセン病学会賞受賞記念講演」で発表した内容を基に執筆したものである。

謝 辞

本研究の遂行に際しご協力頂いた全ての国立感染症研

究所ハンセン病研究センター関係者の方々に感謝の意を表します。

文 献

- 1) Cole ST, Eglmeier K, Parkhill J, James KD, Thomson NR, et al: Massive gene decay in the leprosy bacillus. *Nature* 409: 1007-1011, 2001.
- 2) Guenin-Macé L, Siméone R, Demangel C: Lipids of pathogenic *Mycobacteria*: contributions to virulence and host immune suppression. *Transbound Emerg Dis* 56: 255-268, 2009.
- 3) Nandakumar M, Prosser GA, de Carvalho LP, Rhee K: Metabolomics of *Mycobacterium tuberculosis*. *Methods Mol Biol* 1285: 105-115, 2015.
- 4) Matsuoka M: The history of *Mycobacterium leprae* Thai-53 strain. *Lepr Rev* 81: 137, 2010.
- 5) Kohsaka K, Matsuoka M, Hirata T, Nakamura M: Preservation of *Mycobacterium leprae* in vitro for four years by lyophilization. *Int J Lepr Other Mycobact Dis* 61: 415-420, 1993.
- 6) Shepard CC, McRae DH: A method for counting acid-fast bacteria. *Int J Lepr Other Mycobact Dis* 36: 78-82, 1968.
- 7) Soga T, Ohashi Y, Ueno Y, Naraoka H, Tomita M: Nishioka T: Quantitative metabolome analysis using capillary electrophoresis mass spectrometry. *J Proteome Res* 5: 488-494, 2003.
- 8) Xia J, Sinelnikov IV, Han B, Wishart DS: MetaboAnalyst 3.0-making metabolomics more meaningful. *Nucleic Acids Res* 43: W251-W257, 2015.

Dynamics of Intracellular Metabolites in *Mycobacterium leprae*

Yuji Miyamoto*

Department of Mycobacteriology, Leprosy Research Center, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan

[Received / Accepted: 29 August, 2017]

Key words: *Mycobacterium leprae*, metabolites, metabolic system

Mycobacterium leprae, the causative agent of leprosy, possesses unique features including inability to proliferate in vitro. In the cellular components of *M. leprae*, the fate of intracellular metabolites, assumed to be associated with such physiology, remain largely unknown. In this study, we found that amino acid species are significantly accumulated, while most of intermediates related to central carbon metabolism markedly decreased, in the intracellular metabolite fraction of *M. leprae*, as compared with that of other mycobacteria. Our results show the unique metabolite dynamics of *M. leprae* for the first time and these insights might contribute to understanding the physiological characteristics of leprosy.

*Corresponding author:

Department of Mycobacteriology, Leprosy Research Center,
National Institute of Infectious Diseases.
4-2-1 Aoba cho, Higashimurayama-shi, Tokyo 189-0002, Japan
Tel: +81-42-391-8211, Fax: +81-42-394-9092
E-mail: yujim@nih.go.jp