癩に於ける植物性神経の變化に就いて

京都帝國大學病理學教室

瀧 野 益 市

私は曩に、癩に於ける植物性神経末梢部の變化に就いて、報告致しました。然し、癩に於ける植物性神経の臨床上の徴候は、單に、末梢部の變化のみでは説明されない場合があります。末梢神経は、多くは混合神経であつて、其の中に色々の機能を有する纖維を含んで居ります。それでありますから、若し一定の癩性變化が、神経幹内に生じますと、知覺、運動等の機能障害の外に、往々、汗腺、脂腺、粘液腺等の植物性神経の機能障害をも、併發するものであります。然るに、癩に於て、屢々、植物性神経の機能障害が、より單獨に表はれる場合があります。例へば、皮膚の一定の範圍に、主として汗腺の分泌障害のみが表はれる。その部分には知覺障害を全く缺く。そして硬結をも觸れない。この場合には、恐らくは、植物性神経末梢部の變化に歸するよりも、植物性神経中樞部の變化に歸した方が、より妥當の如く思はれます。

そこで、私は10例の結節癩と、1例の神経癩とに於て、植物性神経末梢部の外に、其の中樞部（交感神経節、頸靜脈神経節及び節狀神経節）をも檢索して興味ある所見を得ました。其の後、私は、櫻井氏と共に、多數の神経癩及び浸潤癩に於ても、この方面の檢索を遂げ、各癩型に於ける植物性神経の變性及び癩菌の分布狀態、其の傳播徑路等を相比較觀察致しました。詳細は後程報告し度いと思ひます。本論文の詳細は獨文に譲る（自抄）。

DIE VERÄNDERUNG DER VEGETATIVEN NERVEN BEI DER LEPROSE.

VON

Masuichi Takino.

(Aus dem pathologischen Institut   kaiserlich-japanischen Universität
Kyoto, Japan.)

(Mit 1 Tafelabbildung.)

INHALT:

Erster Abschnitt. Der zentrale Teil des vegetativen Nervensystems.

- I. Einleitung.
- II. Die normale Anatomie und Histologie des Grenzstranges und des Ganglions nodosum.
- III. Untersuchungsmaterial und Untersuchungsmethode.
- IV. Makroskopische und mikroskopische Befunde.
- V. Zusammenfassung.
  - (1) Die Verbreitung der Leprabazillen in den Zentren des vegetativen Nervensystems.
  - (2) Über die Verbreitungsweise der Leprabazillen nach den Zentren des vegetativen Nervensystems.
  - (3) Über die pathologischen Veränderungen der Nerven Elemente des sympathischen Grenzstranges bei Lepra.
    - (a) Die Veränderungen der sympathischen Ganglienzellen.
    - (b) Die Veränderungen der Markscheiden.
    - (c) Über die Veränderungen der Schwannschen Zellen bei Lepra.
    - (d) Das Verhalten der Kapselzellen der sympathischen Ganglienzellen zur leprosen Entzündung.
  - (4) Über die Veränderung des Ganglions nodosum bei Lepra.
  - (5) Über die Veränderungen der Fibrillennetze der Vagusganglienzellen bei Knotenlepra.
  - (6) Die Veränderungen der vegetativen Nerven bei einem Fall von Nervenlepra.

I. Einleitung.

Wie ich schon berichtet habe, erleiden die peripheren Nervenfasern der Haut neben den sensiblen und motorischen bei der Lepra gewisse Veränderungen, welche

klinisch je nach dem Stadium der Degeneration verschiedenartige Symptomen hervorrufen, nämlich Störung der Schweiss- und Talgsekretion in gewissen Gegenden der Körperoberfläche und abnorme Färbung und Entfärbung der Haut. Diese Symptomen treten in den meisten Fällen nebeneinander auf. So sehen wir z. B. häufig An- und Hypästhesie in den abnorm verfärbten Gebieten oder Störung der Schweiss- und Talgsekretion in den ergriffenen Hautpartien. Was die Piloerektion der Haarbalgmuskeln bei der Lepra anbetrifft, so hat sich bis jetzt noch niemand damit beschäftigt. Ich habe zwar die Piloerektion in den ergriffenen Hautpartien niemals beobachtet, aber ich konnte histologisch an den Nerven Degeneration nachweisen. Da die peripheren Nervenbündeln in den meisten Fällen aus gemischten, d. h. marklosen und markhaltigen, Nervenfasern bestehen, so ist das Zusammentreffen der oben erwähnten Symptome sehr wahrscheinlich, wenn gewisse Veränderung durch das Eindringen der Bazillen innerhalb der Nervenbündel entstehen. Wir treffen aber gelegentlich auch Fälle, wo sich diese Symptome, wie Trockenheit, Entfärbung oder abnorme Färbung, mehr vereinzelt in gewissen Gegenden der Körperoberfläche vorfinden, während die Sensibilität daselbst ziemlich gut erhalten, oder völlig intakt ist und von Infiltration sich nichts vorfindet. Es liegt hierbei die Annahme nahe, dass es sich bei diesen vereinzelt auftretenden Symptomen mehr um lepröse Veränderungen des vegetativen Zentrums, wie des sympathischen Grenzstrangs und des Ganglions nodosum usw., als um solche der peripheren Nervenbündel handelt. So habe ich mir vorgenommen, nicht nur die peripheren Nerven, sondern auch das vegetative Zentrum bei der Lepra zu studieren. Hierzu habe ich den sympathischen Grenzstrang und das Ganglion nodosum als Material ausgewählt.

Wie die normale Histologie zeigt, besteht der Grenzstrang nicht allein aus rein sympathischen Nervelementen, wie sympathischen Ganglienzellen und marklosen Nervenfasern, sondern auch aus markhaltigen Nervenfasern, die zu anderen Nerven Gruppen gehören, wahrscheinlich zum parasympathischen und zum Spinalnervensystem. Wenn also eine lepröse Veränderung im Grenzstrang vorkommt, so degenerieren neben den sympathischen Nervelementen auch die markhaltigen Nervenfasern, die im Grenzstrang enthalten sind, und zwar im allgemeinen stärker als die sympathischen Nervelemente.

Woher stammen nun diese markhaltigen Nervenfasern eigentlich, welche sich innerhalb des sympathischen Grenzstranges befinden?

Der Grenzstrang steht in Verbindung mit dem Ganglion nodosum und den Spinalnerven. Beim Studium der pathologischen Veränderung des vegetativen Nervensystems bei der Lepra ist diese anatomische Beziehung zwischen dem Grenzstrang, den Spinalnerven und dem Ganglion nodosum besonders wichtig, da die Leprabazillen mit Vorliebe längs der Nervenbündel oder zwischen den vereinzelt Nervenfasern sich verbreiten. Ich möchte deshalb eine kurze Schilderung der normalen Anatomie und Histologie des Grenzstranges, des Ganglions nodosum, sowie der Beziehung zwischen diesen beiden voranschicken, um die Pathologie des vegetativen Nervensystems verständlich zu machen.

II. Die normale Anatomie und Histologie des Grenzstranges und des Ganglions nodosum.

Der Grenzstrang liegt zu beiden Seiten der Wirbelsäule. Im Halsteil des sympathischen Grenzstranges sind in der Regel drei Ganglien eingelagert: Ganglion cervicale superius, Ganglion medium und das grosse Ganglion cervicale infimum. Die Halsganglien senden stets Verbindungsäste zum N. vagus, worüber Schinozaki neuerdings eingehend untersucht hat. Nach ihm ist das Verhalten des N. vagus zu dem Sympathicus auf der rechten Seite viel inniger als auf der linken. Iwama wies nach, dass die Nervenfasern bei der Katze mittelst dieser Verbindungsäste zwischen dem N. vagus und dem Halsganglion von dem einen Nerven zum anderen übergehen. Man kann leicht vermuten, dass die im Grenzstrang enthaltenen Markscheiden von dem Nervus vagus abstammen. Wie steht es mit der Verbindung zwischen dem Grenzstrang und den Spinalnerven?

Lateralwärts ist der Sympathicus durch die Rami communicantes mit den Spinalnerven verbunden. Nach der Literatur haben viele Autoren, wie Volkmann, Kölliker, Onodi, Gaskell und Yoshio Matsui, auf diesem Gebiete gearbeitet. Nach ihnen verlaufen die markhaltigen Nervenfasern, die aus dem Rückenmark durch die Rami communicantes in den sympathischen Grenzstrang eintreten, in diesem immer nach zwei Richtungen auf- und abwärts. Nur die Resultate Turschkowskys weichen von denen der obigen Autoren ab. Nach ihm steigen die markhaltigen Nervenfasern aus dem Rückenmark sämtlich abwärts. Kurz gesagt, steht der Grenzstrang anatomisch mit den Spinalnerven und besonders mit dem Nervus vagus, in inniger Beziehung, und die im sympathischen Grenzstrang enthal-

tenen markhaltigen Nervenfasern stammen teils von dem Nervus vagus, teils von den Spinalnerven her.

Histologisch besteht der Grenzstrang aus Ganglienzellen verschiedener Grösse, Kapselzellen, marklosen sowie markhaltigen Nervenfasern und Schwannschen Zellen. Nach der Markscheidenfärbung sind die Markscheiden im Ganglion bald vereinzelt, bald in Bündeln erkennbar. Sie sind im allgemeinen sehr dünn. Ihnen sind aber dickere Markscheiden, deren Markgerüst Fischflossenform besitzt, in geringer Anzahl beigemischt. Diese Markscheiden kommen unter den dünnen entweder vereinzelt oder in kleinen Bündeln vor.

Die Grösse der Ganglienzellen ist verschieden. Gelegentlich sah ich Ganglienzellen, die ebenso gross wie die grossen Vagusganglienzellen waren. Tokura berichtete, dass in den sympathischen Ganglien einer ausgewachsenen Katze auch Nervenzellen cerebros spinaler Herkunft vorkämen. Ob die von mir im Ganglion gefundenen auffallend grossen Ganglionzellen wirklich cerebros spinaler Herkunft sind, steht es vorläufig noch dahin.

Das Ganglion nodosum: Die Wurzelfäserchen, die aus der Medulla oblongata entspringen und in den Nervus vagus eintreten, sind, wie die Markscheidenfärbung beweist, markhaltig. Diese Wurzelbündel sind in weit überwiegender Mehrzahl aus ganz dünnen markhaltigen Fasern zusammengesetzt, zwischen denen dickere mit segmentierter Markscheide eingelagert sind.

Diese dicken Faserbündel treten weder in das Ganglion jugulare noch in das Ganglion nodosum ein. Die Bündel dicker Markscheiden entsprechen den Bahnen des motorischen N. laryngeus inferior. Bei den Nerven mit zarter Markscheide handelt es sich wahrscheinlich um viscerale Fasern. Ausserdem finden sich hier auch vereinzelt marklose, also nackte Achsenzyylinder. Auf den Querschnitten durch den Halsvagus kann man also stets verschiedenartige Nervenfasern feststellen, nämlich mit einem dicken Markmantel versehene und schmale, mit ganz zarter Markscheide und nackte Achsenzyylinder.

III. Untersuchungsmaterial und Untersuchungsmethode.

Das Material für die Untersuchung des Zentrums des vegetativen Nervensystems bestand aus dem Grenzstrang und Ganglion nodosum von 11 Sektionsfällen und zum Zweck der Untersuchung der peripheren vegetativen Nervenfasern habe

ich die Hautstücke aus verschiedenen Körpergebieten derselben möglichst frischen Leichen verwendet und ausserdem solche, welche sensibel gestört und chirurgisch entfernt worden waren. Das Leichenmaterial erhielt ich vom Sotojima-Leprakrankenhaus zu Osaka. Die Leichen (Fall 1, 2, 5, 6) waren im kalten Winter sezirt worden. Die Hautstücke, Ganglion nodosum und der Grenzstrang, welche aus den Leichen (Fall 1, 2, 3, 6) stammen, wurden sofort nach dem Tode oder binnen 5—12 Stunden nach dem Tode in 10%iger Formalinlösung oder in 80%iger Alkohol fixiert.

Zur Färbung der Achsenzylinder und Ganglienzellen verwandte ich hauptsächlich die Bielschowskyschen und die Cajalsche Achsenzylinderfärbungsmethode, zur Färbung der Markscheiden die Kultschitzkysche und die Kamijosche Markscheidenfärbung und zur Bazillenfärbung die modifizierte Ziehl-Neelsensche Methode. Zur Darstellung der Verbreitung der Bazillen innerhalb der Ganglienzellen habe ich die durch Säurefuchsin gefärbten Stücke mit Toluidinblau nachgefärbt.

Zur Untersuchung der fettigen Degeneration der Nervenelemente verwandte ich Sudan-III-oder Scharlachrotfärbung, oder die Kombination der Bielschowskyschen Achsenzylindersilberimprägnation und Scharlachrotfärbung. Damit es nicht zur Verwechslung der pathologischen Veränderungen der verschiedenen Nervenelemente mit den postmortalen kam, beobachtete ich sehr vorsichtig, indem ich möglich frische Materialien verwandte und die betreffenden mikroskopischen Befunde mit zahlreichen Materialien verglich, welche von nichtleprösen Leichen stammten.

IV. Makroskopische und mikroskopische Befunde.

Fall I. 22 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale superius dextrum.

Grösse normal, Konsistenz etwas hart, Schnittfläche nicht besonders.

Die entzündliche Zellinfiltration und das Granulationsgewebe sind überall sichtbar und zwar in der Umgebung der Blutkapillaren oder Lymgefässe und häufig auch zwischen den Ganglienzellen. Wenn auch nicht sehr oft, sah ich, dass die Ganglienzellen von der Zellinfiltration und den Granulationsgewebe völlig umgeben waren. Ausserdem treten die Zellinfiltration und das Granulationsgewebe häufig in die im Ganglion enthaltenen Nervenbündel ein. Die Zellinfiltration

wird hier in verschiedenen Stadien beobachtet, nämlich von den jüngeren, aus lauter Rundzellen bestehenden Stadien bis zu den älteren, in welchen schon in verschiedener Anzahl die Lepraglobi zu erkennen sind. Die Markscheiden sind dort gut erhalten und zeigen keine besondere Veränderung, wo sich weder Zellinfiltration noch Granulationsgewebe vorfinden. Dagegen sind die Markscheiden innerhalb der Zellinfiltration, besonders dort, wo die Lepraglobi schon mehr oder weniger zahlreich vorhanden sind, entweder sehr verödet oder fast verschwunden. An den übrigen Stellen, wo sich keine Globi vorfinden, selbst in der unmittelbaren Nähe der Zellinfiltrationsherde, sind die Markscheiden fast normal erhalten. Auf Grund meiner Beobachtung bin ich davon überzeugt, dass die Degeneration der im Ganglion enthaltenen Markscheiden wie die Veränderung der Hautnerven zu der Globibildung in inniger Beziehung steht.

Nach der Bazillenfärbung sind die Bazillen überall, nicht nur innerhalb der Zellinfiltrations- und Granulationsherde oder dicht in der Nähe davon, sondern auch zwischen den Nervenfasern an entfernten Orten nachzuweisen. Im Gegensatz dazu sind sie innerhalb der Ganglienzellen verhältnismässig nur selten feststellbar, und wenn, nur in sehr geringer Anzahl. Selbst in den Ganglienzellen, die innerhalb wie zwischen den Zellinfiltrationsherden oder gerade in der Nähe davon liegen, konnte ich nicht stets Bazillen feststellen. Trotz eifrigen Suchens gelang es mir nicht, in diesem Ganglion innerhalb der Ganglionzelle eine Bazillenanhäufung nachzuweisen. Was die Lepraglobi anbetrifft, so finden sie sich bald innerhalb sowie in der Nähe der Zellinfiltrations- und Granulationsherde, bald überall zwischen den Nervenfasern. Im allgemeinen zeigen die Ganglienzellen keine besondere Veränderung, d.h. die Nisslschen Körperchen und auch die Kerne sind im allgemeinen sehr gut erhalten. Selbst in den Ganglienzellen, welche in den Zellinfiltrationsherden und dem Granulationsgewebe oder dicht in der Nähe davon liegen, treten die Veränderungen nicht stets auf. Nur zerstreut finden sich leichte Veränderungen der Ganglienzellen vor. Nach der Sudan-III-färbung sind die Fettkörnchen überall in den Zellinfiltrations- und Granulationsherden und innerhalb der Lepraglobi, sogar zwischen den Nervenfasern vorhanden. Die Verbreitung der Fettkörnchen entspricht fast der der Bazillen. Innerhalb der Ganglienzellen konnte ich jedoch fast niemals die Fettkörnchen nachweisen, selbst in denjenigen nicht, die innerhalb der Zellinfiltrations- und Granulationsherd lagen oder mit denselben in Berührung standen.

Die Schwannschen Zellen sind im allgemeinen nicht gewuchert, selbst in der Nähe der Zellinfiltrations- und Granulationsherde nicht, während sie innerhalb derselben fast verschwunden sind. In der Nähe der Zellinfiltrations- und Granulationsherde sind die Schwannschen Zellen jedoch mehr oder weniger verändert und das Bindegewebe etwas vermehrt.

(2) Ganglion cervicale medium dextrum.

Makroskopisch nichts Besonderes, d.h. Konsistenz und Schnittfläche zeigen keine besondere Veränderung.

Zellinfiltration und Lepraglobi sind nirgends sichtbar. Schwannsche und Kapselzellen zeigen keine Wucherung. Die Ganglienzellen sind im allgemeinen gut erhalten. Nur die dickeren Markscheiden sind stellenweise leicht degeneriert. Die Bazillen sind weder zwischen den Nervenfasern noch zwischen den Ganglienzellen nachzuweisen. Nur einige Bazillen liegen zerstreut in den Ganglienzellen, meistens in deren peripheren Teilen.

Es ist interessant, dass die Bazillen ohne Bildung von Zellinfiltration oder Lepraglobi besonders in die Ganglienzellen eintreten können, während sie zwischen den Nervenfasern und den Ganglienzellen fast niemals gefunden werden.

(3) Ganglion cervicale inferius dextrum.

Makroskopisch ist die Grösse normal, die Konsistenz derb, und an der Schnittfläche sind punktförmige, gelbliche Flecken sichtbar.

Was die mikroskopischen Befunde anbetrifft, so sind sie denen beim Ganglion superius dextrum ähnlich. Die Granulations- und Zellinfiltrationsherde sind aber hier hauptsächlich zwischen den Nervenfasern und den Nervenbündeln vorhanden und nur selten auch um die Kapillaren und die Lymphgefäße herum. Die Zellinfiltration und die Granulation treten oft zwischen den Ganglienzellen. Die Bazillen werden überall gefärbt.

In diesem Falle konnte ich die Veränderungen der dem Zerfall verfallenen Schwannschen Zellen stufenweise verfolgen. Wie schon oben erwähnt, sind häufig in den Nervenbündeln Zellinfiltration und Granulationsgewebe zu beobachten. In der Nähe solcher Herde fand ich oft die Bazillen nicht nur zwischen den Schwannschen Zellen, sondern auch in deren Kernen selbst.

Dort wachsen die Bazillen und bilden Vakuolen. Wenn ein Bazillus in den Kern einer Schwannschen Zelle eintritt, so bildet sich eine Vakuole um den Bazillus herum, während die übrigen bazillenfreen Teile des Kerns fast normal

aussehen. In der Nähe der Granulations- und Zellinfiltrationsherde sind die Schwannschen Zellen im allgemeinen nirgends bedeutend gewuchert. In die Ganglienzellen in der Nähe der Granulations- und Zellinfiltrationsherde oder innerhalb derselben die Bazillen nicht immer ein. Häufig stösst man auf Bazillen in von den Granulations- und Zellinfiltrationsherden etwas entfernt liegenden Ganglienzellen. Es gibt auch Ganglienzellen, in welchen die Bazillen an einer Stelle gruppiert liegen und es dort zur Vakuolenbildung gekommen ist. Ganz wie bei der Schwannschen Zelle ist der übrige bazillenfreie Teil der Ganglienzellen in den meisten Fällen fast normal erhalten. Die Bazillen treten weiter in die Schwannschen Zellen ein, wo sie gedeihen und so endlich nach dem Verschwinden des Kerns Vakuolen entstehen. Gedeihen die Bazillen zwischen den Nervenfasern und werden dort Vakuolen gebildet, so werden die mit der Vakuole in Berührung kommenden Schwannschen Zellen dadurch gedrückt und gehen endlich zugrunde.

(4) Ganglion thoracale dextrum et sinistrum.

Zellinfiltration und Granulationsgewebe sind nirgends nachweisbar. Nur stellenweise sind die Bazillen in geringer Anzahl in die Ganglienzellen eingedrungen. Im allgemeinen sind die Ganglienzellen gut erhalten. Ob solche Ganglienzellen, welche nur wenige Bazillen enthalten, sich in ihrem feineren Bau verändern, werde ich durch weitere eingehende Untersuchungen feststellen. Die Markscheiden sind im allgemeinen gut erhalten, teilweise aber stark degeneriert.

(5) Ganglion lumbale et sacrale dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes. Die Zellinfiltration und das Granulationsgewebe, bzw. die Lepraglobi sind nirgends nachweisbar. Während von den Bazillen zwischen den Nervenfasern und den Ganglienzellen nichts zu sehen ist, finden sie sich dagegen in geringer Anzahl in den Ganglienzellen selber vor. Die Ganglienzellen und die Markscheiden sind im allgemeinen gut erhalten und die Schwannschen Zellen und die Kapselzellen nicht gewuchert. Die letzteren sind selbst um die bazillenhaltigen Ganglienzellen herum nicht vermehrt.

(6) Ganglion cervicale superius medium et inferius sinistrum.

Makroskopisch ist an keinem dieser Ganglien etwas besonderes zu bemerken. Nirgends sind Zellinfiltration und Globi nachweisbar. Im allgemeinen sind alle Nervelemente gut erhalten. Bazillen sind nur in geringer Anzahl vorhanden, und zwar vorwiegend in den Ganglienzellen.

Sonst nichts Besonderes.

(7) Ganglion thoracale sinistrum.

Makroskopisch und mikroskopisch nicht besonders. Nirgends sind Zellinfiltration und Lepraglobi nachweisbar. Bazillen finden sich nur wenige vor und hauptsächlich innerhalb der Ganglienzellen.

(8) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Grösse und Konsistenz normal. Zellinfiltration und Granulationsgewebe, bzw. Lepraglobi nirgends nachweisbar. Die Bazillen befinden sich nur sehr selten in den Nervenfasern und zwischen den Ganglienzellen während sie innerhalb der Ganglienzellen selber, wenn auch nicht diffus, so doch sehr reichlich vorhanden sind. Die Bazillen innerhalb jeder Ganglienzelle sind bald diffus verbreitet, bald stellenweise sruppiert. Die veränderten bazillenhaltigen Ganglienzellen treten nicht gleichmässig auf. Wo aber die Bazillen innerhalb der Ganglienzellen sehr reichlich vorhanden sind, sind die Nisslschen Körperchen am bazillenhaltigen Teile verschwunden oder färben sich dort dünn, und häufig bilden sich kleine Vakuolen, während der übrige bazillenfreie Teil der Ganglienzelle fast normal erhalten ist. Lokalisieren sich die Bazillen in den peripheren Teil der Ganglienzellen, so verschwinden die Nisslschen Körperchen dort, und es bilden sich oft sehr kleine Vakuolen, während an den zentralen Zellteilen die Nisslschen Körperchen noch gut erhalten sind. Wenn die Bazillen aber an einem Teile der Ganglienzelle gruppiert vorhanden sind, so verschwinden die Nisslschen Körperchen nur an dieser Stelle. Kommen die Bazillen in der Ganglienzelle diffus zum Vorschein, so verschwinden die Nisslschen Körperchen auch diffus. Der bazillenhaltige Teil der Ganglienzelle zeigt oft wabige Degeneration. Was die Kapselzellen anbetrifft, so sind sie im allgemeinen nicht gewuchert, selbst die in Kapselzellen den bazillenhaltigen Ganglienzellen nicht. Die Markscheiden sind im allgemeinen verhältnismässig gut erhalten. Nur teilweise haben die Markscheiden ihr Markgerüst verloren oder sind stark aufgequollen und bilden Vakuolen. Mittels der Sudan-III-färbung gelang es mir nicht, in den Nervenfasern und zwischen den Ganglienzellen Fettkörnchen festzustellen. Innerhalb der Ganglienzellen trifft man aber hellgelbe kleine Körnchen in den bazillenhaltigen Ganglienzellen an. Es scheint mir, dass die Lokalisation dieser hellgelblichen Körnchen der Verbreitung der Bazillen entspricht. Die Körnchen treten innerhalb der Ganglienzellen bald diffus, bald zirkumskript und bald nur in den peripheren

Teilen auf.

Fall II. 27 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale dextrum.

Die Konsistenz ist nicht so derb, die Kapsel etwas verdickt. In diesem Falle treten die Granulations- und Zellinfiltrationsherde nur im peripheren Teil des Ganglions auf. Im zentralen Teil konnte ich nicht einmal etwas von Zellinfiltration entdecken. Ebenso waren die Lepraglobi im peripheren Teil des Ganglions nachzuweisen, und zwar in der Nähe des das Ganglion umgebenden Bindegewebes. Auf Grund dieser Befunde glaube ich, dass die Zellinfiltration hierbei am peripheren Teile des Ganglions beginnt. Die Ganglienzellen und die Markscheiden sind im allgemeinen gut erhalten, abgesehen vom peripheren Teile, wo sie Hand in Hand mit dem Auftreten der Granulations- und Zellinfiltrationsherde sehr verödet oder sogar beinahe verschwunden sind. An dem peripheren Teile ist das Bindegewebe etwas gewuchert, besonders an den Stellen, wo die Globi entstanden sind. Die Schwannschen Zellen haben sich nicht vermehrt, selbst nicht in der Nähe der Zellinfiltrations- und Granulationsherde. Die Bazillen sind im zentralen Teil fast niemals festzustellen.

(2) Ganglion cervicale superius sinistrum.

Das Ganglion war mit einer daumenkopfgross angeschwollenen, derben Halslymphdrüse verwachsen und daher die Trennung des Ganglions von der letzteren fast unmöglich. Die Konsistenz des Ganglions ist etwas hart. Zwischen der Lymphdrüse und dem Ganglion sind bindegewebige Stränge vorhanden. Die Schnittfläche des Ganglions ist so gut wie normal. In dem dicken Bindegewebe, das die Verwachsung der Lymphdrüse mit dem Ganglion darstellt, treten die Rundzelleninfiltration stellenweise auf, dringen aber nicht in das Ganglion selber ein. In der Lymphdrüse stehen die leprösen Herden mit den tuberkulös-käsigen in direkter Berührung. Im Ganglion fand ich fast niemals Rundzelleninfiltration um die Blutkapillaren und die Lymphgefäße herum. Die Lepraglobi finden sich meistens nur im peripheren Teil des Ganglions, und zwar an der Seite der Verwachsung. Etwas entfernt davon liegen die Globi und die Granulationsherde zwischen den Ganglienzellen zerstreut. In der Mitte des Ganglions konnte ich fast niemals Granulationsherde, bzw. Globi nachweisen. Ausserdem sind die Lepraglobi das Septumbindegewebe entlang angeordnet. Es ist bemerkenswert, dass in diesem Fall die Globibildung nur im peripheren Teil des Ganglions auftritt und um

die Blutkapillaren und die Lymphgefäße herum weder Globi noch Zellinfiltration nachweisbar sind. Ich vermute daher, dass die Bazillen in die Lymphspalten des peripheren Teiles des Ganglions eindringen, von wo aus sie längs der Lymphspalten Globi- und Granulationsbildung veranlassen. Die Kapsel und das Septumbindegewebe sind stark verdickt, insbesondere an dem peripheren Teil, wo die Globi zahlreich vorkommen. An dem am stärksten gewuckerten Teile des Bindegewebes aber sind die Globi nur in geringer Anzahl zu sehen. Die Schwannschen- und Kapselzellen sind nicht vermehrt. Die Markscheiden verhalten sich ganz gleich denen am Ganglion cervicale superius dextrum. Die Bazillen sind überall reichlich vorhanden, und zwar in den Globi, zwischen den Nervenfasern und in den Granulationsherden sowie in den Schwannschen Zellen. In die Ganglienzellen sind die Bazillen zerstreut eingetreten und sind zahlreicher als in den oben erwähnten Ganglien vorhanden. Ich entdeckte hier fast ganz mit Bazillen ausgefüllte Ganglienzellen, die stark entartet aussahen. Die Sudan-III-färbung zeigte deutlich, dass die Verbreitung der Fettkörnchen der der Bazillen entspricht.

(3) Ganglion lumbale sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Die Kapsel und das Septumbindegewebe sind gewuchert. Stellenweise sind Lepraglobi und Granulationsherde zu sehen, insbesondere in der Nähe der verdickten Blutkapillaren und Lymphgefäße. Die Bazillen sind in die Ganglienzellen eingetreten, während sie in den Nervenfasern und zwischen den Ganglienzellen fast niemals nachzuweisen sind. Die Ganglienzellen und die Markscheiden sind im allgemeinen gut erhalten. Schwannsche Zellen und Kapselzellen sind nicht vermehrt, selbst die Kapselzellen der bazillenhaltigen Ganglienzellen nicht.

(4) Ganglion sacrale sinistrum.

Nirgends sind Zellinfiltration und Globi nachweisbar. Nur stellenweise sind die Bazillen in geringer Anzahl in die Ganglienzellen eingedrungen. Sonst nichts Besonderes.

(5) Ganglion lumbale Dextrum.

Die Kapsel ist nicht weiter verdickt. Im Ganglion sind vereinzelte, sehr kleine Granulationsherde sichtbar. Die Bazillen in den Ganglienzellen sind nur so wenige vorhanden, dass sie sich nur durch genaue Beobachtung erkennen lassen.

(6) Ganglion sacrale dextrum.

Zellinfiltration ist nirgends nachweisbar. In den Ganglienzellen sind die Bazillen in geringer Anzahl nachzuweisen. Sonst nichts Besonderes.

(7) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

An den beiden Ganglien sind weder Zellinfiltrationen noch Granulationsherde nachweisbar. Wie bei Fall I konnte ich auch hier zwischen den Nervenfasern und den Ganglienzellen fast niemals Bazillen ausfindig machen, während sie innerhalb der Ganglienzellen, wenn auch nicht diffus, so doch sehr reichlich vorhanden waren. Die Verbreitungsweise der Bazillen in den Ganglienzellen verhält sich sehr ähnlich wie die bei Fall 1. Die Markscheiden sind im allgemeinen gut erhalten und nur vereinzelt verändert. Was die Degeneration der Ganglienzellen anbetrifft, so zeigen die bazillenhaltigen der Verbreitungsweise und der Bazillenmenge entsprechend ganz wie bei Fall 1 mehr oder weniger Veränderungen. Die Schwannschen- und Knäselzellen sind nicht gewuchert, selbst in den Knäselzellen der bazillenhaltigen Ganglienzellen nicht. Sonst nichts Besonderes. Die Veränderung der Ganglienzellen und das Eindringen der Bazillen in diese sind am linken Ganglion stärker als am rechten.

Fall III. 38 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

Alle Ganglien etwas hart. Sonst nichts Besonderes.

Die Zellinfiltrations- und Granulationsherde sind in allen Ganglien des Halses nachweisbar, und zwar in der Umgebung der Blutkapillaren und Lymphgefäße. In den peripheren Teilen der Ganglien, und zwar in der Nähe der Nervenscheide, waren die Granulationsherde trotz eifreigen Suchens fast niemals auffindbar. Bei diesem Fall sind Veränderungen der Nervelemente denen bei Fall I ähnlich.

Fall IV. 27 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale sup. med. inf. dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Die kleinen Rundzelleninfiltrations- und Granulationsherd sind in der Umgebung der Blutkapillaren und Lymphgefäße nachweisbar. Die Bazillen lassen sich überall färben, besonders in den Zellinfiltrations- und Granulationsherden, wo sie Globi bilden. Wie beim Fall 1 sind die Bazillen nur zerstreut in den Ganglienzellen eingedrungen, und zwar in geringer Anzahl. Sonst nichts Besonderes.

(2) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Die Rundzelleninfiltration ist in der Nähe der Nervenscheide nachweisbar.

Die Bazillen und die Bazillenanhäufung ist nicht nur in den Zellinfiltrationsherden oder zwischen den Nervenfasern, sondern auch innerhalb der Ganglienzellen festzustellen. Wenn auch nicht sehr oft, sind doch die Bazillen innerhalb der Ganglienzellen gewuchert und haben an einer Stelle Vakuolen gebildet.

Was die Degeneration der Nervelemente anbetrifft, so ist sie fast ganz dieselbe wie die bei Fall 1 und 2, aber die Degeneration der Markscheiden besonders das Verschwinden derselben ist dort stärker als die der Achsenzylinder, wo die Bazillen zwischen die Nervenfasern eingedrungen und hier gediehen sind. Die Schwannschen Zellen sind nicht gewuchert, sondern vielmehr durch Bazillenwachstum degeneriert.

(3) Ganglion thoracale dextrum et sinistrum.

Granulationsherde sind nirgends nachweisbar. Aber in den internodalen Nervenbündeln ist stellenweise diffuse Rundzelleninfiltration sichtbar. Es ist noch nicht zur Globibildung gekommen. Die Bazillen sind innerhalb der Ganglienzelle in geringer Anzahl nachzuweisen.

(4) Ganglion lumbale dextrum et sinistrum.

Es sind weder Granulation noch Zellinfiltrationsherd nachweisbar. Nur selten sind die Bazillen in die Ganglienzellen eingedrungen.

(5) Ganglion sacrale dextrum et sinistrum.

Fast dieselben Befunde wie die beim Ganglion lumbale.

Fall V. 38 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale sup. med. et inf. dextrum et sinistrum.

Makroskopisch Grösse normal, aber Konsistenz sehr hart.

Zellinfiltration, Granulationsherde und Lepraglobi sind überall sichtbar. Die Globibildung ist in der Peripherie am stärksten. Unter den schon beschriebenen Fällen von Knotenlepra ist bei diesem Falle die Degeneration der verschiedenen Nervelemente am stärksten, indem sich hier die Zellinfiltrations- und Granulationsherd verbreitet und diffus überall vorfinden. Dort, wo das Bindegewebe stark gewuchert ist, sind die Ganglienzellen und Nervenfasern fast zugrundegegangen. Was die Verbreitung der Bazillen anbetrifft, so liegen sie nicht diffus und zerstreut, sondern mehr diffus und gruppiert, indem sie überall Lepraglobi bilden.

Diese Ausbreitung der Bazillen ist ganz anders als bei der infiltrativen Form der Knotenlepra, wo Bazillen zerstreut und diffus liegen und, wenigstens bei

meinen Fällen, keine oder nur sehr wenige Globi bilden.

Die Bazillen sind oft im Gegensatz zu den schon beschriebenen Fällen von Knotenlepra je nach der Verbreitung der Zellinfiltrations- und Granulationsherd und der Bazillen nicht nur zwischen den Nervenfasern, sondern auch in die Ganglienzellen eingedrungen. Häufig konnte ich sehen, dass die Bazillen an einer Stelle der Ganglienzelle eine Bazillenanhäufung gebildet hatten. Was die Verbreitungszustände der Bazillen innerhalb der Ganglienzellen anbetrifft, so finden sich die Bazillen teils an einer Stelle gruppiert, teils diffus in ganzen Zelleib der Ganglienzellen vor. Die Ganglienzellen sind also grösstenteils sehr degeneriert. Trotzdem bleiben die Ganglienzellen im Vergleich mit den übrigen Nervenelementen, wie die Markscheide, die Achsenzylinder und die Fortsätze der Ganglienzellen, lang erhalten. Wenn die Lepraglobi ausserdem gerade in der Nähe der Ganglienzellen auftreten, werden diese dadurch gedrückt und verändern sich, wie es bei der Schwannschen Zelle der Fall war. Sonst ist nichts weiter zu erwähnen.

(2) Ganglion thoracale dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Die Zellinfiltrations- und Granulationsherde sind in der Umgebung der Lymphgefässe und der Kapillaren sichtbar. Die Anzahl der Bazillen, die Globibildung, das Eindringen der Bazillen in die Ganglienzellen und die Degeneration der verschiedenen Nervenelemente sind im Vergleich mit dem Halsganglion leichtgradig. Sonst nichts Besonderes.

Wie an den Halsganglien sind die Schwannschen Zellen nicht gewuchert.

(3) Ganglion lumbale et sacrale dextrum et sinistrum.

Nirgends sind Zellinfiltrations- und Granulationsherd nachweisbar. Nur sind Bazillen stellenweise innerhalb der Ganglienzellen zu sehen.

(4) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Makroskopisch hart und verdickt.

Die Zellinfiltrations- und Granulationsherd sind in der Umgebung der Lymphgefässe und Kapillaren und in der Nähe der Nervenscheide sichtbar. Die Globi und die Bazillen sind überall festzustellen. Die Bazillen sind auch innerhalb der Ganglienzellen zu sehen. Was die Degeneration der Nervenelemente anbetrifft, so sind die Markscheiden im allgemeinen stärker als die Achsenzylinder degeneriert. Hierbei handelt es sich mehr um das Eindringen der Bazillen und das

Wachstum derselben zwischen den Nervenfasern, d.h. mehr um primäre Degeneration als sekundäre, durch welche letztere die Entartung der bazillenhaltigen Ganglienzellen zustandekommt. Die Ganglienzelle, die Fortsätze und der Achsenzylinder sind im allgemeinen verhältnismässig gut erhalten. Auch dort, wo die Markscheiden fast verschwunden sind, sind die Achsenzylinder und die Ganglienzellen, wenn auch mehr oder weniger degeneriert, noch gut färbbar. Bei der primären Degeneration degenerieren und verschwinden also die Markscheiden im allgemeinen schneller als die Achsenzylinder und die Ganglienzellen.

Fall VI. 30 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

Fall VII. 39 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

Bei diesen beiden Fällen bieten alle Ganglien makroskopisch nichts Besonderes dar. Bei keinem Ganglion sind Zellinfiltration, Globi und Bazillen nachzuweisen. Die Ganglienzellen und die Markscheiden sind sehr gut erhalten und die Achsenzylinder unverändert. Nur sind postmortale Veränderung nachweisbar. Auch am Ganglion nodosum konnte ich beiderseits weder Zellinfiltration noch Bazillen entdecken.

Fall VIII. 21 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale dextrum et sinistrum.

Zellinfiltrations- und Granulationsherde sind nirgends nachweisbar, sondern nur stellenweise kleine Gruppen von Lepraglobi sichtbar. Nach der Bazillenfärbung sind die Bazillen sehr selten innerhalb der Ganglienzellen feststellbar, und wenn, nur in geringer Anzahl. Auch innerhalb der Lepraglobi ist die Zahl der Bazillen sehr gering. Ja es finden sich sogar bazillenfreie Lepraglobi vor. In den Lepraglobi, in denen sich die Bazillen ziemlich reichlich nachweisen lassen, neigen die Bazillen selber zur Zersetzung. Durch die Sudan-III-färbung sind die Fettkörnchen entsprechend der Verbreitung der Globi gefärbt. Die Ganglienzellen, die Markscheide und die Achsenzylinder sind im allgemeinen gut erhalten. Nur an der Stelle, wo die Lepraglobi nachzuweisen sind, sind die Nervenelemente, besonders die Markscheiden, zugrundegegangen.

(2) Ganglion thoracale dextrum et sinistrum.

Die Befunde sind fast ganz dieselben wie an den Halsganglien. Nur Anzahl der Globi weit geringer.

(3) Ganglion sacrale dextrum et sinistrum.

Die Lepraglobi sind sehr selten anzutreffen. Innerhalb der Ganglienzellen lassen sich die Bazillen sehr selten färben.

(4) Ganglion nodosum dext. et sinistrum.

Nur an den peripheren Tellen des N. vagus beiderseits gab es Bazillen und Zellinfiltration, während im Ganglion davon nur sehr wenig nachzuweisen war.

Fall IX. 25 jähriger Mann. Klinische Diagnoses: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale sup. med. et inf. dext. et sinistr.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Mikroskopisch sucht man vergebens nach Zellinfiltration und Granulationsherden. Im Gegensatz dazu sind die Bazillen hauptsächlich in die sympathischen Ganglienzellen eingedrungen und dort sehr gewuchert. Die bazillenhaltigen Ganglienzellen sind im Vergleich mit denen von Fall 1 und 2 viel häufiger anzutreffen. Was die Verbreitung der Bazillen innerhalb der Ganglienzellen anbetrifft, so finden sich die Bazillen teils diffus, teils an einer Stelle gruppiert vor. Globusbildung ist überall zwischen den Nervenfasern und den Ganglienzellen zu sehen. Innerhalb der Ganglienzellen, wo die Bazillen an einer Stelle gewuchert sind, fand ich häufig Vakuolen, wie es beim Nervus vagus (Fall 1 und Fall 2) der Fall war. Obgleich innerhalb der bazillenhaltigen Ganglienzellen die Bazillen reichlich nachzuweisen sind, enthalten die zwischen den Nervenfasern und den Ganglienzellen vorhandenen Globi dagegen nur eine geringe Anzahl sehr veränderter Bazillen. Was die Degeneration der Ganglienzellen anbetrifft, so verändern sich die Ganglienzellen je nach der Vermehrung der Bazillen verschieden, wie das beim Nervus vagus von Fall 1 und 2 der Fall war.

(2) Ganglion thoracale, lumbale et sacrale dextrum et sinistrum.

Weder Zellinfiltration noch Granulation. Die Bazillen sind hauptsächlich in die Ganglienzellen eingedrungen. Lepraglobi sind stellenweise nachweisbar. Sonst nichts Besonderes.

(3) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Auf der rechten Seite konnte ich einen kleinen Zellinfiltrationsherd feststellen, in welchem sich auch Bazillen vorfanden. Auch in den Ganglienzellen stiess ich auf Bazillen. Auf der linken Seite konnte ich trotz eifrigen Suchens weder Zellinfiltration noch Granulationsherde entdecken. Hier waren die Bazillen auch innerhalb der Ganglienzellen festzustellen. Die Degeneration der Nervenelemente war fast ganz dieselbe wie bei Fall 1 und 2.

Fall X. 41 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Knotenlepra.

(1) Ganglion cervicale dextrum et sinistrum.

TABELLE I. Die Verbreitung der Leprabazillen im Grenzstrang.

Klinische Diagnose.	Fall I. Knoten- lepra 22 Lj. ♂ rechts links	Fall II. Knoten- lepra 27 Lj. ♀ rechts links	Fall III. Knoten- lepra 38 Lj. ♂ rechts links	Fall IV. Knoten- lepra 27 Lj. ♂ rechts links	Fall V. Knoten- lepra 38 Lj. ♂ rechts links	Fall VI. Knoten- lepra 30 Lj. ♂ rechts links	Fall VII. Knoten- lepra 39 Lj. ♂ rechts links	Fall VIII. Knoten- lepra 21 Lj. ♂ rechts links	Fall IX. Knoten- lepra 25 Lj. ♂ rechts links	Fall X. Knoten- lepra 41 Lj. ♂ rechts links	Fall XI. Nerven- lepra 69 Lj. ♂ rechts links
Ganglion cervic. sup.	+	+	+	+	+	—	—	+	+	+	—
Ganglion cervic. med.	+	+	+	+	+	—	—	+	+	+	—
Ganglion cervic. inf.	+	+	+	+	+	—	—	+	+	+	—
Ganglion thoracale	+	+	—	+	+	—	—	+	+	+	—
Ganglion lumbale	+	+	—	+	+	—	—	+	+	+	—
Ganglion sacrale	+	+	—	+	+	—	—	+	+	+	—

TABELLE II. Zellinfiltration und Granulationsherd im Grenzstrang.

Bei diesen 3 Fällen (Fall 8, 9 und 10) waren Zellinfiltrations- und Granulationsherd nicht nachweisbar, sondern nur Globulibildung zu sehen.

Klinische Diagnose.	Fall 8.	Fall 9.	Fall 10.
Ganglion cervic. sup.	+	+	+
Ganglion cervic. med.	—	—	—
Ganglion cervic. inf.	+	—	—
Ganglion thoracale	—	—	—
Ganglion lumbale	—	+	—
Ganglion sacrale	—	—	—

TABELLE III. Die Verbreitung der Leprabazillen im Ganglion nodosum und Nervus vagus.

Klinische Diagnose.	Fall 8.	Fall 9.	Fall 10.
Bazillen reichlich.	++	++	++
Bazillen mässig.	+	+	+
Bazillen spärlich.	—	—	—
Zellinfiltration und Granulationsherd trotz eifrigsten Suchens nicht nachweisbar.	—	—	—

+ Bazillen reichlich. ++ Bazillen mässig. + so spärlich, dass die Bazillen erst durch genaues Suchen feststellbar sind.

— Bazillen spärlich. — Zellinfiltration und Granulationsherd trotz eifrigsten Suchens nicht nachweisbar.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Nirgends Zellinfiltration und Granulationsherd. Die Bazillen sind hauptsächlich in die Ganglienzellen eingedrungen, und zwar in geringer Anzahl. Stellenweise sind bazillenarme Lepraglobi festzustellen, besonders in der Umgebung der Kapillaren und Lymphgefäße. Ganglienzellen und die Nervenfasern sind im allgemeinen gut erhalten. Nur an den Stellen, wo die Globi nachweisbar sind, konnte ich eine gewisse Degeneration feststellen. Bindegewebe und Schwannsche Zellen sind nicht gewuchert.

(2) Ganglion thoracale, lumbale et sacrale dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Die mikroskopischen Befunde sind fast ganz dieselben wie die von den Halsganglien. Nur ist hier die Anzahl der Lepraglobi weit kleiner.

(3) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes. Verdickung nicht nachweisbar. Die Bazillen sind hauptsächlich in die Ganglienzellen eingedrungen. Sonst nichts Besonderes.

Fall XI. 69 jähriger Mann. Klinische Diagnose: Nervenlepra.

(1) Ganglion cervicale sup., med. et inf. dextrum et sinistrum.

Kapsel und Septumbindegewebe sehr verdickt. Auch Blut- und Lymphgefäßwand verdickt und hyalinös verändert. Im Vergleich mit den schon beschriebenen Knotenleprafällen bietet dieser Fall ein ganz anderes histologisches Bild dar. Im Ganglion treten die Rundzelleninfiltrationen im allgemeinen diffus auf und bestehen hauptsächlich aus grossen und kleinen Lymphozyten, Histiocyten, Makrophagen und gewucherten Fibroblasten. Obgleich diese Zellinfiltration diffus aussehen, gelang es mir doch trotz eifrigen Suchens niemals, Lepraglobi und Bazillen festzustellen. Die Dichtigkeit der Rundzellenanhäufung ist nicht gleichmässig d. h. um die Blutkapillaren und die Lymphgefäße ist die Rundzellenanhäufung teils eine dichte, teils eine dünne. Im Vergleich mit den beschriebenen Knotenleprafällen sind hier die Markscheiden an Zahl ausserordentlich reduziert, und zwar sind sie innerhalb der dichten Zellinfiltrationen beinahe verschwunden. Dagegen sind die Ganglienzellen fast normal erhalten. Nur in den dichten Zellinfiltrationen sind sie mehr oder weniger verändert. Die Fettfärbung lieferte stets negative Resultate.

(2) Ganglion nodosum dextrum et sinistrum.

Makroskopisch nichts Besonderes.

Weder Zellinfiltration noch Granulation nachweisbar. Bazillen waren trotz eifrigen Suchens nirgends feststellbar.

V. Zusammenfassung.

Fasse ich die histologischen Vernderungen an den sympathischen und parasympathischen Ganglien bei 10 Fllen von Knotenlepra und bei einem Falle von Nervenlepra zusammen, so lsst sich etwa folgendes sagen:

1. Die Verbreitung der Leprabazillen in den Zentren des vegetativen Nervensystems.

Wie die Tabelle zeigt, lassen sich die Bazillen in den meisten Fllen an den sympathischen Ganglien und am Nervus vagus gleichzeitig nachweisen. Unter 10 Fllen von Knotenlepra konnte ich bei 8 in den sympathischen Ganglien die Bazillen (80%), die Bazillen und zugleich die Zellinfiltrations- und Granulationsherd bei 5 Fllen feststellen.

Wenn ich auch bei Fall 8, 9 und 10 die Zellinfiltrations- und Granulationsherde nirgends nachweisen konnte, stellte ich doch neben den Bazillen stellenweise gruppierte Lepraglobi fest.

Bei einem Fall von Nervenlepra waren nur die Zellinfiltrationen nachweisbar, whrend die Bazillen histologisch trotz eifrigen Suchens niemals auffindig zu machen waren.

Die Art und Weise der Verbreitung der Bazillen ist innerhalb der Ganglien je nach der Lokalisation verschieden. Die Bazillen sind im allgemeinen am reichlichsten in den Halsganglien, in den Brust- und Bauchganglien dagegen nur sehr sprlich vorhanden. Es scheint mir, dass die Bazillen in den Sacralganglien meist etwas zahlreicher als in den Brust- und Bauchganglien anzutreffen sind. An den Halsganglien bei Fall 1, 2, 3 und 4 finden sich die Bazillen vorwiegend in den Nervenbndeln oder zwischen den Ganglienzellen vor, whrend sie in den Brust-, Bauch-, Lenden- und den Sacralganglien in geringer Anzahl, und zwar vorwiegend innerhalb der Ganglienzellen auftreten.

Bei Fall 8, 9 und 10 aber sind bei allen Ganglien die Bazillen hauptschlich innerhalb der Ganglienzellen nachweisbar, und zwar etwas reichlicher. Bei Fall 5 sind in den Hals- und Brustganglien die Bazillen nicht nur in den Nervenbndeln

oder zwischen den Ganglienzellen, sondern auch innerhalb der letzteren in grösserer Anzahl feststellbar.

Am Ganglion nodosum sind bei Fall 1, 2 und 10 beiderseits weder Zellinfiltrations- noch Granulationsherde nachweisbar, und man stösst auf die Bazillen nur innerhalb der Ganglienzellen selbst. Die Anzahl der Bazillen innerhalb der Vagusganglienzellen ist im allgemeinen weit grösser als die innerhalb der sympathischen Ganglienzellen. Am Ganglion nodosum stellte ich bei Fall 4, 5 und 9 sowohl Bazillen als auch Zellinfiltrations- und Granulationsherd fest, wobei ich die Bazillen innerhalb der Ganglienzellen und zwischen den Nervenfasern nachwies.

(2) Über die Verbreitungsweise der Leprabazillen nach
den Zentren des vegetativen Nervensystems.

Wie ich schon 1929 bei der Sitzung der wissenschaftlichen Gesellschaft für Lepraforschung zu Osaka veröffentlicht habe, treten die anfänglichen und jüngeren Herde der Zellinfiltration im Grenzstrang um die Blutkapillaren und Lymphgefässe herum auf. Zuerst sind hier nur wenige oder fast keine Bazillen wahrnehmbar, und es haben sich noch keine Lepraglobi gebildet. Bald darauf kommen die Lepraglobi Hand in Hand mit der Vermehrung der Bazillen zum Vorschein. In den älteren Zellinfiltrations- und Granulationsherden sind die Globi fast stets in grösserer Anzahl nachzuweisen. (A) Diese Befunde legen die Vorstellung nahe, dass die Blutkapillaren und Lymphgefässe des Grenzstranges imstande sind, die Bazillen nach den Zentren des vegetativen Nervensystems zu verschleppen. Ich konnte das in der Tat bei Fall 1, 2, etc. feststellen.

Hier entdeckte ich an den beiden Grenzsträngen von einer solchen perivaskulären Zellinfiltration so gut wie nichts. Die Zellinfiltrations- und Granulationsherde und die Bazillen zeigten sich dagegen im peripheren Teil der sympathischen Ganglien. Die anfänglichen und jüngeren Zellinfiltrationsherde, in welchen sich die Lepraglobi noch nicht oder nur in geringer Anzahl vorfinden, sind gerade in der Nähe des Lymphraumes sichtbar, welcher sich zwischen dem Grenzstrang und dem diesen umgebenden Bindegewebe, d.h. an der Nervenscheide, gebildet hat. Auf Grund der obenerwähnten Befunde glaube ich, dass die Saftbahnen für die Verbreitung der Bazillen nach den Zentren des vegetativen Nervensystems von grosser Bedeutung sind. Unsere Kenntnisse über die Saftbahnen des Nervensystems verdanken wir den Anatomen Key und Retzius. Neuerdings haben Prof. Dr. Funakoka

und seine Mitarbeiter mittels der von ihnen gefundenen neuen Injektionsmethode des Nervensystems über die Lymphräume im Nervensystem Genaueres gebracht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Grenzstrang auch Saftbahnen besitzt, die sich zwischen dem Parenchym des Grenzstrangs und der Nervenscheide befinden. Weiter ist auch anzunehmen, dass die Saftbahnen des Grenzstranges mit denen anderer Nervensysteme, wie der Spinalnerven, des Nervus vagus u.a., in Verbindung stehen. (B) Auf Grund meiner Beobachtung bei Fall 2 besteht kein Zweifel darüber, dass auch die Saftbahnen des Grenzstranges einen Verbreitungsweg des leprösen Prozesses darstellen.

Woher aber dringen die Bazillen hier in die Saftbahnen des Grenzstranges ein?

Wenn ich auch den ganzen Verlauf des betreffenden Nerven histologisch nicht verfolgen konnte, vermute ich doch, dass sich die Leprabazillen unter bestimmten Umständen von den peripheren Nerven aus längs der Lymphräume der Anastomosen oder längs der Nervenelemente selber kontinuierlich verbreiten und schliesslich in die Saftbahnen des Grenzstranges eindringen können.

(C) Die erwähnten beiden Verbreitungsweisen (A) (B) können zuweilen gleichzeitig vorkommen, d.h. die jüngeren Zellinfiltrationen treten teils um die Blutkapillaren und die Lymphgefässe herum, teils gerade in der Nähe der Nervenscheide auf.

Woher dringen die Bazillen in das Ganglion nodosum ein?

Bei Fall 8 konnte ich an den peripheren Teilen des Nervus vagus sowohl Bazillen als auch Zellinfiltrations- und Granulationsherde feststellen, während die Bazillen und die Zellinfiltration im Ganglion nodosum nur sehr gering waren. Auf Grund dieser Befunde vermute ich, dass die Bazillen von den peripheren Teilen des Nervus vagus längs der Saftbahnen dieses Nerven oder längs der Nervenelemente selber kontinuierlich in das Ganglion nodosum verschleppt werden können.

Bei Fall 1 und 2 sind weder Zellinfiltration noch Granulationsherde anzutreffen, während die Bazillen hauptsächlich in die Ganglienzellen selber eingedrungen sind, wo sie weiter gedeihen. Ich konnte also hierbei auch nicht feststellen, von woher die Bazillen in die Ganglienzellen des Nervus vagus eindringen.

Weiter entsteht die Frage, ob die Bazillen längs der Anastomosen zwischen dem Grenzstrang und dem Nervus vagus ins Ganglion nodosum gelangen. Bei Fall 11 habe ich die Bazillen reichlich in den Verbindungsästen zwischen dem

Grenzstrang und dem Nervus vagus nachgewiesen. Ich vermute also, dass die Bazillen unter bestimmten Umständen sich längs der Verbindungsäste des Grenzstranges nach dem Nervus vagus zu verbreiten können.

(3) Über die pathologischen Veränderungen der Nerven-
elemente des sympathischen Grenzstranges bei Lepra.

(a) Die Veränderungen der sympathischen Ganglienzellen.

Das Zustandekommen der pathologischen Veränderungen der sympathischen Ganglienzellen hängt mit dem Eindringen der Leprabazillen zusammen, da die bazillenfreien Ganglienzellen in den meisten Fällen, selbst innerhalb der Zellinfiltrations- und Granulationsherde, keine besondere Veränderung zeigen. In den 4 Fällen von Knotenlepra sind die Ganglienzellen grösstenteils von Bazillen frei. Diese Ganglienzellen sind im allgemeinen gut erhalten. Nur vereinzelt finden sich bazillenhaltige Ganglienzellen vor, die dementsprechend gewisse Veränderungen aufweisen. Die wenigen Bazillen aber bleiben innerhalb der Ganglienzellen erhalten und bilden da Vakuolen. Es ist natürlich, dass die vakuolenhaltigen Teile stark degenerieren und die Nisslschen Körperchen und die Febrillennetze dort bald völlig verschwunden, bald stark zerstört sind.

Bei Fall 8, 9 und 10 sind nirgends Zellinfiltrations- und Granulationsherden nachweisen, während die Bazillen hauptsächlich in die sympathischen Ganglienzellen eingedrungen und dort sehr gewuchert sind. Die bazillenhaltigen Ganglienzellen sind im Vergleich mit denen von Fall 1, 2 und 3 viel häufiger anzutreffen. Auch ist die Anzahl der Bazillen grösser. Die Ganglienzellen sind also hierbei stärker degeneriert, obgleich ich hierbei weder Zellinfiltration noch Granulationsherde nachweisen konnte. Nur an den Hals- und Brustganglien war bei Fall 5 starke Degeneration und selbst Verschwinden der Ganglienzellen festzustellen. Hierbei dringen die Bazillen Hand in Hand mit der Verbreitung der Granulationsherde überall in die Ganglienzellen ein, wo sie sehr gedeihen. Die Ganglienzellen sind also meistens teils stark verödet, teils fast verschwunden.

Bei einem Fall von Nervenlepra gelang es mir jedoch nicht, Bazillen in den Ganglienzellen nachzuweisen. Trotzdem fand ich hier eine gewisse Veränderung der sympathischen Ganglienzellen, hauptsächlich innerhalb der dichten Zellinfiltrationsherde, während sie dagegen innerhalb der dünnen Zellinfiltrationsherde gut erhalten waren.

(b) Die Veränderungen der Markscheiden.

Es ist selbstverständlich, dass ich bei der Untersuchung der Markscheide das Material vorher einer sorgfältigen Behandlung und guten Fixierung unterwarf, um möglichst Kunstprodukte auszuschalten. Als pathologisch nehme ich die Veränderung der Markscheidenstrukturen nur dann an, wenn im gleichen Präparat, resp. am gleichen Material neben den veränderten auch völlig normal aussehende und nicht künstlich entstandene Fasern vorhanden sind. Und an den Materialien, die postmortale Veränderung zeigen, nehme ich hauptsächlich das Verschwinden der Markscheiden als pathologisch an. Zum Zwecke der Studien der feinen Struktur der Markscheiden habe ich nur solche Materialien gebraucht, die von im kalten Winter seziierten Leichen stammten und binnen 7 Stunden nach dem Tode fixiert worden waren. Die Veränderungen der in den sympathischen Ganglien enthaltenen Markscheiden bei Knotenlepra treten innerhalb der Zellinfiltrations- und Granulationsherde auf, besonders in den älteren, in welchen die Lepraglobi schon entstanden sind. In den meisten Fällen sind die Markscheiden in den alten Granulationsherden entweder fast verschwunden oder stark verodet, während sie in den jüngeren, wo sich die Globi noch nicht gebildet haben, verhältnismässig gut erhalten sind. Ab und zu fand ich normale Markscheiden auch in den alten Granulationsherden, und zwar an den globifreien Teilen. In der Umgebung der Granulationsherde sind dagegen die Markscheiden verhältnismässig gut erhalten. Wie ich schon in meinem Bericht über die Veränderungen der Hautnerven bei Lepra veröffentlicht habe, steht die Degeneration der Markscheiden auch hier in inniger Beziehung zu der Globibildung.

Wie bei den Hautnerven degenerieren und verschwinden auch hier die Markscheiden in Granulationsherden am frühesten, da sich die Achsenzyylinder der markhaltigen Nerven hierbei noch in grosser Anzahl gut färben. Im allgemeinen bleiben die Ganglienzellen und die Achsenzyylinder der marklosen Nerven am längsten erhalten. Ausserdem trat ganz unabhängig von den Zellinfiltrations- und Granulationsherden hier und da Degeneration der Markscheiden auf, die an den dicken, fischflossenhaltigen Markscheiden deutlich zutage trat. Bei der Knotenlepra dringen die Bazillen oft in die Nervenbündel oder zwischen die Ganglienzellen ein, wo sie gedeihen und zu Vakuolen- und Globibildung führen, ohne dass es zur Zellinfiltration kommt. Ich glaube also, dass die obenerwähnten Veränderungen der Markscheiden meistens durch das Eindringen der Bazillen zwischen die Ner-

venfasern entsteht. In einem Fall von Nervenlepra ist die Veränderung der Markscheiden ganz anders als bei der Knotenlepra, d.h. das Zugrundegehen der Markscheiden tritt besonders dort auf, wo das Bindegewebe stark gewuchert ist und die Bazillen und die Globi sich kaum nachweisen lassen. Nur sind Rundzellenanhäufungen in verschiedener Menge vorhanden. Auch Dr. Kobayashi berichtet, dass die Bazillen in den meisten Fällen von Nervenlepra an den Ulnarnerven fast niemals nachzuweisen sind. Bei Knotenlepra, wie schon beschrieben, steht die Entstehung der Veränderungen der Nerven Elemente, nämlich der Achsenzylinder sowie der Markscheide, zu dem Eindringen der Bazillen, und zwar zur Globibildung in inniger Beziehung. Die Bazillen und die Globi lassen sich aber bei Nervenlepra fast niemals nachweisen, während die Markscheiden im Vergleich mit der Veränderung bei Knotenlepra stärker degeneriert sind. Durch welchen Vorgang verändern sich die Markscheiden nun bei Nervenlepra?

Folgende Vorstellung dürfte ungefähr richtig sein: Die markhaltigen Nervenfasern, die bis zum Eintritt in den Grenzstrang einen langen Verlauf nehmen, werden unterwegs von den Bazillen besiedelt, die die Globi bilden. Zuerst fällt an den betreffenden Stelle die Markscheide der Degeneration anheim, dann auch die Achsenzylinder. Nach der Verödung der Achsenzylinder degenerieren die Markscheiden dem Wallerschen Gesetze gemäss weiter zum Grenzstrang hin. Dieser Vorgang könnte unter bestimmten Umständen an einem Teile der Markscheide stattfinden. Es gibt aber wohl mehrere solcher Teile. Es ist auch möglich, dass es eine andere Art und Weise der Veränderung der Markscheiden als die eben erwähnte gibt: Wie ich schon bei den Knotenleprafällen beobachtet habe, sind die sympathischen Ganglienzellen im allgemeinen gut erhalten, während dagegen die markhaltigen Nervenfasern, besonders deren Markscheide, sich frühzeitiger und stärker verändern. Die Ganglienzellen können also im Vergleich mit der Markscheide der markhaltigen Nerven viel längere Zeit erhalten bleiben. Dazu treten weniger Bazillen in die Ganglienzellen als in die Vagusganglienzellen ein. Sehr wahrscheinlich wird der oben beschriebene Vorgang anfangs auch für die Nervenlepra zutreffen. Zuerst werden die Markscheiden sich verändern und verschwinden, während die Ganglienzellen grösstenteils erhalten bleiben. Bei Fall 2 finden sich veraltete Granulationsherde, in denen das Bindegewebe stark gewuchert und die Markscheiden völlig verschwunden. Dagegen sind die Ganglienzellen noch grösstenteils unverändert erhalten. Dort neigen die Lepraglobi mit der

Bindegewebswucherung zum Verschwinden, und auch werden hier die Bazillen weniger als die in den jüngeren Herden gefärbt. Dieses Bild habe ich an den verdickten Ulnarnerven bei *Lepra mixta* beobachtet, wobei ich verschiedene Stadien der Degeneration an den betreffenden Nerven verfolgen konnte. In der Nähe des Peri- und Endoneuriums sind veraltete lepröse Herden sichtbar, in welchen die markhaltigen Nerven spurlos verschwunden sind, während dort das Bindegewebe stark gewuchert ist und Bazillen sowie Globi sich kaum nachweisen lassen. Innerhalb der jüngeren Granulationsherde aber zeigen die Nerven Elemente verschiedenartige Degeneration und sind sowohl die Bazillen als auch die Globi sehr reichlich vorhanden. Daraus darf man den Schluss ziehen, dass nach dem Verschwinden der Nerven Elemente das Bindegewebe allmählich wuchert und die Bazillen selber in den veralteten Herden nur in geringer Anzahl oder fast nicht nachzuweisen sind.

Es ist natürlich, dass die sympathischen Nerven Elemente viel längere Zeit in den veralteten Granulationsherden erhalten bleiben. Wenn ich auch bei einem Fall von Nervenlepra die verschiedenen Degenerationsstadien der Nerven nicht alle verfolgen konnte, ist doch wahrscheinlich, dass die Markscheiden bei Nervenlepra durch denselben Vorgang verschwinden wie bei der Knotenlepra sowie an den Ulnarnerven der *Lepra mixta*.

Endlich entsteht noch die Frage, ob es sich bei der Nervenlepra um eine besondere Entzündung handelt, bei welcher die Markscheiden ohne Vorhandensein von Bazillen oder Globi degenerieren.

Durch welchen Vorgang die Markscheide im Grenzstrang der Veränderung anheimfällt, konnte ich leider nicht festzustellen, da mir nicht genug Untersuchungsfälle zur Verfügung standen.

(c) Über die Veränderungen der Schwannschen Zellen bei Lepra.

Wenn ich auch bei meinen Fällen fast stets an den Granulationsherden die Wucherung des Bindegewebes gesehen habe, beobachtete ich doch so gut wie keine besondere Wucherung der Schwannschen Zellen, selbst nicht in der unmittelbaren Nähe von Zellinfiltrations- und Granulationsherden. Natürlich sind die Schwannschen Zellen innerhalb der leprösen Herde entweder stark verödet oder zugrundegegangen. Nach sorgfältigen Untersuchungen konnte ich feststellen, dass gerade in der Nähe der Granulationsherde oder etwas entfernt davon die Schwannschen Zellen nicht gewuchert, sondern im Gegenteil mehr oder

weniger degeneriert sind. Wenn auch nicht oft, war sogar Vakuolenbildung innerhalb der Schwannschen Zellen sichtbar. Es ist interessant festzustellen, warum hier die Schwannschen Zellen degenerieren, anstatt reaktiv zu wuchern. Ich beobachtete bei der Bazillenfärbung ein interessantes Bild der Degeneration der Schwannschen Zellen. Es steht nämlich die Veränderung der Schwannschen Zellen auch mit dem Eindringen der Bazillen in diese Zellkerne oder zwischen sie in innigem Zusammenhang. Besonders gut konnte ich bei Fall 1 und 2 die Art und Weise des Zugrundegehens der Schwannschen Zellen verfolgen. Gerade in der Nähe der leprösen Herde oder etwas entfernt davon sind die Bazillen nicht nur zwischen den Schwannschen Zellen, sondern sogar auch in deren Kerne eingedrungen. Dort wachsen die Bazillen und bilden Vakuolen. Wenn ein Bazillus in den Kern der Schwannschen Zell eintritt, bildet sich eine Vakuole um ihn herum, während der bazillusfreie Teil des Kerns fast normal aussieht. Mit dem Wachsen der Bazillen vergrößern sich die Vakuolen, wodurch es schliesslich zum Verschwinden des Kerns kommt. Gedeihen die Bazillen zwischen den Nervenfasern und verursachen sie Vakuolen, so werden die mit den Vakuolen in Berührung kommenden Schwannschen Zellen dadurch gedrückt und gehen endlich zugrunde.

(d) Das Verhalten der Kapselzellen der Ganglienzellen zur leprösen Entzündung.

Die Kapselzellen stehen vom histologischen Standpunkte aus in inniger Beziehung zu den Ganglienzellen, wie die bindgewebige Kapsel in der Niere zum Glomerulus. Diese Kapselzellen werden bei Ganglienzellenerkrankung, sowohl entzündlicher als auch degenerativer Natur, stets in Mitleidenschaft gezogen. Nach der neueren Auffassung werden die Zellen, welche die innere Fläche der um die Ganglienzellen gelegenen Kapseln auskleiden, als modifizierte Gliazellen betrachtet. Sämmler berichtet, dass die Kapselzellen der sympathischen Ganglienzellen bei Sepsis wuchern. Fernando de Gastro teilt mit, dass er am Lumbalganglion einer Tabeskranken die Wucherung der Kapselzellen beobachtete. Wie schon berichtet, treten die Leprabazillen häufig in die sympathischen und parasympathischen Ganglienzellen, besonders in die des Ganglion nodosum ein. Auch innerhalb der Schwannschen Zellen finden sich die Bazillen, wenn auch nicht so häufig, vor. Im Gegensatz dazu konnte ich sie in den Kapselzellen nicht einwandfrei ausfindig machen, selbst nicht in denjenigen der bazillenhaltigen

Ganglienzellen. Die Kapselzellen zeigen also dabei keine nennenswerte Veränderung. Wenn aber die Bazillen in der Nähe der Kapselzellen Vakuolen bilden, so werden die Kapselzellen dadurch gedrückt und gehen schliesslich zugrunde.

Können die Kapselzellen, und zwar die der bazillenhaltigen Ganglienzellen, in Wucherung geraten?

Bei meiner mit besonderer Aufmerksamkeit vorgenommenen Untersuchung war ich imstande festzustellen, dass die Kapselzellen bei allen meinen Knotenlepra-fällen nicht besonders gewuchert sind, selbst nicht die der bazillenhaltigen Ganglienzellen. Ich will damit natürlich nicht behaupten, dass bei allen Fällen von Lepra die Kapselzellen keine besondere Wucherung zeigen. Ich kann aber doch wohl sagen, dass die Kapselzellen in den meisten Fällen bei Lepra nicht so besonders oft wuchern, wie man gewöhnlich annimmt.

(4) Über die Veränderung des Ganglions nodosum bei Lepra.

Die Anzahl der in der Vagusganglionzelle enthaltenen Bazillen ist im allgemeinen grösser als die in der sympathischen. Die Veränderung der Vagusganglienzellen ist also stärker als die der sympathischen. Wenn die Bazillen wie bei Fall 1 und 2 vorwiegend in die Ganglienzellen eindringen, verändern sich diese zuerst mit dem Wachstum der Bazillen allmählich. Wenn auch die Ganglienzellen, wie schon beschrieben, in solcher Weise entsprechend der Bazillenverbreitung entartet sind, sind die Markscheiden dagegen im allgemeinen verhältnismässig sehr gut erhalten. Was den Degenerationsgrad zwischen den Markscheiden und den Achsenzylindern anbetrifft, so sind die letzteren stärker degeneriert als die ersteren. Die Achsenzylinder sind nicht diffus verändert. Auf Grund meiner Untersuchung bin ich der Ansicht, dass die Degeneration der Achsenzylinder sekundär von der der Ganglienzellen aus entsteht, indem diese Ganglienzellen durch das Eindringen der Bazillen sehr allmählich erkranken. Das lange Erhaltenbleiben der Markscheide lässt sich vielleicht wie folgt erklären: Erstens dringen die Bazillen nur stellenweise in die Ganglienzellen ein, und die Ganglienzellen bleiben grösstenteils gut erhalten. Auch wenn die Bazillen in die Ganglienzellen eintreten, kommt es dadurch nicht sofort zu bedeutenden Veränderungen in denselben, wenigstens nicht in den bazillenfreien Teilen. Wenn die Bazillen innerhalb der Ganglienzellen wachsen, verschwinden die Nissl'schen Körperchen nur im bazil-

lenhaltigen Teil, und die Zellen färben sich dort dünn, und es bilden sich häufig kleine Vakuolen, während der übrige bazillenfreie Teil der Ganglienzelle fast normal erhalten bleibt. Danach handelt es sich bei der Markscheide ebenso wie beim Achsenzylinder um eine sekundäre Veränderung, die durch die sehr langsam auftretende Degeneration der Ganglienzellen hervorgerufen wird.

Wenn die Bazillen aber wie bei Fall 5 nicht nur in die Vagusganglienzellen, sondern auch zwischen die Nervenfasern eindringen und dort gedeihen, so degenerieren die Nervenfasern im allgemeinen stärker als die bei Fall 1 und 2. Hierbei entarten besonders die Markscheiden im allgemeinen am stärksten, da sich die Markscheiden bei dem unmittelbaren Eindringen der Bazillen zwischen die Nervenfasern schneller verändern als die Achsenzylinder, wie ich das schon an den Hautnerven ebenso wie an den sympathischen Ganglien bei Lepra angetroffen habe. Hierbei handelt es sich bei der Degeneration der Nervenfasern nicht nur um eine primäre Degeneration, die durch das direkte Eindringen der Bazillen, bzw. zwischen die Nervenfasern zustande kommt, sondern auch um eine sekundäre, die, wie schon beschrieben, sekundär durch die Degeneration der bazillenhaltigen Ganglienzellen entsteht.

(5) Über die Veränderungen der Fibrillennetze der Vagusganglienzellen bei Knotenlepra.

Bei der Untersuchung der Fibrillennetze der Ganglienzellen verwandte ich erstens möglichst frische Materialien, welche hauptsächlich aus den im kalten Winter seziierten Sektionsleichen stammen. Zweitens beobachtete ich sehr sorgfältig, indem ich, wie schon beschrieben, die betreffenden mikroskopischen Befunde mit denen von anderen zahlreichen Materialien verglich, welche ich Individuen entnommen hatte, die in fast derselben Jahreszeit an anderen Krankheiten gestorben waren.

Wie schon beschrieben steht die Veränderung der Nisslschen Körperchen im dem Eindringen der Leprabazillen in inniger Beziehung. Auch die Veränderungen der Fibrillennetze der Ganglienzellen treten entsprechend der der Nisslschen Körperchen dort auf, wo die Bazillen eingedrungen und gedeihen sind. Die Fibrillennetze verlieren ihre normale Anordnung, ihre Netze werden grob (wabige Degeneration), und schliesslich kommt es bei ihnen zur Zertrümmerung und zum Verschwinden. Da diese Veränderungen entsprechend der Verbreitung der Bazillen

vor sich gehen, so treten sie bald zirkumskript, bald peripherwärts vom Zelleib, bald diffus auf. Nach der modifizierten Bielschowskyschen Färbung ist die Differenzierung der Bazillen von den fein zertrümmten Fibrillennetzen sehr schwer. Doch fand ich die Bazillen in denjenigen Ganglienzellen sehr leicht auf, die stark degeneriert und deren Fibrillennetze gänzlich verschwunden waren. Die Veränderungen der Fortsätze der Ganglienzellen sind im Vergleich mit denen der Fibrillennetze nur leichter Natur.

(6) Über die Veränderungen der vegetativen Nerven
bei einem Fall von Nervenlepra.

Wie schon bemerkt, steht die Degeneration der verschiedenen Nervelemente bei Knotenlepra, sei es eine solche der Ganglienzelle, sei es eine solche der Markscheide, mehr zu dem Eindringen der Bazillen und ihrem Wachstum als zu der Zellinfiltration in Beziehung. Im Vergleich mit den schon beschriebenen Knotenleprafällen bietet ein Fall von Nervenlepra ein ganz anderes histologisches Bild dar. Hier wurden nämlich die Nervelemente nur durch die Zellinfiltration stark zerstört, was aus den teils dicht, teils dünn verbreiteten Rundzelleninfiltrationsherden hervorgeht, während fast niemals histologisch Bazillen nachweisbar waren. Ich konnte also den Schluss ziehen, dass bei einem Fall von Nervenlepra die Degeneration der Nervelemente im Gegensatz zur Knotenlepra nur durch die Zellinfiltration entstanden war.

Zum Schluss möchte ich Herrn M. Murata, Direktor des Sotojima-Leprakrankenhauses, für seine freundliche Überlassung der Materialien und meinem Freunde S. Amano für seine freundliche Hilfe bei Ausführung dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank ausdrücken.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. zeigt die Degeneration der Vagusganglienzellen.

Der Verschwund der Fibrillennetze der Ganglienzellen.

Zeiss. C.C.E. Ob. 10. Ok. Hl. L. 40 cm.

Modifizierte Fibrillennetzfärbung nach der Bielschowskyschen Methode.

Fig. 2. zeigt die Rundzelleninfiltration in dem Verbindungsast zwischen dem Ganglion cervicale dextrum und Ganglion nodosum dextrum.

a.....Verbindungsast.

b.....Das sympathische Ganglion.

c.....Die Rundzelleninfiltration.

Zeiss. C.C.E. Ob. 10. Ok. 10. K. 4. L. 35 cm.

Hämatoxylin-Eosinfärbung.

Fig. 3. zeigt die Globibildung in der Nähe der Nervenscheide des Grenzstranges.

a.....Gruppierte Lepraglobi.

b.....Nervenscheide.

Zeiss. C.C.E. Ob. 10. Ok. Hl. L. 40 cm.

Hämatoxylin-Eosinfärbung.

Fig. 4. zeigt die starke Veränderung der Markscheide des Nervus vagus.

a.....Dichte Rundzelleninfiltration.

b.....Die zurückgebliebenen Markscheiden.

Zeiss. C.C.E. Ob. 10. Ok. 10. K. 4. L. 35 cm.

Markscheidenfärbung nach Kultschitzky.

Fig. 5. zeigt die bazillenhaltige Vagusganglionzelle des Nervus vagus.

a.....Normal erhaltene Ganglionzelle.

b.....Wabige Degeneration der bazillenhaltigen Ganglionzelle,
in welcher zahlreiche Bazillen gefärbt sind.

Modifizierte Bazillen- und Fibrillennetzfärbung nach der Bielsch-
woskyschen Methode.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 3.

M. Takino: Die Veränderung der vegetativen Nerven bei der Lepia