顎関節の臨床解剖

第6報

杉崎 正志* 木野 孔司**

Clinical Anatomy of the Temporomandibular Joint

Part VI

Masashi Sugisaki*, D.D.S., Ph.D., Koji Kino**, D.D.S., Ph.D.

Anatomy of the temporomandibular joint appears to have an important role in understanding masticatory system and diseases. Although many articles have been reported about the temporomandibular joint anatomy, there are a few reports describing the relations between basic anatomy and clinical condition.

We reviewed current articles about temporomandibular joint anatomy, aimed for clarifying the relations between basic and clinical findings.

Part 6:

There were three ligaments in the temporomandibular joint except the lateral ligament; i.e. the sphenomandibular ligament, the stylomandibular ligament and the tiny ligament. The tiny ligament include discomalleolar ligament and sphenomandibular ligament those continued from the malleus. The functions of those ligaments are unclear, but the discomalleolar ligament might have a function in force of a vector that pull the disk to medial with the medial head of the lateral pterygoid muscle at gape. And the discomalleolar ligament might be derived from upper head of the lateral pterygoid muscle.

顎関節には第5報で述べた外側靱帯以外に2つの大きな付属靱帯と小さな靱帯が記載されている。

すなわち蝶下顎靱帯と茎突下顎靱帯、および tiny ligament の3つである。この tiny ligament は蝶下顎靱帯と discomalleolar ligament のふたつから成っている。

* 東京慈恵会医科大学歯科学教室

** 東京医科歯科大学歯学部第1口腔外科学教室

図1 蝶下顎靱帯 (sphenomandibular ligament) および茎突下顎靱帯 (stylomandibular ligament) を示す
(Gray's Anatomy 37th より引用¹⁾)

7. 付属靱帯

1) 蝶下顎靱帯 (図1)

蝶下顎靱帯 (sphenomandibular ligament) は、下方は下顎枝の小舌上あるいはその周囲に付着し、上方は蝶形極と squamotympanic fissure, petrotympanic fissure 部につき、ツチ骨につながっている¹⁾。Burch²⁾ はこの靱帯を tympanomandibular ligament と呼び、下顎が強度の前方位において overclosed するときのみ緊張する靱帯であるとしている。最近、Loughner³⁾ は蝶下顎靱帯は下顎骨の押し下げで緊張し、過度の押し下げではツチ骨に損傷を与える可能性があることを示唆している。

2) 茎突下顎靱帯 (図1)

茎突下顎靱帯 (stylomandibular ligament) は深頸筋膜上に位置し、下顎角と内側翼突筋筋膜周囲に付着し、上後方に向い茎状突起に付着する。これは下顎が強度に前方運動したときや、あるいは overclosed したときのみ緊張する²⁾。

3) Tiny ligament (図2, 3)

これら以外に tiny ligament と呼ばれる小さな靱帯が関節包内に認められている。

Pinto⁴⁾ は“tiny ligament は耳小骨であるツチ骨の前突起と頸部から前方、下方、外側に円錐形にひろがり、関節包の内後上方部、関節円板、蝶

図2 Tiny ligament を示す (左側)
AD: 関節円板, M: ツチ骨
矢印: Tiny ligament は2つ存在する。

図3 図2の模式図⁵⁾

AD: 関節円板, M: ツチ骨, I: キヌタ骨, FS: 棘孔, D: discomalleolar ligament, S: tympanomandibular ligament (Burch⁷⁾) で前方は蝶下顎靱帯につづいている。

下顎靱帯に入り込んでおり、そして鼓索神経とともに Huguier 管を通る”と述べている。しかし、Komori ら⁵⁾ は実際にはこの部位には2つの独立した靱帯が内外側に骨を介して並んで存在し、内側のそれはツチ骨と蝶下顎靱帯の間に介在し、外

図4 Meckel 軟骨はツチ骨につながっている。
(Gray's Anatomy 37th¹⁸)より引用改変)

側のそれはツチ骨と円板後部組織との間に存在するとしている。

4) 中耳との関係 (図4)

ツチ骨は発生学的には Meckel 軟骨に由来し、爬虫類の原始顎関節部に相当する。この Meckel 軟骨はその腹側末端部にツチ骨原基形成後、軟骨の中間部が消失するが、その線維性 perichondrial sheath はツチ骨の前方靭帯および、蝶下顎靭帯として残る⁶⁾。今までに蝶下顎靭帯が中耳においてツチ骨につながっていることはあきらかにされている^{7,8)}。

Komori ら⁵⁾の観察では、ふたつの靭帯の内側のものは後方でツチ骨に付着しており、前方では蝶下顎靭帯につながっており (図3)、この靭帯は Meckel 軟骨の痕跡かあるいは Burch⁷⁾がいうところの tympanomandibular ligament であろうとしている。

ヒト胎児では外側翼突筋からの延長が下顎頭芽あるいは関節円板を超えて Meckel 軟骨に、あるいは成長途上のツチ骨に連絡している組織学的証拠が示されている^{9~11)}。Rees¹²⁾、Coleman¹³⁾はこれを、胎生期 discomalleolar band あるいは discomalleolar ligament と称しているが、いずれも成人死体においては discomalleolar ligament を発見できなかった。Coleman¹³⁾は Moffett¹⁰⁾の報告と一致して胎生終期には discomalleolar ligament のツチ骨への連続性は失われると結論づけ

図5 顎関節関節鏡視による斜走隆起を示す
AD: 関節円板, 矢印: 斜走隆起

ている。しかし成人ヒトにおいても、ふたつの靭帯のうち外側のもののように関節円板や関節後部からツチ骨を直接ひっばっている discomalleolar ligament が存在すると Komori ら⁵⁾は述べている。

5) Tiny ligament の可動性

一部の研究者たちはこの tiny ligament が顎関節症での耳症状の原因であると述べている^{14,15)}が、Coleman¹³⁾はこの靭帯への刺激はツチ骨を動かすことはない結論づけている。さらに Mohl¹⁶⁾はその理由はこれら線維はその経過中 fissure の壁にしっかりと付着しているからであると述べている。また Komori ら⁵⁾もこの discomalleolar ligament を動かしても、ツチ骨に動きはみられなかったとしている。

Perry¹⁷⁾によれば外側翼突筋、下顎頭、成長途上のツチ骨をつないでいる初期の靭帯様結合は顎関節の上関節腔と下関節腔が形成される過程で、機械的相互作用を通して必要であるとされている。もしこれが真実なら、胎生期における discomalleolar ligament は円板とともに動く可能性はあるかもしれない。

頭蓋付着である蝶下顎靭帯もまた注意しなければならない。すなわち、前述のごとく、それもまた胎児期におけるツチ骨の前方靭帯につづいている¹⁸⁾。成人の脱灰標本による一連の解剖では、Burch⁷⁾は緊張が靭帯に現れた時ツチ骨は動くよ

図 6 外側翼突筋, tiny ligament の下顎頭長軸との関係

表 1 外側翼突筋, tiny ligament の下顎頭長軸との関係

外側翼突筋の各筋頭と下顎頭長軸とのなす角度	
上 頭 :	97.9 ± 10.3 (n=26)**
下 頭 :	108.7 ± 11.8 (n=25)**
内側頭 :	126.3 ± 11.4 (n= 9)**
各靱帯と下顎頭長軸とのなす角度	
discomalleolar ligament:	
	87.2 ± 8.7 (n=23)**
sphenomandibular ligament:	
	116.7 ± 8.7 (n=23)**

単位: 度

** : 各群間で 1 % の危険率で有意差あり

うにみえると述べている。しかし、最近の Mohl と Burch の personal communication¹⁶⁾ では Burch は“緊張が蝶下顎靱帯に現れた時、ツチ骨に動きがみられたのは標本が脱灰されているか、あるいは squamotympanic-petrotympanic fissure 部で骨折していたものである”また“私は正常な標本で蝶下顎靱帯に加わった緊張がツチ骨に伝わるということは本当に疑わしい”と述べている。一方、Loughner³⁾ は最近、蝶下顎靱帯は下顎骨の押し下げで緊張し、closed lock に対するマニピュレーションテクニックや関節鏡視などの際に過度

表 2 外側翼突筋各筋頭と discomalleolar ligament の角度的関係を示す

	Spearman の片側順位 相関係数
上 頭/D-M ligament (n=23)	0.453*
下 頭/D-M ligament (n=22)	0.398*
内側頭/D-M ligament (n= 9)	-0.319

* : 有意水準 5 %

D-M ligament: discomalleolar ligament

の下顎骨の押し下げはツチ骨に損傷を与える可能性があることを示唆しているので注意が必要であろう。

6) 斜走隆起との関係

木野¹⁹⁾の関節鏡による顎関節上腔観察ではこの discomalleolar ligament の関節円板付着部位と思われるところに斜めに走行する斜走隆起が開口時に観察されている(図 5)。discomalleolar ligament は下顎頭長軸の内側端あるいは内側 1/4 に付着しており、かつ長軸に対してほぼ 90 度でついている(図 6, 表 1)²⁰⁾。この事実と下顎頭の長軸方向が前額断に対し内側に向いていること、下顎頭の前運動は矢状面に対し直角な移動であることなどから考えれば、斜走隆起が discomalleolar ligament である可能性は存在する。また

discomalleolar ligament の円板につながるところには多数の弾性線維が認められ¹⁵⁾、これ以外に同部には線維束はみられていない²¹⁾。

ここで外側翼突筋と discomalleolar ligament の角度の差を考えてみる必要がある。外側翼突筋は下顎頭長軸に対して上頭、下頭、内側頭はそれぞれ 97.9 度、108.7 度、126.3 度であり、discomalleolar ligament のそれは 87.2 度である (表 1)²⁰⁾。すなわち、外側翼突筋は下顎頭長軸に対し、内方につき、その牽引方向も内側である²²⁾。このことは下顎頭が前方に移動することは雑食動物であるヒトの捕食や咀嚼においては齧歯類に比較して少なく、また咀嚼においてはその運動経路からして均衡側の内側移動が重要な運動であることを示している。

均衡側下顎頭が内側運動を行い、それに随伴して関節円板が外側翼突筋上頭 (内側頭を無視して) によって下顎頭よりわずかに外側方向に牽引されることは、下顎頭が関節隆起後斜面にそって移動するためには関節円板を内方にひっぱる内側頭の存在が必要であり、かつ discomalleolar ligament が下顎頭長軸に対し 90 度で付着していることは、この ligament の円板付着部が弾性線維を多く含んでいることから、内側頭との力のベクトルは関節円板の内方移動を check するのに適切な位置と考えられるが考察の域をでない。

しかし、Mohl¹⁶⁾ は関節の内側に弾性線維が多く集中していることは典型的な円板の前方転位を阻害するのに最良の位置ではないとしている。

7) Discomalleolar ligament の由来

いま、discomalleolar ligament が胎児期における外側翼突筋のツチ骨への付着残遺であるという仮説が認められるならば、上頭との角度と最も相関が認められたことから上頭がツチ骨にまでつながっていたのであろうと思われる (表 2)²⁰⁾。Troiano²³⁾ は内側頭が胎生期においてツチ骨にまで付着していたのであろうと述べているが、内側頭が存在していた標本において discomalleolar ligament が特に太いという関連はみられなかった⁵⁾。また Choukas ら²⁴⁾ は外側翼突筋上頭の最内側および最上方の筋線維が関節円板の内前方部の隅角部に付着していることから、胎児期の外側翼

突筋後方延長部から円板の一部が形成されるという Moffett¹⁰⁾ を支持している。しかし外側翼突筋上頭と discomalleolar ligament のあいだにも角度差が認められた²⁰⁾が、これは胎生期を主とした下顎頭の発育方向²⁵⁾によって生じたものと考えられる。

最近、Smeets²⁶⁾ は顎関節後部組織は 3 層に分けられ、上下の層は関節腔の区分になっており、また中間層は中耳腔に向かい、ツチ骨と前ツチ骨靱帯に付着している。またこの上および下層が Rees¹²⁾ のいうところの 2 層部を形成しているが、この上層部が胎生期の discomalleolar ligament に一致するとしているのは誤りであるとし、intermediate lamina がこれに相当すると報告している。

参考文献

- 1) Williams, P.L. and Warwick, R.: Gray's anatomy. 37th Ed.: 485-489, Churchill Livingstone, Great Britain, 1989.
- 2) Burch, J.G.: Activity of the accessory ligaments of the temporomandibular joint. J. Prosthet. Dent., 24: 621-628, 1970.
- 3) Loughner, B.A. and Mahan, P.: Discomalleolar and anterior malleolar ligaments: Possible causes of middle ear damage during temporomandibular joint surgery. Oral. Surg., 68: 14-22, 1989.
- 4) Pinto, O.F.: A new structure related to the temporomandibular joint and middle ear. J. Prosthet. Dent., 12: 95-103, 1962.
- 5) Komori, E., Sugisaki, M., et al.: Discomalleolar ligament in the Adult human. J. Craniomandibular Practice, 4: 300-305.
- 6) Doyle, D.E.: Embryology and evolution. Diseases of the temporomandibular apparatus. 2nd Ed.: 3-7, edited by Morgan, D.H., House, L.R., et al. The C.V. Mosby Co. St. Louis, 1982.
- 7) Burch, J.G.: The cranial attachment of the temporomandibular (Tympanomandibular) ligament. Anat. Rec., 156: 433-438, 1966.
- 8) Cameron, J.: The cranial attachment of the internal lateral ligament of the lower jaw: with an investigation into the fibrogenesis of this structure. J. Anat. Physio., 49: 210-215, 1915.
- 9) Harpman, J.A. and Woollard, H.H.: The tendon of the lateral pterygoid muscle. J. Anat., 73: 112-115, 1938.

- 10) Moffett, B.C. Jr.: The prenatal development of the human temporomandibular joint. *Contributions to Embryology*, 243: 19-280 plates 2 1957.
- 11) Symons, N.B.B.: The development of the human mandibular joint. *J. Anat.*, 86: 326-333, 1952.
- 12) Rees, L.A.: The structure and function of the mandibular joint. *Br. Dent. J.*, 16: 125-133, 1954.
- 13) Coleman, R.D.: Temporomandibular joint: Relation of the retrodiskal zone to Meckel's cartilage and lateral pterygoid muscle. *J. Dent. Res.*, 49: 626-630, 1970.
- 14) Hawthorne, R., Christensen, F.G.: Some anatomical concepts associated with the temporomandibular joint. *Annals. Royal. Aust. College. Dent. Surg.*, 2: 39-60, 1969. より引用.
- 15) Ioannides, C.A. and Hoogland, G.A.: The disco-malleolar ligament: A possible cause of subjective hearing loss in patients with temporomandibular joint dysfunction. *J. Maxillofac. Surg.*, 11: 227-231, 1983.
- 16) Mohl, N.D.: Functional anatomy of the temporomandibular joint. In *The president's conference on the examination, diagnosis and management of temporomandibular disorders.*: 1-12, Edited by Laskin, D., Greenfield, W., et al. American Dental Association, Chicago, 1983.
- 17) Perry, H.T., Xu, Y., et al.: The embryology of the temporomandibular joint. *J. Cranio-mandib. Pract.*, 3: 125-132, 1985.
- 18) Williams, P.L. and Warwick, R.: *Gray's anatomy*. 37th Ed.: 171-172, Churchill Livingstone, Great Britain, 1989.
- 19) 木野孔司: 顎関節上関節腔の内視鏡所見に関連する滑膜ならびに滑膜ヒダの形態と構造についての観察. *口病誌*, 47: 98-134, 1980.
- 20) 杉崎正志, 他: 外側翼突筋と discomalleolar ligament の角度的関係. *口科誌*, 33: 2738, 1987, 第32回日本口腔外科学会総会(抄).
- 21) 木野孔司: 円板後部結合組織における二層部(Bilaminar zone)の再検討. 第二報 円板後部結合組織の線維構成および円板との関係. *日顎誌*, 2: 43-54, 1989.
- 22) 杉崎正志, 小守英一, 他: 経頭蓋法による外側翼突筋の解剖学的観察ならびに文献的考察. *日口外誌*, 32: 718-730, 1986.
- 23) Troiano, M.F.: New concept of the insertion of the lateral pterygoid muscle. *J. Oral Maxillofac. Surg.*, 25: 337-340, 1967.
- 24) Choukas, N.C. and Sicher, H.: The structure of the temporomandibular joint. *Oral Surg.*, 10: 1203-1213, 1960.
- 25) 森永登規雄: 日本人顎関節の研究 第2編 顎関節発生の立体的観察. *口病誌*, 1: 215-221, 1941.
- 26) Smeele, L.E.: Ontogeny of relationship of human middle ear and temporomandibular (squamomandibular) joint. *Acta. Anat.*, 131: 338-341, 1988.