同一腫瘍内に活動性肺結核を合併した CEA 産生肺腺癌の 1 例

安田 雄司, 朝倉 庄志, 高橋憲太郎, 加藤 弘文, 岡田 慶夫

要 旨

1982年7月に S⁶ に円形陰影と CEA 高値とを指摘され, 病巣擦過物から結核菌が培養陽性であったので, 抗結核療法が行われた。病巣陰影は一時縮小したが, 1986年5月頃から再び増大する傾向がみられたので, 気管支鏡検査が行なわれた。擦過細胞診により腺癌細胞が検出されたので, 肺結核と肺癌との合併例との診断のもとに同年7月左下葉切除術が行われた。病理組織学的にも同一腫瘍内に結核病巣と腺癌とが混在していた。

索引用語: 肺結核, 肺癌, CEA, 腺癌, 円形陰影. pulmonary tuberculosis, lung cancer, CEA, adenocarcinoma, coin lesion

はじめに

抗結核療法の進歩に伴ない, 最近では若年者肺結核患者は激減したが, 一方では肺結核患者の高齢化に伴ない, 肺癌を合併した症例の増加がみられる。

われわれは活動性肺結核と肺癌が同一腫瘍内に合併した症例を経験し, これを術前に診断するとともに, 切除標本について両者の混在を確認した。このような合併例の臨床診断や本病巣の形成機序などに関して若干の考察を加えたのでその大要を報告する。

症 例. 57歳, 男性, 教師。

主 訴: 咳嗽。

既往歴: 35歳, 椎間板ヘルニア。

48歳, 胆石症。

喫煙歴: 30本/日×36年=1,080

家族歴: 特記すべき事項なし。

現病歴: 昭和57年5月健康診断にて胸部異常陰

影を指摘され, 某院を受診した。同異常陰影は円形で左 S⁶ にあり, 3.0 cm×2.8 cm の大きさであった (図1)。気管支鏡下の吸引物から培養で結核菌が検出され, 肺結核症と診断された。一方, 悪性細胞は検出されなかったものの, 血清 CEA 値が 11 ng/ml と高値を呈したため, 消化管を含む全身的な精査が行なわれた。しかし, 腫瘍の存在を示す証拠は得られなかった。

ただちに, INH, EB, RFP による抗結核療法が開始され, 6カ月後には陰影の大きさは 1.8 cm×1.8 cm (図2) と縮小し, 菌も陰性化した。

しかしながら, 61年5月頃から咳嗽がみられるようになり, 同院を受診したところ, 前回にみられた陰影が 3.8 cm×3.3 cm と再び増大していることが指摘された (図3)。また血清 CEA 値は 200 ng/ml 以上の高値を呈した。そのため, 気管支鏡検査を行なったところ, 可視範囲内に異常所見はみられないものの同腫瘍からの擦過細胞診で腺癌細胞が検出された。したがって, 当科に精査および治療の目的で同年6月19日入院した。

入院時現症: 身長 165 cm, 体重 57 kg. 貧血,

滋賀医科大学医学部第2外科
〒520-21 大津市瀬田月輪町
原稿受付 1988年1月18日
原稿採択 1988年3月1日

図1 昭和57年5月の胸部X線写真. 左 S⁶ に 3.0×2.8 cm 大の円形陰影がみられる.

黄疸なし. 胸部, 腹部, 四肢などに特に異常認めず. 表在リンパ節は触知せず.

入院時検査成績: 血清 CEA 値が 4,200 ng/ml と異常高値の他, ALP, γ -GTP, LAP など肝胆系酵素が軽度上昇. 消化管造影では異常なし. 腹部超音波検査では胆嚢に結石2個が検出された以外には異常所見なし. その他肺機能, 心電図, 動脈血ガス分析なども正常であった. CT

写真では縦隔リンパ節の腫大はなく, 術前の評価は T₂N₀M₀, stage I であった.

手術所見: 7月8日左開胸術を施行した. 左後側方切開にて, 第5肋間開胸を行なったが, 開胸時胸水貯留, 胸膜播種などは見られなかった. 左 S⁶ に胸膜嵌入を伴う直径 4 cm の弾性硬な腫瘍が触知されたが, 肺門, 縦隔リンパ節に腫大はみられなかった. 左下葉切除術および縦隔リンパ節郭清術が行われたが, 諸所見から絶対的治癒切除と判定された.

切除標本: 腫瘍は図4のように S⁶ にあり肉眼的には充実性で境界は比較的鮮明であった. 組織学的検査によれば, 同一腫瘍内に結核病巣と癌病巣とが混在しており, その分布は図5のようである. すなわち, 癌病巣が結核病巣を包みこむように増殖し, 腫瘍内に占める結核病巣と癌病巣の比率はほぼ 1:4 である.

病理組織学的所見: 癌の組織は細気管支肺泡型乳頭腺癌で, 結核病巣を取り囲み浸潤性に広がっており, 癌細胞で塞栓された小血管も見出される (図6, 7). 一方, 結核病巣は Langhans 巨細胞はわずかにしかみられなかった (図8). Ziel-Neelsen 染色を行なったが結核菌は検出されなかった. また, 抗 CEA 家兎血清を

図2 抗結核療法開始6ヶ月後の胸部X線写真. 左 S⁶ の陰影は 1.8×1.8 cm 大に縮小している.

図3 昭和61年5月の胸部X線写真. 左 S⁶ の円形陰影が 3.8×3.3 cm 大に 再び増大している.

用いて, PAP 法による CEA 染色を行なったところ, 図9のように, 腫瘍細胞の細胞質は強く染色され, CEA 産生腫瘍であることが組織学的にも立証された.

術後経過: 術後経過は順調であったが, 20日目より胆石症発作が頻発した. 胆管造影を行な

ったところ, 総胆管の拡張がみられ, さらに, 総胆管に結石も確認されたため, 8月14日胆嚢摘出術, 総胆管切石術および乳頭形成術が施行された. なお, 開腹の際, 腹腔内臓器の検索を行なったが, 転移病巣, その他の異常所見は認められなかった.

図4 切除標本. 充実性で境界が比較的鮮明な腫瘍. 腫瘍内に石灰化を認める.

図5 腫瘍内の結核病巣と癌病巣の分布図

開胸，開腹後経過は順調のため，8月30日退院した。

退院後の経過：血清 CEA 値の経時的変動は図10の通りであり，術後同値は 200 ng/ml まで低下したが，その後，再び上昇の傾向がみられる。しかし，術後1年半を経過した現在では，腫瘍，肝ならびに骨シンチグラフィーでも異常な集積はみられず，自覚症状的にも健在で，目下現在経過観察中である。

考 察

肺結核患者の高齢化に伴い肺癌の合併率は増

加する傾向がみられる。活動性肺結核患者において肺癌を合併する頻度は1%以下とする報告が多いが³⁾，中には2%以上とするものもみられる⁴⁾。こうした合併例では，両者が同側にみられることが多く¹⁾，したがって，両者の合併を早期に診断しうることは困難で，進行癌の状態になって始めて診断されることが多い。

本症例において，肺癌は血清 CEA 値が高値を示した1982年にはすでに存在したものと思われる。一方，癌病巣が結核病巣を取り囲むように浸潤している組織学的所見から，既存の結核病巣へ癌浸潤が及んだと解するのが適当であろ

図6 腫瘍の病理組織弱拡大像。(×16, HE 染色)。癌病巣は結核病巣を取り囲み，浸潤性に広がっている。

図7 腫瘍の病理組織強拡大像。(×40, He 染色). 腫瘍は細気管支肺泡型乳頭腺癌である.

う. 肺結核と肺癌が併存する場合一般には前者が先行するようである⁵⁾.

肺結核と肺癌との合併に関して, 以前から両者が拮抗するという説, 単なる共存とする説, 結核性瘢痕が癌の発性母地になるとする説などが提唱されているが定説はない. 本症例におけ

る両者の発生機転について考察すると下記の2つの場合が考えられる.

1) 既存の結核病巣と癌とが偶然相接して発生したとする考え方. この場合, 結核と癌とが拮抗するという考え方や, BCG 局所投与による腫瘍の変性⁶⁾, あるいは肺結核を合併した肺

図8 腫瘍の病理組織強拡大像。(×40, HE 染色). 結核病巣辺縁に僅かながら Langhans 巨細胞がみられる.

図9 CEA 染色を行った癌病巣の組織像 (×80). 癌細胞の細胞質は周囲の細胞に比べて濃染されており, CEA を産生していることがわかる.

癌患者に延命効果がみられるとする報告⁷⁾ などから, 結核の存在が癌の発育に抑制的に働くことも考えられる.

図10 本症例の血清 CEA 値の変動.

2) 結核性瘢痕が癌の発生母地となったとする考え方. 岡田ら^{5,8)}や影山ら³⁾は結核性瘢痕が癌の発生要因になりうることを報告しており, 本例もその可能性を否定できない. ただし, 肺癌発生以降に癌と肺結核とが相互の病勢にどのような作用をおよぼしたかは判断し難い.

以上本症例の発生機転についての考察であるが, いずれも決定的ではない. 肺結核と癌が同一腫瘍を形成している症例は少数例ながら報告されているが^{9~11)}, 本例のように結核病巣を癌が完全に包囲するように増殖している例はみられていない.

人口の高齢化に伴ない, 肺結核と癌との合併例が多く経験されるようになったが, その多くが肺結核症の経過観察中に肺癌が発見されている. ただし, これらでは癌の発見は一般に遅れがちであり, 特に結核病巣に接近して癌が発生した場合には早期診断は極めて困難である. その点, 自験例では血清 CEA 値の上昇が癌の合併を疑わせる手掛かりとなった.

両者の合併例の診断に関して, Sinner¹²⁾は経皮的穿刺細胞診検査の有効性を報告しており, また, 中村ら⁴⁾は肺結核患者に早朝3日間の喀

痰細胞診を行うことを勧めている。しかしながら、合併例の早期診断は一般に困難であるので、癌年齢にある肺結核患者で胸部X線写真上新たな陰影や陰影の変化が生じた場合には、肺癌の合併を疑って、喀痰細胞診、気管支鏡、腫瘍マーカーの測定などの諸検査を強力に行うべきであろう。

ま と め

同一腫瘍内に肺結核を合併した CEA 産生肺癌の1切除例を報告した。腫瘍陰影の出現から確定診断がなされるまでに約4年を経過したが、腫瘍の発育は非常に緩徐であった。

両者の合併例の発生機序について考察を行ったが、本症例における両者の関わりあいについては明らかではなかった。人口の高齢化に伴なった肺結核と肺癌との合併頻度は上昇しているが、CEA などの腫瘍マーカーの上昇はこのような合併例の診断に大きな手掛かりを与える。

本症例の病理組織学的診断にあたり滋賀医科大学中央検査部 岡部英俊講師の助言をいただいた。ここに深く感謝します。

文 献

- 1) 板野龍光, 杉本直人, 西井保司, 等: 肺結核と肺癌の合併—日本病理剖検輯報, 過去18年間の観察—, 日胸, **38**: 197-201, 1979.
- 2) 小松彦太郎, 石塚葉子, 米田良蔵: 肺癌と活動性結核の合併例の検討, 結核, **56**: 49-55, 1981.
- 3) 影山圭三, 花岡和朗: 肺結核と肺癌, 結核 **50**: 607-611, 1975.
- 4) 中村憲二, 李 龍彦, 中元賢武, 等: 肺結核病棟における肺癌, 結核, **56**: 403-406, 1981.
- 5) 岡田慶夫, 池田貞雄: 肺結核と肺癌, 臨床と研究, **47**: 2019-2030, 1970.
- 6) 徳永 徹: BCG の抗腫瘍作用の機序, 結核 **55**: 351-357, 1980.
- 7) 松島敏春, 原 宏紀, 莊田恭聖, 等: 癌と肺抗酸菌症との合併例に関する臨床的検討, 結核, **59**: 269-275, 1984.
- 8) 岡田慶夫, 池田貞雄, 北野司久, 等: 肺の癒痕癌について, 日胸, **26**: 39-49, 1967.
- 9) Phillips, L. G., Cunningham, J., Hillman, N. M., et al.: Carcinoma of the lung and coexistent active pulmonary tuberculosis: Diverse morphologic and radiographic presentation, J Nat. Med Assoc, **76**: 125-1984.
- 10) 田ノ上雅彦, 益田貞彦, 吉沢靖之, 等: 同一肺葉内に一塊となって認められた肺癌と活動性肺結核の1合併例, 日胸, **44**: 220-223, 1985.
- 11) 佐々 弘, 蜂谷哲也, 草間 博, 等: 肺癌・肺結核症合併剖検例の検討, 東医大誌, **41**: 717-726, 1983.
- 12) Sinner, W.: Fine needle biopsy of tuberculosis coexistent with carcinoma of the lung, Fortschr Rontgenstr, **139**: 173-182, 1983.

**CEA-Producing Adenocarcinoma of the Lung Complicated
by Active Tuberculosis in the Same Mass; a Case Report**

*Yuji Yasuda, M.D., Shouji Asakura, M.D., Kentaro Takahashi, M.D.,
Hirohumi Katoh, M.D. and Yoshio Okada, M.D.*

Second Department of Surgery, Shiga University of Medical Science, Otsu, Japan

A coin lesion in the left middle lung field on the X-ray film and a high CEA level were noted in July, 1982. A culture of scrapings from the lesion grew out tubercle bacilli. After anti-tubercular therapy, the size of the shadow decreased temporarily but increased again from about May, 1986. Adenocarcinoma cells were detected in smears obtained at bronchoscopy, and a diagnosis of pulmonary tuberculosis complicated by lung cancer was made. A left lower lobectomy was performed. Histopathological studies revealed that foci of adenocarcinoma were the main constituents of the mass which had infiltrated around the focus of tuberculosis.

Immunohistochemical staining for CEA in this specimen showed that CEA was localized in the cytoplasm of the adenocarcinoma cells.