餅に関する食品学的研究

永 島 伸 浩*

Physical Characteristics of Mochi

Nobuhiro NAGASHIMA

*Musashigaoka College**(111-1, Minamiyoshimi, Yoshimimachi, Hikigun, Saitama, 355-01, Japan)*

The physical characteristics after aging of Mochi prepared by several methods were studied, and the following results were obtained:.

1) Mochi prepared by stamping exhibited much of the initial rice grain structure, while that prepared by a power mixer was of a well-mashed paste form rather than rice grain tissue.

2) The hardness of each type of Mochi measured by a rheolometer depended on the storage conditions: Mochi prepared by a mixer was softer than by stamping with no storage, while that prepared by a mixer was harder than by stamping after storing for 3 hr at 5°C.

3) The creep curves of Mochi measured by a rheoner could be explained by a six-element mechanical model consisting of Hookean body, two pairs of Voigt bodies and a Newtonian body. The shift factor-1/T relationship for Mochi stored at 5°C resulted in two straight lines, a refraction point being observed at 50°C; however, no such phenomenon was observed for Mochi stored at -20°C.

4) The cooking loss of Mochi stored at 5°C decreased with increasing storage time, while that of the Mochi stored at -20°C hardly changed. Mochi prepared by stamping showed a small cooking loss after storage at 5 and -20°C, respectively.

5) The crystalline structure of raw glutinous rice could be classified as a type-A pattern, although this pattern disappeared upon heating and was transformed into a type-B pattern after storing at 5°C for one week. In the case of Mochi stored at -20°C, the crystallinity was never recovered.

6) The viscosity of Mochi measured by a Brabender viscograph after storing at 5°C showed a maximum value of 800 to 1000 B.U., while that stored at -20°C showed a maximum value of 200 to 300 B.U. The viscosity of the latter reached a peak after storing for 72 hr, and then decreased with a further period of storage.

伝統食品としての餅の歴史は古く奈良朝時代にはすでに存在していたといわれる^{1,2)}。しかし、餅に関する食品学的な研究は少なく、米菓製造時の餅の性状、白玉餅および粳米団子の性質について扱った文献がみられる程度である³⁻¹⁹⁾。最近では、家庭用餅搗き機の普及や量産製造のために餅生地調製法が変化してきた。

餅生地は、原料の糯米が同一でも生地の調製法の違いにより、食味時のテクスチャーや調理時における性状の

変化が異なることが日常の経験でよく知られている。調製直後の搗きたての餅生地は、変形が容易でかなりの柔軟性を示すが、時間の経過とともに硬化が進み、石のように硬い生地に変化していく。しかし、これらの現象はまだ明らかにされていない部分が多い。そこで本研究では調製法を異にした餅生地の物理的特性および保存による餅生地の硬化過程の性状の変化を中心に検討した²⁰⁻²⁵⁾。

*武蔵丘短期大学健康生活科健康栄養専攻 (355-01 埼玉県比企郡吉見町大字南吉見 111-1)

Fig. 1. Photomicrographs of various Mochi.

A, stamp type ; B, mixer type ; SEM, scanning electron micrograph ; LM, light micrograph.

1. 搗き方別餅生地の物理的性質^{20, 23, 24)}

1) 餅生地組織構造

Fig. 1 に走査型電子顕微鏡 (SEM) および光学顕微鏡 (LM) で観察した搗き方別餅生地の一例を示した。餅生地の組織は大別すると糯米粒組織の残存部、これら米粒細胞より流出した澱粉ペーストおよび調製時に混入する気泡とから構成されている¹⁸⁾。電動スタンプ式餅生地は比較的残存米粒が多く、その粒径も大きいこと、電動ミキサー式は糯米粒が細かく破壊され、残存米粒の粒径が小さく、しかも米粒細胞から流出した澱粉ペーストや気泡の量が多いことが観察された。したがって、このよう

な組織細胞の違いが物性に大きく影響するものと考えた。

2) 餅生地テクスチャー

レオロメータによる餅生地のテクスチャーの結果 (Fig. 2)、硬さと粘りは冷蔵保存の経過とともに増加した。このうち硬さでは調製直後はスタンプ式が、保存3時間後は逆にミキサー式が高い値を示した。同様に剪断強度の測定をした結果、テクスチャーの硬さの結果と同傾向を示した。針入度の測定結果を Fig. 3 に示したが、搗き方別を問わず調製直後の餅生地は針入度が190 ユニット、すなわち生地の厚みの90%以上の針入があった。これを冷蔵保存した24時間後の餅生地の針入度では、いずれの方式でも生地の厚みの20%以下まで激

Fig. 2. Texture of various Mochi by rheolometer.

●, prepared by a stamp; ○, prepared by a pounding; □, prepared by a mixer.

Fig. 3. Time course of penetration of Mochi at 20°C.

—○—, prepared by a stamp and stored at 5°C;
 ---○---, prepared by a stamp and stored at -20°C;
 —○—, prepared by a mixer and stored at 5°C;
 ---○---, prepared by a mixer and stored at -20°C.

減し餅生地は硬化が急激に進行することが認められた。一方、冷凍保存した場合は保存一週間後でも生地厚みの75%以上の針入があり、餅生地はほとんど進行していないことが認められた。冷蔵保存ではミキサー式餅生地は針入度がスタンプ式よりやや小さく、生地の硬化の進行が早いこと、冷凍保存では逆にスタンプ式の針入度がやや小さく、餅生地調製直後の特性を維持しているものと考えている。

3) 餅生地の静的粘弾性(クリープ特性)

餅生地のクリープ特性の検討を行い、スタンプ式餅生地の保存別・測定温度別の粘弾性係数を Fig. 4 に示し

た。保存経過による餅生地の瞬間弾性率・遅延弾性率をみると、冷蔵(5°C)保存の餅生地(測定A)では保存時間が長くなるほど弾性率がやや高くなり、冷凍(-20°C)保存の餅生地では保存経過による弾性率の変化はほとんど認められなかった。すなわち、餅生地を冷蔵保存すると時間の経過とともに硬化が進行するが、冷凍保存ではほとんど起こらないといえる。冷蔵餅生地(測定A)において、すべての餅生地は30~60°Cに温度を上昇させると弾性率は低下し、徐々に軟化していることが示され、とくに瞬間弾性率および遅延弾性率ともに50~60°Cの温度領域で弾性率の急激な低下がみられた。この現象は硬化した餅生地が再糊化する温度域として注目される。一方、冷凍保存では瞬間変形部は測定温度を上昇させても弾性率の低下はわずかであったが、遅延変形部では顕著な低下を示した。餅生地の粘性率の変化をみると、弾性率と同様に冷蔵保存により粘性率が高くなるが、冷凍保存の餅生地はこれらの変化がほとんどなかった。測定温度別では餅生地は温度上昇に伴い、粘性率が低下した。測定Aでは遅延粘性率および定常粘性率ともに弾性率の場合と同様に50~60°C間で急激な低下が認められた。一方、冷凍餅生地(測定C)は遅延粘性率、定常粘性率ともに測定温度を上昇させるにつれ、顕著な低下が認められた。ミキサー式餅生地は弾性率・粘性率ともにスタンプ式餅生地と同様の傾向を示した。餅生地のみかけの活性化エネルギーを求めた結果を Table 1 に示した。ここで注目されることは、冷蔵餅生地の測定Aでは撓き方別にかかわらず、50°Cを屈折点として低温領域(30~50°C)と高温領域(50~60°C)とでみかけの活性化エネルギーの値が異なり、測定BやCの場合に比べて餅生地の内部構造の変化が著しいことである。また、みかけの

Fig. 4. Effect of temperature on the Young's modulus and viscosity of Mochi (stamp type) stored at 5°C and -20°C.

Storage time : —, 24 hr ; ---, 72hr ; ·····, 168 hr.

A : Samples stored at 5°C were measured from 30 to 60°C.

B : Samples stored at 5°C were heated to 60°C before the viscoelastic measurement.

C : Samples stored at -20°C were measured from 30 to 60°C.

活性化エネルギーをみると冷蔵保存ではミキサー式のほうが、冷凍保存ではスタンプ式のほうがやや高い値を示した。これらの特性の違いは冷蔵保存の場合ミキサー式餅生地のほうが硬化が進み、再加熱によるエネルギーの移動が大きく、一方冷凍保存の場合両方式で搗いた餅生地はほとんど硬化が起こらず、調製直後の餅生地の特性を維持しているため、スタンプ式のほうが値が大きくなったと考える。

2. 搗き方別餅生地の硬化過程における性状の変化²⁴⁾

前項までの測定で、餅生地は調製法や保存法の違いにより異なった物性を示すことが認められた。そこでこれらの物性に起因する餅生地の性状についてさらに検討を進めた。

Table 1. Apparent activation energy of Mochi.

Sample	(kJ/mol)			
	5°C		-20°C	
	(30-50°C)	(50-60°C)	(30-60°C)	(30-60°C)
	$\times 10^2$	$\times 10^3$	$\times 10^1$	$\times 10^2$
Stamp type	2.78	1.65	8.36	3.32
Mixer type	3.00	1.70	17.06	2.95

Fig. 5. Time course of cooking loss of Mochi.

The symbols are the same as those for Fig. 3.

1) 餅生地の煮溶け率

Fig. 5 に示したように調製直後の餅生地はいずれも高い煮溶け率を示すが、スタンプ式がミキサー式より煮溶けがやや少なかった。保存別では冷蔵保存の場合は餅生地の硬化が進行するにしたがい煮溶け率が減少するのに対し、冷凍保存の場合は調製直後の特性を維持し、冷蔵保存より煮溶け率の減少が少なかった。冷蔵保存および冷凍保存のいずれもスタンプ式のほうがミキサー式より煮溶け率が少なかった。すなわち、硬化の進行とともに煮溶け率は減少するが、澱粉分子（ペースト状）が米粒細胞外に多量に流出しているミキサー式餅生地はスタンプ式に比べ、煮溶けやすいといえることができる。

2) 餅生地の水分含量および水分活性

調製直後の餅生地の水分含量は搗き方別にかかわらず、約 43% であった。水分含量の変化はスタンプ式およびミキサー式において、冷蔵および冷凍保存においても

まったく認められなかった。一方、餅生地の水分活性値は搗き方別においてミキサー式がスタンプ式よりやや高い値であった。水分活性の変化は保存別で冷蔵保存がわずかに減少したが、冷凍保存ではまったく変化がなかった。これらの結果より、とくに冷蔵保存で餅生地の硬化が急激に進行することの要因と水分量の変化とは直接関係していないといえる。

3) 餅生地の糊化度

調製直後の餅生地の糊化度は搗き方別にかかわらず 98% 以上の高い糊化度を示した。保存別では冷蔵保存の場合、餅生地の硬化にしたがい糊化度がやや低下する傾向を認めたが、保存 1 週間後で 80% 以上の糊化度を示した。冷凍保存の場合は糊化度の変化がわずかな低下で保存 1 週間後で 95% の糊化度を示した。これらの結果より、冷蔵保存において餅生地の硬化が急激に進行することと、これらの酵素法による糊化度の変化とは一致せず、水分含量の測定結果と同様に餅生地の硬化の指標にはならないと考える。

4) 餅生地の結晶構造

Fig. 6 に示したように生糯米は典型的な A 図形を示した。これを加熱し餅生地を調製した直後では結晶性を示すピークが消失した。冷蔵保存の場合は保存 24 時間より餅生地の硬化が進むにしたがい結晶性の回復を示すピークがあらわれ始め、保存 1 週間後における結晶図形は B 図形へと変化した。一方、冷凍保存の場合は経時変化による変化がほとんどなく、保存 1 週間後においても明瞭な結晶ピークの回復が認められず、調製直後の餅生地の性状を維持していることが明らかとなった。したがって、結晶図形による追跡は餅の硬化過程をあらわす指標となりえるものとする。

5) ビスコグラフによる餅生地の粘度変化

Fig. 7 に示したように調製直後の餅生地は測定開始と同時に粘度がわずかに増大し、その後の加熱・冷却による粘度の増減は認められなかった。餅生地を冷蔵し、24、

Fig. 6. X-ray diffraction patterns of Mochi on storage at various temperatures.

72, 168 時間保存した場合の粘度曲線は、約 40℃ 付近より急激な粘度の増大がみられた。ミキサー式餅生地の場合、この粘度増加は保存72時間で最大を示し、保存1週間後では逆に低下した。一方餅生地を冷凍し、24, 72, 168 時間まで保存した場合の粘度曲線はいずれの餅生地も調製直後の餅生地と同様な粘度曲線を示したことから、

調製直後の性状を維持しているといえる。

以上より、餅生地は調製方法の違いによる差異だけでなく、保存方法を変えることによって、餅生地の物性は性状が大きく異なることが見出された。餅を含め、澱粉性食品の老化現象は種々の要因によって変化するものであり、一様なものとして論ずることはできないが、餅生

Fig. 7. Brabender viscograms of Mochi on storage at various temperatures.

Storage time : —, raw glutinous rice ; — — —, 0 hr ; - - - - , 24 hr ;
 - · - · - , 72 hr ; · · · · · , 168 hr.

地の硬化現象の要因の一つは、餅生地中に多量に存在する澱粉分子と水分子の相互の挙動によって起こるものと推察している²⁶⁻²⁸⁾。すなわち、餅生地を冷蔵保存すると

餅生地中の水分子と澱粉分子に変化が起こり、互いに分離し、水はクラスターとなる。一方で、澱粉分子間で会合を起こし、これが密な状態となって巨大なネットワーク

クを形成し、餅生地構造の物理的な安定（強度）に寄与していると考えられる。また、餅生地の水分は、43%と全体の半量以下のためか、水分含量の多い澱粉ゲルのような離漿を起こさず、澱粉分子のネットワークの中に包含されており、そのために水分量の変化がほとんどないと考えられる。餅生地を冷凍することにより、生地の硬化が進行しないのは、水が結晶して澱粉分子が固定されるためであろう²⁷⁾。これらの問題については今後の検討課題としたい。

3. 粳米・糯米の硬化過程における性状の変化²⁵⁾

今までの結果で、餅生地は原料の糯米が同一でも調製法の違いにより生地の物性や性状に影響をあたえることが明らかとなった。そこでつぎに糯米中の糊化澱粉の存在状態を変えて、生地の硬化過程の追跡を試みた。すなわち、糊化澱粉が細胞内に留っている米粒状としての強飯、糊化澱粉が細胞内と細胞外にペーストとなって存在する半米粒状としての餅、そして糊化澱粉が大部分細胞外に存在する米粒状としての団子をそれぞれ調製し、調製直後および冷蔵保存過程の性状について検討した。

1) 粳米・糯米試料の物理的性質

調製直後のそれぞれについてフェリノグラフにより硬粘度測定を行った結果、粳米、糯米とも米粒組織が破壊されていない強飯では硬粘度がもっとも高く、米粒組織が細かく破壊されている団子では硬粘度の低下がもっとも顕著であった。糯米の硬粘度は粳米に比べ、いずれも低い傾向にあった。これは糯米に含まれる澱粉がアミロースを含まないためである。ビスコグラフによる粘度測定では、粳米試料はいずれも粘度立上がり温度がかなり高温側で、しかも温度上昇中は粘度の増加が小さいこと、冷却により粘度が急激に上昇すること、保存過程での変化が少なく近似した曲線であることが特徴であった。糯米試料は粳米試料とかなり異なり、いずれの場合も調製直後の試料は測定開始と同時に粘度が上がり、冷却後はあまり大きな粘度の増加はみられないが、冷蔵保存した試料では保存 24 時間後より約 40℃ 付近から急激な粘度増加があり、粘度の大きさは保存 72 時間を最大とし、保存 1 週間後では逆に低下した。粳米・糯米試料とも調製別で異なった結果となり、米粒状の強飯は粘度がもっとも高く、米粒状の団子は粘度がもっとも低くなった。

2) 粳米・糯米試料の糊化度

粳米試料は保存時間が長くなるほど、糯米試料より糊

化度の低下が大きく、老化しやすいことがわかった。また、いずれも米粒組織が破壊されず、米粒細胞内に糊化澱粉が存在する強飯試料の糊化度がもっとも高く、老化しにくいことが認められた。

これらのことより、粳米・糯米の米粒状、半米粒状、米粒状の試料の諸特性に差異が認められるのは、試料の組織構造に由来していると考えられる。すなわち、糊化後の米澱粉は米粒胚乳組織の細胞内に存在する場合と圧力や攪拌によって米粒細胞より外にペーストとなって流出している場合とでは、硬化のメカニズムがかなり異なり、餅生地中に澱粉ペーストが多量に存在していると、冷蔵保存とともに老化が進行する割合も早く、また再加熱の場合には、すみやかに柔らかくなることが示唆された。

4. 糯米、ワキシコーンおよびキャッサバ澱粉の餅への利用^{20), 22)}

1) 糯米、ワキシコーンおよびキャッサバ澱粉の物理的性質

各種澱粉の中で糯米、ワキシコーンおよびキャッサバ澱粉は澱粉ペーストが硬いゲルにならず、半固形状で流動性を示すことが知られている。これらの澱粉よりペーストを調製し、曳糸特性とクリープ特性について検討した。曳糸特性では濃度が増すにつれて曳糸距離と曳糸エネルギー値は増加する傾向を示したが、糯米>キャッサバ>ワキシコーン澱粉の順にその増加率が大きかった。クリープ特性では弾性率・粘性率ともにキャッサバ澱粉がもっとも大きく、糯米澱粉は定常粘性率が 3 種の中でもっとも小さかった。糯米澱粉は温度依存性がもっとも大きく、温度上昇に伴い弾性が減少し、澱粉分子と水分子のネットワークがゆるくなることが示唆された。

2) 澱粉ペースト添加餅生地の物理的性質と食味特性

澱粉ペースト添加餅生地のテクスチャーの結果、ワキシコーン澱粉添加により餅生地は柔らかくなり、キャッサバ澱粉添加により、硬さと粘りが増加することが認められた。食味特性の結果、糯米 100% 餅生地は弾力性とこしがあること、ワキシコーン澱粉添加餅生地は白っぽく、組織が均一で伸びのことが、そしてキャッサバ澱粉添加餅生地は弾力性とこしがあり、糯米 100% 餅生地より伸びがよい特性であることが示された。したがって、餅生地は嗜好性が多様化しており、これらの澱粉を添加した餅への利用も有効であることが明らかとなった。

本研究を行うにあたり、終始ご指導ご鞭撻を賜りました東京大学名誉教授東京農業大学客員教授中村道徳先生、東京農業大学教授川端晶子先生に厚くお礼申し上げますとともに、東京農業大学調理学研究室の先生方のご協力のもとに行われ、改めてお礼申し上げます。

文 献

- 1) 二國二郎：自然（中央公論社），2，14-21（1948）。
- 2) 日東製菓（株）：おもちの本，食品出版社，東京，p.66（1983）。
- 3) 斎藤昭三，谷地田武男，石井修一，有坂将美，中島幸一：新潟食研報，11，85-90（1970），11，95-98（1970），13，49-56（1974），13，57-67（1974），14，53-58（1974），15，39-45（1978），18，39-42（1981）。
- 4) 谷地田武男，中島幸一，斎藤昭三：新潟食研報，11，91-93（1970）。
- 5) 柳瀬 肇，遠藤 勲，奥野元子：食総研報，42，1-9（1983）。
- 6) 柳瀬 肇，大坪研一，橋本勝彦：食総研報，45，1-8（1984）。
- 7) 斎藤昭三，池山八郎，福場博保：新潟食研報，9，63-66（1966）。
- 8) 斎藤昭三，馬場 操：新潟食研報，9，67-70（1966）。
- 9) 斎藤昭三，馬場 操，古石澄子：新潟食研報，9，71-75（1966），9，77-83（1966）。
- 10) 池山八郎，斎藤昭三：新潟食研報，10，25-28（1968）。
- 11) 馬場 操，斎藤昭三：新潟食研報，10，29-30（1968）。
- 12) H. HORIUCHI：Agric. Biol. Chem.，44，1231-1235（1980）。
- 13) 堀内久弥：農化，54，241-245（1980）。
- 14) 堀内久弥：日食工誌，33，38-43（1987）。
- 15) 堀内久弥：農化，61，1417-1423（1987）。
- 16) 勝田啓子：家政誌，37，351-355（1986），38，275-281（1987），38，283-291（1987），38，711-718（1987），39，289-295（1988）。
- 17) 桐渕滋雄：食品開発，11，35-39（1976）。
- 18) Y. ISONO, E. OKAMURA and T. FUJIMOTO：Agric. Biol. Chem.，54，2941-2947（1990），54，2949-2952（1990）。
- 19) 永島伸浩，川端晶子，中村道徳：澱粉科学，34，179-185（1987）。
- 20) 永島伸浩，川端晶子，中村道徳：澱粉科学，34，186-195（1987）。
- 21) 永島伸浩，澤山 茂，川端晶子，中村道徳：澱粉科学，37，21-28（1990）。
- 22) 永島伸浩，川端晶子，中村道徳：澱粉科学，37，235-242（1990）。
- 23) 永島伸浩，川端晶子，中村道徳：澱粉科学，37，243-250（1990）。
- 24) 永島伸浩：第16回食品の物性に関するシンポジウム講演要旨集，p.87-96（1989）。
- 25) 久下 喬：New Food Ind. 19（8），33-47（1977）。
- 26) 檜作 進：調理科学，3，225-229（1970）。
- 27) 野口 駿，中沢文子：調理科学，12，8-16（1979）。
- 28) 中沢文子，野口 駿，高橋淳子，高田昌子：家政誌，34，566-570（1983）。

（平成3年10月3日受理）

- Am. J. Clin. Nutr., 32, 1636-1644 (1979).
- 6) M. MELLIS, R. JANDACEK *et al.* : *Am. J. Clin. Nutr.*, 37, 339-346 (1983).
- 7) F. MATTSON, E. HOLLENBACH and C. KUEHL-THAU : *J. Nutr.* 109, 1688-1693 (1979).
- 8) 特開平 3-39068.
- 9) 特開平 3-7539.
- 10) C. A. BERNHARDT : *Food Tech. Int. Eur.*, 176-178 (1988).
- 11) D. GARDNER and R. SANDERS : *J. Am. Oil Chem. Soc.*, 67, 788-796 (1990).
- 12) *Food Chem. News*, April 3, 23-24 (1989).
- 13) G. P. RIZZI and H. M. TAYLOR : *J. Am. Oil Chem Soc.*, 55, 398-401 (1978).
- 14) U.S. Patent, 4, 517, 360 (1985).
- 15) *J. Am. Oil Chem. Soc.*, 65, 1708-1712 (1988).
- 16) *Inform*, 2, 115-119 (1991).

(平成 3 年 12 月 26 日受付)