南 関 東 の テ フ ロ ク ロ ノ ロ ジ ー (I)

——下末吉期以降のテフラの起源および層序と年代について¹⁾——

町 田 洋²⁾

Tephrochronological Study in South Kanto

Part I Stratigraphy of tephra and its relation to the history of volcano

Hiroshi MACHIDA

It is well known that the pyroclastic-fall (tephra) layers are the best key beds for regional geologic chronology. South Kanto is a good field for Quaternary tephrochronology in Japan, since there exists a vast amount of tephra mainly supplied from the two volcanoes, Mt. Hakone and Mt. Fuji to the east, covering upon and interbedding within Quaternary sediments.

There exists a considerable number of literature on the tephrochronology around Tokyo and Yokohama about 100 kilometers away from the source volcanoes. However, so many tephra beds there consisting of weathered and yet thinner fine ashes with similar brown loamy appearance make it extremely difficult to discriminate some definite time-markers of tephra.

As one goes nearer to the source volcanoes, coarser and thicker tephtras are expected. In this connection, the best type field is placed in the Ooiso hills, adjacent to the Hakone volcano, where a great number of time-markers is easily distinguished even to the naked eyes and several Quaternary sediments are developed.

In this study, each sheet of time-markers which fell after the marine Shimosueyoshi or Kissawa formation was constructed, is precisely discriminated at the type field, Kissawa, eastern part of the Ooiso hills. And then each is traced and correlated eastward along the main axis of distribution to the environs of Tokyo which have been a standard Quaternary succession in Japan (Fig. 1, 2, 4, Table 1, 2, 3).

As the first part of this study, the stratigraphy of tephra and absolute ages of several time-markers are discussed in this paper together with the history of the source volcanoes. Former interpretations as to the development of the volcanoes and the marine terraces in this area would be improved considerably.

1) The tephra layers of South Kanto were formerly divided into four groups; Tama, Shimosueyoshi (Kissawa), Musashino, Tachikawa tephtras. Time gaps during the accumulation of each group were estimated by soil profiles and unconformable relations to about 10,000 years or more in length. But few data concerning large breaks of tephra falls are found at every boundary in the Ooiso hills and its neighbourhood. A buried soil profile and unconformity are inferred not to indicate a great stratigraphic hiatus but possibly to show a slow accumulation and to be apparent features revealed in the air-laid tephra deposits upon slopes and at the scarps of terraces. In addition, some absolute ages measured by Carbon-14 and Fission track datings indicate that the tephra was supplied rather successively through the late Quaternary (Fig. 10). The longest break of tephra accumulation might be less than several thousand years.

2) The Younger tephra groups consisting of the Musashino and the Tachikawa tephra are roughly estimated to have successively accumulated from about 60,000 years to about 10,000 years B. P. This estimation is based upon the Fission track age of the Tokyo pumice (TP)

1) 1970.11.11 受付

2) 東京都立大学理学部地理学教室 Department of Geography, Faculty of Science, Tokyo Metropolitan University

and the C-14 ages of the several horizons of the Tachikawa loam (Fig. 10). And the underlying Shimosueyoshi or Kissawa tephra layers are estimated to have successively fallen from about 130,000 or 120,000 years B. P. to about 60,000 years B. P. based upon the Fission track datings of obsidian and zircon included in the several pumice beds (Fig. 10). This result seems to coincide the stratigraphic facts that the total volume of the Shimosueyoshi tephra is about the same as that of the Younger one (Fig. 2) and that some short stratigraphic hiatuses are found at several horizons such as the boundaries of the three subgroups (K_1 ; the lower Kissawa tephra, K_m ; the middle Kissawa tephra, K_u ; the upper Kissawa tephra, Fig. 6A, B). The above age of the lower limit of the Shimosueyoshi tephra layers must suggest that the Shimosueyoshi transgression was dated back to the past a little older than the former concept. In addition, it may be pointed out that the Obaradai marine terrace surface, which was formed by a considerable transgression after the Shimosueyoshi stage, is estimated to have been formed about 80,000 F. T. years B. P. This is based upon the fact that the Obaradai surface is stratigraphically placed at the middle horizon between the two time-markers, the Pm-I and the OP.

3) Several buried soil horizons are found in cross-sections of tephra (Fig. 9). They seem to have been formed during a quiescent period of tephra fall or during a climatically suitable stage for soil formation. It is pointed out that they more or less coincide at the horizons of marine terrace surfaces; the Shimosueyoshi buried soil (SB), the Obaradai buried soil (OB), the Musashino buried soil (MB) and the Fuji buried soil (FB) are correlated with the Shimosueyoshi terrace surface, the Obaradai surface, the Misaki surface and the Holocene surface respectively (Fig. 1). Each surface is considered to have been formed by the transgression of interglacial or interstadial of the late Quaternary. This stratigraphic accordance is problematic and might be important in considering some relations between the volcanic activity and the climatic change in the late Quaternary.

The paleogeographic history related with the glacial eustatic change of sea level will be discussed in detail in the next paper.

まえがき

南関東の台地、丘陵地に広く分布する関東ロームは、諸先学の研究に加えて、戦後関東ローム研究グループなどの研究者によって飛躍的に解明され、日本の第四紀地史研究上重要な地層として脚光を浴びたことは改めてのべるまでもない。ところで、これらの研究では、火山灰層（以下簡述のためテフラと呼ぶ）は海、河成の地層や地形面を対比し、編年するための鍵層という意義をとくに重要視された。むしろこのために、次のようなテフラに関するかなり基礎的な問題が残されてしまったものと考えられる。第一はテフラがその給源火山の発達史においてどんな位置を占めるか、火山の活動史によってテフラの層序区分が可能かといった問題である。また第二はテフラの堆積年代に関連して、従来の海・河成層の区分に準拠したテフラの層序区分にみられる不連続的堆積の考えが当たっているか否か、といった問題である。

筆者ははじめとくに第一の問題に接近するため数年前から南関東の主要なテフラ給源火山である箱根・富士の研究に従事した。そしてその後次第に調査範囲を東に広げるにつれて、第二の問題およびそれにまつわる諸問題

にも大きな関心をもつに至った。その結果、テフラによる層位的、地形学的研究は、従来の火山から離れた平野から火山へという方向ではなく、火山になるべく近い地域で標準を確立した上で、より遠方のテフラ分布地へ適用するように進めるべきだと考えるようになった。それは、自明のことながら、火山に近いところではテフラがより厚く、また枚数も多くしかもかなり連続して堆積しているからである。テフロクロロジーの一つの基礎は、テフラ単層が時面を示すところにあるのであるから、その面が明確に識別され、しかも刻みの間隔が細かいほど詳しい編年をする上に都合がよい。

このような考えのもとに、筆者はこの数年の間、富士、箱根のテフラが厚く、しかも海、河成層の発達の良い大磯丘陵での調査を中心に、次第に東方の諸地域（相模野、三浦半島、横浜〜川崎、武蔵野、房総）へ調査を広げてきた。その結果、上記の2つの問題を含めたこの地域の第四紀の諸問題について、従来とはかなり異なっていたいくつかの知見をうることができ、さらに新しい問題も生ずるに及んだ。今なお、新事実の発見や訂正、さらに問題の追加がつづいているため、まとまった報告を書く時期を見出しにくい。しかし、いわゆる下末吉期以降

については、多少整理されたと考えられるので、第1報、第2報では時代を主にこれに限って報告する。

第1報では上記の2問題を中心としてのべ、第2報では海水準変化を中心にした諸問題を扱う。つづいて地殻変動、台地、丘陵の開析度、下末吉期以前の第四紀の諸問題についても報告し、富士、箱根から南関東一円の地域での第四紀の多岐にわたる諸問題を、テフラを中心に総合的にとらえたいと考えている。

立ち入った議論を行なう前に、第1報、第2報でのべる主要な論点を列挙しておこう。

1) 箱根、富士の火山活動とテフラ 箱根古期外輪山にひきつづく新期外輪山の活動は、多量の軽石を噴出し、下末吉(吉沢)ローム中、下部層をもたらし、その後、軽石流の噴出期、中央火口丘の活動期に入ると、テフラをもたらし活動は次第に小規模となり、間歇的となった。一方、富士火山はあたかもそれを補うかのように活動し、下末吉(吉沢)ローム上部層、新期(武蔵野、立川)ローム層の主要部分をもたらし、

2) テフラ堆積の連続性と年代 テフラの堆積状態や、さいきん集まりつつある年代測定の資料などからみると、箱根、富士のテフラは1万年位の尺度ではかなり等速的に降下・堆積したと考えた方がよいように思われる。各ローム層の間で従来考えられたような大きな堆積間隙は考えにくい。また武蔵野、下末吉ロームなどの堆積年代については見通しが得られつつある。

3) 第四紀後期の海面変動史 この中で重要な意味をもつ下末吉面、下末吉層の分布、時代、内容が、いままでもよく知られていなかった関東南西部の地域で明らかとなった。さらに、小原台面と呼ばれる地形面が、下末吉面と武蔵野面との間にあって、その分布、構造がかなり明らかとなった。これは地形面の分布と堆積物の厚さからみて下末吉海進に匹敵しそうな、かなりの規模の海進の産物であり、第四紀後期の海面変動史の中で重要な意味をもつと考えられる。

4) テフラ中の埋没土の形成環境 地形面とその構成地層から高海面期と考えられる時期のテフラには、埋没土層のみられることが多い。これは気候～海面変化と火山活動および土壌生成作用との間に、興味ある関係の存在する可能性を示唆するものと考えられる。

この研究にあたって、筆者は多くの方々から御教示と御援助とを頂いた。貝塚栄平氏、菊地隆男氏をはじめとする都立大学地理学教室の方々には多くの助言と御協力をうけた。また小野正敏氏には旧石器について、鈴木正男氏にはフィッシュン・トラック法による年代測定につ

いて、宮崎明子氏にはC-14法による年代測定について、種々教えられた。小林国夫氏、袴田和夫氏ほか多くの第四紀研究者には現地で討論していただいた。また調査費の一部には65～69年度の科学研究費ならびに品川区史調査費をあてた。報告に際し、ここに記して感謝の意を表する次第である。

I. テフラの降下・堆積の連続性

南関東のテフラが新しいものから、立川、武蔵野、下末吉、多摩の4ローム層に区分されたのは、それぞれの堆積の間に大きな時間間隙が認められたからであった。それは 10^4 年ないし 10^5 年の桁の年数が推定されている(関東ローム研究グループ、1965)。その認定基準となった事実とは、テフラ間の不整合関係や、その間に段丘が形成されたこと、さらに埋没土の形成、テフラの岩相、鉱物組成の変化などであった(貝塚、1958)。

これらの事実は個々にとりあげるときには、必ずしも堆積間隙を指示しない。まず、テフラ間の不整合関係とは、かなりあいまいな言葉であって、ときにたんなる斜交関係を指す場合がある。テフラの斜交現象は、テフラを堆積させたのとはちがった営力の変化、とくに崖の後退などの地形変化で発現する。そこで、斜交関係が長期の堆積間隙を示すと認められる場合は、崖の後退などの地形変化が等速にすすむときに一定の層準のところでテフラの斜交がみられるといった場合や、著しい埋没土をはさむとか、あるいは上下のテフラの堆積年代が測定されてその間に大きな時間間隙のあることのわかった場合などに限られる。風成層の斜交現象を生む崖の後退は、浸食基準面の変化とか、気候・植生の変化などの条件に支配され、どこでも等速に行なわれるとは限らない。また斜交関係が同一層準でみられるか否かには、細かくみると問題がある。テフラの厚い相模野以西では、鍵層が多いので斜交関係のみられる層準を詳しくきめることができるが、それによると斜交する層準のちがうのはむしろ普通である。

また2グループのテフラの間に、テフラの降下がなく、海、河成の段丘が形成されるという考えも、段丘堆積物の中にテフラ起源の物質(AW型のテフラ、小林、1970)が多量に見出されることからみると、むしろ非現実的だといえよう。沖積層の下部に立川ローム相当のかんらん石が多量に認められたり(青木、柴崎、1966)、武蔵野礫層や下末吉層、さらに後述の小原台層にもスコリアや軽石がある。もっともAA型のテフラに比べ、AW型のテフラはよほど特徴的な鉱物組成をもっている

ものでないと同定しがたい。この点特徴のある Pm-I はしばしば海、河成層中に認められている（小林ほか、1968、皆川、1968）。

次に、埋没土の形成や岩相、岩質の変化も、気候、植生の変遷、さらに火山活動の変化、それにともなう堆積速度の変化などに支配されるので、必ずしも一義的に堆積間隙の時間の長さを反映するとは限らない。

ところで、最近えられた富士火山の現世の活動とテフラについての情報（町田、1964）は、この問題を考える上に一つの手がかりを与える。富士では、過去約 1 万年のうちで、前半のおよそ 4~5 千年の間は活動がきわめて静穏で、わずかに細粒のテフラがゆっくり堆積したが、再び活潑化した後半の 5~6 千年間の活動期に、粗粒のテフラが積もった。相模野以東での両層の堆積速度は、立川ロームのそれに比べると遅く、堆積に並行して腐植の集積が著しく行なわれて、両層とも顕著な黒ボク土をなすに至った。そしてこれらは丘陵地ではしばしば下位の地層をきって斜面にはい下って堆積している。したがってもし今後この上に新しいテフラが降下・堆積し、野外でその露頭をみる場合を考えると、そこには従前使われたような不整合、埋没土など、堆積間隙を示す諸事実が第一級の規模で見出されるにちがいない。もっとも、時代がちがうと、堆積間隙を示す諸特徴の保存度やその認定などは、同じようには扱えないかもしれない。しかし、現世の黒土から少なくとも推定できそうなことは、立川〜下末吉ロームの降灰の休止期ないし静穏期は、あったとすれば、現世でみられた長さ（10³ 年の桁）を越すような規模ではなかったということであろう。

富士東麓の、湯舟原から山中湖に至る地域には、連続的に堆積した厚さ 100m に及ぶ大量のスコリア互層がある。その中で唯一の顕著な埋没土層は前述の FB である。これをはさむ上下のテフラの間には、下位のテフラではほとんどみられない斜交関係がしばしば見出される。また、箱根の場合には、東麓にあたる大磯丘陵に、これまた連続的に堆積した莫大な軽石・スコリア互層がある（土沢ローム）。いずれも大成層火山の成長期のテフラであり、こうした堆積状態は、大火山の成長期にはマグマの活動の長期にわたる休止はほとんど起らなかったことを暗示する。

以上述べたように、筆者は、更新世中〜後期の関東南部では、西方の火山に由来するテフラの堆積が、従来の考えよりもはるかに継続的に行なわれたと考えている。そしてさらに、テフラの厚さ（地表からの深さ）と時間との関係が、1 万年刻みの大まかな年表で表わすと、か

なり直線的であったということを作業仮説として提示したい。いうまでもなく、この仮説はあくまでマクロなものであって、定量的な検討にたえられるか否かには問題がある。テフラの厚さとひと口にいっても、測定場所の火山との位置関係やその地形によってかなり異なるし、また下位のもののほど風化や圧密で薄くなるといった点も、問題の複雑なことを示す。しかし、後述のように、いままでにえられた若干の年代資料は、大局的には上の仮説を支持するようにみえる（図 10）。今後、テフラの年代測定の数が増すにつれてさらに検討されるにちがいない。

ところで、従来のテフラの層序区分については、筆者は多少改変した方が段丘をも、また火山の発達史をもより具合よく説明できると考えてはいる。しかし、従来の区分と名称の慣習を変えて用いると、無用な混乱をおこす恐れがあるのでここでは変更しない。各ローム層の具体的な内容を知り、個々のテフラで示される各時代の諸現象の意味を追究する方により大きな意義があるからである。従来の各ロームの境界（層）の意味は、時間の間隙を示すことよりも、後述のように、それらがある特定の気候・植生・土壌生成、さらに降灰（火山活動）などの諸条件の総合的な指標になりそうだという点に重要性があると考えられる。

II. テフラ層序のあらまし

大磯丘陵は、箱根火山の東北東約 20km、富士火山の東約 40km の位置にあるところから、これらの火山に由来する多量のテフラにおおわれている。東京、横浜など従来の南関東の標準地域に分布するテフラで、これらの火山起源のものは必ずこの丘陵に分布するといえる。しかもここでは海・河成層にも恵まれている。こうした点から、この報文では大磯丘陵でのテフラの層序を南関東のその基礎とする。

丘陵の東部、平塚市旧土沢村一帯の地質調査によると、早田砂層と呼ばれる厚い海成砂の上に、合計 120m もの厚さのテフラがある（図 1）。なお丘陵西部ではさらにこれより下位に数十 m もの厚さのテフラがあるが、詳論は別の機会にゆずる。この報文で対象とするのは、図 1 の上部をなす厚さ約 60m の、吉沢ローム層と新期ローム層（町田・森山、1968）とである。

吉沢ローム層は、町田・森山（1968）の調査当時は、ほぼ下末吉ローム層に対比されるが、その下限については少しずれる可能性があると考えていた。しかし、その後の調査によって、吉沢ロームは大磯丘陵より東方の高

座丘陵、座間丘陵、多摩丘陵南部、下末吉台地、下総台地などにひろく分布し、模式地の下末吉ローム層と全く同一の地層であることがわかった。大磯丘陵の吉沢ロームと下末吉台地の下末吉ロームとは岩相がかなり異なり、一見しただけでは対比は難しい。それは、下末吉地域が吉沢一下末吉ロームの分布軸からやや北にずれた位置にあるため、そこでは必ずしもすべてのテフラが堆積していないからである。分布軸にあたる横浜戸塚～保土が谷付近と大磯丘陵の吉沢ロームとを比べると、図4のように鍵層はすべて一致する。なお、この報文で同一層である吉沢～下末吉ロームについて、両層名とも用いるのは、模式となる2地域で岩相がかなり異なるからである。便宜上、分布の主軸にあたる地域（大磯丘陵～横浜）では「吉沢」を、分布の周縁域（下末吉、下総台地など）および代表地層名としては、「下末吉」を使うことにする。

新期ローム層は、町田・森山(1968)ののべたように、従来の武蔵野・立川ローム層である。

下末吉および新期ロームの等厚線図(図2)によると、それぞれの分布軸は、前者は箱根から東北東にのび、後者は富士から同方向にのび、主たる給源火山が異なることがわかる。またその量はほとんど同じである。

吉沢ローム中・下部の主体をなす両輝石安山岩質の軽石層は、後述のように区別できるものだけで20数枚にのぼり、それぞれ特色のある降下物である。すべて箱根方向に厚さを増す。こうした分布や岩質の類似性からみても箱根の噴出物であることは明らかで、その発達史(久野, 1950)と対比すると、ほぼ新期外輪山の噴出物と考えられる。この上位で、新期ローム下部までに富士

Fig. 1 Typical columnar section of the tephra in the Ooiso hill, with reference to the volcanic history and the marine terrace surfaces.

T; Tama or Tsuchizawa loam (tephra), K; Kissa-wa or Shimosueyoshi loam, K₁; Lower Kissawa loam, K_m; Middle Kissawa loam, K_u; Upper Kissawa loam, Y; Younger loam, M; Musashino loam, Tc; Tachikawa loam.

OS; Older Somma stage of Mt. Hakone volcano, YS; Younger Somma stage, P; Pumice flow stage, CC; Central Cone stage, OF; Older Fuji stage, YF; Younger Fuji stage.

So; Sôda surface, Ku; Kuroiwa surface, S; Shimo-sueyoshi or Kissawa surface, O; Obaradai surface, M; Misaki or Musashino surface, Tc; Tachi-kawa surface, A; Alluvial surface.

For legend see Fig. 4.

Fig. 2 Thickness contour map of the Shimosueyoshi or Kissawa loam and the Younger loam.
thickness in meter
S; Shimosueyoshi loam, Y; Younger loam (Musashino and Tachikawa loam)
1~16; localities of columnar sections in Fig. 4.
K; Kissawa (吉沢). S; Shimosueyoshi (下末吉)

系のスコリア質テフラに挟まれてみられる諸降下軽石層は、後述のように多くの場合軽石流を伴うところから、軽石流期といえる活動期の噴出物である。

下末吉(吉沢)ローム上部層以上にとくに新期ロームで発達するスコリア質テフラは、大磯丘陵と桂川とはさまれる地域で厚くかつ枚数も多い。そしてかんらん石玄武岩質のものが卓越することや、富士東麓に存在する厚いスコリア互層を考えにいと、古期富士活動期(町田, 1964)の噴出物として一括できよう。それらには鍵層として役立つ顕著なものが少ない。箱根の中央火口丘軽石層も主に武蔵野ローム中にはさまれるが、量が僅かでしかも分布がせまく、よい鍵層となりにくい。後述のように、立川ロームや武蔵野ローム上部では埋没土層が鍵層となる。

III. 各ロームの境界層

関東ローム研究グループにより設定された各ローム層の上下限、境界層がどんな意味をもつかの問題を検討する。

(1) 多摩・下末吉ロームの境界

関東ローム研究グループ(1956, 1965)は、下末吉台地で下末吉層に整合に重なるテフラを下末吉ロームの下限とした。これは風化した白色軽石からなると報告されている(貝塚, 1958, 羽鳥・寿円, 1958, 関東第四紀研

究会, 1970)。一方、多摩丘陵東部のT₂面分布地では、多摩ロームを不整合におおい、埋没土層を隔ててのる数枚の軽石が下末吉ロームの下部層と考えられた(鶴見・大村, 1966)。

多摩丘陵東半部でこの境界付近をよく観察すると、多摩ロームをきって埋没斜面をはい下りるテフラは、厚さ0.5~1m、黒褐色で乾くとクラックにとむ粘土質層で、ときに泥炭をまじえる。川地の分析では、他の埋没土層に比べて粘土含量が多いこと、植物珪酸体も少なくないという結果がえられている(図9)ので、かつての土壌と考えられる。野外での愛称はクロカゲ、この報文では下末吉埋没土層(SB)と呼ぶ。その上位にの

る軽石は、下末吉層に整合に重なる三色アイスと愛称される軽石群にあたる。

多摩丘陵の多くの露頭で注目されるのは、SBと上位の軽石層とは平行し、連続的であるのに、下位の多摩ローム層とは斜交し不連続的であることである。つまりこの埋没土は多摩ローム最上部を母材として形成されたものではない。そこでこれを多摩、下末吉両ローム層間の独立した境界層として扱う。

SBは多摩丘陵以外では、横浜南西部の丘陵地や座間丘陵などに発達し、西ほど厚さが次第に増して顕著な埋没土断面をなす。さらに大磯丘陵では、図1のように吉沢、土沢両ローム(町田・森山, 1968, 町田, 1968)の境界に、厚さ約2.5mの暗褐色で比較的細粒の、かつ層理の不明瞭なテフラがみられる。層序、岩相からSBに対比できる。これは上下のテフラが火山の爆発的活動期の産物であるのに対して、活動の比較的穏やかな時期の堆積物と考えられる。そしてときに二次的のテフラや非火山性物質が混入する。

SBは上位のローム中の諸埋没土層に比べ、もっとも発達のよいもの(色、厚さ、分布範囲など)で、現世の黒土層に次ぐ顕著な埋没土層といえよう。

(2) 下末吉・武蔵野ロームの境界

これは模式地の武蔵野で、東京軽石の下約1m弱にあるチョコレート色クラック帯の上限にひかれていた。

三浦軽石の分布する範囲ではその20~30cmほど下位にあたる。こうした定義からすると、チョコレート・クラック帯は下末吉ロームの最上部の埋没土と考えられるが、それはいわゆる武蔵野礫層の直上にも存在するし、またクラック帯の上限が不明瞭なこともあり、小林他(1968)の指摘のようにかなり連続的とみられるので、ここではクラック帯をSBと同様のセンスで下末吉・武蔵野両ロームの境界層、武蔵野埋没土層MBとして扱いたい。

MBの明瞭にみられるのは主に多摩丘陵以東の地域で、とくに斜面では非火山性物質を混入して顕著に発達する。平坦な台地上では不明瞭なことが多い。多摩丘陵以西の諸地域では、クラックも斜交関係も稀になり、この層準付近のテフラは連続的に堆積したようにみえる。後述のように、相模野南部以西ではこのクラック帯の部分に数枚の軽石、スコリアがみられる。したがってこうした地域で両ロームの境界を判定するのは難しいが、だいたい後述のAP層準付近と考えられる(図1)。

なおMBと同様な埋没土性のテフラは、下末吉ローム中に小原台面のおかれる層準にも、また吉沢中、下部ロームの境界にもみられる(図1)。

(3) 武蔵野・立川ロームの境界

立川ローム層は、模式地の武蔵野南部で、地表から3~4mの深さにあるクラック帯上限によって下位の武蔵野ローム層と分けられる。また相模野では、堆積状態がかなり連続的なため区別しがたいが、戸谷(1961)は相模野上位(第1)スコリアの下1m内外のところに境をおいた。

相模野でこの部分を詳しく観察すると、すでに貝塚、森山(1969)が記した“波状”と呼ばれる擾乱帯が認められる。これは図3のように、下部は乾くとクラックの入る細粒の暗褐色スコリア・ローム、上部は粗粒の暗褐色のスコリア・ロームで、両者が互いに波頭状をなして混り合う。これは小野正敏により発見されたが、その後多摩丘陵や武蔵野台地、下末吉台地など各地で見出され、従来の立川、武蔵野両ロームの境界相であることがわかった。

この種の擾乱は、注意深く観察すると、これより上位にも下位にも認められる。しかしその連続性や規模は、これがもっとも良好でかつ大きい。その成因は、今後十分検討する必要があるが、層位・編年上、ウルム氷期の最盛期にさしかかる層準であるところから、一種のinvolutionの可能性があると考えられる。

ほぼこの波状境界以上のテフラをのせる段丘は、田名

Fig. 3 Cross section of the upper Younger loam and the undulatory boundary between the Tachikawa (Tc) and the Musashino loam (M).

原段丘群の原当麻面や多摩川沿いの立川段丘群の一部であるが、必ずしも広くはない。また斜交関係については、この境界が確実に斜交することがわかった露頭よりも、後述の立川ローム第2埋没土層や武蔵野ローム、第4埋没土層の層準で斜交する露頭の方が多い。これらは波状部に比較的近接した層準であるので、厳密な斜交関係の層準は、テフラの厚い地域でないとおさえにくい。

これらの事実は、この境界が堆積の間隙を指示するという従来の考えを、むしろ否定する材料といえる。

(4) 立川ロームと黒土との境界

テフラの色が褐色ないし赤褐色から黒褐色になるところ——粗粒から細粒になるところ——を境界とすると、それは漸移的で、5~10cmの幅がある。色の変化が腐植含量のちがいに基づくことは明らかで、おそらく1000年位のうちに急に腐植の集積量が増したらしい。こうした変化は、腐植の供給量の急増をもたらした植生の条件によっても説明できるが、他方、富士の火山活動が静穏期を迎え、降下するテフラが細粒に変わったこと、さらに堆積速度が著しく遅くなったこと(町田, 1964, 1968)などの条件もきわめて重要である。

IV. 諸層準指示層の層序と火山活動との関係

図1のように吉沢(下末吉)ローム以上のテフラには、数多くの層準指示層がある。それらは箱根起源の諸軽石層と富士起源の若干のスコリア層、さらに若干の埋没土層である。ここでは中でもよい鍵層となる諸軽石層を、箱根の火山発達史との関係を中心に記載する。

表 1 吉沢ローーム下部諸軽石層 (K₁P) の特徴

従来の名称 (1)	(2)	色	厚さ cm	最大 粒徑 cm	層化	分級	発泡	石質岩 片の量	分布が広く 鍵層として重要なもの	重鉱物組成 fraction 115~250	その他の
ビンクバミ ス (PP)	SP ₃	yel	5	3	m	w~m	w~m	r		Mg>Hyp>Au>Ol	下部の ash 著しい。分布 は Fig. 5.
		yel	40~	2	f→c	w	w~m	p		Mg≧Hyp>Au≫Ol, He	
		gy~p	100~	5	f→c	w~m	w~m	m~r	○	Mg>Hyp>Au≫Ol	
		yel~p	70	2	f→c	w~m	m	p~r		Mg>Hyp>Au>Ol	
		gy~yel	70	3	m	w~m	m	m		Mg≧Hyp>Au>Ol	
		yel	50	3	m	w~m	w	m~p		Mg>Hyp>Au	
		p など	30	10	m	w	w	r	○	Mg>Hyp>Au≫Ol	
		gy	100~	4	f→c	w	w	r~m	○	Hyp>Mg>Au	
		wh~yel	110~	6	f→c 反覆	w~m	w	r~m	○	Mg>Hyp>Au	
		wh~yel	60	8	c→f→c	w~m	w	m→r	○	Mg>Hyp>Au>Ol	
(1) 町田・森山 (1968) と野 外での愛称 (2) 関東第四紀研 究会 (1970) の呼称		wh~gy	15	0.2	m	w	p	p		{ Horn≫Mg≫Hyp=Ol Hyp= Mg>Au≫Ol Mg>Hyp>Au≫Ol Hyp>Mg>Au	岩質に特色あり，野外で ゴマシオ的。
		bk~gy など	15	1	c→f	w	p	p			
		br~bk など	35	2	f→c→f	p	w	r			
		yel	25	1	c→f	w	m	p			
		yel	20	1	m	m	m	p			
		yel : 黄色 gy : 灰色 p : 桃色 wh : 白色 bk : 黒色 br : 茶色 or : 橙色	m : massive f : fine c : coarse → : 左側が下 位	m : well m : moderate p : poor

Fig. 5. Thickness contour map of the lower Kissawa loam (K_1), the middle Kissawa loam (K_m) and the remarkable key beds (K_1P-13 and K_mP-7). thickness in meter

吉沢ロームは、町田・森山 (1968) によると、下から I, II, III の 3 部層にわけられ、さらにすでに名称のつけられた軽石層もある。この報文では、記載を簡略化するため、下部層 (K_1)、中部層 (K_m)、上部層 (K_u) とし、さらに下・中部層の各層には軽石の場合 P、スコリアの場合 S、風化テフラ (いわゆるローム) の場合 L、埋没土の場合 B をつけ、下位から番号をつけて呼ぶことにしたい (例: K_1P-1)。なお風化テフラや埋没土などの中間層の場合には、番号は 1/2 などとする。また K_u と新期ローム層については、すでに親しまれた名称のある軽石、スコリアが多いので、なるべく従来の名称を用いる。

(1) 吉沢ローム下部層

大磯丘陵では、図 4-1 のように、15 枚の軽石層が主体をなす。このほかにうすい軽石、スコリア層があるが分布が断片的なため省く。なおここでいう 1 枚の軽石 (単層) は、1 噴火輪回で連続的に降下・堆積したいくつかの fall unit の合したもので、多少の堆積間隙 ($10^2 \sim 10^3$ 年) を示す風化土層で上下を限られるものを指す。

一般的に、下位の土沢ローム層がスコリア層やその風化物、さらに厚い軽石層などと岩相が著しく変化するのに対し、 K_1 は厚さ、岩相とも類似した軽石の互層であり、野外で比較的容易に識別できる。

表 1 には $K_1P-1 \sim 15$ の主な特徴を記す。また図 4 は各地のテフラ柱状図である。

K_1P は、図 5 のように箱根から大磯丘陵南部をへて横

浜にいたる NEE 方向に、分布の主軸がある。これより北や南に行くと一般に急にうすくなるが、15 枚の軽石のうちとくに $K_1P-7, 8, 13$ の 3 枚は、分布軸がやや北偏するようで、座間丘陵中部、多摩丘陵、下末吉台地などでもよく識別され、下末吉ロームや下末吉面の同定に役立つ。

この 3 枚の軽石はいずれも特徴があるが、中でも K_1P-8 はその直上に K_1P のうちもっとも特色のある K_1P-9 (非常に粗粒のピンク色軽石、石質岩片も多い) がのるので、両者組み合わせでよい鍵層となる。また K_1P-13 は K_1P-12 とやや厚い

風化テフラ (埋没土) で隔てられることや、下部に青灰色の火山灰を伴うこと、ピンク色の粗粒軽石を多量に含むことなどで K_1P-8 につく鍵層である。とくに分布が広い点有利で、おし沼以北の多摩丘陵や所沢台などでは、 K_1P-13 と K_1P-7 とが認められるだけで、他は尖滅している。

下末吉台地の下末吉層や下総台地の成田層に整合に重なる軽石は、粘土化のすすんだ、青～橙～黄～灰などの雑色の軽石層で、三色アイス軽石層と呼ばれた (小林・清水・北沢, 1968)。これは模式地である梶山や大倉山の露頭で注意してみると、いくつかの軽石単層の合したもので、 $K_1P-8, 9, 13$ などが識別できる (図 4-11)。下末吉台地でも南部の構浜市街地、三ッ沢、堀の内などでは、図 4-10 のように、明瞭に各軽石層が区別できる。関東第四紀研究会 (1970) が命名した $SP_1 \sim SP_8$ の諸軽石は、表 1 に示したように $K_1P-6 \sim K_1P-13$ にあたる。 SP_1 は下末吉ローム層最下部と考えられたが、陸化の早いところではこの下位に 5 枚の軽石が風成層として存在する。陸化の遅いところではそれらは下末吉 (吉沢) 層最上部に夾在することが多い。

こうした K_1P の細かい観察をつうじてみると、下末吉 (吉沢) 面の陸化の時期にはかなり幅があって、旧汀線付近で最も早く、海側に向かって次第におくれることがよくわかる。図 1 に概略示したように、陸化の時期は K_1P-1 直下から K_1P-13 直下にまでおよぶが、その中で $K_1P-6, 7$ 位の時期に陸化した地域が比較的広い。この

ころ海退は急激にすすんだのかもしれない。

K₁P の各軽石の重鉱物組成は、表1のように K₁P-4を除いてよく似ており、いずれも紫蘇輝石の多い両輝石安山岩質である。このことと粗粒物の多いこと、分布状態などを合わせてみると、K₁P のほとんどすべては箱根起源であると考えられる。

K₁ 部層のうち軽石以外のテフラは、①下位の軽石の風化土層、②小規模な火山灰降下や風塵などの反覆でよくゆっくりと堆積したテフラの風化物、といった起源が考えられる。無層理の風化テフラの厚い部分は、かんらん石をかなり含むこと、軽石やスコリアの集積帯に移行する場合のあることなどの点からみて、②の起源が多いと考えられる。とくに K₁P-5, 6, 7, 8 の上下付近や K₁P-12/13 など中間層の厚い部分は、富士系のテフラの混入が考えられ、かつ上下の鍵層の堆積間隙は 10³ 年のオーダーに及んだものと考えられる。

(2) 吉沢・ローム中部層

K₁ 部層の最上部はスコリアにとむ暗褐色風化テフラで、粘土含量も高く埋没土層と考えられる。この上に、ときに斜交関係をもって重なる、大磯丘陵で厚さ総計 12~13m の、厚い灰白色軽石ではじまる 12 枚の軽石互層が中部層 (K_m) である。K₁ と K_m との斜交関係は、大磯丘陵東部の平塚市土沢中学校の西、横浜市戸塚区矢沢の横沢新道西側の崖面などの露頭で、とくに顕著で、ともに K_m は K₁ および吉沢、下末吉層 (砂層) を切った谷の斜面にはいり下りている。K_mP-1 の降下時にはすでに相当谷が穿たれていたことがわかる (図 6A, B)。このことは第2報でのべるように、吉沢一下末吉面形成後小原台面形成前の間に浸食基準面 (海面) がかなり低下したことを示唆し、海面変動史の上で注目値する事実である。

K_mP は、一般に K₁P より厚いものが多いこと、岩相がいずれも類似することなどの特徴をもつ (表2)。12 枚の軽石の中でも顕著なものは、K_m-1, 5, 6, 7 の4枚で、町田・森山 (1968) は吉沢 A, B, C, D 軽石と呼んでいた。大磯丘陵から NEE の方向 (戸塚方向) の地域では、1 枚づつよく追跡されるが、これより少し北へずれると急にうすくなり、尖滅するものが増える。この傾向は K₁P よりも一層著しい (図5)。南への分布は海と山地などに阻げられて定かではない。

K_mP のうち、K_mP-7 は比較的東北方向の地域に広く分布する。下末吉台地ではこの K_mP-7 とその直下にごく薄い K_mP-6 がみられる。この2枚は厚薄の対照が著しい特色があるので、親子軽石層と呼ばれている。K_mP-

A: east of Tsuchizawa junior high school in the Oiso hills

B: Yazawa, Totsuka-ku, Yokohama; east slope facing the new Yokohama high-way.

Fig. 6. Cross sections showing the erosion stage between K₁P and K_mP as well as K_mP-4 and K_mP-5.

K(S)F; Kissawa and Shimosueyoshi Formation

1は大磯丘陵ではもっとも厚い軽石であるが、横浜北部ではごく薄くなって、K_mP-5 などとともにパッチ状にしか認められない。なお、K_mP-7 は多摩丘陵中部以北では不明瞭となる。K_mP-1~12 を関東第四紀研究会 (1970) の報告した SP グループに対比させると、表2に示したように、K_mP-1 は SP₉ に、K_mP-6 は SP₁₀ に、K_mP-7 は SP₁₁ にそれぞれあたる。戸塚付近以西では大磯丘陵とよく似ており、K_mP の大部分が保存されているが、それより東、東北の地域では尖滅するものが多くなる。

小林ら (1968) の御岳第1浮石層、Pm-I は、関東南西部ではごく断片的にしか分布しない。三浦半島、大磯丘陵、下末吉台地の一部などでこれの断続的な薄層をとくに見出すことがある。より北方の座間丘陵北部、八王子付近、桂川沿いなどで発達のよいものと比べてみると、層序、岩相はまったく一致する。そのおかれる層準は、K_mP-12 の 30~40cm 上方 (大磯丘陵) で、K_mP とまったく平行し、その間に大きな堆積の間隙はみられない。後述のように、Pm-I は小原台層最上部の鍵層としても見出され、海面変動史上重要な鍵層の一つである。

表 2 吉沢ローム中部諸軽石層 (K_mP) の特徴

従来の名称 (1)	従来の名称 (2)	色	大 礫 厚さ	最大 粒径 cm	中部での肉眼的特徴	軽石の量	重 鉱 物 組 成	そ の 他
Pm-I	Pm-I ⁽³⁾ SP ₁₃	wh	5	0.2	m	p	Mg>Horn>Hyp=Zir (Biot 含む)	Tc(Curie Temperature): 450°C. 色, 粒度, 鉱物に特色あり.
K _m P-12		wh~gy	40	0.5	c→f	m~p		
11		wh~yel	100	2	c→f	p	Mg>Hyp=Au	
10		wh~yel	50	1	m	m~p	Mg>Hyp>Au>Hon	
9		wh~yel	70	4	m	p→r	Hyp>Mg>Au>Horn	
8		wh~br	20	2	m	m~p		Tc=295. 分布は Fig. 5, Fs: 40~37.
7	K-Dp	gy~wh	130~100	4~5	f→c→f	w	Mg=Hyp>Au>Horn	Fs: 40%.
6	SP ₁₁	wh~gy	150~100	4~5	m	p→m	Hyp>Mg>Au>Ol	Fs: 39%.
5	K-Cp	wh~gy	140~100	4	m	p	Hyp>Mg>Au>Ol	
4	K-Bp	wh~gy	10	0.5	m	p	Hyp>Mg>Au>Ol	
3		yel	20	4	f→c→f	p	Hyp>Mg>Au>Ol	
2		or~bk	50	3	m	w	Au>Mg>Hyp>Ol=He	Fs: 43%.
1	K-Ap	wh~gy	200~270	5	m	p	Hyp>Mg>Au>Horn	Fs は新井 (1970) による
(3) 小林他 (1968)		記号は表 1 参照				—: unmeasured		

K_mP の降下堆積は, その間に埋没土層や風化テフラをあまり挟まないで, かなり連続的であったらしい。ただ K_mB-4/5 の中間層には, かんらん石にとむ火山灰があり, また平塚市出縄などではうすい礫層が入ったり, 異質物にとむ黒褐色埋没土が発達すること, 斜交関係がみられること (図 6-B) などからみて, ここに K_mでは最大の堆積間隙を認めることができる。

Pm-I の上位はほぼ連続的にスコリアにとむテフラに変わる。かんらん石は, 新期ロームにおけると同程度多量に含まれ, 富士の活動の影響が暗示される。K_m 部層との間に堆積間隙はあまり認められないが, 岩相が著しく異なるため, このテフラは K_n に入れる。

(3) 吉沢ローム中・下部層の給源火山

K_n のうち最下位にある顕著な軽石は, 後述の小原台軽石 (OP) である。これは箱根火山の新期外輪山 (YS) 以後の軽石流をとまなうもののうち最古期の降下軽石である。しかも箱根芦の湯の国道沿いの露頭では, 久野 (1950) の新期外輪山溶岩 (YS₃) をおおうテフラのうち最下位のものでもある。このような YS との層位関係からみると, OP の下位にくる K_mP は YS 活動期の噴出物と考えられる。町田・森山 (1968) は, 吉沢ローム下部の軽石群が土沢ロームから連続的につづくもので, 古期外輪山 (OS) の噴出物と推定したが, 前述のように下末吉埋没土層の存在, 土沢ロームと吉沢ロームとの岩相の相違などからみると, 確定的ではないが, K₁P も YS の噴出物と考えた方がよさそうである。

久野 (1952) は, YS の噴出物には火砕物の割合が小さいと記しているが, 記載によるとその初期には比較的多量の軽石を噴出したらしい。すなわち, 畑宿西方に最大 50m の厚さの白色軽石層が YS₁ と YS₃ との間に介在し, 屏風山南東斜面では同じ厚さの軽石質の凝灰角礫岩が YS₁ と OS との間にあるという。現在一般に露出が悪く十分に確かめることができないが, 箱根新道の黒岩橋周辺にみられる厚い白色の降下軽石は, 岩相上 K₁P や K_mP の軽石群と似ている。また久野によって採集された YS₁ の黒曜石のフィッシュン・トラック年代は, 12 万~13 万年前と測られた (鈴木, 1970)。後述のように, K₁P の噴出年代は, この値を含む範囲にあると考えられる。

K₁P と K_mP との間や K_mP の中にも堆積の間隙期は多少あると考えられ, また岩質もやや変化している。それがどのような火山の発達と関係するかは, 今後の課題である。また軽石以外のテフラの給源火山については, 十分に議論できる資料をもたない。粒度, 岩質, 厚

さの変化などから、箱根以外のより遠方の火山を考慮する必要がある。

(4) 吉沢ローム上部および新期ローム下部の諸軽石層

これは下末吉ローム上部と武蔵野ローム下部にあたるが、両者を一括したのは、中に含まれる箱根の降下軽石が主に“軽石流噴出期”のものであるからである。

この部分のテフラは、全体的にはかんらん石玄武岩質のスコリアに富むが、その中には図4-2のように、OP, YP, AP, MP, TP, SPの6枚の降下軽石が認められる。その中のMP, TPは、すでに有能な鍵層として著名であるが、その他のものにも編年上重要な役割を果たすものがある。表3にそれらの主な特徴を記す。

小原台軽石 (OP) 大磯丘陵では、Pm-I ないし Kmp-12 の上位に、約4~5mの褐色スコリアにとむテフラを隔てて、白色の粗粒軽石がある。これは町田・森山 (1968) が白パミス (WP) と記したものである。その後、この軽石については、分布、厚さ、層序、岩相、強磁性鉱物のキュリー温度などの調査がすすみ、層位の点でもまた火山活動史の上でも、重要な意味のあるものであることがわかった。その結果、従来各地で次のような種々の名称で呼ばれたものが実は同一層であり、南関東にかなり広く分布することが明らかとなった。三浦半島の小原台浮石 (走水グループ, 1965), 高座丘陵の藤沢軽石 (関東ローム研究グループ, 1965) および下末吉台地のクリョウカン軽石 (小林ほか, 1968) などがこれである。統一名称としては、分布軸に近く、しかも地形面との関係で標式となりうるところに基づき、小原台軽石 (OP) を用いる。

その分布は東京軽石より南に偏り、かつ細長く、三浦半島から房総北部へのびる (図7)。

OP は多くの降下軽石と同様、いくつかの fall unit からなる。とくに最上部はきわめて粗粒 (相模野で径2, 3 cm) の軽石粒が褐色火山灰中に点在する、いわば栗ようかん的な産状を示す。この部分の分布は OP 本体のそれとやや異なり、箱根からNE方向へ広がる。下末吉台地のみならず、座間や多摩丘陵の北部、武蔵野台地などの OP がこのような産状をもつ。

OP の容積は図7に基づいて試算すると、およそ7.8 km³ (厚さ1cm以上) である。箱根火山の後期の噴出物としては TP の8.4km³ に次ぐ著大なものである。

OP の層位的な意味は、Pm-I とともに小原台面と呼ばれる海成面の層準に近いところにある。

また火山発達史の点からは、前記のように軽石流をと

表3 吉沢ローム上部以上の諸軽石層の特徴

従来 の 名 称	大磯丘陵中部での肉眼的特徴	厚さ cm	最大 粒 径 cm	色	分級	発泡	石質岩 片の量	鍵層として重要なもの	組成
マユガ(4) チョコビヒガ(4)	大磯丘陵にはほとんど分布しない。	20	2	yel~or	f→m	w	p~m	○	Hyp>Au>Mg Hyp>Mg>Au
青ヒガ(4)		10	1	yel~or	m	w	m	○	Mg>Hyp>Au Hyp>Au>Mg
三色旗(4)		200~100	7	gy~wh	f→c→f →c	w	m	○	Hyp>Mg>Au Hyp>Au>Mg
東京パミス		30	1	yel~bk	上部成層	w	r	○	Hyp>Au>Mg Mg>Hyp>Au
三浦パミス		10	1	yel	m	w	p	○	Hyp>Mg>Au>Ol
安針パミス		30	1	or→bl	c→f	w	p	○	Mg>Hyp>Au>Horn
吉園パミス (小原台パミス, SP ₁₄ ⁽²⁾) WP(4) 藤沢パミス(3) くりによりかん(3)		30	4	wh	f→c→f →c	m~w	r	○	Tc=325°~335° (2相) Tc=350°~360°, Fs: 38% (上部), 36% (中部), 37% (下部) Tc=325°, Fs: 39~40% Tc=300° Tc=430°, 525° Tc=310°~320° Fs: 44% (Fs rich)
CCP-4									
CCP-3									
CCP-2									
CCP-1									
SP									
TP									
MP									
AP									
YP									
OP									

(4) 関東ローム研究グループ (1958)

(5) 関東ローム研究グループ (1965)

Fig. 7. Thickness contour map of the remarkable pumice layers in the upper Kissawa and the lower Musashino loam (OP; Obaradai pumice, MP; Miura pumice, TP; Tokyo pumice), and the distribution of the pumice flow erupted immediately after the TP. thickness in meter

もなう降下軽石のうち初期のものである。この軽石流は小田原北部の星山や岩原で観察されるが、多くの場合、より新しい軽石流におおわれるため、その分布はごく断片的にしかわかっていない。少なくともこれは大磯丘陵には到達しなかったらしい。

吉岡軽石 (YP) 相模野中部の綾瀬町吉岡、目久尻川左岸の露頭を模式とし、相模野礫層の直上にある薄い軽石層について名付けられる。相模野では OP の上位約 1.5m にあって、発泡の悪い橙色ないし青色軽石粒の集積層である。その分布は富士東麓湯舟原、山北、さらに小田原から相模野のほぼ全域、そして多摩丘陵南東部におよぶ。下末吉台地でも OP と MP との間に認められる。両輝石安山岩質であるがその起源や火山活動との関係はよくわかっていない。層位的には、第 2 報で述べるように、相模野面の平均的な層準に位置する点が重要である。

安針軽石 (AP) 相模野南部で、YP の上位 1~1.7 m, MP の下位約 0.6m にある、きれいな白色軽石層である。量は MP より少なく、小田原から横浜戸塚、座間丘陵、尼寺原で囲まれる範囲に分布し、箱根起源である。これの上下の部分はクラックが目立ち、また暗色を呈することが多いので、埋没土層 MB に対比される層準と考えられる。

三浦軽石 (MP) AP と TP とのほぼ中央にはさまれる、黄～橙色の軽石層である。関東ローム研究グループ (1965) は、分布軸が TP のそれより南偏し、三浦半島では TP より厚くなるとして、この名をつけたが、層序、岩相、分布の調査の結果、三浦半島で MP と考えられたものは TP で、従来 TP とされたものは、TP の上位にくる後述の SP (三色旗軽石) ないし CCP-1 (青ヒゲ軽石) であることがわかった。したがってこの軽石は名称のよりどころを失なうわけだが、混乱をさけるため、従来どおりの名称を用いた。

図 8 のように、その分布は従来の知見よりせまくなった。

MP の層位的な意味は TP と

ともに新期 (武蔵野) ロームの下部の層準を示すところにある。またこれにはその直後に噴出した軽石流がともなう。それは小田原北部星山でみられる。

東京軽石 (TP) とその直後に噴出した軽石流 TP についての層位上の新しい知見は、三浦半島での上述の MP などとの認定問題のほか、とくに目新しいものはない。しかし、町田・森山 (1968) が明らかにした TP にともなう軽石流については次のようなことがわかってきた。

1) 箱根火山の東側の地域では、現在の相模川を越して相模野中部に帯状に流れ、さらに多摩丘陵を刻む帷川や柏尾川の上流にも流入し、横浜西部に達した (図 7)。横浜でもっとも明瞭な軽石流の認められるところは、戸塚区上柏尾、国道 1 号の東側の低い段丘上である。

2) 箱根の西南麓から狩野川中流大仁、愛鷹南麓にかけて広く分布する軽石流も TP 直上のものと考えられていた (町田, 1968, 愛鷹ローム研究グループ, 1969)。その源に近い箱根峠～三島間では、軽石流直下に薄い降下軽石が存在し、鉱物組成、キュリー温度などから TP と対比された (袴田, 1970) ため、上の対比が裏づけられた。

3) 相模野東部、小田急線中央林間駅付近に砂丘状の

高まりがあることは、戸谷 (1961) により指摘されている。これは、細粒の軽石と重鉱物とが縞状のきれいな細互層をなす、風成と思われるものからなる。そしてその直下に TP 本体がある。この堆積物と高まりは、TP と軽石流の堆積直後、裸地となった地表でつくられた砂丘性のものと考えられる。これと似た、しかし薄い堆積物は相模野～横浜の、軽石流分布地の周辺にしばしばみられる。

三色旗軽石 (SP) TP またはその 軽石流の上位約 1 m (相模野南部) にある降下軽石は、色の特徴から三色旗パミスと命名されたもの (関東ローム 研究グループ, 1958) にあたる. 相模野南部では粗粒軽石の散点層であるが, 三浦半島中, 南部で厚さを増す. 図 8 のように, 箱根からほぼ真東に飛散したと考えられる.

SP の上位にも、後述の CCP 群があるが、SP をこれらと別にして OP~TP 群にまとめたのは、鉱物組成や堆積状態による。SP の輝石の組成比 (Hyp./Hyp.+Aug.) の上下の変化は、CCP-I 以上の軽石のそれと異なる (袴田, 1970)。また SP は新期のカルデラ内には分布しないようで、かつ外輪山の斜面では SP と CCP-I との間に斜交関係が認められることがある。これらの点や層序からみると、久野 (1952) の「酸性火山礫凝灰岩」が SP にあたると判断される。

(5) 箱根火山の新期軽石流

箱根の軽石流は、久野 (1950) により新期外輪山 (YS) の直後、中央火口丘 (CC) の活動前に噴出したとされ、かつ岩質上も両噴出物の中間的な性質をもつと指摘された。そして町田・森山 (1968) は TP に伴なわれるものが久野の軽石流 (P) に相当するとし、新期軽石流と名づけた。ところが、前述のように、OP, MP にも軽石流が伴われたことが明らかとなり、整理して記載することが必要となった。これら 3 層準の軽石流は、YS 以後の噴出物で、しかもそれほど大きくない時間 (後述のフィッシュン・トラック年代では最大 2 万年位の間) に噴出したと考えられる。そこで、改めてこれらをまとめて新期軽石流とし、区別するときには P_Y-O , P_Y-M , P_Y-T 、と記号化して呼びたい。すなわち、箱根の火山発達史の中で YS と CC との間に軽石流の噴出で特色づけられる独立の活動期 (新期軽石流期, P_Y) を設定する。なおここで新期と呼んだのは、大磯丘陵の土沢ローム中に介在する「古期」の軽石流 (おそらく箱根古期外輪山の活動期) に対してである。また $P_Y-O \sim P_Y-T$ の中で、もっとも多量で広域に分布するのは、 P_Y-T である。

箱根の第2期カルデラ形成がこれら軽石流の噴出に関

係することは確かだが、その詳しい時期はよくわからない。SP がカルデラ内に認められないので、その直後かとも考えられる。しかし OP から TP にいたる軽石流噴出期に、数回にわたって規模の多少はあれ、カルデラ沈降が起こったと考えることもできる。

(6) 新期(武蔵野・立川) ローム中の中央火口丘軽石層

これに相当するもので分布が広く、有効な層準指示層となる軽石は、青ヒゲ軽石 (CCP-1) と三島軽石 (CCP-4) にすぎないが、箱根の最近の活動史を論ずる上で必要なテフラについて記す。

中央火口丘形成期の最古の噴出物は降下軽石（久野，1950 の CC₁）である。記述からみると1枚を対象にしたらしいが，箱根山中や山麓にはこれに近い層準に数枚の降下軽石があるので，どれを指すかが問題となる。久野（1952）の CC₁ は，岩相，厚さからみると，SP の上位1 m 余り（小田原～大磯丘陵南部）にある青ヒゲ軽石（関東ローム研究グループ，1958）に相当すると思われる（久野もかつて筆者とともに現地におもむいた際，このことをのべた）。小田原ではこれを含めて6枚，芦の湯付近ではほぼ8枚の軽石ないし爆発角礫が，武蔵野ローム中部から現世の黒土層，スコリア層にまでみられる。久野の CC₂～CC₈ はテフラを含まないので，これらのテフラを箱根芦の湯を模式地として，改めて CCP-1～8 と呼びたい。従来の青ヒゲは CCP-1，チョビヒゲは CCP-3，マユゲは CCP-4 にあたる。三島軽石は岩質の類似性から CCP-4 に，また二子山の爆発角礫（町田，1964）は CCP-8 にあたる。

CCP-1 は江の島から三浦半島北部へ追跡される。散点相をもつ分布周縁域は相模湾の北岸の大磯丘陵から相模野南部におよぶ。したがって分布の主軸方向は SP よりやや北による(図 8)。この軽石の層準はだいたい武蔵

Fig. 8 Thickness contour map of SP (Sanshokuki pumice), CCP-1 (Aohige pumice) and CCP-4 (Mayuge or Mishima pumice). thickness in meter

野ローム下部層の上部または中部層の上部といえよう。

CCP-2 以上のテフラは、分布が海域かまたはごく狭いものが多く、わずかに CCP-4 が南西方向の三島、狩野川平野、愛鷹南麓に飛散したことがわかっているにすぎない(町田, 1968, 愛鷹ローム研究グループ, 1969)。

CCP-1~8 のテフラで残されている問題といえ、中央火口丘をつくる溶岩や泥流、熱雲堆積物(久野の CC₂~CC₈)との関係である。ごく新しい CCP-8 や CCP-6, 7 については、二子山および駒が岳の溶岩と関係する(町田, 1964, 1968)。中央火口丘のうちもっとも大きい成層火山神山は CCP のかなり多くのものを噴出したと考えられるが、確実にはわかっていない。

CCP は、下から上に順に厚さ(量)と本質物質の割合とを減じている。また輝石中に占める紫蘇輝石の量比は次第に大きくなる(袴田, 1970)。火山活動は次第に爆発の度を減じ、間歇的となったようである。

(7) 新期ローム中の層準指示層

新期(武蔵野・立川)ロームの大部分は、富士に由来するスコリアで占められ、岩相の類似したものが多いことと、相模野以東では1枚が薄く層理が不明瞭となることなどのため、TP 以下におけるような高密度で鍵層が見出されていない。相模野では立川ローム下部と武蔵野ローム中部とを指示するスコリア2枚(S₁S と S₂S)が知られている(戸谷, 1961)。このほかに秦野盆地や道志川流域で、やや特徴のある火山ガラスの多い白色火山灰層と青色火山灰盤層とが、それぞれ立川ローム下部と武蔵野ローム中部と考えられる層準にあるが、いずれも薄く、広域には分布していない。このように、相模野以西では多数のスコリア層の類別が今後のしごとである。

新期ロームではこの他に、立川ロームで知られているような埋没土層が鍵層になる。これは一般に相模野以東の地域で発達する。その成因からみても、一次的テフラのように厳密な時間を指示しはしないが、対比に役立つ。かつ既述のように環境の指示者としても有効である。

V. 埋 没 土 層

(1) 認 定

これまで風化テフラとか二次的テフラとか呼んだ無層理、褐色のテフラは、軽石やスコリアなどの堆積当時の特徴を失っていない一次的テフラに対して、多少とも地表での風化、土壌化作用を受けたものである。いずれも狭い意味の埋没土層であるが、より単元の大きなそれらの集積層である広義の埋没土層とは区別する。

火山から離れた地域では、既述のように、一次的テフラより二次的テフラが卓越する。そしてその間のいくつかの層準に、暗色が目立ったり、粘土化のすすむ層がみられ、従来から暗色帯(黒バンド、チョコ帯)、クラック帯などと呼ばれていた。暗色は一般に腐植の吸着によるらしい(戸谷・貝塚, 1956)。そして暗色帯がふつう立川、武蔵野ロームに多くみられるのに対して、クラック帯は概して古い層準に多い。乾くとクラックの生じるのは、粘土含量の多いためであるが、C量、C/N比を測定すると暗色帯のそれに比べて小さい。また暗色帯の場合、上下限が漸移的だが、クラック帯では上限が一般に明瞭である。それは粗いテフラに急におおわれたためとみられる場合が多い。

筆者は、新期ロームにあるいくつかのクラック帯が、給源火山に近づくにつれ暗色帯に変わり、やがて褐色の二次的テフラの多い部分に漸移することを、武蔵野～秦野の地域で観察している。そこで、クラック帯も多くの場合、暗色帯とはあまり本質的にはちがいのない埋没土層と認定できるのではないかと考えている。ただし、次のような局地的な堆積条件によっては、著しく粘土化のすすむ場合がある。たとえば、①厚い粗粒のテフラの直下は、滲透水の影響で粘土化のすすんでいることが多い(TP直下など)。②離水のごく初期に堆積した地形面直上のテフラは、しばしば湿地的環境にたまった特徴をもち、多かれ少なかれ水による粘土化がすすんでいる(武蔵野面直上など)。これらのため、クラック帯を埋没土層と認定するためには、腐植の量と正の相関をもつといわれる植物珪酸体の含量が多かったり(加藤, 1963)、粘土含量が大きかったりすることが必要である。それとともに、堆積の中絶ないし静穏期を示す諸特徴も総合的に考慮する必要がある。

(2) 埋没土層の層序(図9)

既述の下末吉、武蔵野埋没土層、富士黒土層(SB, MB, FB)以外のものにふれよう。

下末吉ロームの埋没土層 横浜・川崎以東の下末吉ロームの中には粘土化の著しいクラック帯がいくつか発達する。それらを西の箱根、富士の方へ追うと、新期ロームのそれと同じく暗色帯となりやがて軽石、スコリア質の二次的テフラとなる。中で顕著なものは K₁P-13 の直下(K₁B-12/13)、K₁ と K_m の境界層(K₁/mB)、K_mB 4/5、それに Pm-I と OP との間(小原台埋没土層, OB)などの層準である。それらでは斜交関係がみられたり、海成地形面に相当したりする(小原台面は OB の時代)。

Fig. 9 Some pedological characteristics of the buried soil horizons of tephra (analyst; Takeshi Kawaji).
locality of the columnar section; northern part of Zama hill.
sampling localities: S; Kajiama, Shimosueyoshi upland. Z; Katusaka, Zama hill.

武蔵野ロームの埋没土層 あまり顕著ではないが、TP直下の層準とその上の少なくとも3層準に暗色帯(クラック帯の外観を示すこともある)が認められる(MB-1~4)。図9のように、これらの中には植物珪酸体の多い部分があったり、斜交関係のみられる場合がある。とくにMB-4(最上位のもの)はときに著しいクラック帯となって(横浜・保土ガ谷)、立川ロームとの不整合面と見誤られることがある。

立川ロームの埋没土層 秦野盆地や大磯丘陵などでは顕著な埋没土層は認められないが、相模野から武蔵野にかけての地域では、図9のように4層(TB-1~4)が発達する。中でもTB-2がもっとも厚く、これの細分も可能である。TB-3, 2については後述のようにC-14年代が測られている。東京東部から千葉にかけて、テフラの厚さが全体に薄くなる場所では、2~1層しかみられない。4層のいくつかが合体したためであろう。

C量は現世の黒土層に比べるといずれもはるかに少ない。また図9の下末吉と座間との比較でも明らかなように、火山から遠いところのものほどC量が多く、色も黒い。なお相模野では立川ロームから多量の旧石器が出土

する(大和市月見野遺跡など)が、その大部分は褐色のローム部分からではなく、TB-1~4から出土する。

VI. テフラの年代

南関東のテフラの堆積年代の測定は、さいきんその端緒についたばかりで、測定例も少なくまた問題点も少ない。しかし、現在相当な勢いで測定例が増えつつあって、概略の年代について議論できるようになった。測定値が落ちつくまでにはまだ時間が必要であろうが、ここでは今までに得られたテフラのC-14年代とフィッシュ・トラック年代を紹介する(図10, 表4)。

(1) C-14法による立川ローム以上のテフラの年代

現世のテフラを母材として生じた黒土層については、人類遺物の出土層位や若干のC-14年代測定が行なわれて、10³年のオーダーでわかってきた(町田, 1964)。黒土層上部を占める新期富士テフラ(YFT)の下限は、表4, ①の二子山爆発角礫(CCP-8)の与える約5千年前に近い。御殿場付近ではこの層準から縄文前期末の土器が出土する。また富士黒土層(FB)の下限については、C-14年代として愛鷹南麓休湯遺跡でえられたもの(表

4, No. 3)より新しく、縄文早期より若干若い。今のところ確証はないが、休場の出土層準より FB 下限までのテフラの厚さ (20~30cm) を考慮すると、FB 下限すなわち立川ローム上限は 1~1.2 万年前位かと考えられる。なお、最近大和市月見野の宅造工事場で、小野正敏により FB の下限から約 20cm 下の立川ローム最上部に細石器と共存する隆起線文、爪形文、平底の土器が発掘されたことが注目される。

次に立川ロームの年代測定値は、主に相模野と武蔵野で最近得られたものを中心に収録した。測定試料は遺跡で発見された木炭を含めるが、主に埋没土層から抽出した腐植である。そして種々のフラクションに分離し、それぞれの年代測定を行なった (学習院大、木越研、宮崎明子による)。同一層準でもフラクションにより測定値が異なるのは、松井・成瀬・黒部 (1968)、宮崎 (1968) ものべたように、主に各フラクションの可動性に基づく。一般に安定度の高い腐植酸フラクションが古い値を与え、その埋没土層の形成年代に近いと考えられる。埋没土の年代とは、松井らによると腐植生成期間の平均的年代と考えられ、したがってかなりの幅をもつという。得られた値をみると、木炭などの値を含めて層序の上下と時代の新旧との間に矛盾するところはない。

立川ロームではその上限からの深さに応じ、図 10 のように、年代はかなり直線的に古くなる。TB-3 は 1.6~2.0 万年、TB-2 は 2.4 万年前後と考えられ、立川・武蔵野両ロームの境界は 3 万年に近いと推定される。ところが、MB-4 の値は、図 10 のように直線からかなりはずれ、新しい年代を示す。これは測定試料中に腐植が僅かしかなかったこと、ふつうの C-14 法による測定限界に近い年代と考えられること、しかも腐植のフラクションの種類と年代の古さとの関係が、上位のものと合わないことなど、多くの問題や誤差が含まれるので、ここでは一応年代の根拠として重要視しないでおく。

なお、箱根の CCP のうち CCP-7 (爆発角礫層) には木炭の細片をとまう。これの C-14 年代は次のとおり。Gak-2367 $18,000 \pm 600$ yr. BP. (採取場所、芦の湯北東国道沿い) これは明らかに立川ロームに入る。中央火口丘のうち駒ガ岳の溶岩のほとんどすべてと、神山の溶岩の一部 (小湧谷北方へ流れたもの) の上には、ほぼこの層準以上のテフラをのせるので、これらの溶岩は立川ローム中部の上記の時代の頃に噴出したものと推定される。

(2) フィッション・トラック法による TP, OP の年代

Fig. 10. The ages of several time-markers and the rate of tephra accumulation. locality of columnar section; Totsuka, Yokohama.
S : Shimosueyoshi surface, O : Obaradai surface, M : Misaki surface, SF : Shimosueyoshi formation.

最近、軽石層中の黒曜石を対象とするフィッション・トラック法による年代測定が、鈴木正男によって試みられ、C-14 法の適用範囲より古いテフラの年代がわかりつつある。

箱根 YS の溶岩や火砕物の一部に黒曜石が産することは、すでに久野 (1952) が記しているが、筆者も、箱根から大磯丘陵にいたる調査の際に、いくつかの降下軽石と軽石流の中に黒曜石片のあることを観察してきた。そこで吉沢ローム以上の降下軽石について系統的に採取し、鈴木に年代測定を依頼した。その結果はまとめて別に報告する予定でいるので、ここではとりあえず今までに求められた TP と OP および K₁P-8 の年代値を報告し、関連する諸問題にふれるにとどめたい。

TP

箱根大観山の東約 300m、湯河原へ下る道路沿いの露頭では、OS 溶岩の浸食面の上に風化スコリア層をはさむ OP から SP までが観察できる。各軽石の同定は、岩

表 4 テフラの年代測定資料

No.	測定値	採取地	試料	文献
	year B. P.			
1	4,840±120	箱根芦の湯	木炭 (二子山噴出物)	杉原・小野 (1965)
2	5,370±200	多摩ニュータウン	黒土 (fulvic acid)	
	6,040±100	〃	〃 (humus, total)	
	6,540±100	〃	〃 (humic acid)	
	7,000±100	〃	〃 (humin)	
3	14,300±700	愛鷹南麓, 休場	木炭 (遺跡)	
4	15,400±600	成 城	黒バンド (humin)	
	16,000±300	〃	〃 (humic acid)	
	19,800±500	〃	〃 (humus, total)	
	17,000±400	〃	〃 (humic acid)	
5	20,500±800	大和, 月見野	木炭 (遺跡)	松井他 (1968)
6	21,400±600	成 城	黒バンド (humin)	
	22,300±900	〃	〃 (humic acid)	
	24,900±900	〃	〃 (humic acid)	
7	19,800±650	長 後	〃 (humin)	
	21,500±1,700	〃	〃 (fulvic acid)	
	— 2,100	〃	〃	
	25,700±2,300	〃	〃 (humic acid)	
	— 3,300	〃	〃	
8	49,000±5,000	箱根大観山	東京軽石 TP (obsidian)	
9	66,000±6,000	〃	小原台軽石 OP (obsidian)	
10	132,000±10,000	大磯, 土屋	K ₁ P-8 (obsidian)	

(注) 1~7 は C¹⁴ 法による年代……学習院大, 木越研・宮崎明子測定。

8~10 はフィッシュン・トラック法による年代 No. 1~10 は Fig. 10 に対応する。

相, 層序, 軽石流の随伴状況などから比較的容易にできる。とくに TP と OP については, 鉱物分析, 強磁性鉱物の熱磁気曲線, キュリー温度の測定などを行ない(袴田, 1970), これらの同定の確実性が裏づけられている。厚さ 110cm の TP の下部には径 3~5cm の良質の黒曜石塊が含まれている。これについてのフィッシュン・トラック法による年代は表 4, No. 8 のように, 約 5 万年と測定された。

OP

上と同じ露頭でみられる厚さ 70cm の OP には, その上部に径 10cm に達する巨塊の黒曜石が含まれている。この年代は表 4, No. 9 のように, 約 6.6 万年と測られた。

K₁P-8

大磯丘陵内旧土沢村土屋には K₁P が露出する数多くの露頭がある。その一つから K₁P-8 中に径 1cm 弱の数箇の黒曜石が得られた。その年代は表 4, No. 10 のように, 約 13 万年と測られた。

さて, これらの測定値を図 10 に記入してみると, テフラの深さと年代値との間には, 立川ロームでみられたとほぼ同様の直線的な関係が認められる。しかしながら, 上の値はあくまでフィッシュン・トラック法による

ものであって, 同法による値と C-14 法による値との対応関係が明らかにされない限り, 厳密には同一の尺度で扱うには問題があるわけである。

(3) 各海成地形面および下末吉(吉沢)ロームの年代についての予察

筆者は, 南関東のテフラの堆積速度について, 下末吉ロームの堆積に要した時間は, 従来の考えよりも長く, 新期ロームのそれに匹敵するほどの長さではなかったかと考えている。それは一方ではテフラの総量が両者ほぼ同じ位であることも根拠となる。他方, 吉沢ローム中, 下部は, 厚い軽石の互層からなるので, 一枚一枚が比較的薄いスコリアの互層からなる新期ロームより早く堆積したと考えることも可能であるが, 既述のようにいくつかの層準に埋没土層の発達がみられることや, 次報でのべる海水準変化などを考慮すると, さほど早かったとは考えにくいのである。

ところで, TP, OP の F. T. 年代に基づくならば, 三崎面および小原台面の位置する重要な層準である MB と OB との年代は, それぞれ 6 万年前後と 7.5~8 万年前後と推定される。後者については OP の下位の time marker である P_m-I の年代が求まると, さらにはつきりするにちがいない*。

* 脱稿後, 鈴木正男氏より, P_m-I の F. T. 年代が 7 万~9 万年に求まったとの私信をえた。P_m-I は小原台層の最上部に夾在するので, OB または小原台面の年代についての上の推定値は的はずれではない。

下末吉ロームの下部および下末吉面の年代については、いまのところ上述の K_1P-8 の、13 万年という値しか得られていない。この軽石層は下末吉～吉沢層の陸化後間もなく降下したもので、上の年代値は、信頼度が高ければ、下末吉面の年代に近いということになる。ただし、わずか一つの値のえられた段階で、性急に結論を下すのは避けるべきであろう。

あとがき

ここで報告した下末吉（吉沢）ローム以上のテフラは、図 1 からもうかがえるように、南関東に分布する第四紀テフラの上半の 1/3 以下であって、これより下位にもおそらく箱根古期外輪山などの発達に大きく関係すると思われる厚いテフラが存在する。

それらは東の多摩丘陵などで従来多摩ロームと呼ばれているものにつづくが、こうした古いテフラでも火山の近くから遠方へという研究方向は編年上有効なように考えられる。それらの大磯丘陵での詳しい調査は、先下末吉期の編年にまつわる諸問題に基礎的資料を提供するものと予想される。

次にこの報告では、火山の近くの地域ではテフラがかなり連続して堆積したことを、ことさらに強調してのべた。連続的であればあるほど、地形面や種々の堆積物の層準指示層というテフラの特色は重要性を増す。と同時にテフラの層序区分や地形面の対比などに難しさが生じる。火山から遠い地域でテフラの堆積の連続的性格がともすれば見失われるのは堆積速度が微弱であったり、異質物の混入が行なわれたりするためと考えられる。テフラの年代に関する資料は今後も逐次集積されるであろうが、それらはいままでもなく、第四紀の気候～海面変動との関係で論ずる必要がある。第 2 報では南関東各地に分布する海・河成の地形面や地層の、テフラとの関係に基づく編年、海・河成層の性格の吟味などをつづいて、海面変動にまつわる諸問題を論じたい。

引用文献

- 青木 滋・柴崎達雄 (1966) : 海成“沖積層”の層相と細分問題について。第四紀研究, **5**, 3/4, pp. 113—120.
- 愛鷹ローム団研グループ (1969) : 愛鷹山麓のローム層。第四紀研究, **8**, 1, pp. 10—21.
- 新井房夫 (1970) : 大磯中吉沢露頭の軽石中のシン輝石。軽石雑, **3**, pp. 17—18.
- 貝塚爽平 (1958) : 関東平野の地形発達史。地理評, **31**, 2, pp. 69—90.
- 加藤芳朗 (1963) : 火山灰中の植物珪酸体。第四紀研究, **3**, 1/2, pp. 59—61.
- 関東ローム研究グループ (1956) : 関東ロームの諸問題。地質雑, **62**, 729, pp. 302—316.
- (1958) : 関東ロームの諸問題 (Ⅱ)。地質雑, **64**, 752, pp. 293—307.
- (1965) : 関東ローム, その起源と性状。築地書館。
- 関東第四紀研究会 (1970) : 下末吉台地およびその周辺地域の地質学的諸問題。地球科学, **24**, 5, pp. 151—166.
- KUNO, Hisashi (1950) : Geology of Hakone volcano and adjacent areas, Part I. J. Fac. Sci., Univ. Tokyo, Sec. 2, 7, pp. 257—279.
- 久野 久 (1952) : 7 万 5 千分の 1 熱海図幅および地質説明書。地質調査所。
- KOBAYASHI, Kunio, MINAGAWA, Koichi, MACHIDA, Mizuo, SHIMIZU, Hideki, KITAZAWA, Kazuo (1968) : The Ontake Pumice-Fall Deposit Pm-I as a Late Pleistocene Time-Marker in Central Japan. J. Fac. Sci., Shinshu Univ. **3**, 2, pp. 171—198.
- 小林国夫 (1970) : 火山灰層位学—日本の現状と課題—科学, **40**, 2, pp. 74—83.
- 杉原莊介・小野真一 (1965) : 静岡県休場遺跡の細石器文化。考古学集刊, **3**, 2, pp. 1—33.
- 鈴木正男 (1970) : フィッシュントラック法による黒曜石の噴出年代とウラン濃度の測定 (第Ⅰ報)。第四紀研究, **9**, 1, pp. 1—6.
- 鶴見英策・大村 纂 (1966) : 多摩丘陵東部の地形およびローム層に関する若干の知見。第四紀研究, **5**, 2, pp. 59—64.
- 戸谷 洋・貝塚爽平 (1956) : 関東ローム層中の化石土壌。地理評, **29**, 6, pp. 339—347.
- 戸谷 洋 (1961) : 相模野北西部の地形に関するいくつかの問題。辻村太郎古稀記念論文集, pp. 107—118.
- 袴田和夫 (1970) : 箱根火山のテフロクロノロジー。軽石雑, **3**, pp. 24—25.
- 走水グループ (1965) : 三浦半島小原台付近の第四系。地球科学, **80**, pp. 1—11.
- 羽鳥謙三・寿田晋吾 (1958) : 関東盆地西縁の第四紀地史 (Ⅰ)。地質雑, **64**, pp. 232—249.
- 町田 洋 (1964) : Tephrochronology による富士火山とその周辺地域の発達史。地学雑, **73**, pp. 23—38, pp. 17—30.
- ・森山昭雄 (1968) : 大磯丘陵の Tephrochronology とそれにもつづく富士および箱根火山の活動史。地理評, **41**, 4, pp. 241—257.
- (1968) : 富士, 愛鷹, 箱根火山および大磯丘陵の第四紀火山灰。日本地質学会。
- 松井 健・成瀬 洋・黒部 隆 (1968) : 立川ローム層中の暗色帯の ^{14}C 年代。地球科学, **22**, pp. 40—41.
- 皆川絃一 (1968) : 相模川山間部のローム層と第四紀地史。第四紀研究, **7**, pp. 101—108, **8**, pp. 1—9.
- 宮崎明子 (1968) : 埋没腐植層の $C-14$ 測定にかんする問題点。古土壌, **4**, pp. 1—3.