シンポジウム I 血管内皮細胞の機能と動脈硬化

はじめに*

島田 和幸**

内皮細胞は、さまざまな生理活性物質を産生し、血管の透過性、抗血栓性を制御するばかりでなく、血小板やマクロファージ、血管平滑筋細胞など他の細胞と相互に反応して、血管壁の緊張や血管壁細胞の遊走、増殖などをも制御している。常時、血液や血液細胞と接触し、血流が変化したことを最初にシグナルとしてうけ取るのは内皮細胞である。血管の正常状態を維持し、異常が生じた場合に正常に戻そうとするのも内皮細胞である。すなわち、内皮細胞は血管の司令塔である。

血管壁になんらかの傷害が加えられた場合、マクロファージ、Tリンパ球などの白血球、炎症性細胞が動脈硬化巣において重要な血管反応（遊走、増殖、血栓、貪食など）を行っている。そこに関与する分子機構として、サイトカイン、成長因子、接着因子などが明らかにされている。一方、正常な血管機能を維持する分子機構も解明が進んでいる。血管内皮由来の NO は、標的細胞にサイクリック GMP を産生させて、適切に血管径を調節するだけではなく、白血球や血管壁細胞に対して他の生物学的作用を発揮し、正

常な血管構築に貢献している。内皮の抗血栓性には、プロスタノイド、トロンボモジュリン、ヘパリン様物質、外因系凝固インヒビター等が関与している。これらの内皮機能が、血管壁に対する傷害性刺激にどのように反応するかは、動脈硬化の成立・進展過程に大きな影響を与えていることは想像にかたくない。

ここで血管内皮細胞に作用するさまざまな生理活性物質は、このような血管内皮細胞の血管壁細胞の増殖調節、抗血栓性調節、緊張調節のうちのどれか一つではなく、これら多岐にわたる作用を同時に誘導する (Fig. 1)。これらの機序の細胞内シグナル伝達を一つ一つ明らかにすることにより、より統一した血管内皮細胞作用機序の概念が生まれるであろう。

本シンポジウムは、このような血管内皮細胞をめぐる最近の研究の進歩のいくつかをレビューし、ベンチからベッドサイドへ、そしてさらにベンチへと血管細胞生物学・血管医学がさらに進展することを意図して企画された。

血栓⇔血管作動⇔増殖

弛緩・抗血栓・増殖抑制	収縮・血栓・増殖
NO	エンドセリン
プロスタサイクリン	トロンボキサン
ナトリウム利尿ペプチド	アンジオテンシンII
アドレノメデュリン	トロンビン

本シンポジウムでとりあげられる生理活性物質を太字で表した。

Fig. 1

* 1996年6月、第28回日本動脈硬化学会総会（大阪）において発表。

** 自治医科大学循環器内科

Key words: 内皮細胞, 抗血栓性, 血管緊張性, 増殖, 遊走

Kazuyuki Shimada: Department of Cardiology, Jichi Medical School.

原稿受取日: 1996年10月16日