気管支瘻を形成し舌に癌性変化を伴つた 食道癌の一剖検例

* 小 野 譲 ** 田 口 純 子
村 上 泰 二 郎 湯 地 貞 二

は し が き

食道癌は、胃、子宮、乳腺に次ぐ頻度を有し全癌腫に対する発現率は諸家の統計を平均すると6%となつてゐる。食道癌に舌癌を併発した例は非常に少く本邦文献においては小野²⁾³⁾、原田が1例を発表しているに過ぎず、欧米ではWatson⁶⁾の2例、Leroux¹⁾及びRichter⁴⁾の各1例、計4例が発表されているに過ぎない。

私共は最近食道癌が気管支瘻を形成しさらに舌癌を伴つた症例を経験したので報告する。

症 例

〔患者及び現病歴〕 患者は嚥下障害を主訴として、昭和34年1月22日に慶大病院外科を訪れた53才の男子。昭和33年10月頃より流動物は通るが有形の食物の通過障害があつた。10月末より某大学病院に診断不明のまま、約1ヶ月通院していたが経過が思ひなかつたのでその後治療を受けていなかった。昭和33年12月頃より喀痰、咳嗽が出るようになり本年に入りさらに増強した。1月10日朝より、流動物も通過しなくなつたので某病院耳鼻科を訪れ食道鏡検査の結果、食道腫瘍と診断され1月22日当院外科に紹介された。

〔既往歴〕 昭和16年 腸チフス、昭和17年マラリア及びアルコリスムス

〔家族歴〕 特記すべきものはない。

〔嗜好品〕 酒1日1合 煙草1日20本位

〔初診時の主なる所見〕 体格栄養中等度、顔貌正常、意識明瞭、皮膚体位正常、血圧110~74、脈搏60整調緊張良、呼吸胸腹式、眼耳鼻口唇咽頭正常、舌には薄い白色舌苔附着し腫瘍なし、頸部淋巴腺は触れず、心尖部は第6肋間で、左

側乳腺上の内側、肺は右肺下で副雑音を聴取、腹部には圧痛及び抵抗なし、肝脾腎は触れず、膝蓋及びアキレス腱反射は正常、背部四肢所見なし、淋巴腺は何れも触れず、食欲睡眠良好、排尿は1日5回、便通は1日1回。

〔検査成績〕 血液—赤血球478万、ザーリ90%、血色素係数0.94、ヘマトクリット53%、白血球4900、クロール97mEq/L、循環血液量6650cc、循環血漿量3515cc、総蛋白8.6%、A/G比1.57、尿—色淡黄、反応アルカリ、比重14、混濁(±)、糖ベネデクト(—)、蛋白ズルフォ(—)、ウロビリリン(—)、ウロビリノーゲン(±)、ビリルビン(—)、インヂカン(+), アセトン(—),

肝機能検査—黄疸指数4.5、T.T.T.2単位、Cobalt Ro, Gross 反応(1.8以上)(±)、アルカリファスファターゼ2.8単位
便—潜血反応ベンチデン(+).

食道造影レントゲン検査—第2狭窄部に著明な陰影欠損あり。

食道鏡検査—気管分岐部の高さに一致して長径10cmに及ぶ肺瘍を認めた。

病理組織学的所見—食道の腫瘍は扁平上皮癌

〔図1, 2〕

E.K.G.—特別な所見なし。

肺機能検査—咳嗽あるため中止す。

〔入院後の経過〕

2月3日 試験開胸したが、剔出不能な状態のため胃瘻形成術のみを行つた。

2月4日 咳嗽喀痰ともにほとんどなくなつたが呼吸速迫あり。

2月5日 咳は軽くなる。血性痰はなおあり。右肺の呼吸音は弱い。

2月12日 血性痰はなお中等量あり、右肺前中央に笛声音を軽度聴取、胸部苦悶感は軽くなる。舌左縁の前口蓋弓の近くに長さ1.4cm、巾

* 慶大医学部教授 ** 助手

0.8cm のカリフラワー状弾力性硬の硬結に気付く。出血はない。

2月19日 血性痰は少くなつたが食事をすると食物による刺激でひどく咳嗽が出る。舌腫瘍は急速に大きくなる徴候なし。

2月24日 気管支鏡検査を行い、上歯列より29cm の所で気管分枝部に一致して潰瘍性、びらん性の腫瘍を認めた。腫瘍は出血性で鉗子でさわると抵抗著明であつた。気管支及び舌の腫瘍を鉗子でとり、切片の組織学的検査の結果、気管分枝部及び舌の腫瘍は何れも扁平上皮癌という診断を得た。〔図3、4、5、6〕

図3は気管支腫瘍の弱拡大でエオジンに赤染した角化層、即ち癌真珠の形成を伴つた扁平上皮癌の像で、実質と間質との境界が極めて明瞭である。図4はその強拡大で角化上皮が求心性に排列し核が濃縮に陥つた細胞、あるいは核の消失した細胞等が見られる。

図5は舌腫瘍の弱拡大で上皮性の細胞が異常に増殖し細胞は大小不同、やや不整形で異型性が見られる。図6はその強拡大で角化層が認められ扁平上皮癌の像である。

以上何れも10%ホルマリン固定のバラフィン切片をヘマトキシリンエオジン染色したものである。

3月2日 食道気管支瘻を証明するため、レントゲン写真を撮る。図7は背腹位単純撮影のレントゲン写真で、この写真からは食道気管支瘻は明らかでなく肺縦隔洞にも異常所見は見られない。図8はバリウムで食道造影を行つた横位のレントゲン写真で気管分枝部に相当する位置で高度の狭窄を形成しており、バリウムの一部が気管内に洩れている。図9はバリウム食道造影後に横位で撮影した胸部写真で、バリウムは主として右中葉に入っているのが見られ食道気管支瘻を作っている事が確認された。腫瘍は食道より気管支に浸潤したものと思われる。舌癌に対し Co^{60} 針1mg3本を1週間刺入した。

3月7日 悪臭ある喀痰を多量排出。咳嗽は食事後ひどくなる。

3月10日 口渇なく全身に浮腫は認められぬ。咳嗽はなお食事後に頻発す。午後4時突然約100ccの血塊を喀出。咳嗽が頻発し、喘鳴、呼

吸困難あり。口唇は紫藍色、脈搏は84で緊張著明。痰を吸引し酸素吸入す。1時間半程して以上の症状は消失した。

3月11日 胸部は全面に呼吸音を聴取、特に左肺前部に著明である。これは食道気管支瘻の存在によると思われる。微熱あり。

3月12日 喀痰に大量の唾液を混ざるが血痰はない。

3月14日 全身症状は癌の末期で悪液質の状態になり、又軽度の脱水状態にあると思われる。

3月19日 舌は厚い白色舌苔が附着し、舌の腫瘍は悪臭ある膿苔におおわれ、周囲には軽度の炎症あり。腫瘍は縮少して来ている。喀痰に血液を混ぜず。

3月20日 口渇を訴える様になる。

3月23日 全身状態不良、時々軽度の意識混濁あり、難聴幻覚を訴える。視力は正常、舌は厚い白色及び褐色の舌苔におおわれ腫瘍は非常に小さくなり膿苔が附着し周囲に多少の硬結あり。

3月24日 気管切開を施行。

3月25日 咳嗽、喀痰依然多量に喀出し、ほとんど1~2分ごとに吸引す。

3月26日 複視を訴える、脈搏140整調、緊張中等度。

その後食道気管支瘻による肺合併症が著明となり衰弱増強す。

4月1日 心衰弱にて死亡

〔剖検所見〕

肉眼的所見

1. 食道癌 気管支分枝部の高さに一致し長径10cmに及ぶ。腫瘍は食道内腔を満し中心部は壊死に陥り気管内腔まで連続性に浸潤して瘻孔を形成す。
2. 転移
 - a) 肝左葉と胃噴門附近との間。肉眼的には胃の粘膜下組織は明らかに腫瘍浸潤あり。
 - b) 周辺リンパ節。左肺門部その他。
3. 両側気管支肺炎
4. 両側纖維素纖維性胸膜炎
5. 脾の肥大
6. 気管切開創、胃瘻造設、右胸部手術痕
7. 褥瘡

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5

図 6

図 7

図 8

図 9

図 10

図 11

図 12

8. 高度の癰瘻

舌は左縁に長さ0,8cmの小さな上皮欠損を認めたが腫瘍性的変化は明らかでなく、鎖骨上リン巴節及び頸部リン巴節には病変は認められなかった。図10は食道癌及び舌癌の標本である。

病理組織学的所見

1. 主腫瘍（食道）

図1は腫瘍が食道から連続性に気管分岐部後面に浸潤した部分の弱拡大で、この腫瘍の中に食道気管支瘻が形成されている。この標本はその瘻孔の近くからとつたもので、気管支腫瘍と同じく癌真珠の形成の著明な扁平上皮癌である。真珠を作っていない所の細胞は大型の立方形及至扁平なものが多く、大型の細胞は原形質に富み核は明瞭な核膜を有し、核小体の見られるものもある。図2はその強拡大である。

2. 胃噴門小彎側の腫瘍は外方から粘膜下組織内まで浸潤していた。

3. 肺では気管支内や肺胞内に白血球や脱落した上皮細胞単球等が満ちており、一部には菌塊が見られる。気管支肺炎の像である。

4. 図11は剖検時の舌の組織標本で、肉眼的には腫瘍はなく浅い潰瘍が見られただけである。組織学的にも潰瘍と古い肉芽組織からなり、癌又は悪性腫瘍等の像は見られない。図12はその強拡大である。

考案並びに結語

本例は食道癌の経過中に舌に癌性変化を認めた53才男性の1例である。

すなわち、嚥下困難を初発症状として始まり、その約3ヶ月後にレ線検査、食道鏡検査により、食道第2狭窄部に腫瘍を認めた。バイオプシーによる病理組織学的検査の結果は扁平上皮癌であつた。その後気管支鏡検査により気管分岐部の腫瘍を認め、レ線検査で食道気管支瘻の形成を確認した。気管支腫瘍も病理組織学的検査の結果、扁平上皮癌であつた。

舌には初診時、何等病変を見なかつたが、約1ヶ月後、左側縁部に花菜状の腫瘍を発生、バイオプシーにより同様に扁平上皮癌の像が見られた。その後次第に全身衰弱を来し、気管支肺

炎を併発して死亡した。剖検により食道第2狭窄部を中心として気管分岐部、大動脈弓周辺に及ぶ癌と、その中心部に食道気管支瘻の形成が見られたが、舌には放射線療法が行われたためか浅い潰瘍のみで癌の所見は認められず、又頸部その他のリンパ節には転移が認められなかった。以上の諸点から、食道癌については、これが原発性のものであることは確実であるが、舌癌については、これが食道癌からの転移であるか、あるいは食道癌とは別に舌に原発した癌、すなわち重複癌であるかという点は問題である。病理組織学的には両者ともに扁平上皮癌ではあるが、食道癌は癌真珠形成の著明な典型的扁平上皮癌であるのに対して、舌癌は比較的角化の傾向の少い扁平上皮癌である。

癌腫の転移は主としてリンパ行性によるもので、血行性、播種性あるいは接種性に転移するものは比較的少いとされている。本例でも胸部食道と舌との位置的関係よりみて播種性あるいは接種性転移は全く考えられない。又淋巴行性の転移は隣接せる所属リンパ節よりリンパ管を介してその流域下のリンパ節が連続的に侵襲を受けるのが常である。食道癌がリンパ道を介して舌に転移を来す事は解剖学上考えがたいが、もしかりに H. Rouvière と G. Valette⁵⁾ がいうように食道癌による食道のリンパ管閉塞のため、リンパの逆流があつたとしても、本例においては剖検によつて明かなように上部縦隔ないし頸部リンパ節には転移を認めていない。ゆえにリンパ行性の転移も考えられない。以上のように転移とすれば血行性転移が考えられるが、食道と舌は、いづれも原発性に扁平上皮癌が見られる部位なので、本例の舌癌が転移性のものか、原発性のものすなわち重複癌かという事を決めるのは慎重でなければならない。

稀有な例として食道癌が気管支瘻を形成し、さらに舌に癌性変化を伴つた1例をここに報告する。

慶大病理の斎藤豊明先生に病理学的所見について種々御教示頂いた事を深謝す。

本論文の1部は、昭和34年10月18日、日本気管食道科学会第11回総会にて発表した。

文 献

- 1) Leroux 2) より引用
- 2) 小野 譲 舌に転移を来せし食道癌の1例 耳鼻咽喉科14巻 昭和16年
- 3) 小野 譲 食道癌の臨床 39頁
- 4) Richter 2) より引用
- 5) Rouviere H, Valette G. Physiologie du Systeme Lymphatique 1937
- 6) Watson W. L. Cancer of the Esophagus some etiological considerations. Am. J. Roentg. vol 41 420~424頁 1939

内視鏡的にみた食道静脈瘤の5例について

小 野 譲 田 口 純 子
松 村 弘 湯 地 貞 二

近年内視鏡の発達とともに食道静脈瘤の発見もまた多くなつて来た。上部消化管の出血に際しては、その原因として食道静脈瘤の存在も考慮されなければならない。バンチ氏症候群や肝硬変症の患者の多くに食道静脈瘤が認められている。例えば竹田¹⁴⁾¹⁵⁾はバンチ氏病の術前術後並びに肝硬変症の患者31例に食道鏡検査を実施しその中21例に食道静脈瘤を認めたと発表しており、矢毛石¹⁹⁾は門脈圧亢進症剖検屍18例中61.1%といい、上田¹⁷⁾は肝硬変22例バンチ氏病9例についてレ線による食道静脈瘤の検査を行い、前者に10例、後者に4例の静脈瘤を認めている。さらに宮田⁸⁾はバンチ氏病、溶血性黄疸の6例に食道鏡検査を行いその2例に食道静脈瘤を認めたと報告している。

このようにここ4年間に食道静脈瘤については多くの文献が発表されているが、われわれは内視鏡的にみた食道静脈瘤の5例について報告する。

症 例

第1例 41才女子

〔現病歴〕 5年前より左季肋部及び右季肋部に腫瘍を触れ、3年前より顔面の蒼白を認めたので、本年5月14日当院外科を訪れバンチ氏症候群と診断された。

〔初診時所見〕 腹部は柔かく肝は右乳線上で3

慶大医学部

横指触れ余り硬くない、脾は左乳線上で5横指触れ肋骨弓下に指を挿入し得る。截痕を触知出来、硬く、移動性がある。

〔入院後の経過〕 5月16日食道鏡検査を行つた所、上歯列より30cm以下に食道静脈瘤を発見した。局所の皺壁は普通以上に多数存在し、粘膜は発赤しやや赤紫色の腫瘍が認められた。肝機能検査は、黄疸指数総3.0、総ビリルビン0.4、直接ビリルビン0、間接ビリルビン0.4、T.T. T.3u、C.C.F. 卅(48h) Cobalt R5. Gross 反応卅、総コレステロール98.6、アルカリフォス

(図1)

THE CANCER OF OESOPHAGUS ACCOMPANIED BY THE TRACHEAL FISTULA AND CANCEROUS CHANGE OF THE TONGUE

Jo Ono, et al

Keio University

A 53 year old man complained of dysphagia, cough and sputum since October 1958. These symptoms became more marked in the following year. In the middle of this January, he noticed that even liquid did not go down. An esophagoscopic examination revealed a tumor at the level corresponding to the bifurcation of the trachea. The biopsy removed showed cancrioid.

On 3rd of February, exploratory thoraeotomy was performed and it was found that complete extirpation of the growth was impossible and gastrostomy was performed.

On 12th of February, hard, elastic and cauliflower-like mass appeared on the left margin of the tongue.

On 24th of February, a bronchoscopic examination showed a tumor at the tracheal bifurcation and the pathological examination of both this part and the tongue proved cancrioid.

A tumor at the tracheal bifurcation was the extension of the oesophageal tumor and x-ray study with contrast media showed the existence of tracheo-oesophageal fistula.

The cancer of the tongue might be considered to be haematogenous metastasis from the trachea or duplicated cancer.

The size of the tongue cancer was decreased and hardly recognized by the treatment of CO needles, but the complication in the lung due to tracheo-oesophageal fistula became manifest and the patient grew weaker and died on April 1st.

The autopsy showed oesophageal cancer of 10 cm length at the height of the tracheal bifurcation and had infiltrated into the inner part of trachea forming a fistula.

Pathological examination showed it to be cancrioid.

Metastasis were found at the submucosa of the stomach, lymph nodes around the stomach, left hilus of the lung and left margin of the tongue.

The histologic pictures of the oesophagus, bronchus, and the tongue ; and the x-ray photograph of the lung are herewith attached.