気管支造影と肺機能との関係について

* 矢 嶋 淳

I) 緒 言

肺機能の研究は最近長足の進歩を遂げ、特に肺結核症における肺機能障害については、Köster,¹⁾ Bold,²⁾ Hertz,³⁾ Donald & Miller,⁴⁾ Attinger,⁵⁾ Schmidt,⁶⁾ Marrde,⁷⁾ Simonin,⁸⁾ 鈴木,⁹⁾ 梅田,¹⁰⁾ 小高,¹¹⁾ 北村¹²⁾ 等多くの報告がある。併し肺機能検査装置及び操作の面から必らずしも簡便に行えるものでない為に、Comroe¹³⁾ 等はX線検査によつて肺機能障害の程度を知らんと研究し、Tulou¹⁴⁾ 等も左右別肺機能測定に於て、ゾンデを挿入することなしにX線検査を改良することによつて、左右別機能評価を試みている (Cigraphie)。又、神津¹⁵⁾ 等は、肺の病態生理と気管支造影機転について研究し、Köster¹⁶⁾ は気管支狭窄と肺換気との関係について、北村¹²⁾ は気管支拡張と肺活量の関係について夫々報告している。著者は前報¹⁷⁾ ¹⁸⁾ に於て肺切除例における肺病巣と気管支造影及び気管支鏡所見との關聯及び切除肺における気管支病変と術前気管支造影像及び鏡所見との關聯について検討し、夫々密接なる關聯を有することを認めたが、更に肺結核患者に左右別肺機能を施行して、気管支造影像とその同側肺機能との關係を、気管支鏡所見を参考として追究し、兩者の關聯は密接であり、気管支造影像より肺機能障害を推定し、又逆に肺機能障害より気管支造影像の異常を想定することが可能であることを認めたので茲に報告する。

II) 方 法

当教室入院肺結核患者46例に気管支造影及び左右別肺機能測定を行なつた。気管支造影は1% T-Cain 噴霧により咽喉頭麻酔を行い、油

性 Dionosil 約10 c.c. を Nélaton 氏カテーテルを用いて経口的に一側全域に注入して、撮影を行ない、造影像について充影度、気管支樹の變形、気管支拡張像を検討した。

左右別肺機能測定は1% T-Cain 噴霧麻酔により Carlens' カテーテル 及び Knipping 氏装置 (Gebauer 型 Respirometer) を用いて座位で施行し、肺活量 (以下 V.C. と略)、一回換気量 (以下 T.V. と略)、最大換気量 (以下 M.B.C. と略)、酸素当量 (以下 O₂-eq. と略) を測定した。

III) 成 績

A. 肺換気能と充影度との關係

1) V.C. と充影度との關係 (表 1)

V.C. は京大結研モノグラフによる予測値に対する%を算出し、之より減少率を算定し、左右肺活量比は Schmidt⁶⁾ により 47:53 とした。充影度は完全充影、不完全充影及び過度充影即ち肺泡像に分け、完全充影は第5次分枝迄平等に造影されたものとし、不完全充影、肺泡像は更にその範囲によつて一区域内程度のものを軽度、一葉に亘るものを中等度、一側全域に亘るものを高度とした。

1) V.C. and Degree of Filling

		V.C.		1	-11	21	-31	-41	-51	-71	Total
		-10	1	1	1	1	1	1	1		
		%									
		-20	-30	-40	-50	-60	-70				
Complete	filling	1	4	5	4	1	2			17	
	minimal	1	1	3	1	1	1	3	11		
Incomplete	mode-rate	1				1			1	3	
	filling										
	marked						2	3	5	46	
	minimal				1	1	2	1	5		
Alveolar	mode-rate					1			2	3	
	filling										
	marked								2	2	

* 信州大学医学部戸塚内科教室 (指導: 戸塚忠政教授)

完全充影を示すものは46例中17例で、その中10例は V.C. 減少率-30%以下で、V.C. 減少率は少い。不完全充影ではその度が強くなるに従って V.C. 減少の強いものが多くなり、不完全充影高度の5例は全例 V.C. 減少-50%以上で特にその中3例は-70%以上で減少率が高い。過充影即ち肺胞像を示すものは V.C. 減少率は一般に高度である。

2) T.V. と充影度との関係 (表2)

T.V. は実測値を示し、() 内数字は女性数を示す。完全充影は T.V. 正常値を示すものが多いが、不完全充影ではその度が強くなるとその値の小さいものが多くなる。併し V.C. における程此の関係は密接ではない。肺胞像では正常範囲のものが多くなり得る。

2) T.V. and Degree of Filling

	T.V.	O.c.c.						Total
		101	201	301	401	501	601	
		-100	200	300	400	500	600	
Complete filling				4 (3)	9	4		17
	minimal	2 (1)	2	2	1	4		11
Incomplete filling	moderate		1		2			3
	marked	1 (1)	2	1	1 (1)			5 46
Alveolar filling	minimal			5 (1)				5
	moderate		1	1 (1)		1		3
	marked		1	1				2

() : female

() : female

3) M.B.C. and Degree of Filling

		M.B.C.		6	11	16	21	26	Total
		1	1	1	1	1	1	1	
		5	10	15	20	25	30		
Complete	filling		3 (1)	7 (1)	6 (2)	1			17
	minimal	4 (3)		4	2	1			11
Incomplete filling	moderate		2 (1)		1				3
	marked	1 (1)	3	1					5 46
Alveolar filling	minimal			4	1				5
	moderate	1	1	1					3
	marked	1	1						2

() : female

() : female

3) M.B.C. と充影度との関係 (表3)

M.B.C. は実測値を示す。不完全充影高度例では5例中5例が、肺胞像例は10例全例が M.B.C. 15 l 以下の低値を示した。

4) O₂-eq. と充影度との関係 (表4)

O₂-eq. は実測値を示し、() 内数値は女性数を示す。完全充影を示す場合は、やはり正常範囲 2.1~3.0 を示すものが17例中9例で最も多い。高度不完全充影及び肺胞像を示すものは5.1以上を示す症例が多くなり、充影不全及び肺胞像の症例に換気効率の悪いものが多いことを示している。

4) O₂-equivalent and Degree of Filling

	O ₂ -eq.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0			
Complete filling	minimal	4 (2)		3	2	2					11
	marked		1	2 (1)				1	1	5	46
Incomplete filling	minimal			2 (1)				1 (1)	2	5	
	marked	1						1	1	3	
Alveolar filling	minimal										
	marked	1							1	2	

() : female

B. 肺換気能と気管支樹の変形との関係

1) V.C. と気管支樹の変形との関係 (表5)

気管支樹の変形は、変形のないもの、一区域内に止まるもの、一側全域に亘るものに分けた。気管支樹の変形のないものでは5例中4例が V.C. 減少率-20%以下で、変形の範囲も広く、高度の症例において V.C. 減少は高度のものが多くなり、一側全域に亘る変形では14例中

5) V.C. and Deformation of Bronchial tree

	V.C.									Total
		-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70		
no deformation		2	2		1					5
Segmental		2	1	3	4	5				15
lobal					3	2	2			7
ipsi lateral						1	2	11		14

11例が—71%以上の高度減少を来している。

2) T.V. と気管支樹の変形との関係(表6)

気管支樹の変形のない場合は大部分 T.V. は正常で、変形の範囲が広がると T.V. は著明に少くなり、一側全域に亘る変形の場合は、14例中 8 例は 200c.c. 以下の低値を示している。T.V. が正常値を示す場合は気管支樹の変形はないか、あつても軽度であるが、T.V. の著明に少い場合は気管支樹の変形も又著明であることが認められる。

6 T.V. and Deformation of Bronchial tree

T.V.	0c.c.	101	201	301	401	501	Total
	100	200	300	400	500		
no deformation				1	4 (1)	5	41
segmental			5 (4)	5	5	15	
lobal			2 (1)	5 (1)		7	
ipsi lateral	3 (1)	5	6 (1)			14	

() : female

3) M.B.C. と気管支樹の変形との関係(表7)

気管支樹の変形の範囲が広がるに従つて、M.B.C. は低値を示している。一側全域に亘る変形の場合は14例 全例が15l 以下の低値である。

7) M.B.C. and Deformation of Bronchial tree

M.B.C.	6	11	16	21	26	Total
	5 l	10	15	20	25	30
no deformation			1	4 (1)		5
Segmental		3 (3)	7 (1)	5		15
lobal		1 (1)	4 (1)	1	1	7
ipsi lateral	6 (2)	7	1			14

() : female

4) O₂-eq. と気管支樹の変形との関係(表8)

気管支樹の変形のないものでは O₂-eq. の値は正常値からへだたつたものは余りないが、変形の範囲が広がるに従つて正常値を示すものは少くなり、一側全域に亘る変形では14例中5

例が7.1 以上を示している。

8) O₂-equivalent and Deformation of Bronchial tree

O ₂ -eq.	0	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	7.1	Total
	1	2.0	3.0	4.0	5.0	7.0		
no deformation			2	1	2		5	41
Segmental			3	7	3	2	15	
lobal			4		1	1	7	
ipsi lateral	6		1		2	5	14	

C. V.C. と気管支造影拡張像及び気管支鏡所見との関係

1) V.C. と気管支拡張像との関係(表9)

気管支拡張像は柱状、円筒状、数珠状、囊状に分類した。造影で気管支拡張のないものでは V.C. は殆ど正常に近いものが多いが、拡張の度が強くなるに従つて V.C. 減少率も著明となり、特に囊状拡張では6例中4例は—71%以上の減少を示した。

9) V.C. and Bronchiectasis

V.C.	%	-11	-21	-31	-41	-51	-71	Total		
		1	1	1	1	1	1			
		-10	-20	-30	-40	-50	-70			
no ectasis	2	2						4		
stick-form	2	1	2	4			2	11		
cylindric form					1	5	3	3	12	41
beads-form				1	2	2	1	2	8	
Sacci form					1		1	4	6	

2) V.C. と気管支鏡所見との関係(表10)

気管支鏡所見は小野氏分類に依つた。異常所

10) V.C. and Bronchoscopic findind

V.C.	$\frac{0}{1}$	$\frac{-11}{-10}$	$\frac{-21}{-20}$	$\frac{-31}{-30}$	$\frac{-41}{-40}$	$\frac{-51}{-50}$	$\frac{-71}{-70}$	Total
N.A.F.		4	3	2		1		10
I Type	1	1	3	5	1	2	6	19
II Type	2			1	1	2	3	9
III Type			3			3	1	7
IV Type							1	1

I }
II } : Classification of tuberculous bronchial
III } lesions by Prof. ONO
IV }

見のないもの10例では V.C. 減少率 -11~-20% 4 例, -21~-30% 3 例, -31~-40% 2 例, -51~-70% 1 例で, II, III, IV 型の順に V.C. 減少率が著明となる。

D. レ線病型主病巣, 気管支樹の変形, 気管支拡張像, 気管支鏡所見と充影度との関係

1) レ線病型上の主病巣と充影度との関係 (表11)

空洞例でも完全充影を示す場合が相当数認められるが, 乾酪巣, 細葉巣の場合の方がよく造影されることが多い。肋膜肺脈の例では完全充影は困難で, 又肺泡像を示すことが多い。

11 Roentgenological type of Main lesion and Degree of Filling

	cavity	case-ous lesion	aci-nous lesion	pleu-ral thick-ning	Total
Complete filling	7	5	4	1	17
minimal	5	1	1	4	11
Incomplete filling	moderate	1	2		3
marked	3			2	5
minimal	1		1	3	5
Alveolar filling	moderate		1	2	3
marked				2	2

12 Deformation of Bronchial tree and Degree of Filling

	no defor-mation	seg-mental	lobal	ipsi-lateral	Total
Complete filling	3	9	5		17
minimal	2	3	1	5	11
Incomplete filling	moderate	1		2	3
markd	undetermined by incomplete filling				41
minimal		1	1	3	5
Alveolar filling	moderate	1		2	3
marked				2	2

13) Bronchiectasis and Degree of Filling

	no ecta-sis	stick form	cylindric form	beads-form	sacci-form	Total
Complete filling	4	3	6	4		17
In-complete filling	minimal	3	1	3	4	11
mode-rate		1	2			3
marked	undetermined by incomplete filling					41
Alveolar filling	minimal	2	1		2	5
mode-rate		2	1			3
marked			1	1		2

2) 気管支樹の変形と充影度との関係 (表12)

変形のない場合はよく充影され, 変形のある場合は不完全充影か又は肺泡像を作り易いことが認められる。完全充影を示すものは気管支樹の変形は多くは一区域内に止まる。肺泡像を示す場合は一側全域に亘る如き高度の気管支樹の変形がある場合が多い。

3) 気管支拡張像と充影度との関係 (表13)

気管支拡張のない場合は4例全例共完全充影を示しているが, 拡張は著明でも比較的よく造影されるものもあり両者の関連は余り密接ではない。

4) 気管支鏡所見と充影度との関係 (表14)

一般に気管支鏡で異常所見のない場合の方が完全充影の率は多いことが認められる。併し気管支結核はその病変が比較的強くてもよく造影されるものもある。

14 Bronchoscopic finding and Degree of Filling

	N.A.F.	I	II	III	IV	Total
Complete filling	6	7	2	2		17
In-complete filling	minimal	2	4	2	2	11
mode-rate		2	1			3
marked	1	2	2			5
Alveolar filling	minimal	1	2	2		5
mode-rate		3				3
marked		1	1			2

主なる症例の気管支造影及び左右別肺機能グラフを写真に示す。

写 真 1.

症例 1. (完全充影で変形、拡張等を認めないもの)

写 真 2.

症例 1. 同症例の左右別肺機能グラフ
換気障害は認めない。

写 真 3.

症例 2. (気管支拡張、気管支樹変形、肺胞像、充影不全の軽度のもの)

写 真 4.

症例 2. 同症例の左右別肺機能グラフ
右側は軽度換気障害を示す。

写真 5.

症例 3. (肺泡像著明例)

写真 6.

症例 3. 同症例の左右別肺機能グラフ
左側換気障害著明

写真 7.

症例 4. (気管支樹の変形著明例)

写真 8.

症例 4. 同症例の左右別肺機能グラフ
左側換気障害高度

Ⅳ) 総括並に考按

Tulou¹⁴⁾ はレントゲン検査に考案を加えて肺機能の評価を試み、Comroe¹³⁾ も V.C. の減少は胸廓の変形、肋膜肥厚、肺病変、横隔膜の状態、浮腫、肉芽形成等の間質性的変化等によるもので、これらの病変はレントゲンの質的に知り得られ、全肺気量は正面と側面写真でプラニグラフを使つて推定することができると述べている。併し Schmidt⁶⁾ はレントゲン像から想像した機能と実際の減少率とは必ずしも一致しないことを主張しており、レントゲン写真よりの肺機能評価には種々難点が多い。著者は気管支造影で造影充影度、気管支拡張像、気管支樹の変形度と同側の V.C. 減少率、T.V., M.B.C., O₂-eq. との関聯を検討し、レ線像上結核病巣の型と充影度との関係を検討し、又気管支鏡所見と充影度、V.C. との関係を検討した所、肺換気機能と気管支造影像との間には密接な関聯があり、又レ線病型、気管支鏡所見とも夫々密接な関聯を有することを認めた。

気管支造影でその充影を阻害する因子は種々ある。Attinger⁵⁾ は慢性肺気腫について、肺の弾性度が減少すると肺胞内圧が高まり、理論的に気管支に制動弁作用が生ずることを述べている。Schostok¹⁹⁾ は局所麻酔で僅かな換気機能低下を来すことを報告している。Abrams²⁰⁾ は気管支痙攣は充影を妨げる因子の一つであることを報告している。Hewlett²¹⁾ は79例の造影施行例中7例に第4次以下の気管支に気管支痙攣を認め、この為これより末梢へ造影剤の欠損することを報告している。この場合痙攣の為末梢へ造影剤が入らないので第2次気管支附近に造影剤が止まり、その重力で同部気管支が拡張した様な形になるが、その形は眞の拡張像と異り、又気管支間の肺組織に異常がないので気管支相互の位置的関係は正常であること等により、その他の原因によるものと区別できると考えている。Holden²²⁾ は造影剤が肺胞内へ入る主な原因は深吸気で、強い吸気を行なうと重力に打勝つて造影剤が末梢へ入ると言っており、又所謂 Böhm²³⁾ の absent bronchus もその原因は吸気性吸引力の減退といわれている。著者の肋膜癒着

のある症例で肺胞像を示した例が多いことが認められたが、肋膜癒着の場合は一般に換気能の低下が認められており、(Bolt,²⁾ Hertz,³⁾ Marra,⁷⁾ Köster,¹⁾ 小高,¹¹⁾ 梅田¹⁰⁾), 吸引力が減弱しているにも拘らずこの様な肺胞像を示したことは興味あることである。Abrams²⁰⁾によれば重力が主に作用して入つたものと考えられ、造影剤の流入には重力が大きく作用することを示すものといえよう。

以上の如く充影不全については種々の報告をみるが、著者の観察では充影度と V.C. との関係は、V.C. 減少率-51%以上では全例高度の不完全充影を示し、又肺胞像を示した例が多いことを認めた。T.V. と充影度との関係は余り密接ではなく、M.B.C. と充影度との関係は不完全充影高度例及び肺胞像を示す場合は M.B.C. の低下著しく、15 l 以下の低値を示した。O₂-eq. と充影度では、充影不全高度症例及び肺胞像著明の場合は O₂-eq. の値が高く換気効率の悪いものが多いことが推定される。Lynne M. Reid²⁴⁾ は造影欠損乃至不完全は屢々細小気管支の狭窄、閉塞によつておこり、気管支壁の線維化、技術不良、分泌物による閉塞を考えるべきであると述べており、Nordenström²⁵⁾ は気管支領域が平等な呼吸能力をもつていと平等に造影されるが、或気管支領域に狭窄、拡張症或は病巣などがあつて呼吸能力が低下していると、その領域の気管支は十分に造影されない結果となると述べている。私は気管支拡張度と充影度との関係を検討した所、拡張のない場合は充影も完全であるが、拡張は著明でも完全充影を示す場合もあり、気管支拡張度と充影度との間には密接な関聯はみとめなかつた。気管支樹の変形と充影度との関係は気管支樹の変形が一葉以内に止まる場合にはよく充影されるが、変形が強い場合には不完全充影が著明となることを認めた。充影度と気管支鏡所見との関係をみると一般に異常所見のない場合の方が完全充影の多いことを認めた。次に気管支樹の変形の程度と肺換気能との関係についてしらべた所、V.C. 減少率と変形程度とはよく平行し、一側全域に亘る変形の場合は殆ど V.C. 減少率-71%以上であつた。併し変形が一区域内程度に止まる場合

も症例の $\frac{1}{3}$ は V.C. 減少率 -41~50%であり、気管支樹変形例の V.C. 減少率の高いことは注意を要すると考える。M.B.C. と変形の関係では、変形著明となるにつれて M.B.C. 値も又低値となることを認めた。T.V. と気管支樹の変形との関係では、変形のない場合は T.V. 正常値を示し、変形強くなると T.V. 低値を示した。O₂-eq. と変形とでは変形強くなるに従つて O₂-eq. が正常域より離れるものが多かつた。北村¹²⁾は高度気管支拡張は V.C. の著しい減少を認めたことを報告しているが、著者も拡張度との関係を検討し、拡張の度が強くなるのに比例して V.C. 減少率も強くなり両者の関聯は非常に密接であることをみとめた。又 V.C. と鏡所見との関係では異常所見ない場合は V.C. 正常値が多く、小野氏分類でⅡ、Ⅲ、Ⅳ型の順に V.C. 減少率は著明であつた。

以上気管支造影充影度及び気管支樹の変形と肺換気能とは密接な関聯を有することを認め、肺結核治療上特に手術適応決定上非常にお考になることが明らかとなつた。

V) 結 語

気管支造影像と同側換気能との関係を気管支鏡及びレ線病型を参考として追求し次の結果を得た。

1) 肺換気能と充影度との関係は、充影不全の度が強くなるのに従つて、肺活量、一回換気量、最大換気量、酸素消費量の値は夫々低下し、換気障害程度と平行関係を示した。

2) V.C., T.V., M.B.C., O₂-eq. と気管支樹の変形との関係は、変形高度となるに従い、各値は低下し特に V.C., M.B.C. 値は低下著明となり、密接な平行関係を示した。

3) 気管支拡張高度となるに従い、V.C. 減少率も高度となり、気管支鏡にて異常所見著明となるに従い、V.C. 減少も高度となつた。

4) 充影不全の度が強くなるに従つてレ線病型上主病巣、気管支樹の変形、気管支拡張像、病的鏡所見の程度も著明となることを認めた。

本論文の要旨は昭和33年9月、第7回国際気管食道科学会総会に於て発表した。

撰筆するに当り終始御懇篤なる御指導と御校閲を賜つた恩師戸塚忠政教授並びに種々御援助下された松岡正俊助教授に深謝致します。

文 献

- 1) K. Köster: Beitr. Klin. Tub. 109, 197-207, 1953. Ibid. 116, 5-14, 1956
- 2) W. Bölt et al: Beitr. Klin. Tub. 111, 317-334, 1954
- 3) C.W. Hertz: Beitr. Klin. Tub. 112, 446-453, 1954
- 4) John R. McDonald & R. Drew Miller: A.M.A. Arch. Path. 62, 454-467, 1956
- 5) Ernst O. Attinger et al: Am. Rev. Tuberc. 74, 210-219, 1956
- 6) F. Schmidt: Acta. tuberc. scand. 33, 366-386, 1957
- 7) A. Marra, L. del Torre: Arch. di Tisiol. 10, 266-280, 1955
- 8) P. Simmonin et al: Rev. Tuberc. 20, 547-558, 1956
- 9) 鈴木千賀志, 他: 呼吸器診療 13巻, 2号, 151-167, 昭33
- 10) 梅田博道: 日本臨床結核 15, 827-832, 昭31
- 11) 小高進: 胸部外科 9, 780-793, 昭31
- 12) 北村省三, 他: 結核の臨床 3, 52-54, 昭30
- 13) J. H. Comroe et al: Am. J. Roent. 75, 668-681, 1956
- 14) P. Tuiou et al: Sem. Hôp. 30, 183-189, 1954
- 15) 神津克己, 他: 呼吸器診療 12, 897-915, 昭32
- 16) K. Köster: Beitr. Klin. Tub. 116, 28-41, 1956
- 17) 矢嶋淳: 日本気管食道科学会会報 10, 4-12, 昭34
- 18) 矢嶋淳: 日本気管食道科学会会報 10, 13-18, 昭34
- 19) Schostok, P.: Thoraxchirurgie 1, 122-131, 1953
- 20) H. L. Abrams et al: Radiology 61, 317-326, 1953
- 21) T. H. Hewlett: J. Thorac. Surg. 33, 609-616, 1957
- 22) W. S. Holden: Brit. J. Radiol. 30, 530-536, 1957
- 23) F. Böhn: Tbk-Arzt 7, 258-267, 1953
- 24) Lynne M. Reid: Thorax 10, 199-204, 1955
- 25) B. Nordenström: Acta. Radiol. 44, 280-288, 1955

ABSTRACTS

The Bronchographic Findings and the Function of the Lung

Atsushi Yazima
Shinshu Univ.

The relation between the bronchographic shadow and function of the lung was investigated, making reference to the findings of bronchoscopy and x-ray examinations. It was found that degree of bronchial filling and deformation of tracheo-bronchial tree and the ventilation capacity of the lung are closely related to each other. The ventilation capacity is found decreased in proportion to the degree of filling defect, and the extent of the deformity of the bronchus.

A Study of Bronchial Secretion in Broncho-Pulmonary Tuberculosis (Report 3)

Otohiko Takayama, et al.
Nihon Univ.

A histological and bacteriological studies and the observation of pH fluctuation were made with bronchial secretion in broncho-pulmonary tuberculosis by instilling the streptomycin to the affected region for 10 month, and following results were obtained.

- 1) The pH of bronchial secretion was between 6.4 and 9.0, which is between slight acidity and alkalinity.
- 2) The pH of bronchial secretion was almost neutral in mild cases (the first and second stage), and it fluctuated from slight acidity to slight alkalinity in severe cases (the second and third stage). An ulcer was noted in the case of slight acidity and cavity or hypersecretion in slight alkalinity.
- 3) pH was inclined so approach to neutrality when treatment was given, but in ulcerative cases such tendency was not recognized.
- 4) In the mixed infection bacilli were abundant in alkalin reaction, and showed signs of