支の腺腫，右上葉気管支癌，Clagett の4例の気管腫瘍例等，腫瘍に対する修復も報告されているが，やはり悪性腫瘍に於ては予後不良のものが多い。然し乍ら今後，良性の腫瘍には大いに利用され，その予後も期待され得るものと考える。

結 語

- (1) 吾々は35才女子の頸部気管癌に柵状のポリエチレン製プロテーゼに皮膚弁を併用して造気管術を施行した症例を報告し併せて文献的考察を試みた。
- (2) 此の手術により気道の確保と云う点では満足すべき効果があつたが，悪性腫瘍の場合は猶予後が不良である。
- (3) 出来得れば Cat gut による断端吻合が望ましいが，その不能の場合は，移植法よりもむしろプロテーゼ法をとるべきである。
- (4) かかる手術を行う際には呼吸機能，心肺性動態，嚥下機能等を充分考慮に入れるべきである。

本論文中の要旨は日本気管食道科学会第8回総会に於て報告した。

文 献

- 1) Clagett, Grindley., Arch. Surg. 57 : 253, 1948.
- 2) Colley, F.: Deutsch. Zeitschr. f. Chir. 40 : 150, 1894.
- 3) Ferguson, D.J.; Ann. Oto-Rhino-Laryng. 57 : 875, 1948.
- 4) Gebauer, P.W.: Thorac. Surg. 22 : 568, 1951. and, J.A.M.A. 199, 1952.
- 5) Gebauer, P.W.: J. Thorac. Surg. 26 : 241, 1953.
- 6) Pressman, J.J.: Ann. of Oto-Rhino-Laryng. 62 : 791, 1953.
- 7) 河合：胸部外科，7：6，2.
- 8) 木本：臨床外科，7：111.
- 9) 菊地：日外雑，54回6：529.
- 10) 佐藤他：日胸外雑，3：2，94.
- 11) 西 他：肺，1：3，300.
- 12) 橋本他：日気食，6：1抄
- 13) 浜 他：日外雑，54回6：524
- 14) 福田 他：胸部外科，8：7，690.
- 15) 宮内 他：日胸外，2：268.
- 16) 牧野 他：日外雑，55回6：609.
- 17) 神津 他：胸部外科，9：11，1177.
- 18) 河合 他：胸部外科，9：11，1167.
- 19) 片岡 他：胸部外科，9：1207.
- 20) 中山 他：胸部外科，9：1182.
- 21) 岡 他：胸部外科，9：1200.
- 22) 松前 他：胸部外科，9：11，1191.
- 23) 道舛 他：胸部外科，12：1，27.
- 24) 道舛 他：日気食会，8：4，143.
- 25) 新井 他：日胸外，7：7，763.

頸部食道癌の診断と吾々の試みた 上部食道成形術について

* 吉 江 祝 正 上 野 幹
奥 村 日 貞 太

結 言

Carmody によれば 東洋人には特に頸部食道癌が多いとされているにも拘らず，早期診断，早期治療の機会は比較的少なく，既に周囲の組織に浸潤し，リンパ腺に転移するようになって始めて専門医を訪れる患者が多い。そのため本症の治療成績は極めて悪く，例えば胃癌，子宮癌

の治療成績に遙かに及ばない現況である。これは本症が各科の境界にある疾患であるのが一因でもあるが，又その早期診断の困難さ及び食道は喉頭等に比し比較的容易に周辺に浸潤を来す事に起因するようである。

食道癌の診断については幾多の文献に詳述されているように，早期に嚥下異常が出現するにも拘らず症状に消長があるため放置されている場合が多い。食道癌の確実な診断には食道直達

* 国立金沢病院耳鼻咽喉科

鏡検査を要するに贅言を要しないところであつて、可及的早期に診断を確定し、早期手術に訴えるべきである。この場合癌浸潤の程度、転移の有無等により手術方式を考慮しなければならない。Geuck は予後を良好ならしめるためには喉頭の全摘出術を必ず併用すべきだと述べているが、然し最近における診断学の進歩と相俟つて手術の侵襲を可及的少なくして根治せしめるよう考慮すべきである。

吾々は嚥下困難を主訴とした症例において食道直達鏡検査並にレ線検査、殊に断層撮影により、腫瘍はいまだ食道内に限局せるを確認した上、喉頭に侵襲を加えることなく、下咽頭並に頸部食道の横断切除術を施行し、摘出部に有茎の粘膜及び皮膚瓣によつて新食道を成形し、ほぼ満足すべき結果を得たので茲に報告する

実験症例及び治療経過

患者： 53才 女 農業

初 診：昭和28年12月22日

主 診：嚥下困難

家族歴：遺伝的関係において特記すべきものを認めない。

既往歴：生来健康で著患を知らない。

現病歴：昭和28年4月、餅を食べた時に軽度の通過障害を感じたが、疼痛はなく、間もなく普通に食餌が摂れる様になつた。その当時某医に診断を受けたが、特に心配はいらないといわれたのでその儘放置していた。昭和28年11月初旬から食餌の通過障害が著明となつてきた。昭和28年12月20日蜜柑を食べていると咽頭に引かかつたので某医に受診、異物として蜜柑が摘出され、その際食道壁の腫脹が強く、腫瘍が疑わしめたので当科へ紹介されてきた。嗄声及び咽頭、喉頭における疼痛はないが、嚥下困難、殊に固形物が食べ悪いという。

現 症：

(1) 全身所見 体格良好、栄養稍々不良、平温平脈、皮膚及び可視粘膜に貧血を認めない。顔貌正常、口腔正常、舌軽度の白苔形成、心肺共に正常、腹部、四肢異常なく、膝蓋腱反射正常。

血液所見 白血球数7800、赤血球数426万、ザ

リー75%、白血球分類概ね正常、血中梅毒反応、ワ氏、村田、カーン反応共に陰性。

尿 病的所見を認めない。

糞 潜血、虫卵ともに陰性。

(2) 局所所見 上中咽頭ともに正常、下咽頭下部から食道入口部の粘膜浮腫状軽度に腫脹、声帯の運動正常で発赤、腫脹は認めない。頸部に著明な淋巴腺の腫脹は認めないが、左胸鎖乳頭筋内側下部に硬く太い索状腫瘍を触知する。

直達鏡検査 咽頭、気管ともに正常、食道入口部の粘膜軽度浮腫状に腫脹するが発赤はない。更に約1.0 cm 管を挿入すると、食道腔は腫瘍状組織をもつて充満されている。腫瘍表面は顆粒状、凹凸不平、貧血性、出血し易く脆弱である。新生物の発生部位は食道左壁の如く此の部の腫脹が最も強く、浸潤は殆んど全周に及んでいる。新生物下部の食道の状況は直達鏡では精診は困難であつた。

レ線検査 透視によると、食道は頸椎Ⅶ—胸椎Ⅱ迄の間の管腔著しく狭窄し、造影剤を僅かに通過させる程度である。

矢状経によるレ線撮影によると、頸部食道の陰影強く、その辺縁は比較的明瞭で、喉頭を前方へ圧排しているのがみられる。

断層撮影 喉頭は頸部食道によつて右方に押されている。甲状軟骨の左縁の像が稍々乱れていて右側に比べてはつきりしない。食道が少しく左方へ移動している。左甲状軟骨左縁が乱れているのは食道の陰影と重なつたため、腫瘍は尚お食道内に限局し、喉頭、脊椎等には浸潤せざるものと診断した。

臨牀診断：頸部食道癌

治療経過：昭和29年1月6日入院、1月8日 Witzel 氏法により胃瘻造設術を施行。栄養を多少恢復せしめた後、1月22日頸部食道切除術を行つた。手術は0.2%ペルカミン局所麻酔、左頸部、胸鎖乳頭筋の前縁にそい、約10.0 cm 皮膚切開、甲状腺、甲状軟骨外側縁を鈍的に剝離、進入、硬く索状に腫脹した食道に達す。

硬く腫脹した食道壁と喉頭、気管及び脊椎の間には癒着は殆んど認められず容易に鈍的に剝離することが出来た。食道入口部より胸骨直上部に及ぶ硬い浸潤性結節性食道を露出、健康と

思われる部に於て切除。切除した食道は、長さ8.0cm、直径1.8cm、外側面平滑である。これを縦切し、内側を見ると増殖性腫脹は左側に強く、右側に少々軽度であるが全周に亘り、管腔は新生物により殆んど閉鎖し、その表面は米粒大から大豆大腫瘤多数簇生している。

新食道の成形 (1)右側壁は咽頭粘膜の有茎皮膚瓣を作り、食道切除腔右壁へ縫合固定、(2)前壁即ち喉頭及び気管後面は、皮膚切開創前縁に添い大なる皮瓣を作り、上部を遊離、これを縫合固定、(3)後壁は前壁と同様に有茎皮膚瓣を作り、下縁を遊離、脊椎前面に縫合固定、(4)左壁は食道の一部を更に遊離し、一部を残し輪状に切開、有茎皮膚瓣を作り、創内より胸鎖乳頭筋の前面に縫合固定。以上のように粘膜及び皮膚瓣を創内の殆んど全部に移植してから、ガーゼタンポンを施行、開創のまま本手術を終つた。

3日後第一交換、以後隔日交換。11日後は毎日1回繃帯交換、術後約40日、粘膜皮膚瓣とにより癒着、上皮形成完了するを待つて、3月5日、第二次食道成形術を施行、頸部食道管を作り、内側の縫合は総て〇〇番の縫線を使用した。口腔から直径1.0cmの胃管カテーテルを挿入、固定した後、筋膜、胸鎖乳頭筋等夫々切開創前後縁を引寄せ縫合、更に皮膚縫合を施行した。術後一週間目、皮膚の抜糸、10日後胃管カテーテル除去。除去直後直達鏡を以て検査するに、縫合創は良く接着し、新食道腔は広く清潔であつた。よつて流動食を与え、爾後粥食、固形物のある食餌とかえ、経口的に食餌が摂取出来るようになったので胃瘻を閉鎖し、手術を全部完了した。

組織学的診断：切除せる食道から組織片を取り、法のように固定、パラフィン包埋、ヘマトキシリン、エオジン複染色により組織標本を作り鏡検するに、腫瘍組織と結締組織とは明らかに区別され、蜂窠状の構造を有し、顆粒細胞及び基底細胞の増殖が著明で腫瘍細胞の排列は、外部より基底細胞層、胚種様並に顆粒層、最内部に角質層を認め、角質層は多くは求心性重層に赤染せる、癌真珠の像を示している。結合組織の部は線維の走行錯雑し、核は紡錘形、楕円形、円形等種々にして、硬性線維腫に一致する

様な像を示している。

以上によつて、定型的扁平上皮癌(Kankroid)と診断した。

総括並に考按

食道癌は食道疾患の中、最も重要なものである。食道狭窄を来す大多数は食道癌による場合が多く、殊に40才以上の患者で食道狭窄があり、更に食道異物を生じた場合、異物の直下に癌腫を発見する機会が多いとされている。本症例では数ヶ月前、嚥下困難があり受診するも、著しい変化は認められず、その儘放置、軽快していた。その後通過障碍著明となり、食道異物を生じたので受診、食道異物の直下に癌腫を発見した一例である。

食道癌には食道内壁に初発するものと、食道外に発生し、食道へ浸潤、増殖して来るものがある。本症例では食道入口部、第一狭窄左壁の食道管腔内に発生し、腫瘍性に管腔内に増殖、壁内に限局せる癌腫であつて、組織標本により定型的扁平上皮癌と診断された。

この診断を行う場合、食道直達鏡により確認を得られたことはいう迄もないが、その浸潤の程度については、頸部の触診、更にレ線検査、就中断層撮影はより有効であつた。これより吾々は喉頭に手術の侵襲を加えることなく頸部食道切除術の指示を得られたものと思う。

胃瘻造設 食道を切除する場合必ずしも必要としないという学者と、作成した方がよいという学者とがある。本症例ではこれを作成し、そのため栄養を恢復せしめ、体力を低下せしめることなく手術を遂行することが出来た。

皮瓣の問題 昔時は専ら皮膚瓣を使用したが、伸展性が小さく、瘢痕狭窄を起し易いので、粘膜瓣を用い新食道を成形する様になつて来た。殊に最近では金鋼又は合成樹脂で食道の型を作り、口腔、咽喉粘膜の遊離皮瓣をもつて新食道を成形する法等が発表されている。この方法は理想的ではあるが、余り大胆すぎて皮瓣の壞疽に陥る危険がある。本症例では有茎粘膜皮瓣と有茎皮膚瓣とをもつて成形を試みた。即ち食道の前、後壁は皮膚瓣、右側壁は咽頭粘膜瓣、左側壁は食道断端上部に有茎皮瓣を作り、

胸鎖乳頭筋前縁に植皮し、後日第2回成形時にこれを新食道左内壁とした。このようにしたので伸展性は充分といえない迄も、ほぼ満足すべき結果を得た。有茎皮瓣としたので瘻道を来すおそれもなく目的を達することが出来たものと考えらる。

結 語

本症例は53才の農婦、約半年前に食餌の通過障害を訴えたが、放置しているうち少々軽快した。最近に至り嚥下困難は強くなり、摂取した蜜柑が食道異物となつたのでこれを摘出した処、異物直下の粘膜の腫脹が強く、精診により頸部食道癌と確診された。

本症の診断には食道直達鏡検査は最も重要であるとともに確実なる方法である。更に腫瘍の大きさ、形状、就中周囲への浸潤の状態を知るには、レ線検査、殊に断層撮影が有効である。吾々は前述の諸検査の結果、本症例はなお手術の適応の範疇にあるを確めた上、喉頭に手術の侵襲を加えることなく比較的容易に、下咽頭、食道入口部を含む頸部食道の全切除に成功した。

新食道の成形には、左右壁は有茎粘膜瓣、前後壁は有茎皮膚瓣により植皮、第二次成形により、新食道を完成し、所期の目的を達すること

が出来た。

組織検査により、本腫瘍は定型的扁平上皮癌と診断した。

本論文の要旨は日本耳鼻咽喉科学会第108回北陸地方会において述べた。

拙筆にあたり御指導、御校閲を賜りし、当院 種村院長、金大松田教授に深謝する。

なお種々御示教下された故 金大 宮田教授並に当院放射線科医長奥原博士に感謝する。

文 献

- 1) A Denker u O. Kahler : Handbuch d. H.N.O.H. IV 212 (1929)
- 2) J.J. Conley : A.M.A. Otolaryngology. 58 (6) 645 (1953)
- 3) Kirshner : Operationslehre. V 428 (auf2) (1953)
- 4) 山川強四郎 : 日耳鼻全書 4 (1) 30 (1953)
- 5) 鳥居恵三、金野巖 : 耳鼻咽喉科学 428 (23年版) 南山堂
- 6) 原勇三 : 最新外科手術の実際 265 (8版) 南山堂
- 7) 後藤修二 : 手術 2 (11) 467 (1948)
- 8) 相戸貞一、山岸正弥 : 手術 3 (12) (1949)
- 9) 福田保 : 手術 5 (10) 503 (1951)
- 10) 兵井、菅野誠、小田哲雄 : 耳鼻臨林 41 (1) 37 (1954)
- 11) 小野譲 : 日耳鼻 51 (5) 141

喉頭に原発せる Schwannoma の一例

* 白 岩 俊 雄 ** 渡 部 三 郎

*** 川 村 一 技

喉頭の良性腫瘍としては、乳頭腫、線維腫、嚢胞、粘液腫等が臨床的に比較的多く見受けられるが、広義のNeurinomaが原発したという報告は至つて少ない。我々は喉頭に原発した極めて稀な Schwannoma の一例に遭遇したので報告する。

症例：23才の女子

* 東京医科大学教授 ** 講師 *** 助手

主訴：高度の嚙声と呼吸困難

既往歴：2年前に同じ様な症状があり、九州の某県立病院で受診したところ、喉頭に腫瘍があるといわれた。そこで直達鏡下に腫瘍の手術を受けて一応症状は軽快したが、摘出した腫瘍については、九州の某大学で病理組織学的に検査の結果、はつきりした診断がつかなくつたとの事である。従つて腫瘍がどの程度迄切除され

ebbing with alteration from neutrality to acidity.

- 5) When the secretion showed alkalin reaction, many polynuclear leukocytes and histiocytes were present. However, they were decreased as it approached to the neutrality.

A Case of Plastic Operation for Cancer of the Trachea

Yasuhiko Hashimoto, et al.

Nihon Med. School

A case of the trachea in a 35 year old woman in whom polyethylen-protese tube combined with skin flap was applied is reported, and survey on the literature made.

End to end anastomosis is desirable for the operation of this kind, but if this could not be carried out, the protese is preferable to grafting.

The prognosis of this case is of course to be guarded. However, for the insurance of air-way it had met the expectation, so that this method is considered to give promising result for the treatment of benign tumors, tuberculous cicatrization and traumatic stenosis.

The Diagnosis of Cancer of Cervical Oesophagus and its Plastic Operation

Chikamasa Yoshie, et al.

Kanazawa National Hosp.

53 year old farmer's wife complained of temporary disturbance of swallowing, six months ago.

Recently the symptoms recurred.

On examination a foreign body was found and this was removed. At the site of foreign body lodgement there was found a tumor which upon biopsy examination proved to be carcionma.

By tomography which is of value to delineate the extent of infiltrative tumor to adjoining tissues, it was decided that this case was still within the indication of operability, so that total excision of cervical oesophagus including hypopharynx and the orifice of the oesophagus was successfully carried out without damaging the larynx. For the plastic

operation of the oesophagus, skin pedicle from the margin of incised wound was utilized for the anterior and posterior wall, and oesophagial mucous membrane for the left and pharynx mucous membrane for the right lateral walls.

Skin graft was applied on all of the operated field and the wound was kept open. New oesophagus was constructed by second plastic operation.

A Case of Schwannoma Arising Primary in the Larynx

Toshio Shiraiwa, et al.
Tokyo Medical School

Schwannoma is rare occurrence as a benign tumor arising primary in larynx.

A 23 years old woman who visited the hospital with complaint of dyspnea and hoarseness, was found to have a large tumor in the larynx which occupied half of the cavity.

The tumor was incised after opening into the hypopharynx, and it was found that the tumor had sprung from aryepiglottic fold.

The tumor was smooth, elastic, hard and quail's egg size, and the histological examination showed that it was neurinoma, that is to say, schwannoma.

The patient maintained a normal laryngeal function without disturbance in swallowing although the epiglottis was incised from its root.

A Case of Laryngeal Haemangioma and its Documental Survey Summary

Jo Ono, et al.
Keio University

A case of laryngeal haemangioma was reported.

The cause in this case was considered to be the trauma of the neck through traffic accident.

A survey was carried out on the basis of the statistics reported between 1945 and