Tracheopathia chondro-osteoplastica について

* 高山 乙彦   ** 石山 英一
*** 村上 嘉彦   **** 伊藤 克彦

I. 緒 言

骨および軟骨形成性気管症 (Tracheopathia chondro-osteoplastica) は、元来無症状に経過することが多く、剖検時に偶然発見されたり、肺結核やそのほかの気管・気管支病変を疑い内視鏡検査を施行した際に偶発的に発見されたりすることが多い。したがって本症が、はたしてどの程度の頻度で発現するものかは明かでないが、本邦の文献に関する限りではその報告例数はきわめて少く、はなはだ稀な疾患に属するものと考えられる。すなわち臨床例としての報告では、城所・湯浅 (1938), 林・林田 (1957), および山崎・児玉 (1959) の各 1 例ずつをみるのみで、ほかに剖検例として松本 (1941), 松島 (1939) の報告各 1 例ずつを加え、計 5 例を数えるだけのである。

私共は、最近血痰を主訴として外来を訪れた 1 患者に内視鏡検査を施行した結果、偶然明らかに本症と思われる症例に遭遇する機会を得たので、ここにその大要を報告したいと思う。

II. 症 例

患者：■■■■■，40才女子，主婦。

初診：昭和34年3月9日。

主訴：血痰，時に喀血。

現病歴：患者は昭和33年5月中旬，婦人科において子宮腔部糜爛の手術を受けて以後，月経時に一致して血痰を認めるようになり，同年10月頃からは月経時以外にもこれを見るようになった。さらに昭和33年末頃から頸部の圧迫感と共に喉頭部の軽度の違和感ないし閉塞感をも自覚するようになったが，これらは特に増悪することなく続いているという。また時折，発声が全く困難になることがありこの際は軽度の呼吸困難があるというが，重篤な状態となつたことはない。出血量は漸次増量してくる傾向があ

り，回数も33年よりも34年に至り頻繁となり，時には喀血様の所見を呈したと訴えている。血痰喀出の際は軽度の咳嗽を伴ない，喀出血液にはしばしば咆沫を混じ，一般に鮮紅色を呈するという。一方全身的に病状が比較的軽度で，わずかに33年に比較してやせたようだと云い，時には軽度の熱発や倦怠感を来すが持続的でなく，食思，睡眠，便通等もほぼ正常である。

既往歴：前述の婦人科疾患のほかには，生来健康で著患を知らず，結核性疾患の既往もない。

家族歴：父母共に健在，同胞 6 人，小供 4 人ですべて健在である。家族的に結核性疾患，奇形などはない。悪性腫瘍は母方叔父に一人胃癌で死亡した例がみられるのみである。

現症：耳鼻科的一般所見では鼻腔に中等度の萎縮性鼻炎像をみる以外著変なく，口腔，咽喉頭にも出血点と思われる所見は認められなかつた。全身的には体格，栄養中等度にて，皮膚粘膜には貧血その他の異常所見なく，胸腹部も理学的に著変を認めなかつた。脈搏，体温その他にも異常はなかつた。

諸検査成績：血液一般検査では赤血球 401×10^4 ，血色素量 14.6g/dl，白血球数 7300 で，血液像にも特別の変化はない。血沈値は 30 分 2，1 時間 6，2 時間 13 であつた。出血時間および凝固時間はそれぞれ 2 分 30 秒および 9 分，Rumpel-Leede 現象は陰性でいずれも，正常，血圧は 130—80 であつた。血液ワ氏反応は陰性，肝機能も正常範囲内にあり，喀痰検査でも，結核菌や肺デストマ卵等は証明しなかつた。

次で出血点を見出すべく直達喉頭鏡検査および気管支鏡検査を施行した結果，次のような特異な所見を見出すに至つた。すなわち，喉頭所見では全く異常を認めなかつたので，引続き気管支鏡管（内径 0.7cm）を挿入しようとしたところ，声門下約 5 cm の部分，門歯列より約 19cm の部分で，気管両側壁が半球形に発赤腫脹して鏡管の挿入を拒み，極めて硬くかつ出血性のほぼ対称的な腫瘍状隆起を形成していた（第 1 図スケッチ）。鏡管挿入不能のため，そのまま頭位を懸垂位として詳細に観察するに，その隆起はさらに下部に延長するもののように，側壁の

* 日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：中村 四郎教授）講師

** 同助手   *** 同助手   **** 同助手

第1図 気管支鏡所見スケッチ

声門下約5cmの部分、門歯列より約19cmの部分で、気管両側壁が半球形に発赤腫脹を示す。

みならず前壁にも小隆起を認め、かなり下方まで凹凸不平な粘膜面を示しているものと思われた。またさらに下部への鏡管挿入を企て、小児用鏡管（内径0.5cm）の使用を試みたが成功しなかった。そこで鏡管挿入をあきらめ、腫脹部分の組織学的検査を試みようとして、試験切片を採取すべく諸種の鉗子を用いたが、表面が平滑な上に硬固（knochenhart）なるために鉗子がすべり、採取不能であるのみでなく、出血もかなり多いため中止し、次回にこれを行なうことにした。

第2図

この間、喉頭および気管部の高压レ線撮影を行ない、この腫脹による陰影の有無を検したところ、第2図に示すように、喉頭下部より下方の部分で凹凸不平な陰影面を呈し、これが延長している像が認められた。その陰影の下方への拡がりには、レ線写真不鮮明のため判然としないが、かなり下部にまで延長しているものと推定された。なお、既に行なわれていた胸部レ線撮影でも異常は見出し得なかった。

以後数回の気管支鏡検査を重ね、組織切片の採取を企てたが、いずれも不成功に終わったため、腫脹部分より smear を採り検査したが、後に述べるように赤血球以外は特別の細胞を検出し得ず、確定的な最終診断は未だ得られないまま今日に至っている。幸い患者の一般状態や局所的な苦痛がほとんどなく、特に増悪の傾向を認めないので、現在は経過観察中であるが、機会を得たら切片採取のためにいろいろな器具を使用して確定的な組織診断を得たいと考えている。

以上のような特異な肉眼的所見と諸検査成績から、確定的な組織診断は未だ不能ではあるが、文献上からも恐らく Tracheopathia chondro-osteoplastica の1症例に間違いないものと考えられるので、ここに本症例を提示した次第である。

Ⅲ. 考 按

この気管内壁にみられる多発性の骨および軟骨増生を呈する疾患については、Wilks (1858) により始めて記載され、これを臨床的に始めて発見観察したのは Schrötter (1899) である。この疾患に対し Tracheopathia osteoplastica の名称を与えたのは Aschoff (1910) で、これに更に Landsberg (1914) は軟骨新生の意味も含めて Tracheopathia chondro-osteoplastica と称することを提唱したが、この両者が現在最も普遍的な名称とされているようである。以来、その所見および成因について欧州においてはかなり多数の記載があり、剖検例のみでなく臨床報告例もかなりの数にのぼり、これに対し治療まで加えられているものもあるが、本病変の本態に関する学者の見解は、互いに分岐し対立しており、その成因を結論づけるような統一された説

は見当らぬようである。これまで記載された諸説を大略分類してみると、①腫瘍説、②慢性炎症説、③組織奇形、④その他の説、とすることができるようであるが、これらのおおの説には病理学的にいろいろの矛盾を来すため發展せずに終るものも多く、多くの変遷を経て、現在では気管粘膜下層の組織奇形説が有力とされているが、この説明をめぐつても学者の見解は必ずしも一致していないようである。

本症病変の所見としては、気管粘膜下に多数の骨および軟骨組織が新生されるもので、通常粘膜表面には著変なく、気管の中部に発生することが多いとされているが、気管全体や気管支、喉頭下部にまでおよぶこともあるという。大さは米粒大以下のものが多いが、時に部分的に症状結節状にかなりの大きさに達することもあり、数も多くて密に存在するときはヤスリ状の外観を呈することがあるという。年令的には30才以上の成人が主で、性との関係は女性に多いという説もあるが確定的ではないようである。臨床的には既に緒言においても言及したように、ほとんど自覚的な訴えがないため、偶然の副所見として観察されたものが多く、従来の報告の多数は剖検例によつて占められている。

また、本病変の組織学的所見としては、新生された軟骨組織は、最も幼若期の弾力性軟骨で、気管軟骨の硝子様軟骨とは異なるが、骨組織の方は、長い間存在するものでは中心に骨髓腔を有する真の骨組織であり、症例によつてはそのいろいろの段階のものがみられるといわれる。私共の症例では前述のように試験切片採取が不成功に終つているため、その組織学的所見を比較して述べることができないのは非常に残念に思う。

また本症の肉眼的所見について、Freundによると次の2型に分けられるという。すなわち

- ①粘膜が網状ないしなわ梯子状を示すもの（軟骨生成の多い場合）。
- ②粘膜が多数の小結節状、症状、橢状、ないしは山脈状に隆起しているもの（骨増殖の強い場合）。

そして①は②よりも稀で、②が大部分を占めるが、本邦報告症例もすべて②に属しており、

私共の症例も明かに②型である。肉眼的には、城所・湯浅報告例は本症例とやや似ているが、色調や出血性の点で相異を認める。また松島報告例と松本報告例の両剖検所見や林・林田報告例と山崎・児玉報告例の両臨床所見も同様、Freundの②型に属するものと考えられるが、肉眼的に私共の症例とは異なり、米粒大ないしはそれ以下の小結節状隆起が、気管、一部は気管支内壁に播種状にみられるものである。

なお、既にふれたように、本症発現に関する見解として慢性炎症による刺激説が試みられた際に、本症に気管オツエナ、気管梅毒、肺結核、肺炎、気管支炎等の合併した症例の記載があり、Schnitzer (1918) によれば、70余例中 $\frac{1}{4}$ 症例において気道およびその周囲に慢性炎症像を伴なつていたと述べているが、本症例においても萎縮性鼻炎像を認めており、これらの点に関しても本症発現の究明に関する研究の余地があるのではないかと考えられる。

またさきに私共の教室では、萎縮性鼻炎の骨変化に着目して血漿蛋白分画に関して研究したが、高度の萎縮性鼻炎においては分画中に γ -globulinの増加を認めた。よつて本症例においても血漿蛋白分画の測定を行なつたが、第1表のように特に正常範囲を逸脱した結果は得られなかつた。

また、前述のように本症例の気管smearを、Papanicolaou染色した検査成績と正常気管分泌物検査成績とを比較すると第2表に示されるように、本症例では多核白血球の軽度の増多と赤

第1表：血漿蛋白分画値測定検査成績(TISELIUS)

	本 症 例	正 常 例 (平井・島尾氏による)
TOTAL P.	8.5g/dl	7.0~7.4g/dl
AL.	56.8%	52.3~56.2%
α GL.	6.3	6.0
β GL.	9.5	12.1~14.6
ϕ GL.	11.1	5.8~7.3
γ GL.	16.3	19.1~22.9
A/G	1.32	1.10~1.28

第2表：気管分泌物検査成績（細菌および細胞成分）

	細菌検査		細胞学的検査									
	一般	結核菌	円柱上皮	扁平上皮	多形核白血球	リンパ球	単球	好酸球	赤血球	組織球	巨細胞	細
本症例	-	-	+	-	+	+	-	-	卅	-	-	-
正常例	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-

注 細菌は塗抹・培養細胞成分は塗抹(smear), Papanicolaou 染色による。

血球を多数認めたに止まり、軽い炎症症状を呈する以外は著しい変化はみられなかった。さらに smear の細菌学的検査でも陰性を示していた。

Ⅳ. 結 語

私共は、血痰時に喀血を主訴として来院した40才女子患者に対し、気管直達鏡検査を施行したところ、いわゆる Tracheopathia chondro-osteoplastica と思われる稀有な所見を得たの

で、この症例に関しその所見を呈示すると共に、本症に関する若干の文献的考察を追加した。

本稿の要旨は、昭和35年11月5日日本気管食道科学会第12会総会（於伊勢市）において発表した。

稿を終るに当り恩師中村四郎教授の御校閲を深謝いたします。

文 献

- 1) 域所・湯浅：日耳鼻会報；44巻，12号，P.2328。
- 2) 松島：東京医誌；3127号，P.787。
- 3) 松本：日耳鼻会報；47巻，5号，P.631。
- 4) 林・林田：日気食会報；8巻，1号，P.28。
- 5) 山崎・児玉：耳鼻と臨床；5巻，2号，P.120。
- 6) 久保：日耳鼻全書；3巻，4冊，P.11。
- 7) 高山・石山：日気食会報；10巻，4号，P.231。
- 8) 高山・山崎他：未発表（萎縮性鼻炎の血漿蛋白分層について）。
- 9) Denker u. Kahler：Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde；Band III，s.242。

新しい口中殺菌剤

C I B A

文献はチバ製品より送呈

成 分：本剤は1錠中 β -フェノキシ-エチル-ジメチル-ドデシル-アンモニウムブロマイド0.5mgを含有する。

適 応 症：口腔および咽喉内の炎症およびカタルの治療と予防。
 咽声、口内炎、咽喉炎、扁桃腺炎の治療と予防。
 扁桃摘出・抜歯前後に発生する敗血性諸疾患の予防。

特 長：本剤の有効成分は、ほとんど無味であるが、製剤は軽度の芳香を有する口中錠として提供されている。
 うがい液は100倍にうすめて使用する。

包 装：口中錠 20錠 100錠 うがい液 20cc 200cc

オラドル うがい液
 口中錠

チバ製品株式会社
 大阪市北区万才町50番地

武田薬品工業株式会社
 大阪市東区道修町2丁目2番地

for microscopic examination. The specimen showed thyroid tissue.

Acute symptoms of esophageal perforation followed immediately after the biopsy.

The acute symptoms were abated. One later. Cancer was subsequently discovered just below the thyroid swelling by esophago tomy.

The esophagus-cancer was coscathed by thyroid swelling. It was impossible to discover it with esophagoscopy.

A Case of Tracheopathia chondro-osteoplastica

Otohiko Takyama, Yoshihiko Murakami,
Eiichi Ishiyama, Katsuhiko Ito

From the Department of Otorhinolaryngology, Nihon University School of Medicine

Authors unexpectedly observed unusual findings similar to the so called Tracheopathia chondro-osteoplastica on a patient, female aged 40, who recently visited the Outpatient Dept. of Oto-rhinolaryngology at Itabashi Hospital of Nihon University with complaint of bloody sputum, and an examination of bronchoscopy was performed.

The authors herein report this case and attempt to give some considerations to literature of this disease.

Clinical Studies of Broncho-genic Pulmonary Cyst

Suetoku Asai, M. D. and Shigeto Ikeda, M. D.

Surgical Department, School of Medicine, Keio University

Clinical studies have been made upon 10 cases diagnosed as bronchogenic pulmonary cyst according to Kumagai's classification. The 10 investigated cases are comprised of 2 cases of solitary cyst. 5 cases of them underwent pneumonectomy and other 5 cases were lobectomized.

Clinical findings of these cases of bronchogenic pulmonary cyst in comparison with those of cases of bronchiectasis are as follows :

1) As to subjective symptoms, cases of bronchiectasis generally complain of accumulated sputum and cases of bronchogenic pulmonary cyst

of ten either have no complaint of sputum or fall into suddenly developing dyspnea in their twenties.

2) In radiological findings, cases of bronchiectasis generally show accentuated linear shadow consisting of pulmonary vessels and bronchi radiated from hilum, and cases of bronchogenic pulmonary cyst generally show honey-comb like shadow.

As to indication of the surgical treatment for bronchogenic pulmonary cyst, pulmonary resection is considered to be effective with consideration of pulmonary function in cases with remittent inflammation or with cysts scattered widely in the unilateral lung.

Treatments of Inflammatory or Neurotic Horseness.

S. Aihara

Tokyo Woman Coll.

Group A : predonin

The patients consisted of 7 cases of chondritis nodosa, 6 cases of laryngeal polypus and 5 cases of prolapsus ventriculi laryngis, among which 15 cases are cured.

Group B : ATP

The patients consisted of 7 cases of internus-paresis. 2 cases of phonasthenia, 3 cases of chronic laryngitis, one case each of functional aphonia and total paralysis of the recurrent laryngeal nerve.

As the method of treatment, ATP 200mg was used in one course.

All cases showed alleviation or recovery.

Esophagosopic Views of the Thoracic Esophageal Diverticula

Seiichi Kawata and Okio Mukuno

From the Department of Otorhinolaryngology (Director : Prof. S. Kawata, M. D.), Kyushu University

The authors performed esophagosopic examination in the cases of thoracic esophageal diverticula and classified into three types according to esophagosopic views.

In the first type a pouch diverged from the esophageal lumen, the entrance of which was slit-shaped or oval, and there was a carina between the esophageal pouch diverged from the lumen