シンポジウム A

頸部食道の成形

* 向野 興雄

1. 緒 言

頸部食道癌の全摘出術後、切除した頸部食道を再建する方法としては、二次的食道成形術と、一次的食道成形術とがある。

二次的食道成形術としては Gluck-Soerensen の術式を基本として若干の変更を加えた手術法が広く行われ、その他 Watson 法、Brunschwig-Camp 法、岩本教授の皮膚索法、福田教授の Z 縫合法、中村教授の有茎皮弁及び皮膚棒法、広戸教授法等が考案実施されている。

この二次的食道成形術では

1. 食道切除術後並に食道成形術後の危険な合併症の発生を防止出来る。
2. 食道成形に際して重大な失敗が稀である。
3. 新食道の瘢痕狭窄の発生も少い。
4. 食道成形迄一定期間局所の再発監視が容易である。

等の利点が挙げられている。しかし又

1. 食道成形迄にかなりの長時日を要し、従つて栄養補給は長期間に亘つてゴム管栄養法、又は胃瘻によらねばならない。
2. 咽頭より唾液が流下、漏出するため、術創の治癒が遷延し、或は頸部に皮膚炎を起す結果、後療法に手数を要し、且つ食道成形の実施を遷延させる。
3. 放射線の術後照射療法が、食道成形前には、皮膚炎の存在、その他の理由で多くは実施困難であり、食道成形完了後では所謂術後照射としての意味がなくなり、癌腫の治療としての面からも問題がある。
4. 転移形成、再発等により食道成形の時期を失うことが少くない。

等の欠点がある。

従つて一次的食道成形術は、色々の面から医療担当者及び患者の双方にとつて望ましいことであつて、近年この方向に向つても諸家の努力

が払われ、種々の方法が考案実施されている。即ち食道切除部に遊離皮弁を Polyethylene 管、Latex stent tube 等に纏絡して用いる方法、Asherson、岩本教授等の軟骨を除去した喉頭及び気管を使用する方法、広戸教授、Som 等の喉頭前半と遊離皮弁を用いる方法、及び外科家により消化管、例えば空腸、結腸、或は胃を用いる方法等も行われている。

2. 九大耳鼻咽喉科学教室に於ける術式及び成績

我教室にて過去10年間に、下咽頭頸部食道癌(梨状陥凹及び輪状軟骨後部の癌を除く)の手術的療法を行つた患者は第1表の如くであつた。

第 1 表

年度 (昭和)	頸 部 食 道 癌				喉頭癌再 発切除後 の食道成 形
	総例数	一次的 食道成形	二次的 食道成形	食道成形 中止又は 未実施	
28	1			1	
29	2		2		3
30	7	5	1	1	1
31	4	3	0	1	1
32	0	0	0		
33	1	0	0	1	
34	3	2	1		
35	2	1	1		
36	5	2	1	2	
37	3	0	2	1 (治療中)	
計	28	13	8	7	5

一次的食道成形術の適応症としては、腫瘍が頸部食道の主として後壁に位置し、前壁が侵されていないもの、上端は食道入口部を越えず、頸部の触診にてリンパ節腫脹なく、甲状腺に異常を認めない症例を選び、喉頭気管を食道に代用する術式を行つている。これは頸部食道を切除すると、喉頭を保存しても通常嚥下障害の結果、食物の気道への誤嚥を来し易く、従つて喉頭に病変が波及していないものでもこれを気道として保存残置することは、肺合併症を越す危険もあつて有害であるので、喉頭気管を食道として利用するのである。本法では術前に全身状態不良のもの、即ち衰弱、貧血等の認められる

* 九州大学医学部耳鼻咽喉科学教室
助教授(主任 河田政一教授)

症例は、一次癒合が困難で瘻孔形成、合併症の続発等を来す場合が多いので、適応症決定にあつては慎重を要する。

腫瘍の発生部位、進展状況により腫瘍と共に喉頭の摘出をも必要とした症例に対しては、二次的食道成形術を実施している。しかし喉頭全摘出を併せ行つた症例15例のうち、転移形成、再発等のため食道成形を完了し得なかつたり、実施し得なかつたものが6例あつた。従つて現在治療中の1例を除くと二次的食道成形術を行つた症例は8例であつた。

又喉頭癌のため喉頭全摘出術を行つた後、下咽頭、食道に再発を来し、再発腫瘍摘出のため食道の切除、或は大なる食道欠損部を生じた5例にも皮膚索による食道成形を実施している。

第2表 二次的食道成形術

症例	年令	性	食道成形術式	切除より成形着手	成形より摂食	切除より摂食まで	転 帰
62	♀		皮膚索法	26日	112日	138日	リンパ節転移1年8ヶ月死
48	♀		"	22	97	119	不明
61	♂		"	0	111	111	不明
55	♀		Watson法	46	15	61	舌癌1年8ヶ月死
68	♂		Watson法皮膚索法	61	145	206	局所再発1年1ヶ月死
69	♂		併用法	26	94	120	下部食道癌8ヶ月死
64	♀		"	27	96	123	健7ヶ月
53	♀		"	40	87	127	健5ヶ月

我々の行つた二次的食道成形術の術式は第2表の如く皮膚索法3例、Watson氏法変法2例、及び私の考案した併用法3例である。食道切除

術実施後、経口摂食が可能となるまでの所要日数は Watson 法では1回の手術で完了するので成功例では61日であつたが、失敗の危険も大きいことを経験した（失敗例には更に皮膚索法を実施した）。皮膚索法及び併用法では111日乃至138日、平均123日で、即ち3ヶ月以上4ヶ月を要した。

最近私の行つている併用法とは、前頸部皮膚を用い二期に分ち、下部次いで上部の食道管を形成し、その外表面は胸部より移動して来た皮膚索を再び皮弁に戻し被覆する方法である。即ち、第1段階(附図I)にて左胸部に幅約5cm、長さ約11cm.の皮膚にて皮膚索を作成する。これは放射線術後照射と同時期に実施し時日の空費を避ける。第2段階(附図II)にて皮膚索の外側端を左側頸部に移動縫着せしめる。第3段階(附図III)にて食道管の下約3分の1を形成する。即ち食道断端をかこみ前頸部にU字形の切開を加えた後、正中側に適宜剝離して皮弁となし、これを翻転して正中にて縫合し、食道管の一部を形成する。次にかくして生じた創面に、皮膚索の胸側の切断端創を縫着せしめた。かくすれば気管と食道口とが極めて近接し両者間の距離が短い場合でも、皮膚索の縫着床となる創面を十分に広く作製し得るので、容易に且つ確実に縫着せしめることが出来、又皮膚索により気管口を被覆閉塞することもない。第4段階(附図IV)としては、食道切除時一時的に閉鎖してあつた下咽頭を大きく開き、頸部皮膚と咽頭粘膜とを縫合して下咽頭口を造設する。下咽頭口縫合創の治癒を待つて、第5段階(附図V)として、下咽頭口と食道端とを囲み皮膚切開を加え、正中側に適宜剝離して皮弁となし、正中にて縫合して食道管を完成し、出来た創面は、側頸部縫着部にて再び切断した皮膚索を、裏面の中央縫合部にて縦に切割して再び皮膚弁となして被覆縫着するのである。

本法の特長としては

1. 縫合部に緊張がなく、且つ正中に位置する食道管の縫合線と前頸部両側方に位置する外頸部皮膚の縫合線とが重ならないので Watson氏法等と異り縫合不全による瘻孔形成の危険が少ない。

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Va

Vb

Vc

Vd

2. 胸部に作製する皮膚索を余り太くしないでよい。

3. 十分大きい食道腔が形成出来る (X線像A)

4. 気管口と食道口とが極めて近接している場合でも実施が容易である。

5. 外頸部の瘢痕, 醜形が軽度である。

6. 頸部皮膚を用いる有茎皮弁法に見られる様な皮弁が壞疽に陥り失敗する危険が殆んどない。

等の諸点である。

この他、咽頭口を食道切除直後より食道成形迄の期間一時的に縫合閉鎖することにより後療法等の点で次の如き利点もある。

1. 唾液の漏出による頸部皮膚炎の発生を防止し、後療法が簡単となる。

2. 皮膚炎等が起らないので、縫合創治癒後直ちに、即ち食道成形術実施前に、皮膚索の作製と平行しつつ局所の放射線術後照射療法を実施し且つ終了することが可能で、再発防止に役立ち得る。このことは二次的食道成形術を行つた頸部食道癌患者の遠隔成績が従来極めて不良である点からも極めて有意義なことと考える。

なお、予め食道切除時に注意すべきは、

1. 食道切断時に、笹木教授の喉頭全摘出術に於ける気管切断法の如く斜に切断

A₁

A₂

第3表 喉頭気管を使用する一次的食道成形術

症例	年令	性	術式	経口摂食まで	備 考	転 帰
	56	♀	原法	15日		健 7 年 8 ヶ月
	60	♂	〃	19	第11日小瘻孔	健 7 年 7 ヶ月
	55	♀	〃	18		健 6 年 4 ヶ月
	48	♂	〃	10		リンパ節転移 4 ヶ月死
	38	♂	〃	18		局所再発 4 ヶ月死
	70	♂	〃		第12日 瘻孔	局所再発 6 ヶ月死
	61	♀	〃	31	第12日小瘻孔	舌癌 1 年 7 ヶ月死
	53	♀	〃	20		肺癌 1 年 9 ヶ月死
	64	♀	〃	(166)	第11日喉頭瘻 瘻皮膚瘻法実施(79日)	局所再発 1 年 8 ヶ月死
	62	♂	軟骨 保存	13		肝癌 1 年 6 ヶ月死
	50	♀	〃		第11日頸部蜂 窩織炎	出血 38日死
	62	♂	〃		第12日 瘻孔	局所再発 5 ヶ月死
	74	♀	〃	12		健 9 ヶ月

し、且つよく伸展して頸部皮膚と縫合する。
2. 癌腫が下方に進展していて、気管口と食道断端とが近接する場合には、気管口はボタン穴法により造設し、両者の隔絶を確実にする。

等の諸点である。

後療法に際し注意すべき事項並にそれに対する対策としては、

1. 逆流吐出を防止する。逆流吐出は食道管縫合部を一時的の過緊張に陥れたり、汚染したりする。栄養管に先端より離れて側孔があると屢々この部が食道内に位置し逆流の原因となるので、側孔のないものか、側孔と先端孔の近接したものを用いる。又食餌の注入速度を緩徐にし、且つ1回量を控え目とする。
2. 感染防止のため十分に抗生物質を使用する。特に緑膿菌等の感染防止にも留意して抗生物質の選択を行う。
3. 縫合部の緊張動揺を防止するため、抜糸までは頭部を前屈位に固定し、頭部の回旋運動を禁ずる。又唾液の嚥下を禁ずる。従つて必要に応じ唾液分泌抑制剤を使用する。

以上の3項目は一次的食道成形術に際しても注意すべき事項である。更に、

4. 皮膚索の移動後は、皮膚索の栄養障害を防止し、且つその活着を助ける目的で、カリクレイン、ニコチン酸剤等の末梢血管拡張剤を使用する。
5. 下咽頭口よりの唾液の外部への漏出を可及的に防止する。下咽頭口造設後は、約15cmのゴム管の一端の周囲にガーゼを巻いたもので下咽頭口を栓塞し、ゴム管の他端は食道内に挿入し、唾液は咽頭よりゴム管を経て食道に流入する如くする。

等である。

なお不幸にして瘻孔を生じた場合は十分癆瘵性に収縮するのを待つて、極めて小さいものでは、笹木教授の賞用された瘻孔周縁への生理的食塩水注射法を行う。この注射法で不成功のもの、稍々大なるもの等には、瘻孔の位置大さ等に応じ、縫合閉鎖、或は有茎皮弁使用等を行う。この際は特に慎重に術式の選択、工夫を行わねばならない。

一次的食道成形術を行つた症例は、第3表の如く13例であつて、原法を9例に行い、7例は一次癒合を営み、1例は喉頭の壊死を来し(本例には後に皮膚索法を実施した)、1例は瘻孔形成後局所再発のため死亡した。最近の4例には喉頭軟骨を全く除去しない方法を行つたが、1例は感染死、1例は瘻孔を形成した。成功例の経口摂食が可能となる迄の期間は、10~31日、平均13.7日であつた。術後狭窄を来したり、その他の障害があつた例はなかつた。特に6年以上の治癒例が3例あることは、適応症を誤らねば、頸部食道癌の治療法として適當であることを実証している。

私は現在皮膚切開は病巣の術時所見に応じ喉頭摘出にも容易に移行出来る様に、T字形切開の横切開を正中より左右何れかの一側に止めたL字形切開を行い、喉頭軟骨は全く除去せず、手術侵襲を最小限に止め手数を省いた。(附図VI) たゞ気管食道縫合部の縫合不全の原因となる緊張、動揺を防ぐため、甲状舌骨筋のみは他側も切斷して喉頭の挙上運動を阻止する如くし、気管断端の稍々下方で、気管後壁と食道前

(VI)

壁とを縫着し、食道の胸郭内へ下垂を防止する等の考慮を計っている。又胸骨舌骨筋、肩胛舌骨筋は舌骨附着部直下にて切断後剝離して保存し、気管と食道との縫合部の補強に用いた。又下甲状腺動脈以外の動脈の切断、損傷を避け、甲状腺の気管よりの剝離も必要最小限に止めて食道に代用した気管の栄養障害の防止に留意した。又死腔を残さぬ様にも考慮を払った。

B₁

なお又、反回神経は食道より分離して出来るだけ保存する様にしている。

喉頭気管を用いる一次的食道成形術では、

1. 自家組織をそのまま、その場所で代用するので成功率が高い。
2. 食道切除と食道成形とが同時に完了し、短時間で経口摂食が可能となる。
3. 新食道及び気管食道縫合部に瘢痕狭窄等を起す危険がない (X線像B)
4. 放射線の術後照射を早期に実施出来る。
5. 反回神経を保存し得た場合には、食道声の発声にも有利である。

等の利点がある。

3. 結 語

以上教室で実施している頸部食道の二次的、及び一次的食道成形術について述べたが、何れにしても食道成形術は

1. 術式が出来るだけ容易簡単で、適応症が広いこと。
2. 重大な失敗の起らない術式であること。
3. 危険な合併症を併発する恐れのない方法であること。
4. 術後の新食道に瘢痕狭窄発生のおそれのない方法であること。

5. 食道切除後出来るだけ短期間で食道成形が完了する術式であること。

6. 食道に代用する材料が入手し易く、自家組織でないものは局所傷害性でないこと。

等が望まれる。

我々の方法にも尚種々改良すべき点があると考え、特に二次的食道成形術では食道成形完了までの日数の短縮が大きな課題であつて、喉頭を使用出来ない症例に対しても、更に考案を重ね一次的食道成形術を実施する

方向に進み度く考えている。

シンポジウムにて発表の機会を御与え下さった小野会長、松田総会々長に謝意を表し、御指導いただいた河田教授、岩本教授に深謝いたします。

文 献

1. Asherson: J. Laryng. & Otol. 68, 550, 1954
2. Brunschwig & Camp: Laryngoscope 57, 305, 1947
3. Conley: Ann. of Otol. 65, 76, 1956
4. 福田：手術 5, 503, 1951
5. Harris: Laryngoscope 70, 952, 1960
6. 広戸：日気食 3, 57, 1952
7. 広戸：日気食 12, 80, 1961

8. 石井：日気食 6, 38, 1955
9. 岩本：耳鼻咽喉 27, 667, 1955
10. 岩本：耳鼻咽喉 30, 355, 1958
11. 柏戸：日気食 11, 351, 1960
12. Lewis: Ann. of Otol. 66, 86, 1957
13. 向野：耳鼻と臨床 6, 75, 1960
14. 中村(文)：耳鼻咽喉 30, 336, 1958
15. Sercer: J. Laryng. & Otol. 73, 589, 1959
16. Shaw & Ormerod: J. Laryng. & Otol. 71, 175, 1957
17. Sisson: Laryngoscope 66, 1268, 1956
18. Som: Arch. of Otol. 63, 475, 1956
19. Watson & Converse: Plast. and Reconst. Surg. 6, 207, 1953
20. Woods: J. Laryng. & Otol. 71, 800, 1957

米国チャールズ
ファイザー社
提 携 製 品

相乗作用により強い効果を示す 新複合広範囲抗生物質

シグママイシン

社会保険新採用

グルコサミン添加テトラサイクリン+
トリアセチルオレアンドマイシン

●新処方 混合感染症／耐性 菌感染症に最適

シグママイシンは、現在最も
広く用いられている広範囲抗生
物質テトラサイクリンと中範囲
抗生 物質として注目されてい
るトリアセチルオレアンドマイ
シン、及び血中濃度上昇剤とし
て定評のあるアミノ糖の一種グ
ルコサミンの複合剤です。

シグママイシンは、特有の相
乗作用により、各種細菌、リケ
ッチャ大型ビールス等、非常に
多くの感染症に強い効果を示し
ます。

又最近問題となっている耐性
菌に対し、他剤にみられぬ優れ
た効果があり、しかも耐性の発
現が極めて遅い特質を有してい
ます。

吸収が速かで持続時間が長く
副作用も殆んどないので重症感
染症、長期投与の必要場合など
にも賞用されます。

【適応症】

肺炎、気管支炎、扁桃炎、中耳炎、百日咳
デフテリア、赤痢、疫痢、敗血症、淋疾
梅毒、発疹チフス、各種皮膚感染症など
（包装） 五〇mg 一〇〇mg
二五〇mg 一〇〇カプセル

文 献

造 品

台糖ファイザー株式会社

東京都中央区日本橋堀留1の6

台糖ファイザーの製品は世界共通の医薬品です

ABSTRACTS

Physiology and Pathology of Fiber Formation in Connective Tissue

Kinichiro Kajikawa

Department of Pathology, School of Medicine,
Kanazawa University

The fine structure of fibroblasts in thin sections was studied with the electron microscope in an attempt to determine the site of collagen synthesis and the mechanism of extrusion of collagen precursors. Use was made of the skin of embryonic, newborn and adult mice, and the granulation tissue in the healing of skin wound of mice. Actively functioning fibroblasts were characterized by a well developed endoplasmic reticulum, enlarged Golgi complex and swollen mitochondria. Some filamentous dense materials, presumably collagen precursors, were found within the cisternae of the endoplasmic reticulum and in the peripheral region of the cytoplasm. The newly formed collagen fibrils were found in contact with the cell surface. They developed into mature form in the extracellular spaces. This study emphasized that collagen precursors are produced in close association with the endoplasmic reticulum and synthesized products are accumulated within distended cisternae of the reticulum and discharged from the cell by perforating the cell surface or through separation of the whole cisternae from the cytoplasm.

Effect of various substances upon the reconstruction of fibrils *in vitro* from dissolved collagen was also studied with the electron microscope. The results support the view that polymerization of collagen precursors extruded from the cells may occur through a physico-chemical effect of extracellular fluids, possibly with the aid of mucopolysaccharides in the

grown substance.

The structural changes of the fibroblasts were observed in some pathological conditions, including human laryngeal nodules, wound healing in scorbutic guinea-pigs and in mice injected with cortisone. The fibroblasts in the laryngeal nodules showed a failure of the development of the endoplasmic reticulum and abundant cytoplasmic filaments, possibly collagen precursors accumulated in the cell matrix instead of within the lumen of the endoplasmic reticulum associated with less abundant RNP particles on the outer surface. Cortisone injection resulted in a striking depression of the proliferation of the fibroblasts, which contained a poorly developed endoplasmic reticulum and many inclusion bodies in the cytoplasm. The possible mechanism of the disturbance of collagen production in these pathological conditions was discussed in the light of the knowledge of fibrogenesis in connective tissue.

Reconstruction of the Cervical Esophagus

Okio Mukuno

Kyushu University

Patients of the cancer of the cervical esophagus that underwent surgical treatment during the past 10 years at the otolaryngological clinic of Kyushu University numbered 28. Of these 13 cases underwent the primary esophageal reconstruction, and 8 cases underwent the secondary reconstruction. In the primary reconstruction the author used the larynx as an autograft to reconstruct the cervical esophagus.

In the secondary reconstruction the author devised a new method combining the use of

the skin flap of the neck and of the tube pedicle graft of the chest. The procedure is as follows: first a tube pedicle graft is made on the hairless portion of the left anterior part of the chest, and after a time the left end of the tube pedicle graft is transplanted to the left part of the neck. The inferior part of the cervical esophagus is reconstructed using the skin flap of the neck after U-shaped incision around the esophageal stoma. The end of the tube pedicle graft at the side of the chest is transplanted on to the surface of the wound. Finally, after healing of the wound, the remaining superior part of the cervical esophagus is reconstructed using the skin flap of the neck after inverted U-shaped incision around the pharyngostoma. The surface of the wound is covered with the tube pedicle graft separated again at the suture.

This new method has several advantages. The suture lines of the new esophagus and of the outer part of the neck do not pile at the same position, and fistulization is rare because of the lack of strain. It is not necessary to make a thick tube pedicle graft. The new esophageal lumen is spacious and causes no cicatricial stenosis.

Psychosomatic Disease of Pharynx Larynx and Esophagus

Itsuo Iwata

Nagoya 1st Red-Cross-Hospital O-R-L-Clinik

When one feels neurotic, autonomic reflex or endocrinological abnormal symptom on the laryngeal region by emotional stress, we define it as laryngeal Psychosomatic disease.

I discussed about the cases of Pharyngolaryngeal neurosis, hysteric hoarse voice, difficult breathing and esophageal spasm from the point of view of psychosomatic medicine.

The medical treatment is principally given by the aid of Psychological-treatment, and accessorially by the aid of Drug-treatment.

A Case Report of Deep Bronchial Foreign Body Removed by Using Biplane Fluoroscope

Sonoji Hino, et al.

Department of Otorhinolaryngology, Tokushima
University School of Medicine (Director: Prof.
G. Sirakawa)

By using Biplane Fluoroscope, the authors have recently succeeded in removing a "Machi-" pin from the bronchiole deep in right inferior lobe of 11-year old boy who swallowed it by accident. As this case can not be done by the traditional photopic vision method, it should be very valuable to make a report on details of Biplane Fluoroscopy with some relating aspects.

The authors are of the same idea with the earlier workers in that this method makes the two dimensional observation possible and can be adequately applied for removing the deep bronchial foreign bodies in X-Ray contrast-graphy. The precautions with special regards to the preventive measures against X-Ray exposure disturbances in applying the method are also discussed.

Extraesophageal Foreign Body (Needle) Situated in the Peri- laryngeal Abscess

- Report of A Case -

Shoichi Honjo, et al

Department of Otolaryngology, Yamaguchi
Medical School

A case of extraesophageal foreign body (needle) which was situated in the perilaryngeal abscess is reported.

Thirty one years old housewife of idiot and epilepsy swallowed a needle for suicide. Two weeks later, the needle was found to be located in the left perilaryngeal abscess cavity.

Literatures on the cases of extrasophageal foreign body are reviewed and their locations