シンポジウム

外因性気管障害の外科的治療

*道 躰 祐 二 郎

気管の器質的障害をその原因によつて分類すると、まず内因性と外因性とに大別される(表1)。内因性障害には、結核その他の炎症性疾患による肉芽性あるいは瘢痕性狭窄と、腫瘍、奇形が含まれる。外因性障害にはいろいろの外力による外傷のほか、吸入された異物や腐蝕性ガスによる炎症性狭窄が属する。これらの疾患のうち、私は気管の外傷に対する外科的治療を中心として述べる。

表 1 気管障害の原因分類

A 内 因 性	
1	炎 症 性 疾 患
2	腫 瘍
3	奇 形
B 外 因 性	
1	外 傷
2	異 物
3	腐 蝕 性 ガ ス

気管外傷の発生頻度は明らかでないが、文献的には Forster⁽¹⁾によると、外傷1237例のうち胸部外傷は59例であり、八重樫⁽²⁾らによれば、1692例中89例となり、全外傷のうち大体5%前後の胸部外傷があつたことになる。しかし昭和38年の国内の自動車事故による死亡率が25年の約5倍に増加している事実からも、外傷数、ことに自動車事故のときに好発する頭部、頸部、胸部の外傷数は当然増加していると思われる。胸部外傷のうちで、気管気管支の外傷は従来、大体0.5%から5%くらいに発生している。Burke⁽³⁾によれば外傷による気管支破裂の発生頻度は、最近の数年間には以前の10倍以上に増加したということである。

気管外傷に対する外科的治療の術式⁽⁴⁾については詳細は省略するが、表2のように受傷直後

表 2 気管障害の外科的治療法

A 応 急 手 術	
1	気管切開術
2	気管開窓術
3	皮膚気管瘻形成術
B 根治手術(気管成形術)	
1	気管縫合・吻合術
2	部分的移植・補填術
3	全周移植・補填術

に応急的に行うものとしては、気道を確保し気管内圧を低下させ、また気道内の吸引のために気管切開術が通常行われる。胸部気管気管支の破裂のとき屢々起る緊張性気胸に対しては胸腔の持続排気を行う。また創の汚染や食道損傷が合併するときか、全身状態が根治手術に適しないときには気管開窓術や気管の末梢断端を皮膚に固定開放する術式を行う場合もある。

根治手術である気管成形術は、3種の方法に大別される。もつともふつう行われるのは、気管裂創縫合や気管壁の楔状切除縫合と、気管壁全周の管状切除を行なつたときあるいは離断されたときにその両端を引寄せて端々吻合する方法である。気管欠損部に組織移植や異物の補填によつて修復する術式は、種々の問題があるので後に述べる。

気管気管支成形術の現状を知るために、1963年までの文献から手術症例362例を集計し、以下それについて検討する(3表)。疾患別にみると、外傷が113例で適応症の第1位であり、つぎは結核、癌、その他の腫瘍の順になる。日本では結核が最も多く、外傷は第2位であるが最近では外傷例手術の報告も増加している。

気管気管支外傷の原因は、表4の如く災害によるものが最も多く、これには交通災害、労働災害、その他の圧挫、打撲などの外傷、また他

*鎌倉市(慶大外科)

表 3 気管気管支成形術の症例
1963年迄の文献による

疾 患	外 国	日 本	合 計
外 傷	100	13	113
結 核	67	37	104
癌	59	12	71
その他の腫瘍	49	2	51
そ の 他	13	10	23
合 計	288	74	362

表 4 外 傷 の 種 類 (113例)

	外 国	日 本	合 計
災 害	84	10	94
手術時損傷	10	3	13
気管支鏡損傷	3	0	3
気管カニューレ損傷	2	0	2
麻酔ガス爆発	1	0	1

殺、自殺の目的で行われた傷害などが含まれる。そのほか診療行為中の事故として、気管支鏡検査や手術中の損傷、気管カニューレによる瘢痕形成、また稀には全身麻酔中ガス爆発による気管破裂などがある。

災害に起因した外傷94例の損傷をうけた部位は、表5の如く、気管が52例でとくに頸部気管の手術例が多い。これは気管の損傷は気管支に比べてより致命的であり気管成形術の絶対的適応になるためであつて、また頸部の外傷は切創のような開放性損傷が多いので早期に新鮮創の手術を行い易いためでもあろう。

表 5 損傷の部位と性状 (94例)

	気 管 52		気管支 42
	頸部30	胸部22	
開 放 性	22	1	0
閉 鎖 性	8	21	42
新 鮮 創	16	6	14
陳 旧 創	14	16	28

胸部気管や気管支の損傷は貫通銃創の1例を除きすべて胸壁の開放創を伴わない閉鎖性の破裂創である。それは介連的外力によるもので、胸廓の急激な圧縮によつて胸腔内圧と気管支内圧が急激に高まり、さらに気管支に捻転、牽引

などの力が加わるために破裂を起すので極めて特異な外傷である。胸部の閉鎖性の気管気管支損傷は頸部気管の開放性損傷に比べて一般に診断が困難である。閉鎖性損傷で受傷後24時間以内に診断されたものは全体の3分の1に過ぎず、半数以上は1週以後十数年までの間に、すなわち受傷部の瘢痕化を来たしてからはじめて診療をうけているという⁽⁵⁾。

新しい気管気管支損傷に対して行われた早期手術は36例で、瘢痕狭窄に対する晚期手術は58例である(表6)。その遠隔成績は良好がそれぞれ86%と72%であつて早期手術の方が成績良好である。

表 6 手術時期と遠隔成績 (94例)

	数	良	不良	不明
早期手術	36	31 86%	5	0
晚期手術	58	39 72%	14	4

表 7 手術々式と遠隔成績 (94例)

術 式	数	良	不良	不明
縫 合 法	29	28	1	0
端々吻合	52	38	11	3
皮膚弁移植	3	1	1	1
筋膜移植	1	1	0	0
SS網補填	7	3	4	0
ポリエチレン管補填	2	0	2	0

術式別の成績は(表7)、縫合法が最もよく、端々吻合法は52例あり78%が良好である。そのほかの術式は例数が少く皮膚移植法3例、筋膜移植法1例、不銹鋼線網の補填法が7例、プラスチック管補填法が2例にすぎず、これらの方法は部分的欠損に対するものは成功例もあるが、全周欠損では殆んど成功例はない。

つぎに慶大外科教室における気管気管支成形術の症例を表8に掲げた。昭和26、27年に気管支異物を気管支切開によつて除去した依田博士の2例⁽⁶⁾をはじめ、私の在任中の13例のほか38年までに7例、合計22例である。術式は切開縫合2、切除吻合19、ゲバウアー式皮膚弁移植1例で、遠隔成績は完全に良好なもの18例、成功率は82%である。そのうち頸部外傷4例(表9)について述べる。

表 8 慶大外科教室手術例 (22例)

疾 患	術 式, 数	成 績
気管支異物	切開縫合 2	良
結 核 性 主気管支狭窄	切除吻合 15 皮膚弁移植 1	良13, 死 2 良
頸部気管切斷	切除吻合 4	良 2, 離 開 1 再狭窄 1

表 9 頸 部 気 管 外 傷 症 例

No.		早 期 処 置	期 間	術 式	結 果
1	48♂(刃物) 気管切斷	気管カニューレ 挿入 皮膚縫合	3 月 半	3 軟骨輪切除 端々吻合	7 年間 良
2	25♀(刃物) 気管上端, 食道 切斷	気管カニューレ 食道チューブ 挿入	2 月	気管・食道吻合 胃瘻 食道修復 3 回	食道狭窄 気管離開 消息なし
3	18♂(ガラス) 気管切斷 食道損傷	気管カニューレ 挿入 食道縫合	1 年 8 月	気管端々吻合	良 3 年半 その後 声門下狭窄
4	35♂(刃物) 気管切斷	気管切開 気管縫合	2 月	気管端々吻合	1 年半 良

第 1 例⁽⁷⁾は頸部を刃物で刺され応急処置として縫合と気管切開をうけ一時軽快したが、3 週後より呼吸困難が始まり喘息として治療をうけた。3 月後には強い呼吸困難とチアノーゼをきたして入院した。声門下 3～4 cm の所に内径 2×8mm の竹の節状の瘢痕狭窄があつたので、3 軟骨輪に亘り切除して吻合を行つた。7 年後の現在全く健康である。

第 2 例は刃物で頸部を切り応急処置をうけ 1 月後入院した。創は斜下方から輪状軟骨を前後に 2 分し、気管の末梢断端は約 6 cm 離れて肉芽に埋没し内径約 8 mm になつている。食道も喉頭後方で切斷され創は感染している。そこで胃瘻を作り栄養の恢復を図り受傷後 2 月で喉頭気管吻合と食道吻合を行つたが、術後 10 日創の感染をきたし気管吻合部が離れたため止むなく下方の断端を皮膚に固定し食道の再修復と拡張法を施していたが、気管の再建に到らぬうちに消息不明になつた。

第 3 例⁽⁸⁾は自動車事故によりガラスで頸部気管を切斷し、食道も損傷したが直ちに修復をうけ、気管カニューレ挿入のまま受傷後 1 年 6 月で慶大耳鼻咽喉科に入院した。第 1 軟骨輪の下

で離斷され、その間に瘢痕狭窄を生じている。第 1 回手術は、狭窄部を切除してポリエチレン管を補填し植皮弁で包む方法がとられたが、感染のため失敗し、更に 2 月後に外科と協力して端々吻合術を行つた。退院後日常生活についていたが、術後 3 年 7 月で呼吸困難を訴え気管切開をうけて入院した。声門下に著明な狭窄を生じて居り、再手術の予定である。

第 4 例は昭和 37 年

11 月 28 日ナイフで前頸部を切り、応急処置と気管吻合術をうけたが約 2 週後より狭窄を生じたので気管切開をうけて入院した。2 月後に気管吻合術を行つたが経過良好である。

以上の 4 例はとも

に開放創で外部から創の状態を観察できるし大血管の損傷もないので、気管切開後に早期に一次的吻合が可能であつたと思うが、いずれも 2 月以上経過し瘢痕狭窄を生じてから手術を行つたため、癒着が強く剝離は極めて困難であつた。ことに食道の切斷を伴うときは時期が遅れると創が感染しやすく、気管と食道を同時に吻合することは成功しにくくなる。危険な時期を脱したら速かに根治手術を行うべきである。また初回に失敗すると手術の回を重ねる毎に成績が悪くなる傾向があるので、最初に適確な術式と縫合材料の選択に留意し、感染防止には充分慎重でなければならない。

気管切除吻合の限度 気管成形術のうち本法が最も多く応用され成績も良好であるが、どの位まで切除して吻合が可能であるかが問題である。経験上では大体 2.5 cm が切除の限度と考えられる。教室の古泉⁽⁹⁾らは健康な成人に気管支造影を行い気管の長さを計測し、呼気と吸気、また頭部正常位と後屈位における長さの変化を調べた。表 10 の如く、頭部の正常位で吸気時には呼気時の長さ 114.7 mm の 7.1% 8.1 mm だけ伸び、これを頭部後屈位でみると 7% 9.2 mm

表 10 気管伸長率 造影35例

伸びる。また正常位と後屈位とを比較すると、呼気時には16.8mm、吸気時には17.9mmだけそれぞれ後屈位の方が長くなる。正常位の呼気時と後屈位の吸気時の差は前者の22.7% 26mmで、これが生理的な無理のない**最大伸長範囲**とみなすことができる。男子平均は26.7mm、女子平均は23.5mmになる。

次に気管の伸び方の**年齢差**を知るため、屍体からとり出した気管を牽引してその伸長率を計った(表11)。50例の平均は24.3%だけ伸びたが、年齢により明かな差があり伸長率は年齢に反比例する。10才台では41.6%伸びるが60才台では17.2%にすぎない。

表 11 気管最大伸長率 年齢差 屍 50例

以上の2実験から、気管の吻合しうる切除の限度は、大体2.5cmが標準になるが、年齢、性による差違と、肋膜、横隔膜、縦隔の癒着や気管周囲の癒着などの病変を考慮して決定されるべきである。

最後にこの限度をこえて切除する必要がある場合の手術法として**移植、補填法**の問題が現在残されている。

気管壁の部分的欠損に対する移植、補填法は古くから研究され実験的にも臨床的にも成功しているが、全周を切除してそこに自家組織、同種や異種の組織を移植し、あるいは異物の管を補填する動物実験は1948年頃から各国で報告があり、はじめは内腔を確保して支持力のある点で鉄、ガラス、プラスチックなどの硬い管が用いられたが、気管断端との接合が不良で移動し易く肺の感染を助長し、除去すると狭窄を生じて一時的の効果しか得られなかった。ついで組織を移植してその生着と粘膜上皮形成を期待する種々の実験が行われたが、大きい移植片は壊死し吸収され癒着狭窄を生じ易く、内腔を支持するための各種の支持材料が併用されたが、結果は不充分であつた。

補填を成功させるための**条件**としては、(1)補填物に弾力があり気管断端と無理なく接着できること、(2)周囲からの肉芽組織が早くからみ易いこと、(3)異物反応がないこと、これにより肉芽の過剰形成を防ぎ上皮が形成され易くなる。(4)内腔支持力があること、(5)気密性などである。最近是不锈钢線や合成樹脂の網などがこれらの条件に近いものとして種々の工夫のもとに用いられ、実験成績は次第に向上している。

私どもも(10,11,12)昭和28年以来、いろいろと手術手技や使用材料を検討して移植補填の実験を続けてきたが、教室の石原、塚田らの考案した方法(13,14)は、かなり良い成績を示しているので紹介する。

実験方法は、犬の気管を7~12軟骨に亘り切除して欠損部を作り、更に図の様に口側端の気管軟骨を1~4個膜様部のみを残して軟骨の中央部で断ち割り、膜様部を引張つて下方の断端に縫着し欠損部に橋渡しする。この有茎軟骨輪を支持として、バイレン網を欠損部に補填す

る。網の縦糸を用いて断端の外側に縫着する。気密にするために外側を筋膜で被う。有茎軟骨輪は膜様部からの血行が残されているので肉芽と上皮が形成する母地としても役立つようである。実験成績は手術死などの早期死亡を除く20頭中、7月以上狭窄をきたさず生存しているもの12頭で、補填部には上皮が形成されて居り60%の成功率である。有茎軟骨輪の代りに馬蹄形の鋼線を使用した実験では9例中5例が成功し、これの56%の成功率になる。これらの実験成績は、従来きわめて成績不良であった全周補填法を臨床に応用する上に新しい道を拓いたように思われ、今後の進展を期待するものである。

本論文は昭和39年9月、第16回日本気管食道科学会総会において演説した。

文 献

- Forster, E. et al: Poumon, 14:2, 153(1958)
- 八重樫雄一他: 日胸外誌, 11:5, 384(1963)
- Burke, J.F.: J.A.M.A., 181:8, 682(1962)
- 道鉢祐二郎: 手術, 14:1, (1960)
- Hood, R.M., Sloan, H.E.: J. Thorac. Surg., 38: 458(1959)
- 依田亘正他: 診断と治療, 42:1, 68(1954)
- 道鉢祐二郎他: 胸部外科, 12:1, (1959)
- 斎藤成司他: 気食会報, 11:4, 337(1960)
- 古泉桂四郎他: 気食会報, 14:4, 206(1963)
- 道鉢祐二郎他: 気食会報, 8:4, 7 (1957)
- 新井文雄: 日胸外誌, 7:7, 763(1959)
- 道鉢祐二郎他: 第7回国際気食学会, 147(1958)
- 浅井末得他: 日胸外誌, 11:5, 12(1963)
- 塚田祐福夫他: 日胸外誌, 12:5, 189(1964)
- 早田義博他: 気食会報, 13:4, 179(1962)
- 佐藤陸平, 中川二郎: 胸部外科, 16:12, 737(1963)
- 和田正士, 松本順三: 手術, 18:1, 73(1964)
- 薄場元他: 胸部疾患, 8:1, 102(1964)
- Bailey, H.: Surgic. Emergencies 4th ed., 580(1940)
- Seybold, W. D.: Arch. Surg. 81, 153(1960)
- Rahbek-sørensen, H.: Acta Chir. Scand., 191:4, 346(1960)
- Show, R.R. et al: J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 42, 281(1961)
- Benedict, E.B.: J.A.M.A., 178:5, 509(1961)
- Bohley, P.: Thoraxchirurgie, 9:2, 207(1961)
- Viikari, S.J.: Ann. Chirur. Gynaecol. Fenniae, 50:3, 294(1961)
- Ford, J.B., Swift, C.T.: Dis Chest, 40:1, 76(1961)
- Deaton, W. R., Coggeshall, A. B.: J. Thorac, Cardiovasc. Surg. 44, 84(1962)
- Thorén, L.: Acta Chir. Scand., 124:4, 365(1962)
- Madrid, G.S., Canales, M.: Neu. Cir. Tórax, 23:4, 287(1962)
- Campbell, Jr. D.C. et al: J. Thor. Surg., 43:320 (1962)
- Archer, F.L. et al: J. Thor. Cardiovasc Surg., 45:4, 539 (1963)
- Duchet-Suchaux, L. et al: J. Fr. Méd. Chir. Thor., 17:2, 191(1963)
- Litt, R.E. et al: Am. J. Roentg., 89:5, 1017 (1963)
- Kramisch, D.: Am. J. Surg., 704(1963)
- Fonkalsrud, E.W.: J. Thor. (ardiovasc. Surg., 45, 520(1963)
- 道鉢祐二郎: 肺と心, 7:4, 315(1960)
- 道鉢祐二郎: 呼吸器診療, 16:2, 15(1961)
- パネルディスカッション気管気管支外科: 日胸外誌, 9:7, 1(1961)
- 道鉢祐二郎: 気管気管支の成形, 気食会報, 14: 2, 1(1963)
- 浅井末得: 慶応医学, 40:6, 389(1963)
- Kostenko, M. F. und Rubaschew, S. M.: Zbl. Chir., 39, 1448 (1912)
- Hanlon, C.R.: S.G.O., 86, 554(1948)
- Daniel, R. A.: J. Thorac. Surg., 17, 335(1948)

- 44) Carter, M. G. and Strieder, J. W.: J. W.: J. Thor. Surg., 20:613(1950)
 - 45) Jackson, T. L. et al: J. Thor. Surg., 20:598(1950)
 - 46) Daniel, R. A. et al: Dis. Chest, 17:426(1950)
 - 47) Boucher, R. M. et al: J. Thor. Surg., 21:572(1951)
 - 48) Ehrlich, R. W. et al: S.G.O., 94:570(1952)
 - 49) Swift et al: J. Thor. Surg., 24:5, 482(1952)
 - 50) Davis, O. G. et al: J. Thor. Surg., 23:367(1952)
 - 51) Kiriluk, L. B. and Merendino, K. A.: S.G.O., 96:175(1953)
 - 52) 牧野惟義他: 日外誌, 55:609(1954)
 - 53) Carlos, R.: J. Thor. Surg., 27:6, 554(1954)
 - 54) 河台直次: 胸部外科, 7:6, 2(1954)
 - 55) 宮内忠良: 日胸外誌, 2:268(1954)
 - 56) Pacheco, G. R.: J. Thor. Surg., 27:554(1954)
 - 57) 福田幸雄: 胸部外科, 8:7, 38(1955)
 - 58) 佐藤陸平他: 胸部外科, 9:4, 401(1956)
 - 59) 片岡一郎他: 胸部外科, 9:120, 7(1956)
 - 60) Ekeström, S.: Acta Chir. Scand., 110:5, 367(1956)
 - 61) 佐藤陸平他: 胸部外科, 10:10, 583(1957)
 - 62) 中川二郎: 日胸外誌, 5:11, 949(1957)
 - 63) 関口一雄他: 胸部外科, 11:6, 74(1958)
 - 64) Björk, V. O.: J. Thor. Surg., 35:5, 598(1958)
 - 65) 佐藤陸平他: Kobe J. Med. Sciences, 4:4, 219(1958)
 - 66) 井上芳一: 日大医学雑誌, 18:5, 988(1959)
 - 67) 神吉英雄・神医大紀要, 16:1, 1(1959)
 - 68) 大羽喜雄: 日外誌, 60:6, 1009(1959)
 - 69) Bell, J. W.: Dis. Chest, 38:2, 131(1960)
 - 70) 平野一生: 胸部外科, 13:6, 58(1960)
 - 71) Greenberg, S. D. and Willms, R. K.: Arch. Path., 73:1, 53(1962)
 - 72) Sperling, E.: Thoraxchir., 9:6, 572(1962)
 - 73) Sperling, E.: Thoraxchir., 10:1, 43(1962)
 - 74) Beall, A. C. Jr. et al: A. M. A. Arch. Surg., 84:390(1962)
 - 75) 佐藤陸平: 気食会報, 14:2, 16(1963)
 - 76) 阿保七三郎: 気食会報, 14:2, 23(1963)
 - 77) 樋口隆三他: 胸部外科, 13:6, 27(1960)
 - 78) 米倉剛一: 久留米医学会誌, 24:2, 1632(1963)
 - 79) 錦見節子: 気食会報, 8:1, 30(1957)
 - 80) 佐々木泰也: 気食会報, 13:1, 75(1962)
 - 81) 北村武他: 気食会報, 12:4, 49(1961)
 - 82) 稲田潔: 気食会報, 6:4, 35(1955)
 - 83) 向野与雄, 仙頭哲夫: 気食会報, 5:4, 28(1954)
- その他の文献は 4), 36), 37), 文献欄参照

投 稿 規 定

- 1) 投稿者は本学会々員であること。
- 2) 原稿は新かなづかいで、楷書、横書、簡潔明瞭なること。句読点を正確に、外国語、薬品名はカタカナを用い「 」や——をつけないこと。
- 3) 論文は組上り3頁まで(400字詰原稿用紙約15枚)、但し特例を認めることがあります。規定頁数を超える場合は超過分の実費並びに超過郵送料をいただきます。
- 4) 200字以内の和文抄録(その英訳も一緒に)を必ずつけて下さい。但し英訳のない場合は英文抄録作製料をいただきます。
- 5) 文献は重要なもののみにして著者名、題名、雑誌名、巻、頁、年号の順に統一して下さい。
- 6) 附図は白紙に墨ではつきり描いて下さい。色で描いたもの、又は不鮮明なものは製版ができず描き直すことになりますが、その場合は実費をいただきます。図版、写真版の製版は実費をいただきます。
- 7) 別冊御希望の方は論文と同時に御申込み下さい。但し実費をいただきます。
- 8) 原稿は東京都新宿区信濃町35 慶応大学医学部内 日本気管食道科学会宛お送り下さい。掲載の採否は編集員におまかせ下さい。

ABSTRACTS

Disturbance of Esophageal Passage from the Fundamental Viewpoints

Hideo Irie et al.

Dept. of Radial., Kyushu University

We discussed about the fundamental problems of X-ray examination of oesophagus. In the fluoroscopic examination of oesophagus, hitherto many physicians examined it in the right oblique position. But in my opinion, in the principal method of fluoroscopic examination of oesophagus, upright postero-anterior position and lateral position should be included. And if necessary, other arbitrary positions must be considered. But the examination with lateral position with 60-70 KV X-rays are difficult because of low penetration of the X-ray in these voltage range. 140 KV X-ray is adequate for the oesophagus examination if these positions. The 140 KV X-ray is more useful for the analysis of oesophagus lesion. Postero-anterior radiogram of oesophagus of about 60 KV is hard to read, as most of delicate changes are obscured by dense Ba shadow. The lower the voltage of X-ray is, the more the exposure dose to patients.

In order to reach the precise diagnosis of pulmonary and mediastinal diseases, we have to examine the oesophagus with X-ray. For instance, we have experienced a patient of the perforation of oesophagus cancer who was misdiagnosed as lung abscess, and this patient did not show any oesophageal complaint, also another case of oesophageal cancer was overlooked by other physician as this patient did not complain any system due to oesophagus stenosis; this case was diagnosed with our routine oesophagus examination.

We recommend 30 to 50 cc hard Ba meal (Ba 2.5 : Water 1) for the X-ray examina-

tion of oesophagus. This Ba meal can fill the total length of oesophagus for about 5 to 30 minutes and if a small quantity is used, oesophageal mucosal pattern is demonstrated.

Now we are examining routinely with this method, the oesophageal of patients who come to our department with gastro-intestinal complaint.

We are performing this routine examination to find out early cancer of oesophagus.

Reconstructive Surgery for Tracheal Trauma

Yujiro Dotai

School of Medicine, Keio University

1) Referring to a large literature published up to 1963 in the world, 362 tracheo-bronchial plasty cases were commented on statistically. Traumatic injury was the major cause in 113 cases and ranked first. Traumatic injury following a traffic accident has been increasing recently in number. Site of injury was mostly found in the trachea, especially the cervical trachea. Follow-up studies revealed successful recovery in 86% of the cases operated in an early stage and in 72% of that operated rather late. Concerning to the method of surgery, the results of the suture method and the resection-anastomosis method were both satisfactory, that of the transplantation and prosthesis ended mostly in failure except the patch graft method.

2) We experienced 22 cases of tracheo-bronchial plasty in Keio University Hospital. Four cases of them who had undergone cervical tracheal plasty were reported in detail.

3) In order to study the limitation in length of tracheal resection, Dr. Koizumi of our Surgical Department measured extensibility of

the trachea by means of bronchography. He reported that the physiologically natural extensibility of the trachea was 22.7% of its total length and the trachea of the adult extended 26 mm on the average. He also measured extensibility of corpses' resected tracheas and found that the extensibility was definitely in inverse proportion to the age. In this study the extensibility was 41.6% in the teenagers, 17.2% in the sixties, and 24.3% on the average. From the results of his study it is concluded that the standard limitation of tracheal resection is 2.5 cm in length and that an amount to be resected has to be decided in accordance to pulmonary lesions and an age of a patient.

4) The author, finally, reported the results of his animal experiments on tracheal reconstructive surgery. Reconstruction using "PAIREN" mesh and fascia is the best among other various methods of prosthesis. Satisfactory results were obtained in 60% of the cases using pedicled tracheal cartilages as a support and 56% of the cases using horse-shoe shaped steel wire. These results give us the bright prospects for tracheal prosthesis in clinical use.

The Laminagraphy of the Larynx : As an Aid in the Diagnosis of Laryngeal Cancer

Shogo Awataguchietal.

Department of Oto-Rhino-Laryngology
Medical Faculty, Hirosaki University

Laminagraphic observations have been made on 25 cases with laryngeal cancer, which were classified in supraglottic (8), glottic (5), subglottic (6) and extrinsic (6) type from the laryngoscopic (25 cases) and macroscopic findings (15 resected cases).

From these observations it was concluded that the laminagraphy of the laryngeal cancer was of value in determining the exact

limits of subglottic extension and the invasion to piriform sinus, in the visualization of the regression or the extension of tumor during irradiation therapies, and in the confirmation of the direct and indirect laryngoscopy.

Statistical Observations on the Foreign Body in Esophagus and Trachea or Tracheal Trees for the Past 22 Years

Teruo Takasu, et al.

Department of Oto-Rhino-Laryngology,
Nagoya City University Medical School

The authors took statistics of 173 cases of foreign bodies in esophagus and trachea or tracheal trees for the past 22 years since 1943, and discussed the problem concerned with the kind of foreign body, age and sex of patients, motive of accidents and some of complications.

A Case of Toxicopathy through Lidocaine-spray

Seigo Nihei et al.

Osaka Red Cross Hospital
(Broncho-esophagological Dept.)

Patient (37 years old, Female) is no sooner sprayed in pharynx and larynx 4%-Lidocaine in order to inlet Metras's sonde in trachea, than she falled into convulsion (tonic, clonic), dyspnea and cyanosis. And died after three hours in spite of many effective emergency treatment.

As considerable cause :

- (a) Hepatic insufficiency (For the patient has long taken PAS, INAH)
- (b) Depravation of general appearence (For the patient has long suffered pulmonary tuberculosis)