気管気管支分泌機能と自律神経系

*前川 彦右衛門

はじめに

気管気管支の構造は次の表の通りであるが、これらのうち明らかに自律神経支配を受けているのは——のひかれた血管、分泌腺及び平滑筋々層であり、——のひかれた線毛細胞及び杯細胞については、その自律神経支配は大方否定的ではあるが、まだ若干の疑問を残している。

粘 液	
粘膜	上皮：線毛細胞，杯細胞，補充細胞，基底膜。
	固有層：結合織，神経，血管，リンパ組織。
	粘膜下組織：結合織，神経，血管，リンパ組織，分泌腺，脂肪組織
筋 層	
軟 骨	
外 膜	

これらの関係を機能の面からみると、気管気管支の機能即ち線毛機能、分泌機能、吸収機能及び運動機能のうち、自律神経系と関係の深いのは分泌機能と運動機能である。分泌機能は他の諸機能と相まつて、気道における生体防禦機構の一つとして極めて重要な役割を演じているものであるが、これの詳細殊に自律神経系との関係については、なお解明されるべき点が多い。

実験動物

自律神経系の種々の状態を動物において作るとは、厳密には極めて困難なことであるが、この目的のために本研究では以下の処置を施し

た家兎又は成犬を用いた。

塩酸ピロカルピン注射

硫酸アトロピン注射

塩酸エフェドリン注射

頸部迷走神経電気刺激

迷走神経頸部切断

組織学的観察

気管気管支の分泌物は、その大部分が粘膜下組織内にある分泌腺（管状胞状混合腺）より分泌され、極めて一部が上皮層の杯細胞から分泌される。この両者の関係を中心に組織学的観察を行うために、犬を用いて HE 染色、PAS 染色及びムチカルミン染色を行つた。そのうち所見の最も明白な PAS 染色について得られた所見は次の如くである。

正常成犬にピロカルミン注射を行うと、気管腺の腺組織における PAS 陽性物質は注射直後に著明な増加を来すが、15分後をピークとして以後漸次減少し、30分後には注射前とほぼ同様の状態に戻る。これに対し同じ動物の気管上皮の杯細胞内における PAS 陽性物質は、注射直後には僅かに増加しているに過ぎないが、時間の経過と共に増加し、30分後には著明な増加の所見を呈する。一方、アトロピン注射犬については、気管腺組織における PAS 陽性物質には注射による変動を殆んど認めないが、杯細胞内における PAS 陽性物質は注射 10分後をピークとして一時的に明らかな増加の傾向を示し、20分後には注射前とほぼ同様の状態に戻る。

これらの腺組織と杯細胞とにおける PAS 陽性物質の変動の関係を比較するために、第1表の様な方法を用いた。即ち、杯細胞の分泌機能を、標本中の上皮細胞（線毛細胞及び杯細胞）総数に対する PAS 陽性物質を含む杯細胞数の

* 大阪市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室
(山本 肇教授)

第1表 犬気管腺と杯細胞における分泌の比較

比率で表わし、線組織の分泌機能を腺組織における PAS 陽性物質の量 (+), (H), (H) で表現した。この表より以下の如き考察をした。即ち、腺組織はピロカルピン注射により著明な反応を示し PAS 陽性物質の増加を示すが、アトロピン注射では殆んど反応を来さない。これは従来の報告と一致する結果で、腺組織に対する副交感神経支配を物語る。然るに、杯細胞の分泌機能はピロカルピン注射により軽度の亢進の所見を呈するが、その発現までかなりの時間を要し、更に腺組織の分泌機能が旧に復する様になつてからの方が杯細胞の分泌亢進が著しくなつてくることから、薬剤投与の影響とは判断し難い。一方、アトロピン注射に対しても、これによつて却つて分泌亢進を来し、自律神経支配を受けている一般の分泌腺とは逆の反応を示す。

以上の成績より、杯細胞の分泌機能は腺組織の分泌機能が余り働いていない様な時に一層亢進する様な傾向が認められ、このことは杯細胞は自律神経支配をはなれた別個の働き方即ち粘膜における刺激（この場合には腺組織よりの分泌の減少）に反応して分泌を営むことを示唆す

ると考える。なお杯細胞は線毛細胞が何らかの刺激により杯状に変化して出現するものであるとの考えもあり、これについては今後検討を続ける。

次に、気管粘膜下組織における自律神経末梢を鈴木氏鍍銀法により観察した。その結果は、両側迷走神経を頸部で切断した家兎では、正常家兎の所見と比較して全般に神経線維の減少が著しく、軸索では swelling が消失して針金状になり更には断裂を来している部分もある。シュワン鞘は好銀性が増大し、所々に空胞化及び微細な好銀性顆粒の出現が認められる。この様な明らかな変性の所見は、神経切断の際に通常みられる所見と変らない。

自律神経作動薬を投与した場合の気管粘膜下自律神経末梢の形態学的な所見は、ピロカルピン注射犬において標本の極めて一部分で一過性と考えられる神経細胞の膨化像を認めた。然しながら、この所見は常に見られるものではなく、又その他の自律神経作動薬の投与では自律神経末梢の形態学的変化を認め得なかつたことより、この種の薬剤の一回投与では自律神経末梢の形態には影響を及ぼさないものと考ええる。

組織化学的観察

気管気管支の腺組織における酵素活性と分泌機能との関係を知るために、組織化学的観察を試みた。観察は、酸性フォスファターゼ (Burston 法)、コハク酸脱水素酵素 (Nachlas 法)、及びグルコース-6-リン酸脱水素酵素 (Hess 法) の3者について行つた。これらの酵素を選んだ理由は、酸フォスファターゼは分泌機能に関係深い酵素と考えられている点より、コハク酸脱水素酵素は TCA サイクルの外の代表的なものとして、グルコース-6-リン酸脱水素酵素は TCA サイクルの中の代表的な酵素として夫々選んだ。

正常家兎の気管における夫々の酵素の分布を、濃染せるものより順に列挙すると以下の如くである。

酸性フォスファターゼ：

腺>上皮>軟骨>血管壁=筋層=粘膜下組

織

コハク酸脱水素酵素：

血管壁＝筋層＞上皮＝腺＞軟骨＝粘膜下組

織

グルコース-6-燐酸脱水素酵素：

上皮＞腺＝筋層＞血管壁＞軟骨＝粘膜下組
織

正常成犬に対し、自律神経作動薬を注射した場合の気管腺組織におけるこれらの酵素活性の変動をみると次の如くである。

酸性フォスファターゼ：

正常 (卅)

(ピロカルピン注射) (アトロピン注射)

(±) 5 分後 (卅)

(卅) 15 分後 (卅)

(卅) 30 分後 (卅)

コハク酸脱水素酵素：

正常 (卅)

(ピロカルピン注射) (アトロピン注射)

(卅) 5 分後 (卅)

(卅) 15 分後 (卅)

(卅) 30 分後 (卅)

グルコース-6-燐酸脱水素酵素：

正常 (卅)

(ピロカルピン注射) (アトロピン注射)

(卅) 5 分後 (卅)

(卅) 15 分後 (卅)

(卅) 30 分後 (卅)

これらの各酵素は夫々の性質から一律に考えることは不適當であるが、大体平均して次の様な變動の傾向がみられた。即ち、ピロカルピン注射 5 分後には僅かながら酵素活性の低下を来し、次いで 15 分後をピークとする活性の上昇を示した後、30 分後には殆んど注射前の状態に復している。又、アトロピン注射においては注射

第 2 表 犬気管腺における PAS 反応の変動と酵素活性の変動との比較

5 分後にはかなりの活性低下を来した後、漸次活性の上昇を来し、30 分後には注射前よりも上昇していることを認めた。

この様な犬気管腺における酵素活性の変動の傾向を、先に述べた犬気管腺における PAS 反応の変動の傾向と比較してグラフに指記すると第 2 表の様である。組織化学的觀察によつて得られた成績をこの様な表で表現することや、更にこの様な酵素活性の変動を意義付けるについては多くの難しい問題があることは勿論であるが、大体腺細胞の分泌機序の各時期即ち休止期→補充期→充実期→排出期の各期に応じた夫々の酵素活性の状態を示しているものと考えられる。即ち、ピロカルピン注射では気管腺における酵素活性の状態と PAS 陽性物質の状態とは丁度逆の関係にある様にみえるが、これは腺細胞の分泌機序の充実期及び排出期に PAS 陽性物質の増加が著しいのに反して酵素活性は補充期及び充実期に上昇するためと考えられる。又、アトロピン注射においては PAS 陽性物質には殆んど変化を認めないために、気管腺の分泌機能に対するアトロピンの影響は殆んどないと考えられているが、酵素活性についてみると注射後一時的に低下がみられ、引続き回復の所見が認められることは、興味あることと考える。

顕微鏡映画による觀察

分泌と云う現象は、細胞が分泌物の原材料を細胞内に吸収し、これを化学的に転換又は濃縮して分泌物を形成し、次いでこれを細胞外に放出する機転であるが、気管腺におけるこの分泌機序を明らかにする目的で、顕微鏡映画による

観察を行つた。

ラッテ胎児の気管粘膜下組織より実体顕微鏡の下で腺組織を分離してとり出し、これを細切しトリプシン処理の後、4日間組織培養を行ない、位相差顕微鏡（200倍及び500倍）下に10秒1コマの微速度撮影を行つた。

映画では、腺細胞の集団とその間にある管腔との関係が明らかに認められ、管腔内には分泌物が充満している。個々の腺細胞の中ではミトコンドリアの極めて活潑な動きが認められ、又細胞質内では白く透けてみえる分泌顆粒が多量認められる。この分泌顆粒は細胞質内を移動した後、細胞膜を経て管腔内へ排出されて行く状態が明らかにされた。この様な所見から気管腺の分泌機序は eccrine 形式をとることを認めた。

電子顕微鏡的観察

気管腺の分泌機能に伴う細胞内の微細構造の変化を更に明確にする目的で、電子顕微鏡による観察を行つた。

正常成犬の気管粘膜下組織中の腺細胞においては、次の様な分泌の各時期を示す所見が得られた。即ち、分泌物の前段階物質が粗面小胞体で合成され、それがゴルジ野に運ばれてここで蓄積されると共にゴルジ嚢は次第に球形となつて分泌顆粒になり、この分泌顆粒は次第に大きくなつて融合しつつ細胞上部に集まり、やがて細胞膜を経て放出されて行く夫々の状態を示すと考えられる電顕像が得られた。第1図は正常成犬気管腺細胞の低倍率電顕像で、細胞質内のゴルジ嚢及び分泌顆粒更に管腔内へ放出されて行く分泌顆粒の状態がよく認められる。

この様な分泌機序を営んでいる正常成犬に対してピロカルピン注射をした際の気管腺細胞の電顕像は、殆んど全ての部分で正常の所見と変る所はないが、唯細胞質内の分泌顆粒が正常より幾分明るい像が得られた。従つて、ピロカルピンによる気管腺細胞の分泌機能の亢進現象は、正常時におけると同様の分泌機序が正常の場合よりも早い週期で行われることによるものと考えられる。なお極めて一部の標本では、第2図に示す様な所見即ち、細胞質の一部が切れ

第 1 図

第 2 図

て分泌物となるいわゆる apocrine 分泌を思わせる様な像もみられることがあつた。然しこの所見は、分泌機能の異常な亢進から来る特異な所見とも考えられ、今後検討を要する所である。

分泌物の生化学的観察

気管気管支の分泌物自体についての研究は、分泌物の採取がその部位、量などの関係から困難なためにその報告が少ない。分泌物の組成と自律神経状態との関係について検討した。

試料の採取方法は、家兎において血液及び上部気道分泌物の汚染を防ぐために喉頭部を鉗子で遮断した後、生体より喉頭、気管及び胸腔内臓器を損傷することなくとり出し、各気管支を出来るだけ末端で鉗子にて遮断した上で、気管気管支の内腔を蒸留水（2～4 cc）にて反復洗滌し、その洗滌液を試料とした。

正常家兎、ピロカルピン注射家兎及び迷走神

第 3 表 家兎気管気管支分泌物中の諸成分 (各 5 匹の平均値)

	無 機 物			可溶蛋白 (Kingsbun- Clarh 法)	グルコサミン (Elson- Morgan法 Blix 変法)
	Na (焰光法)	K (焰光法)	Cl (シヤ- レス法)		
正 常	4. 28mg	1. 93mg	3. 56mg	0. 81mg	10. 6 γ
ピロカルピン注	5. 98mg	2. 56mg	4. 22mg	0. 80mg	10. 6 γ
迷走神経電気刺激	5. 18mg	2. 18mg	3. 92mg	1. 01mg	10. 8 γ

経電気刺激家兎における気管気管支分泌物中の各種物質の含有量は第 3 表の如くである。

無機物については、Na, K, Cl の量を測定したがその結果は正常群と比較して副交感神経刺激状態では 3 者共に軽度の増加を認めた。可溶性蛋白の含有量についても、迷走神経電気刺激群で幾分増加することを認めた。粘液の主要構成成分であるムチンの量を知るために、ムチンを構成する糖質の一つとしてグルコサミンを測定したが、その結果は各群において殆んど差異を認めることが出来なかつた。

可溶性蛋白の分画測定には、試料中の蛋白濃度が極めて低いためにディスク電気泳動法 (第 3 図) を必要とした。得られた電泳像は第 4 図の如くで、何れの実験群においても血清とほぼ同様のパターンを呈し、prealbumin, albumin, transferin, 及び globulin group の夫々の線を認めた。これらの電泳像からは、各実験群の間に差異を認めることは出来なかつた。

以上の気管気管支分泌物中の各種成分の測定成績を総合すると第 4 表の如くである。これを第 5 表に示すピロカルピン投与による下部気道分泌量の増加に関する諸家の報告と比較する

第 4 図 家兎気管気管支分泌物の蛋白電気泳動像
(上から正常、ピロカルピン注射、迷走神経電気刺激及びエフェドリン注射)

第 4 表 家兎気管気管支分泌物の組成の比較

と、これらの報告にみられる分泌量の極めて著しい増加に対して、その構成成分の増加の割合は第 4 表に示す様に極めて微々たるものである。このような成績から、自律神経系の気管気管支分泌物に及ぼす影響は、単にその分泌量に大きな変化を来すのみで、その組成にはさしたる変化を及ぼさないものと考えられる。

人体におけるこの種の研究は未だ不充分な点

第 3 図 ディスク電気泳動法

第 5 表 ヒロカルピンによる下部気道分泌量の増加

・家兎耳静注 P^{32} の気管分泌物中の含有量(山本)				
	5 m	30m	6 h	12h
正常	40	50	30	12
ピ注	300	700	350	350
count/min.				
・家兎下部気道よりの分泌物排出量 (Boyd)				
	0~1h	1~2h	2~3h	3~4h
正常	1.7	1.8	2.1	2.3
ピ注	1.0	2.5	19.0	10.0
ml/k/hrs				
・家兎下部気道よりの色素排泄量 (寺田)				
	30m			
正常	1.263			
ピ注	1.957			

が多いが、気管気管支の分泌機能殊に気管腺、気管支腺の発達は動物の種類による差異が大きい。従つて、今回の成績をそのまま人体にあてはめるには慎重を要するが、人体にあつても大体同様の傾向をとるものと考ええる。

む す び

気管気管支の分泌機能を特に自律神経系との関連を中心にして検討し、以下の様な結果を得た。

- 1) 杯細胞の分泌機能は、腺組織の分泌機能とは別の働き方をする。
- 2) 自律神経状態の変化により、気管腺の酵素活性の変動がみられる。
- 3) 気管腺はIV型の分泌機序をとる。
- 4) 副交感神経刺激による分泌亢進時にはうすい分泌物が排出される。

共同研究者：大迫茂人，豊田泰雄，田中正，岡本昌子，田中耕一

終わりに、講演の機会を与えて頂いた総会会長高須照男教授に厚くお礼を申し上げます。

御指導、御校閲を頂いた山本馨教授に心から感謝の意を捧げます。

参考文献

- Boyd, E.M.; Expectorants and respiratory tract fluid, *Pharmacol. Rev.*, 6: 521 (1954)
- Dalhamn, T.; Mucus flow and ciliary activity in the trachea of healthy rats exposed to respiratory irritant gases, *Acta physi. Scand.*, 36: Suppl. 123: 1 (1956)
- Florey, H. et al.; Mucus secretion in the trachea, *Brit. J. Exper. Path.*, 13: 269 (1932)
- 金子 寛; 人の気管腺の組織学的並びに細胞学的研究, 日本組織学的記録, 24: 155 (1963)
- Kurosumi, K.; Electron microscopic analysis of the secretion mechanism, *Int. Rev. Cytol.*, 11: 1 (1961)
- Messerklinger, W.; Die Schleimhaut der obren Luftwege im Blickfeld neuere Forschung, *Arch. Ohren- usw. Heilk.*, 173: 1 (1958)
- 三吉康郎; 線毛運動を中心とした上気道の病態生理, *日気食*, 17: 197 (1966)
- Perry, W.F. and Boyd, E.M.; A method for studying expectorant action in animals by direct measurement of the output of respiratory tract fluids, *J. Pharm. Exper. Therap.*, 73: 65 (1941)
- Rhodin, J.; Ultrastructure of the tracheal ciliated mucosa in rat and man, *Ann. Oto. Rhin. Laryn.*, 68: 964 (1959)
- 寺田文次郎; 祛痰剤の正しい使い方, 医学書院 (1954)
- 山本 馨; 気管気管支の病態生理, *日気食*第9回総会宿題報告別刷 (1957)
- 山本 馨; 気管気管支の生体防禦機能について, *日気食*, 14: 1 (1963)

sia e.t.c. Achalasia showed hyperreactive contraction and it was restrained by Ascher and Cermack.

- 4) X-ray films of the slow type showed various crico-pharyngeal disphagia. It was found that the reaction of medicament was different in upper and lower portion of the esophagus due to the anatomical difference of muscular structure, and 3-block-effect of 25 mg intravenous injection of internal was limited in cricopharyngeal region

Finally, the relation between esophageal motility and autonomic nervous system was discussed precisely from the above mentioned facts.

Studies on the Tracheo-bronchial Secretion — Especially Upon the Autonomic Control —

H. Maekawa, M.D.
Osaka City University Medical School

This experiment was made to investigate the relationship of the autonomic control to the secretory function of the trachea and bronchus. The results were as follows :

There are some evidences on histological study that the tracheal glands receive the autonomic control, however the goblet cells in the tracheal mucosa work in response to the stimulation on the mucosa independently of the autonomic control.

It is clear from the findings of Suzuki's nerve stain that the peripheral parts of autonomic nerve are degenerated by section of the bilateral vagi, and are unchanged by the autonomic drugs.

The enzyme activities — acid phosphatase, succinic dehydrogenase and glucose-6-phosphate dehydrogenase — in the tracheal glands increase and decrease with the secretory function.

In microscopic movie and electronmicro-

scopic study, it was found that secretory mechanism in the tracheal gland cells are carried out by mean of eccrine type (IV type) and the cycle of this mechanism is quickened by pilocarpine injection.

Some components in the tracheo-bronchial secretion, i.e. sodium, potassium, chlorine, soluble protein and glucosamine were determined and Disc electrophoretic study of the fluid was performed. These results suggest that alteration in the various components of the fluid is less as compared with increasing in volume of the fluid at parasympathicotonic state

Autonomic Innervation of the Esophagus and Airway (Histochemical and Clinical Studies)

M. Uono, M.D.
The 3rd Department of Internal
Medicine, Faculty of Medicine,
University of Tokyo

For the investigation on neurohumoral theory, I have studied histochemically the distribution of monoamineoxidase (MAO), noradrenaline fluorescing substance (NAd-F1) and acetylcholinesterase (AChE) in various tissues. The hypothesis thereby was that neuron with AChE activity is cholinergic, and with MAO activity and NAd-F1 is adrenergic. In the course of study, however, some nerve cells with high activity of MAO were found to show marked reaction not only in cytoplasm, but also seemingly in nucleus. Sympathetic ganglia consist mainly cells of this "nuclear positive" type and this type was supposed to be the characteristic feature of adrenergic nerve cell.

In muscle layer and gland cells of esophagus, MAO activity was moderately positive and AChE activity was almost negative, while cholinergic and adrenergic nerve fibers