シンポジウム 食道及び気道における自律神経支配の基礎と臨床

筋電図による食道自律神経支配の研究

*時 田 喬

I はじめに

ヒト・兎を対象として食道運動に対する自律神経支配を筋電図を用いて検討した。ヒトを主な対象としたため食道筋電図記録には管内誘導を試みたので、まづ私共の行った筋電図記録法、その正常型から述べる。

II 観察方法

1 電極

(1) 5号胃ゾンデ(ヒト用), 9或は10号ネラトン(兎用)に300 μ の銀線を1cm間隔にまき環状双極電極とした。上・中・下部食道筋電図記録のためこの双極電極を3対つけた。(2) ゴム管上の電極の位置は次の如く定めた。即ち、ヒト用では3対の電極の間隔が長いもの(基準点より電極迄の距離18・19, 29・30, 43・44cm)と短いもの(基準点より電極迄の距離15・16・25・26, 37・38cm)の2種つくつた。レ線透視で身長170cm前後の被験者に於て、長い方の寸法で下部電極が腹部食道迄入り、短い方の寸法で下部電極が横隔膜より少し口側に入ることを認めたからである。兎用では3対の双極電極を5cm間隔につけた。兎食道の長さが約12cmのためである。(3) ヒト・兎用とも食道内に水・薬液・空気を注入するためのビニール管を電極ゴム管に通し上部と中部電極の中央に開口せしめた。(4) ヒトの電極では、ゴム管に糸を通して入口より糸をひっぱるにより管が中部・下部電極部で彎曲し電極が食道壁に密着する様にした。

* 岐阜大学医学部耳鼻咽喉科教室
(主任: 福田 精教授)

2 観察と記録

ヒトでは経口的に、兎では開腹し胃の中から逆行性に電極管を食道に挿入した。上部・中部・下部食道筋電図と喉頭挙上運動・呼吸の5現象を三栄測器製 physiograph で同時記録した。

III 観察結果

1 ヒト・兎食道筋電図の基本型

記録はヒト・兎とも上段より喉頭運動・上部・中部・下部食道筋電図・呼吸とした。食道よりの誘導には心電図が混入する。

a. ヒトに於ける観察(図1a, b)

(1) 安静時上部食道に低振巾(200 μ v以下)持続性の放電を認める。頸部食道筋電図と喉頭筋電図の混入が疑われる。中部・下部食道に食道運動を思ふ放電を認めることは少い。まれに中部或は下部食道(図1a)に局所放電を認めることがある。

(2) 水(5ml)嚥下を行うと喉頭運動にひきつづき上部・中部・下部食道を伝播する放電を認める。下部食道では更にburst放電の反覆を認める(図1b)。ヒトでは図の如く上部・中部・下部の放電の性質が異り、上部は低振巾(200 μ v以下)、高頻度(放電頻度20以上)、下部では高振巾(500 μ v前後)、低頻度(放電頻度10前後)である。この差は上部の放電が横紋筋性、下部放電が平滑筋性であることによると思われる。

b. 兎に於ける観察(図2a, b)

(1) 安静時、頸部の記録には低振巾持続性の放電を認める。胸部には放電を認めぬことが多い。胸部には図2aの如きburst放電の反覆を認める。この局所放電は食道自動能による自発放電とも考えられるが、比較のため行つた壁内

図1 a ヒトの食道筋電図
自発放電

図1 b ヒトの食道筋電図
嚥下（水 5 ml）に続発せる放電 伝播放電並びに局所放電の誘発

誘導(双極釣針電極)による観察ではこの放電が明確でないことより、食道内え挿入した電極管の壁刺激による局所反射が大きな役割を占めていると考えられる。この局所蠕動を示す burst 放電が腹部食道のみに出現するのは兎食道は腹部のみが平滑筋で局所自動能が強いことによる

と思われる。この腹部食道の放電は観察中漸減、消失する傾向がある。

(2) 嚥下に伴い頸部・胸部・腹部を伝播する放電と、腹部に burst 放電の反覆を認める(図2b)。この図は安静時には腹部局所放電を認めなくなつた時の記録であるが、嚥下により局所

図2 a 兎の食道筋電図
自発放電

図2 b 兎の食道筋電図

嚥下に続発せる放電

伝播放電並びに局所放電の誘発

放電が誘発されている。

以上の観察より、私共はヒト・兎の食道電図を ①安静時に現われる放電（自発放電）と ②嚥下に伴う放電にわけ、後者を伝播放電と局所放電の誘発にわけた。安静時の局所放電の出現は電極管の食道壁刺激による局所反射が大いに関与しているが、食道自動能による自発性の放電の存在を考え自発放電と呼んだ。

2 食道運動調節機能の検討

ヒトに於ては食道運動に影響を与える因子に就て、兎に於ては食道運動に対する迷走神経・交感神経支配に就て検討した。

a. ヒトに於ける観察。

(1) 水嚥下と空嚥下の比較（図3 a. b）。水嚥下（5 ml）では嚥下後下部食道迄の放電伝播は約2秒で、下部食道の局所放電の反覆も6回で

図3 a ヒトの食道筋電図

嚥下に続発せる放電

嚥下 (水 5 ml)

図3 b ヒトの食道筋電図

嚥下に続発せる放電

空嚥下

ある (図3 a)。空嚥下では嚥下後腹部放電出現迄 7 秒で下部食道の局所放電の反覆も認め難い (図3 b)。即ち、食道内容の有無が放電伝播時間に大きな影響をもっている。食道運動に対する局所反射の重要性を示すものである。

(2) 水・薬液注入時の放電 (図4)。電極管に

設置したビニール管より水 5 ml を 5 秒で注入すると中部或は下部食道に burst 放電、持続放電、或は中部・下部を伝播する放電を認める。この局所刺激による放電は注入液の差により強度が異なる。図4は水・単シロップ・重曹・稀塩酸・苦味チンキ注入時の放電で、稀塩酸・苦味チ

図4 ヒトの食道筋電図

正 常 人

食道粘膜刺激

ンキ注入時に最も明瞭な放電が出現している。食道粘膜刺激により誘発された放電である。

(3) 空気注入時の放電(図5)。図5は空気10mlを急速にビニール管より注入した時の放電である。中部・下部食道にburst放電を認める。食道拡張刺激により誘発された放電である。

以上、食道の局所刺激が嚥下に伴う放電の出現特に伝播時間、腹部局所放電の誘発に影響を与えること、又食道粘膜刺激・食道拡張刺激で放電を誘発することを認めた。ヒトの食道運動調節に局所反射が重要な役割を有することを示

すものである。

b. 兎に於ける観察(表1)。

(1) 迷走神経の影響。① 一側迷走神経切断にて自発放電は減少或は消失する。嚥下に伴う伝播放電は減弱し、腹部の局所放電の誘発も少くなる。② 両側迷走神経切断にて嚥下しても喉頭挙上のみで嚥下に伴う伝播放電は現われなくなる。③ 迷走神経刺激(3V, 30cyl, 1~2秒)で反射的嚥下が出現する。④ 迷走神経刺激中の食道運動の観察は一側迷走神経を切断し末梢端を30~100cyl, 0.5~1Vで持続刺激して影響をみた。この刺激で自発放電の出現を

図5 ヒトの食道筋電図

表1 兎食道運動調節機序の検討

食道運動（放電）の区別			嚥下に伴う放電	
検査事項			伝 播 放 電	局所放電の誘発
正 常 兎			規 則 的	burst 反覆 個体により数・持続不定
迷走神経切断			減弱（胸腹部）	減少～消失
一側			消失（喉頭挙上のみ）	
両側			消失（喉頭挙上のみ）	
強 刺 戟 （3 V 30c/s 1～3 秒）			1. 刺戟 1～2 秒後嚥下伝播放電出現 2. 直達性局所放電（まれ）	
迷走神経刺激	弱電圧 持続刺戟 0.5～1 V 30～100c/s 30～60秒	迷切前	不 変	頻発嚥下にて判定困難
		迷切中	不 変	不 変
		迷切後	不 変	不 変
		迷切後	不 変	不 変
頸部交感神経切断（両）			不 変	不 変
頸部交感神経刺戟 （1V 30c/s 30～60秒）			腹部放電振巾減少	burst 振巾減少
SCC 注射（20mg）			嚥 下 消 失	
SCC注射と両迷走神経切断			嚥 下 消 失	
SCC 注射・両迷切後 末梢端刺戟 （3V 30c/s 2～5 秒）			嚥 下 消 失	

示す例，嚥下に伴う腹部局所放電の増加を示す例があつた。

(2) 頸部交感神経の影響（図6）。① 頸部交感神経刺戟で腹部の自発放電の振巾は減少する。burst 数の変化は著明でない（図6）。嚥下に伴い誘発される腹部局所放電も振巾が減少す

図6 兎の食道筋電図
自発放電に対する交感神経刺激の影響

図7 兎の食道筋電図
両側迷走神経切断並びに SCC (20mg) 注射後迷走神経刺激(末梢端)の影響

る。② 頸部交感神経両側切断で変化は認め難い。然し、正常兎では観察中漸減消失する腹部自発放電が長く持続する例が存した。

(3) SCC 注射の影響(図7)。食道に対する運動神経支配を除くため SCC 注射を行つた。嚥下は消失するので腹部自発放電が観察対象である。① SCC 注射或は更に両側迷走神経切断を加えても自発放電残存例がある(図7)。

② これに 3 V 30cyl の迷走神経刺激を加える

と刺激後 burst の振巾が増大する(図7)。即ち、腹部局所放電が局所反射的なものであるが中枢よりの支配もうけていることを示す。

以上、兎の観察で食道は迷走神経の促進作用とともに交感神経の抑制作用を受けていることを認めた。又、腹部の自発放電が中枢よりの影響を受けているが局所性のものであることを認めた。

3 食道運動に対する自律神経薬剤の影響

表 2 ヒト食道運動に対する自律神経薬剤の影響

投与薬剤	食道運動 (放電) の区別	自発放電 (中・下部)	嚥下に伴う放電		粘膜刺激による食道拡張刺激に対する放電 (水・シロップ・重曹・稀塩酸・苦チン入)
			伝播放電	局所放電の誘発	
非注射時		burst 反覆 (まれ)	規則的	水嚥下時著明	burst 或は伝播放電出現
ピロカルピン (0.013ml/kg)		出現?	不変	burst 数増加	burst 振巾・持続増加
メコリール (10mg/60kg)		出現せず	不変	不変	不変
アトロピン (0.013ml/kg)		出現せず	不変	振巾減少	burst 振巾・持続減少
アドレナリン (0.013ml/kg)		出現せず	不変	不変	不変
イミダリン (1 ml)		出現せず	不変	不変	不変

表 3 兎食道運動に対する自律神経薬剤の検討

投与薬剤	食道運動 (放電) の区別	自発放電 (腹部食道)	嚥下に伴う放電		粘膜刺激に対する放電 (水 1 ml 注入)	食道拡張刺激に対する放電 (空気 5 ml 注入)
			伝播放電	局所放電の誘発		
非注射時		burst 反覆 観察中漸減消失	規則的	burst 反覆 個体により数・持続不定	1. 局所放電又は伝播放電 2. 嚥下誘発 3. 無反応 4. 自発放電抑制	
ピロカルピン (10mg)		burst 出現	不変~増強	burst 振巾・数増加	1. 嚥下頻発 2. burst 増強	
メコリール (10mg)		呼吸の影響著明 burst 出現?	不変	不変	不変	
アトロピン (2 mg)		burst 振巾減少	不変	burst 振巾減少	1. 嚥下抑制 2. burst 減弱	
アドレナリン (1 mg)		burst 振巾減少	不変	burst 振巾 不変~減少	不変~burst 減弱	
イミダリン (1 ml)		出現せず	腹部放電増強	burst 数振巾増加	burst 増強	

図 8 a 兎の食道筋電図

嚥下に続発せる放電 アトロピン注射前

図8 b アトロピン注射後

表 4 臨床例に於ける観察

被験者	食道運動（放電）の区別	自発放電（中・下部）	嚥下に伴う放電		粘膜刺激に対する放電	食道拡張刺激に対する放電	自律神経薬剤に対する反応	その他
			伝播放電	局所放電の誘発				
正 常 人		burst 反覆（まれ）	規 則 的	burst 反覆 嚥下時著明	burst 或は 伝播放電出現		ピロカルピンにて放電増加	○
頸部食道摘出例		認めず	発 現 伝播時間正常	有	正 常		○	○
左迷走神経麻痺例		認めず	正 常	有	burst 著明	burst 出現早し	正常反応	嚥下第2相（喉頭運動）障害
瘢痕性食道狭窄例		認めず	上部食道収縮時間延長 中下部放電認め難し		burst 出現弱し	正 常	正常反応	逆蠕動？
特発性食道拡張例		認めず	認むるも弱し		burst 出現せず		メコリールにて散発放電多発	食道鏡後下部異常放電（上腹部痛を伴う）

a. ヒトに於ける観察（表2）

結果は表2の如くで pilocarpin, atropin, adrenalin, mecholy, smidalin 負荷で著明な変化を認めない。pilocarpin 注射で嚥下に伴い腹部食道に現われる局所放電が増加する程度である。

b. 兎に於ける観察（表3，図8，図9）

兎に於ては自律神経薬剤の影響はヒトより明瞭である。pilocarpin 注射後自発放電が出現し、嚥下に伴う腹部局所放電の発現も著明となる。副交感神経遮断剤 atropin にて自発放電の

振巾を減少し（図8），交感神経遮断剤 imidalin で嚥下に伴う伝播放電，腹部局所放電の出現も増強した（図9）。副交感神経の刺激，遮断効果とともに，交感神経遮断の影響が著明で食道運動に対し交感神経の役割りの大なることが伺われる。

4 臨床例に於ける観察（表4）。

(1) 頸部食道癌で喉頭頸部食道摘出例に於て頸部の食道瘻孔より電極管を挿入検査した。空嚥下にて咽頭運動後約5秒で食道が一部ないの下部食道に burst の出現をみた。嚥下に伴う

図9 a 兎の食道筋電図

嚥下に続発せる放電 イミダリン注射前

図9 b イミダリン注射後

伝播放電が神経性に伝播されることを示すものである。

(2) 頸静脈孔症候群による左迷走神経麻痺にて嚥下が障害され、水3ml 嚥下のための嚥下第2相が16秒もかかる症例でも食道の伝播放電は正常に現われた。一側迷走神経麻痺では食道の伝播放電出現には障害を与えない。

(3) 癆痕性食道狭窄例。無端消息子法を行つたので口から胃瘻孔に通した糸に電極管の先端

をつけ電極管を胃瘻より逆行性に食道内に引き入れ観察を行つた。狭窄高度の時期に於ける観察に於て、空嚥下で上部食道に持続の長い(7秒)振巾の大きい放電を認めたが中部・下部には伝播放電を認めなかつた。これは筋層障害のための放電欠除も疑われたが、無端消息子法で狭窄改善後は空嚥下における上部食道の強い放電は消失し中部・下部食道の伝播放電も出現したので、高度の狭窄の存在した時、中部・下部

図10 ヒトの食道筋電図

特発性食道拡張症

空嚥下に続発せる放電（食道鏡検査後の観察）

図11 ヒトの食道筋電図

特発性食道拡張症

メコリール注射後

の伝播放電が出現しなかつたのは上部食道の強い収縮の存在が反射的に中部・下部の放電の出現を抑制したためと推測された。

(4) 特発性食道拡張症（図10，図11）。① 嚥下に伴い伝播放電の出現を認め、食道内容の排泄障害は食道運動の欠除によるものでないことが認められた。② 特殊の所見とし、食道鏡検査後胸骨下部に痛みを訴えた時の食道筋電図検査に於て、安静時下部食道に高頻度の burst

放電の出現を認め、嚥下時この放電の増強を認めた（図10）。正常人には認めない放電である。この放電は胸骨下部の痛みの消退とともに約15分で消失した。食道鏡により腹部食道を拡張したため誘発された異常緊張による放電と思われた。③ 本疾患例が mechlorol により蠕動の亢進を示すことがレ線では認められているが、食道筋電図検査で図11の如く中部・下部食道に散発性放電の多発するのを認めた。正常人ではこの

様な放電を認めていない。

III まとめ

1. ヒト・兎に於て管内誘導による食道筋電図記録を試み、その正常型を明かにした。
2. 食道運動には中枢よりの支配による運動、局所の自動能による運動とともに、局所反射性の運動の重要なことを明かにした。
3. 食道運動には副交感神経の促進性支配と

ともに、交感神経よりの抑制的な支配が存することを、兎の交感神経刺戟実験、自律神経薬剤負荷実験で明かにした。

4. 臨床例（瘢痕性食道狭窄例、迷走神経麻痺例、特発性食道拡張症例）の筋電図検査を行い、各疾患の特長を明かにし、食道筋電図の臨床検査としての有要性を明かにした。

協同研究者 田代和彦，加藤邦二，服部智美

投 稿 規 定

- 1) 投稿者は本学会々員であること。
- 2) 原稿は新かなづかいで、楷書、横書、簡潔明瞭なること。句読点を正確に、外国語、薬品名はカタカナを用い「 」や——をつけないこと。
- 3) 論文は組上り3頁まで（400字詰原稿用紙約15枚）、但し特例を認めることがあります。規定頁数を超える場合は超過分の実費並びに超過郵送料をいただきます。
- 4) 200字以内の和文抄録（その英訳も一緒に）を必ずつけて下さい。但し英訳のない場合は英文抄録作製料をいただきます。
- 5) 文献は重要なもののみにして著者名、題名、雑誌名、巻、頁、年号の順に統一して下さい。
- 6) 附図は白紙に墨ではつきり描いて下さい。色で描いたもの、又は不鮮明なものは製版ができず描き直すこととなりますが、その場合は実費をいただきます。図版、写真版の製版は実費をいただきます。
- 7) 別冊御希望の方は論文と同時に御申込み下さい。但し実費をいただきます。
- 8) 原稿は東京都新宿区信濃町35 慶応大学医学部内 日本気管食道科学会宛お送り下さい。掲載の採否は編集員におまかせ下さい。

around those tissues were seen. In Meissner's plexus, MAO and NAd Fl activity was poor or almost negative, but Auerbach's plexus of esophagus, especially in the lower part, showed high activity of MAO (contained many "nuclear positive type" nerve cells) and NAd Fl. Whereas marked activity of AChE was found generally in nerve cells and fibers of both plexuses.

But MAO activity in Auerbach's plexus was extremely poor in operated materials of cardiospasm, and "nuclear positive type" cells were also hardly found.

In muscle layer, nerve fibers and ganglions of trachea and bronchus, AChE activity was intensely positive, but poor or negative in bronchioli and alveoli, MAO activity in epithelium and muscle layer of trachea and bronchus is moderately strong, and many cholinergic and adrenergic nerve fibers around those tissues were seen. In broncholar and alveolar walls, MAO activity was strongly revealed.

Electromyographical Studies on the Influence of Autonomic Nervous System on Motility of the Esophagus

T. Tokita, M.D.

Department of Otolaryngology
School of Med. Gifu Univ.

The autonomic controls of motility of the esophagus were studied electromyographically. In men and rabbits, the electromyograms of the upper, middle and lower parts of the esophagus were recorded simultaneously by means of bipolar leads with 3 pairs of loop electrodes consisted of circular silver wires attached to a rubber tube.

1. Normal patterns of the electromyograms of the esophagus were explained in men and rabbits. Namely, (1) the burst of spike potentials propagated from the upper

part to the lower part of the esophagus after a swallow, (2) the rhythmic bursts of spike potentials in the lower part of the esophagus during resting state in rabbits, (3) the burst of spike potentials induced by syringing fluids (5 ml) into the esophagus and (4) the burst of spike potentials induced by insufflation of air (10 ml) into the esophagus were observed.

2. On the experiments of rabbits, the rhythmic bursts of spike potentials in the lower part of the esophagus were increased by the electrical stimulation of the n. vagus and by the administrations of pilocarpin and imidalin, whereas the bursts were decreased by the electrical stimulation of the cervical sympatheticus and the administrations of atropine and adrenalin. On the experiments of healthy adults, the spike discharges of the esophagus did not show any marked changes.

3. The electromyographic examinations of clinical cases such as a patient after excision of the cervical part of the esophagus, a patient with vagus palsy, a patient with cicatricial stenosis of the esophagus and a achalasia patient were performed. In a achalasia patient, after the administration of mecholyl the appearance of multiple sporadic spike discharges in the middle and lower parts of the esophagus were observed.

Bronchoscopy is One of the Most Effective Methods in Diagnosis of Lung Cancer

S. Ikeda, M.D., et al.

National Cancer Center Hospital Tokyo

Bronchoscopy is one of the most effective methods in diagnosis of lung cancer.

We have been making researches and developed the prototype of a new Flexible-Broncho-Fiberscope since 1965.

At this time of accomplishment of this new fiberscope, we make the report on its