気管上皮の微細構造

——亜硫酸ガスおよび赤土粉末吸入による影響——

菊池恭三* 有泉道行**
片野文夫*** 高山乙彦****

第1表 実験条件

吸入物質	吸入条件		実験動物数
亜硫酸ガス	125p.p.m. × 3 時間		2
赤土粉末	短期間	6 時間	1
	長期間	6時間持続/日 ×10日	1

大気汚染の呼吸器系に対する研究は、主として臨床的な面においてなされてきたが、近年、その疫学的、病理組織学的観察が行なわれるようになってきている。

著者らは、大気汚染に関する一連の基礎的研究として、亜硫酸ガス、炭粉、硅砂、赤土粉末など大気汚染の原因となると考えられる物質、さらに、食塩や光線など、汚染を増強せしめると考えられるものを用いて、鼻咽喉、気管、気管支、肺に対する影響を病理学的にしらべており、その一部は、すでに発表した。

この論文では、亜硫酸ガスと赤土粉末を用いて動物実験を行ない、気管における形態学的変化を観察し、それぞれの物質が気管線毛細胞に及ぼす影響について、主として、電子顕微鏡学的にしらべたので、その成績を報告する。

実験材料および実験方法

4匹の白色成熟モルモットを使用し、これを実験材料から亜硫酸ガスと赤土粉末の2群に分けた。

実験に用いた装置は、著者の一人高山が、既に発表したものと同種のものである(高山:昭41)。

赤土は、乳鉢にて十分に細粉化し、粒径を10ミクロン前後として実験に供した(片野)。

実験条件は第1表に示した。

亜硫酸ガスまたは赤土粉末の吸入の終った動物に対しては、これを無麻酔のもとに断頭し、咽喉気管肺を一塊として取り出した。そして、この研究のために、気管はすべて carina の直上

部より約1cmの範囲を切除し、osmium 酸にて固定し、形の如く脱水、包埋を行なった。標本は、LKB Ultratome によつて薄切され、日立電子顕微鏡によつて観察された。

実験成績

亜硫酸ガス吸入例(第1図)

線毛細胞における basal bodyは、細胞の自由面に平行に正しく配列しており、その構造は、横断面、縦断面共に正常像のそれに等しい。これより細胞膜を貫通して管腔に向う cilia には、肥厚、腫脹、萎縮、断裂などの病変はなく、殊に横断面では、周辺部に9 double filaments が、そして中心部では2 single filamentsが存在し、すべて、いわゆる9+2の pattern が認められ、形態学上からは、これらの cilia が可動性を失っていないことが示された。cilia の中間に存在する microvilli にも変形は認められなかった。

Terminal barは、細胞膜を正しく接合せしめており、また細胞膜や細胞間隙にも空胞変性、離断などの病変は認められなかった。

細胞の核には、膨化や萎縮などの変形はみられなかった。核上部に特に豊富に認められ、また胞体に広く分布する mitochondria には減少は認められず、その他の細胞内に存在する成分、たとえば Golgi 氏体、vesicle などの分布も正常範囲内であつた。

以上から、亜硫酸ガスは、この刺激条件で

* 日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室(主任:中村四郎教授)講師

** 同助手

*** 同大学院学生

**** 同気管食道科助教授

は、気管の線毛細胞は形態学上、なんらの変化を受けないという成績がえられた。

赤土粉末吸入例（第2～11図）

短期間吸入例（第2～5図）では、線毛細胞における mitochondria は、個々の細胞については、その減少が目立っていたものもあつたが（第3図）、自由面に存在する cilia および basal bodies については、変形などの病変は認められなかつた。Terminal barは、すべてにおいて存在し、細胞間隙に赤土粉末が入りこんで、線毛細胞を破壊するという所見はえられなかつた。従つて、赤土粉末が深部に及ぶということはなく、basal cell は basement membrane上に位置し、indifferent cell と共に細胞膜、細胞成分には変性が認められなかつた。また、reticular and collagenous fibrils にも細胞浸潤や空胞変性はなく、正常像を示していた。

以上から、赤土粉末短期間吸入例においては、線毛細胞の核上部の mitochondria の減少により cilia の可動性が障害されたであろうと考えられた。

長期間吸入例（第6～11図）では、光学顕微鏡上、気管上皮に赤土粉末を認める細胞が多く、気管分岐部に近い部位においてのみ、部分的に上皮細胞の崩壊ないし消失がみられた。これらの変化は、本研究においては、もつとも強い病変であつたが、basement membrane を破壊せしめた例はなかつた。

気管上皮が崩壊せしめられた部位では、病変は、自由面をもつ線毛細胞において最も強く、ついで indifferent cell, basal cell の順であつた。これは、赤土粉末が気管上皮を機械的に刺激するために、病変は表面より次第に深部に波及したためと考えられる。

電子顕微鏡によつて観察すると、つぎのような成績がえられた。

線毛細胞では、cilia と microvilli の付着する自由面は、細胞膜の一部が破壊されて、赤土粉末の侵入が認められた。Terminal barは、隣接細胞を接着せしめており、赤土粉末が、bar を離断して細胞間隙に入りこむということではなく、むしろ、細胞膜を破壊、貫通して細胞が崩壊していく幾つかの過程が認められた。この断

裂が細胞核の近くまで及んでいるものもあつた。

線毛細胞の核上部を cross sectionによつて観察すると、各細胞に少なくとも数個の赤土粉末の侵入が認められたが、mitochondriaの数については、必ずしも常に減少しているとは限らなかつた。赤土の侵入は、単に線毛細胞にとどまらず、indifferent cell および basal cell にも及んでいた。すなわち、多数の赤土の侵入した basal cell では、細胞膜の崩壊が著明で、reticular and collagenous fibrils 側に basement membrane fibrils を残して、細胞の遊離しているものもあつた。さらに、光学顕微鏡では確かめえなかつたが、赤土粉末は、これらの fibrils にも影響を与えており、少数ではあつたが、赤土が basement membrane を貫通して、fibrils の中に侵入しているのが認められた。

なお、気管上皮細胞内に侵入した赤土粉末の粒径は、最大10ミクロンであつた。

考 察

亜硫酸ガスの吸入例においては、すべての cilia には、形態学上なんらの病変がみられず、しかも、横断面では9+2という pattern を示し、cilia の可動性が保たれていることが知られた（第1図）。さらに、線毛細胞の核上部に存在する mitochondria の減少は認められず、cilia の運動のエネルギー源は、少なくとも減少していないと考えられた。しかしながら、これらの形態像から、cilia の可動性が正常であると推定することはできない。Cilia の可動性は、温度の低下のみでも著明な影響を受け（Hakansson & Toremalm : 1965）、また、実際に亜硫酸ガスを吸入せしめて cilia を観察すると、明かにその可動性が減少したという報告がある（三吉：昭41）。

ところが、赤土粉末の吸入群では、短期間刺激例では、線毛細胞の核上部の mitochondria は減少し（第3図）、長期間刺激例では、一部に胞体の崩壊ないし消失が認められた（第6～11図）。これらの病変から、気管上皮細胞の機能は、著しく減退あるいは消失したものと考えられた。

元来、気管上皮は、その線毛運動によつて、吸入された異物や、気道よりの分泌物を排出除去する、いわゆる生体の防禦作用をもつといわれている。ところが、赤土粉末の吸入例、特に長期間刺激例にみられるような気管上皮細胞の明かな崩壊は、この生体の防禦機能を失わしめるものであり、さらに長時間の吸入を続ければ、赤土粉末は急激に上気道に蓄積され、そして、気管上皮細胞を完全に破壊せしめるものと考えられた。

気管上皮細胞の機能的な回復あるいは形態学的な線毛細胞の再生の可能性については、つぎのように考えられる。すなわち、この実験における亜硫酸ガスの吸入例と赤土粉末の短期間刺激例においては（第1～5図）、一部に mitochondria の減少は認められたとしても、上皮細胞の形態は破壊されず、今後刺激を加えないと仮定すると、上皮細胞の機能は回復に向う可能性があると考えられる。しかしながら、赤土粉末の長期間吸入例においては、線毛細胞から basement membrane 下に存在する fibrils に至るすべての構造において（第6～11図）、広範囲に赤土粉末が侵入しており、細胞膜が破壊され、胞体の崩壊が認められるところから、これらの病変は進行性の経過をとり、形態学的には消失の方向に向うものと考えられる。家兎の線毛細胞のみを機械的に障害せしめて、その回復過程をしらべた研究は（Hilding & Hilding : 1967), indifferent cell and basal cell が完全な構造を有していたものであり、これを著者らの実験に応用することはできない。

赤土粉末の気管上皮を破壊する過程や、上皮細胞の変性の経過などについては、組織化学を導入することによつて、さらに明らかになるであろうと考えられる。

ま と め

亜硫酸ガスまたは赤土粉末をモルモットに吸入せしめ、気管上皮の組織学的変化を電子顕微鏡によつて観察した。

亜硫酸ガス吸入群（125p.p.m. 3時間）では、気管上皮に形態学的変化は認められなかった。

赤土粉末群では、短期間吸入例（6時間）で

は、一部の線毛細胞の mitochondria が減少していたが、その他に形態学的変化なく、また上皮細胞に赤土の侵入は認められなかった。

これに反して、長期間吸入例（1日6時間×10日間）では、赤土粉末が気管上皮の細胞膜を貫通し、細胞の崩壊が認められた。そして、少数ではあつたが、赤土粉末が basement membrane を通過して、reticular and collagenous fibrils に存在している部位もあつた。

（稿を終るにあたり、恩師中村四郎教授のご指導を深謝する。本論文の一部は、第18回日本気管食道科学会総会において発表した。）

文 献

1. 高山乙彦：大気汚染の咽頭、喉頭に対する影響について 日気食18, 1967.
2. 片野文夫：日気食発表予定
3. Hakansson, C.H. & Toremalm, N.G. : Studies on the physiology of the trachea. Ann. Otol. 74 : 955, 1965.
4. 三吉康郎：線毛運動を中心とした上気道の病態生理 日気食17 : 197, 1966.
5. Hilding, D.A. & Hilding, A.C. : Ultrastructure of trachea cilia and cells during regeneration. Ann. Otol. 75 : 281, 1966.

（電子顕微鏡写真の説明）

第1図 亜硫酸ガス吸入群

線毛細胞の cilia (C) の縦断面と横断面（この図の左上）を示す。横断面では、いずれも9+2という pattern が保たれており、basal bodies (BB) も正常であるために cilia の運動性は失われていないと推察された。

第2～5図 赤土粉末短期間吸入例

これらの図に示された赤土粉末吸入例においては、気管細胞に赤土の侵入は認められなかった。

第2図 線毛細胞 (CC) の核上部を示す。Mitochondria (M) や他の osmophilic structures には著変の認められない例が多数であつた。

第3図 線毛細胞 (CC) の一部においては、mitochondria (M) の減少が認められたものもありこれは cilia の運動のエネルギーが減少していると考えられた。

第4図 Ciliated cell (CC) の核と核上部の一部を示す。細胞質と細胞間質とは正常像を示している。Mitochondria (M) の分布は正常であつた。

第5図 Basal cell (BC) は Basement membrane (BM) 上にあり Reticular and collagenous fibrils (RET) には著変が認められなかった。

第6～11図 赤土粉末長期間吸入例

〔第6図〕 線毛細胞 (CC) の cilia (C) は存在するが、細胞膜は破壊 (D) され、細胞質に間隙が生じていた。線毛細胞と Brush cell (BC) に赤土粉末

(R) の粒子が細胞内に侵入していた。

〔第7図〕 線毛細胞(CC)の核および核上部の高さの横断面では、各細胞に幾つかの赤土粉末(R)が認められた。この図では、細胞の破壊過程は示されていない。

〔第8図〕および〔第9図〕 これらの両図から、赤土粉末は、細胞膜を破壊(D)して細胞内に侵入していくと考えられた。第8図のIndifferent cell(I C)の細胞膜は破壊されていない。

〔第10図〕 Basal cell(EC)はBasement membrane(BM)と共に、またはBasement membraneを Reticular and collagenous fibrils 側に残して遊離していた。これらの基底部の細胞にまで、赤土粉末(R)の侵入が認められた。

〔第11図〕 少数ではあったが、Reticular and collagenous fibrils (RET) にも赤土粉末(R)の存在が認められた。これは、光学顕微鏡では確かめえない所見であった。

第 3 図

第 1 図

第 4 図

第 2 図

第 5 図

第 6 図

第 9 図

第 7 図

第 10 図

第 8 図

第 11 図

ABSTRACTS

The Use of SILASTIC in Treatment of Unilateral Vocal Cord Paralysis and Atrophy of the Vocal Cord.

Yasunobu Suzuki, M.D, et al.

Dept. of Oto-Rhino-Laryngology,
School of Med., Keio Univ.

A number of substances for paracordal injection have been used in the treatment of unileteral vocal cord paralysis and so on.

The chief reason for vocal disabilities in cases of unilateral vocal cord paralysis or hypogenesis vocalis with bowing is deficient glottal closure for phonation which may be successfully treated with paracordal injection.

Recently new suitable materials were used and discussed, TEFLON by Arnold and SILASTIC (medical grade silicone) by Rubin.

We reported an experience with SILASTIC injected into the unilateral vocal cord paralysis (14 cases) and atrophy of the vocal cord (12 cases).

The result was estimated with phoniatic examinations, such as phonation time, the ratio of phonation time and expiration time, and sound spectrogram etc.

Following problems were discussed and described in this paper.

- 1) The techniques of injection
- 2) The points of injection
- 3) The amount of injecting silicone
- 4) Indications

Ultrastructures of the Tracheal Epithelia; Morphological Changes Resulting from Inhalation of Sulfurous Anhydride and Red

Clay Particles.

K. Kikuchi, M.D.,
M. Ariizumi, M.D.,
F. Katano, M.D. and
O. Takayama, M.D.

Department of Otolaryngology and
Bronchoesophagology Nihon University School of Medicine

Using electron microscopy, tracheal epithelia of four guinea pigs were examined after insufflation of sulfurous anhydride or red clay particles. In cases of sulfurous anhydride insufflation, no morphological changes were found in any cell of tracheal epithelia. When red clay particles were given in a short time, mitochondria of ciliated cells were found decreased in number. However, this was not always observed. In the cases in which insufflation lasted for a long time, cytoplasmic membranes of tracheal epithelia were found penetrated by the particles, resulting a damage of the cell structures. Even in the reticular and collagenous fibrils, few red clay particles were found.

A Study on Complaints of the Patients with Cancer of the Esophagus

H. Koyama, M.D.
A. Nakamura, M.D.

Dept. of Bronchoesophagology,
Dept. of Otorhinolaryngology,
The Red Cross Kyoto second
Hospital

Out of 235 patients who received esophagosopic examinations in our department, 14 cases of cancer of the esophagus