主訴よりみた食道癌の検討

小 山 弘* 中 村 明 正**

癌の早期受診、早期診断が叫ばれて久しいが、胃癌に比し、食道癌に対する啓蒙は未だ充分とはいえない。

我々は先に、食道鏡所見を中心として食道疾患を主訴別に分類した際、食道癌患者の中で、嚥下並びに通過障害を来院時主訴とする者が過半数を占めることを認めた。しかも之等はすでに手術時期を失した者が殆んどであった。そこで食道癌患者の早期自覚症状を知るために、之等の患者が、当院気管食道科を訪れた際の主訴並びにそれ以前の自覚症状を追及し、予後との関係を調べた。

食道に関する訴えは多種多様であり、その分類の仕方も区々である。例えば、同じく食道入口部の異常感にも己に多くの報告にもあるごとく、「何か変な感じがする」或は「気持が悪い」という様な漠然とした訴え（狭義の異常感）から

「何か物が有る様な感じ」…（異物感）
 「ふさがった感じ」……………（閉塞感）
 「おさえられる様な感じ」…（圧迫感）
 等々種々の段階がみられる。

又「食餌が通りにくい」という訴えにも「のみみにくいもの」…（嚥下障害）と、「嚥下した物が食道を通りにくい、或はすぐ逆流するもの」…（狭義の通過障害）があり、同様に疼痛にも、嚥下痛と通過痛が区別される。

これらの区別は、病巣の局在と主訴との関係を知る上に必要な事柄ではあるが、これ等を正確に区別し得ない場合が非常に多く、徒らに細分することは却て不正確となるおそれがあるため、一応次の様に大別する。

「異常感」……普通食は食べられるが、前述の様な種々の異常な感じのあるもの。

「疼痛」……普通食は食べられるが、その際

に疼痛を感じるもの。

「通過障害」……実際に普通食流動食が食べにくい、或いは食べられないもの、

「通過感」……食物が食道を通るのを自覚するもの。その他直接食道の訴えではないが、胃重感、上腹部痛等。

之等の訴えをもつて来院し、食道直達鏡を実施した過去5年間の235例は「表1」のごとく、「異常感」が最も多く95例で全体の40.4%を占め、次いで「通過障害」の70例（29.7%）、「疼痛」の37例（15.7%）、その他である。

表 1

主 訴	例数	男	女	%
異 常 感	95	43	52	40.4
通 過 障 害	70	48	22	29.7
通 過 痛	37	22	15	15.7
通 過 感	4	3	1	1.7
血 性 痰	7	5	2	
胃 重 感	4	2	2	
上 腹 痛	3	3	0	
胃 圧 迫 感	1	1	0	
咳	1	1	0	
胸 や け	1	0	1	
げ つ ぶ	2	1	1	
し や つ くり	1	0	1	
体 重 減 少	1	1	0	
自 覚 な し	8	6	2	
計	235	136	99	

之等のものを疾患別に分けると「表2、3」のごとくで、食道鏡下試験切除により、組織学的に癌腫と決定したものは、通過障害群に最も多く28例を算し、次いで異常感群の8例、疼痛群の4例、通過感群の1例である。

そこで最も頻度の高い通過障害群について検討してみる。

(1)年令分布：「表4」の如く、癌腫は60才台に最も多く14例を示し、50才以上で85%の24例

* 京都第二赤十字病院気管食道科

** " 耳鼻咽喉科

表 2

	癌腫	食道炎	異物による損傷	拡張スパスム	狭窄	憩室	縦隔腫瘍	放射線火傷	異所性胃粘膜	嚥下マヒ	出血	静脈瘤	解剖異常	計
通過障害	28	16	16	4	2	1	1				1		1	70
異常感	8	56		6	2		1	1	1				20	95
疼痛	4	12	8	11			1	1						37
通過感	1	3												4
その他	10			2	1	1	1	1			1	3	1	29
計	41	97	24	11	12	5	2	2	2	1	1	1	3	235

表 3

表 4

を占める。

(2) 男女比 18 : 10

(3) 主訴自覚より来院迄の期間: 「表 5」のごとく、一般的に遅いのは予想通りであるが、6 カ月以上が 3 例も見られる。一方 2 カ月以内

に来院したものが 18 例見られるにも拘らず、X 線上己に 5cm 以上の著明な陰影欠損を認め、又直達鏡的には全周に亘る腫瘍を認めるものが殆んどである。之等はすでに放射線療法を主治療とする以外に方法なく、手術可能例は僅か一例に過ぎない。 ^{60}Co 照射によつても手術可能の域にもたらし得たのは一例に過ぎない。(表 7)

表 5 通過障害を主訴とするものの主訴発現より来院迄の期間

1 カ月未満	8 例
1 ~ 2 カ月	10 "
2 ~ 3 カ月	3 "
5 ~ 6 カ月	4 "
6 カ月以上	3 "
	28 "

〔2 カ月以内 18 例〕

表 6 通過障害発現前の自覚症状

異物感	5 例	5 カ月 ~ 1 年
閉塞感	4 "	2 カ月 ~ 1 年
胃不快感	2 "	8 カ月, 1 年
上腹部痛	1 "	6 カ月
吃逆	1 "	2 カ月
	13 "	

表 7 通過障害群

主治療	例数	転帰	経過		
			1~6月	7~12月	1~2年
^{60}Co	18	⑤ 死 13	2 6	3 5	2
手術	1	⑤ 1			1
放置	1	死 1	1		
不明	8				
計	28	⑤ 6 死 14	2 7	3 5	1 2

(4) 主訴発現以前の自覚症状・詳しい問診により 28 例中 13 例に、通過障害発現以前に「表 6」のごとき初発症状を認めた。長いものは、1 年以上異常感をもちながら放置していたもの。或は受診しながら神経症として対症療法をうけていたものがみられる。それではこの時期に癌腫

を見つけた場合、果して意味があるかどうかの問題になる。僅かな例数で判定することはできないが、未だ通過障害を認めない前述の「異常感群」「疼痛群」「通過感群」中の癌腫13例についてみると「表8」のごとくである。予後は通過障害群と同様決して良くはなく、X線上著明な陰影欠損を認めるものも多いが、手術可能例が一応5例あり、中2例は約2年再発を認めず、又手術死亡例中1例は他病によるものであることから、やはり、通過障害発現以前に見つけ出すことの重要性は否定できない。

表8 異常感、疼痛、通過感群（通過障害を認めないもの）

主治療	例数	転 帰	経 過		
			1~6月	7~12月	1~2年
⁶⁰ Co	6	④ 1 死 5	1 2	3	
手 術	5	④ 2 死 3	2		2 1
不 明	2				
計	13	④ 3 死 8	1 4	3	2 1

主訴と癌腫の進展状況との関係については、林田等は Dysphagia が起つてから入院するまでの期間の長短は余り関係なく、2週間ですでに切除不能例もあつたとのべている。これは我々の例でもみられることで「表5」のごとく1カ月未満でも殆んどが切除不能であり、むしろ通過障害をきたす迄の期間が重要と思われる。なお林田によれば入院時流動食も殆んど通らぬ様な高度の Dysphagia 11例中切除不能は9例あつたという。

疼痛については、嚥下時のみ自覚する疼痛は、切除可能群と不能群との間に余り差を認めないが、持続性の胸痛、背痛のあるもの20例中、切除不能例18例に達していると述べている。

異常感については多くの報告がみられるが、大藤は44例中2例、関谷は食道ツカエ感56例中2例に癌腫を認めている。我々の例でも異常感群では他の統計と同様、所謂癌恐怖症と見做されるものが多いが、実際に直達鏡下に95例中8

例（8.4%）の癌腫を認めている。このことは異常感を訴える患者をノイローゼとして片付けることの危険を充分に示しているものといえる。

現在、食道鏡でも判別しがたい様な時期のX線診断は無意味だとする意見があり、食道癌の早期診断はX線では無理であると断定する人もあるが、X線撮影法の進歩により早期診断の可能性は増してきている。又、少くとも前述の様な大きい陰影欠損をきたす迄放置されないためにも、胃の集団検診に際し、食道も必ず撮影すべきである。このことは以前から2、3の人々により主張され乍ら、一般には経済的或は技術的な関係から余り実施されていない現状である。

又何等かの食道の異常を訴えるものは、X線テレビによる蠕動異常等の動的観察、直達鏡による拡大観察、試験切除、或は細胞診等を行なうことにより、一人でも多く早期に発見する必要がある。

我々はX線で未だあらわれない癌腫を、積極的に食道鏡で見つける努力をし度い。ファイバースコープの拡大観察で以前に比し遙かに明るい細かい粘膜像を見得る様になった現在、我々はむしろ判定困難な早期食道癌のみに悩まされる時期が早くきてほしいものとする。

一総合病院の少数例で統計的価値はないが、都会の中心にある病院であり乍ら他の報告に比し、余りにも来院時期を失している例の多いこと、又折角、胃の検診を受け乍ら、食道が見過ごされている例、或いは神経症として片付けられている例等に接し、食道癌の早期発見と共に早期受診の啓蒙の重要性を痛感するものである。

文 献

1. 河本和友他：咽喉異物感に関する考察 日気食 13, 121, 1962. 14, 104, 1963.
2. 大藤敏三他：咽喉頭食道異常感の臨床的観察 日気食 15, 43, 1964.
3. 入江英雄：食道通過障害の臨床 日気食 16, 51, 1965.
4. 林田健男：食道癌手術の二、三の問題 医事新報 2163, 3, 1965.
5. 関谷忠雄：食道に関係あると思われる主訴をもつて来院した症例の統計的観察 日気食 18, 165, 1967.

本論文の要旨は日本気管食道科学会第19回総会に発表した。

ABSTRACTS

The Use of SILASTIC in Treatment of Unilateral Vocal Cord Paralysis and Atrophy of the Vocal Cord.

Yasunobu Suzuki, M.D, et al.

Dept. of Oto-Rhino-Laryngology,
School of Med., Keio Univ.

A number of substances for paracordal injection have been used in the treatment of unileteral vocal cord paralysis and so on.

The chief reason for vocal disabilities in cases of unilateral vocal cord paralysis or hypogenesis vocalis with bowing is deficient glottal closure for phonation which may be successfully treated with paracordal injection.

Recently new suitable materials were used and discussed, TEFLON by Arnold and SILASTIC (medical grade silicone) by Rubin.

We reported an experience with SILASTIC injected into the unilateral vocal cord paralysis (14 cases) and atrophy of the vocal cord (12 cases).

The result was estimated with phoniatic examinations, such as phonation time, the ratio of phonation time and expiration time, and sound spectrogram etc.

Following problems were discussed and described in this paper.

- 1) The techniques of injection
- 2) The points of injection
- 3) The amount of injecting silicone
- 4) Indications

Ultrastructures of the Tracheal Epithelia; Morphological Changes Resulting from Inhalation of Sulfurous Anhydride and Red

Clay Particles.

K. Kikuchi, M.D.,
M. Ariizumi, M.D.,
F. Katano, M.D. and
O. Takayama, M.D.

Department of Otolaryngology and
Bronchoesophagology Nihon University School of Medicine

Using electron microscopy, tracheal epithelia of four guinea pigs were examined after insufflation of sulfurous anhydride or red clay particles. In cases of sulfurous anhydride insufflation, no morphological changes were found in any cell of tracheal epithelia. When red clay particles were given in a short time, mitochondria of ciliated cells were found decreased in number. However, this was not always observed. In the cases in which insufflation lasted for a long time, cytoplasmic membranes of tracheal epithelia were found penetrated by the particles, resulting a damage of the cell structures. Even in the reticular and collagenous fibrils, few red clay particles were found.

A Study on Complaints of the Patients with Cancer of the Esophagus

H. Koyama, M.D.
A. Nakamura, M.D.

Dept. of Bronchoesophagology,
Dept. of Otorhinolaryngology,
The Red Cross Kyoto second
Hospital

Out of 235 patients who received esophagosopic examinations in our department, 14 cases of cancer of the esophagus

were found, The relationship of chief complaints and symptoms on their first hospital visits to the prognosis of their diseases was studied. In 41 cases, 28 males and 13 females, 1) 28 patients had a chief complaint of disturbance of deglutition, 2) 8 patients had unusual sensation on deglutition, 3) 4 patients had a pain on swallowing, 4) One patient had a sensation of passing food in the esophagus.

Among the 28 patients with a chief complaint of disturbance of deglutition 8 patients had the first hospital visit within one month after they had developed the disturbance, 10 patients in 1 to 2 month, 3 in 2 to 3 month, 4 in 5 to 6 month, 3 after 6 month. In 13 patients, however, the disturbance of deglutition had been preceded by the unusual sensation on swallowing.

To detect malignancy of the esophagus in the early stage, every individual should be routinely examined in a regular check-up of the esophagus as well as the stomach, and the subject who complains of any kind of abnormality should thoroughly be investigated by means of dynamic study with TV fluoroscopy and esophagoscopy.

Studies on the Intraesophageal Pressure of Laryngectomized Patients at the Time of Phonation

Y. Nosaka, A. Setoguchi,

T. Fukunaga, S. ASano,

Department of Oto-Rhino-Laryngology,
Kumamoto University Medical School,
Kumamoto, Japan. (Director : Prof. Y.
Nosaka)

The intraesophageal pressure with esophageal speech on laryngectomized patients at the time of phonation was measured to study the mechanism and capacity of esophageal speech. The results are as follows:

Intraesophageal pressure always marked

the same pattern no matter what was spoke. The wave patterns are the most complicated in the good esophageal speakers.

Maximum pressure at phonation is the lowest and swallowing pressure is the highest in the good speakers. The value of a ratio of the integral quantity by deglutition to that of phonations is the lowest in good speakers.

The measurement of intraesophageal is not only useful to learn the function of pseudoglottis, but to teach esophageal speech and to find out secondary changes at hypopharynx, pseudoglottis and lower esophagus.

Reconstruction of Cervical Esophagus of Previously Irradiated Cases

I. Ono, et al.

Dept. of Oto-Rhino-Laryngology,
National Cancer Hospital

Experiences of twenty-two cases on reconstruction of cervical esophagus after pharyngolaryngoesophagectomy were reported. Most of these cases had received radiotherapy by telecobalt or supervoltage X-ray preoperatively.

Tubed pedicle flaps were useful and assure even for heavily irradiated cases. The disadvantageous influence of irradiation for reconstruction was found not serious in the case of supervoltage X-ray, because of its skin sparing effect.

Studies on The Esophagofiberscope with Emphasis on the Improvement of the Instrument.

M. Endo, M.D., et. al.

Dept. of Surgery Tokyo Women's
Medical College Institute of Gastroenterology

Esophagofiberscopic examinations (Olympus' E. F. S.) have been carried out in 510 cases in our clinic for past two and half