食 道 動 態 の 研 究 (第 2 報)

食道内圧測定法よりみた咽喉頭異常感症

*弓 削 庫 太 池 田 正 典
 内 田 正 興 石 原 文 隆
 服 部 康 夫 高 村 節
 高 根 宏 展
 **永 野 泰 宏

はじめに

咽喉頭に異常感を訴えて来院する患者は年々増加の傾向にあるが、そのなかにはかなりの高率で諸種の食道疾患が含まれていることは想像に難くない。又事実幾多の報告がそれを示している。

我々は食道疾患のうち、特に食動機能異常と異常感との関連につき興味をいだいてきた。そしてこの両者の関連を検索する一方法として異常感患者の食道内圧測定を試み、得られた結果を健常者に対する内圧測定法の基礎的資料（食道動態の研究、第一報）¹⁾と比較検討して新知見を得たので報告する。

1 内圧測定方法

食道内圧の体外への誘導管として内径 2mm、長さ 60cm の先端に小受圧孔を有する polyethylene 管を応用したいわゆる open-tipped method である。この誘導管は 1 本単独のものと、5cm 間隔 2 本、1cm 間隔 3 本等を作製した。日常の検査には患者に対する刺激の最も少い 1 本単独のものを、時に応じて 2 本、3 本を併用した。内圧の測定と記録は日本光電製 Straingauge type pressure transducer (MP-4 型) とインク書き oscilloscope (W-1260 型) を用いた。又嚥下の指標として、嚥下時頸筋の EMG を表面電極法により記録した。

測定に際して誘導管を無麻酔で口腔經由に胃内迄挿入し、仰臥位とし、5cm ずつ引上げなが

ら内圧を記録した。圧測定は主として空嚥み (Dry swallowing) を 30 秒間隔で行わせしめ、1 ケ所で最低 5 回は反復嚥下させ記録の正確を期した。

2 測定対象

咽喉頭食道部に圧迫感、異物感、狭窄感等を訴える患者で、咽喉頭、食道、胃に器質的変化の認められない男女 40 名に対して内圧測定を行った。被検者の年齢構成は 15 才以上 59 才迄とし、小児及び高令者は含んでいない。

食道内圧測定は、①蠕動波の進行速度、②蠕動波の中途消滅率、③特異性波形の出現頻度の三項目につき分析検討した。これらの項目は、本研究第 1 報¹⁾で述べたように、内圧測定上診断価値の高いと考えられる項目である。

3 結 果

① 咽喉頭異常感患者の食道蠕動波の進行速度について

食道の蠕動波は典型的なときには、First wave, Second wave, Third wave の三部分よりなるが、蠕動波の本態は Third wave と考えられている。(第 1 図) 我々は頸筋 EMG により標記された嚥下開始より Third wave の頂点迄を蠕動波の伝導時間と考え、咽喉頭異常感患者の食道各部位での伝導時間を計測し第 3 図に表した。又対照として健常者のそれを第 2 図に示した。

その結果咽喉頭異常感患者の蠕動波には、健常者に比して進行速度の速い一群と、進行速度の遅い一群が存在するのが注目された。

* 日本医科大学耳鼻咽喉科 (主任 橋本泰彦教授)

** 鹿島白十字病院耳鼻咽喉科助教授

ESOPHAGEAL PERISTALSIS

第1図 食道蠕動波形

次に個人別に各部位の進行速度の平均値を算出し、その各点を線で結び個人別進行速度とし、健常者のそれと比較した。(第4図、第5図) その結果異常感患者では健常者に比し、中～下部食道で進行進度の著しく速いものが40名中6名、著しく遅いものが40名中2名に観察された。

第2図 健常者の食道蠕動波

第3図 咽喉頭異常感症の食道蠕動波（健常者に比して黒ワクの部分にバラツキが見られる）

第4図 健常者個々の蠕動波

② 蠕動波の中途消滅について

嚥下運動により発生した食道蠕動波は、健常者の場合でもその全部が食道上部から噴門に向つて、連続的に進行するとは限らず、食道の中

第5図 咽喉頭異常感者の個々の波形（健常者に比し速度の遅い群と速い群が見られる。黒ワク内健常者）

途（特に第2狭窄部附近）でかなりの率で消滅するものである。我々の健常者の例では全蠕動波の10数%が消滅することを観察している¹⁾。

この蠕動波の中途消滅率を異常感症患者について分析したところ、健常者に比して下部食道における蠕動波の消滅がはなはだしいことがわかった。（第1表）

③ 特異性波形の出現について

特異性波形とは、二峰性波形、三峰性波形、その他、Nonperistaltic waves (NPW) 等をいうが、咽喉頭異常感患者の二峰性波形と三峰性波形その他につき、その出現率を健常者及び健常な高令者と比較した。

その結果、これらの波形の出現率は第2表、第3表のように健常者に比し明らかに多発し、高令者の値に近いことが認められた。又個人別では40名中2名に特異性波形の頻発が観察され

第1表 蠕動波の中途消滅率

門歯列より cm	咽頭	PEJ *	22~24 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	消滅した蠕動波の総数 分析した蠕動波の総数 = %
健常者の部位別蠕動波消滅率 (%)	0	3.5%	16.3	12.3	10.5	14.8	13.6	$\frac{199}{1542} = 12.8$
異常感のある患者の部位別蠕動波消滅率 (%)	0	2.1%	7.8	9.5	21.0	26.6	21.4	$\frac{286}{1798} = 15.9$

* PEJ とは Pharyngo-esophageal Junction の略である。

第6図 二峰性波形

第7図 A 三峰性波形 B 多峰性波形

第2表 二峰性波形の出現率

	分析した蠕動波の数	二峰性波形の出現した数	出現率 (%)
健 常 者 (60才以下)	2144	53	2.5
健 常の高令者 (60才以上)	329	29	8.8
異常感のある患者	2178	144	6.6

第3表 三峰性波形、及びその他の波形の出現率

	分析した蠕動波の数	三峰性及びその他の波形の出現した数	出現率 (%)
健 常 者 (60才以下)	2144	3	0.1
健 常の高令者 (60才以上)	329	9	2.7
異常感のある患者	2178	39	1.8

た。

④ まとめ

以上の結果をまとめてみると第4表のようになる。

4 考 按

食道内圧測定法の進歩は、正確に生体腔内圧を測定するために開発された精巧な pressure transducer の出現に因るものである。

既に海外では本測定法は臨床的に盛んに応用され、食道病態生理の新知識は目醒ましいものがある⁵⁾⁶⁾⁷⁾。又本邦でも坂西²⁾、宮川³⁾、植田⁴⁾、

第4表 ま と め

被検者総数	40.
1) 中～下部食道における蠕動波のすすみかた。	
i) 健常者に比して著しく速いもの	6名
ii) 健常者に比して著しく遅いもの	2
2) 蠕動波消滅の著しいもの	3
3) 二峰性、三峰性、及びその他の波形の多発するもの	2
	13名

橋本²⁾、内田¹⁾等の基礎的研究があり、又臨床的にも優れた業績を生んでいる。

今回我々は、本法の臨床的応用の一環として、咽喉頭に異常感を有する患者の食道内圧を検査し、健常者にたいして行つた基礎的データ(食道動態の研究、第1報)との比較検討を行つた。その結果、二、三の新知見を得たので若干の考察を加えてみたい。

① 食道蠕動波の進行速度について

食道蠕動波の進行速度については、坂西²⁾、植田⁴⁾、内田¹⁾等の研究がある。即ち諸家によると、食道を進行する蠕動波の速度は決して一定ではなく部位により差があるという。坂西²⁾は食道入口部附近と噴門で速度は減弱するとした。内田¹⁾は咽頭で最も速く13cm/sec、第1狭窄部～第2狭窄部で急激に減速し2.5cm/sec、中～下部食道で又速度を得て5cm/sec、最後に噴門附近で大きく減速されると述べている。

このように進行速度は各部位により一定ではないが、嚥下開始より噴門に到達するのに要する時間は、健常者では殆んどが6～10秒程度である。・

これらの点については異常感患者の場合はどうであろうか。我々の測定では異常感患者の蠕動波の大多数は健常者の進行速度範囲内にあった。しかし少数ではあるが、速度の明らかに遅い群（遅速群）と、中～下部食道が非常に速い速度で運動する群（高速群）の二つの特異なグループが観察された。（第3図）この遅、高速二群の存在は、個人別進行速度（第5図）で更に明瞭になった。即ち遅速群は40名中2名にみられ、高速群は40名中6名にみられた。

この二群のうち遅速群は、咽喉頭神経症についてのレ線検査上の特徴とみなされる中下部食道における蠕動波の減弱、バリウムの停滞等を内圧測定上より観察したことになり、従来、いわゆる食道アトニーと称されるものはこの群に入るものと推察された。

これに対して高速群の場合はどのように考えるべきであろうか。

この高速群の蠕動波は咽頭より第2狭窄部に至る迄の進行速度には何ら特別な点はなく、健常者の進行速度に全く一致するが、中部食道に進むにつれてそのグラフは水平に近くなってくる。（第5図）これは中部より下部食道に至る広域が同期的に迅速に運動しているものと解釈できよう。この点に関しては数ヶ所同時誘導による詳細な分析が更に必要ではあるが、この高速群に属する蠕動波が嚥下開始後3～4秒の短時間内に中～下部食道に迄達し、持続時間が短かく、しかも広範域にほぼ同期的に観察されることよりみて、いわゆる Nonperistaltic waves が頻発したものと考えられた。

この Nonperistaltic waves（以下NPWと略）とは健常者にも稀ではあるが見出されるもので、内圧測定上広域に同期的に出現する波形である。典型的な食道の蠕動波が、食道の上部より下部へ向つて円滑に進み、食塊の運搬という目的になつた動きをみせるのに対し、NPWは食道の広域が同期的に運動するため、上より下への波の進みがみられず、従つて正常蠕動波

とは機能的にも区別され得る波形である。もちろん嚥下運動により惹起される波形であるから局所蠕動とはいささか趣を異にするものであろうが、その出現機序はわかつていない。諸家⁸⁾⁹⁾によると、自律神経系の影響、精神的ストレス等によりその出現が左右され、又高令者に多発する傾向があるともいう。

それ故 NPW の出現は、直ちに病的状態につながるわけではないが、はなはだ特異な波形である。

我々の経験¹⁾でも健常者に同期性波形と目される波形を見出した。（食道動態の研究、第1報）しかしその殆んどは下部食道に多発し又異常感症に出現した波形とは異なり、正常範囲内の進行速度を有し、又持続時間の長いゆるやかなカーブを描く大きな蠕動波であった。

従つて同期性波形には二種類あるようにも考えられたが、我々が健常者で観察した波形は、下部食道特有の波長の長い大きな波を、3～5cm という短い路離で2ヶ所同時記録したために生じた、みかけ上の同期的な波形であろうと現在推察している。

それ故、Nagler⁵⁾のいう特異な NPW とは、我々の観察からのみいへば、健常者では稀であり、今回の異常感症患者にみられた高速群が、この NPW に相当するものと考えられた。

従つて NPW と目される波形の多発をもつて異常感症患者の特徴とは断定できないが、正常の蠕動波とは出現機序が異なるのではないかと考えられる特異な波が異常感患者に多発したことは興味深い。更に自律神経機能検査、薬剤の負荷、同一人に対する検査の反復等が必要であろう。

② 蠕動波の中途消滅について

Kronecker 以来食道蠕動波は中途で消滅することなしに噴門に達するものと考えられてきた。

しかし宮川³⁾は、その精密な実験結果よりみて、嚥下に続発した波形は食道を下降する途中の第二狭窄部附近で一旦消滅し、その直下部より再び蠕動波が出現し噴門に向うとする説をとる。食道生理学上に新たな問題を提起した。この点に関しては植田⁴⁾の興味深い説がある。即ち植田は鼻孔縁より25cmを中心に、頸部食道に由来する“A波”と下部食道の蠕動波へ連なる“B波”の移行がみられ、時には両者の共存する波形もみられるとした。

我々の行った基礎的研究では、蠕動波の十数%は第二狭窄部附近で確かに消滅するが、他の大部分は連続的に噴門迄到達するのではないかとの結果を得ている。(いずれにしても食道第二狭窄部の生理学的意義を再検討する必要があると考えられる。)

さて異常感症患者のレ線検査上の特徴の一つとして、蠕動波の微弱、消失等があげられるが、内圧測定からみた場合はどうであろうか。結果は第1表のように、健常者に比して明らかに蠕動波の消失が著明であつた。

即ち我々の健常者での経験¹⁾では、前述のように第二狭窄部以下では十数%の消滅率であるのに対し、異常感患者では食道の下部に向うにつれ消滅率の増大する傾向がみられた。又個人別では40名中3名に中途消滅の著しいものが認められた。

このような著しい蠕動波の消滅は、他の機能的、或いは器質的疾患、例えば Achalasia¹⁰⁾¹¹⁾ Raynaud氏病¹²⁾、食道癌¹³⁾にも認められ、又高令者にしばしば見出される傾向がある。又萎縮性食道炎¹⁴⁾に顕著だつた例も経験している。従つて蠕動波の消滅はNPWと同様、咽喉頭異常感症特有のものではもちろんないが、異常感症のレ線上の一つの特徴を内圧測定法によりうらづける結果が得られたものと思う。

③ 二峰性波形の出現について

二峰性波形とは、1回の嚥下運動に二つのpeakを生ずる波形と云い、健常者にも稀(3.3%)にみられるものである。本波形の異常感症患者における出現率は、6.6%で健常者の2倍以上も出現しており、又著しく多発するものが40名中2名にみられた。本波形の出現機序はなお明らかではないが、健常者の場合には若年層に比し高令者の出現頻度が高いことが観察されている。又若年の健常者では本波形の多発は皆無であつたのに咽喉頭異常感患者では高令層の特徴の一つである二峰性波形が、若年層にも多発する場合があるということは興味深い事実であろう。

④ 三峰性、その他の波形の出現

三峰性、その他の波形も又健常者では極めて稀(0.5%)で、主として高令者の場合に見出

される。異常感患者では1.8%にみられ、明らかに高率であつた。本波形は Vantrappen⁹⁾のいう repetitive な NPW と同一なものか否か、或いはレ線観察上しばしば問題となる鋸歯状収縮¹⁵⁾、又は tertiary waves との関連についての検討を必要とし、又レ線映画と内圧測定との同時記録による分析 cineradiometry が期待されるわけである。

以上咽喉頭異常感患者の内圧測定上の成績につき考察を加えてみた。その結果上述のように異常感患者固有の所見として分析することは困難な点が多かつたが、特異な点としては、(1)健常者に比し蠕動波の中途消滅が多いこと、(2)蠕動波の遅滞する症例のあること、(3)二峰性、三峰性波形の多発及び Non peristaltic waves と推察される波形の頻発する症例があつたこと等があげられよう。

これらの諸所見は咽喉頭食道神経症のレ線検査上の特徴をうらづける好資料となるものであり、又所見のあるものはその出現機序に一層興味をもたれるものであつた。今後はレ線映画と内圧同時記録による総合的な分析方法として cineradiometry が必要不可欠なものと考えられる。

5 結 語

① open-tipped methodにより咽喉頭食道に異常感を有する患者40名の食道内圧測定を行い、健常者の場合との比較を試みた。

② 蠕動波の進行速度は大部分は正常域内であつたが、40名中6名に同期性波形(NPW)と思われる波の多発をみ、又40名中2名に進行速度の遅滞が観察された。

③ 健常者に比し蠕動波の中途消滅が多く、特に40名中3名に著しいものがあつた。

④ 二峰性、三峰性波形し健常者に比して出現率は大であり、特に40名中2名に頻発をみた。

⑤ これらの成績は必ずしも咽喉頭異常感患者固有のものとは考えられないか咽喉頭異常感の成因考察上はなほ意義深い問題を包含しているものと思われ、今後、レ線映画、或いは筋電図と内圧測定との併用方式はいよいよ緊要であ

ることを強調した。

稿を終るにあたり、御指導をいただいた橋本泰彦教授に深謝致します。尚本論文の要旨は第19回日本気管食道科学会総会で発表した。

文 献

- 1) 橋本泰彦：食道内圧測定法の意義，気食誌，17，3，106～113，1966.
- 2) 内田正興：食道動態の研究（第一報），食道内圧測定法による食道運動の基礎的研究，気食誌，17（6）273～293，1966.
- 3) 坂西昭夫：食道運動に関する補遺，日胸外誌，12，34～49，1963.
- 4) 宮川 清：(a)嚥下時の消化管内圧変化，信州医学誌 9，775～873，1960. (b)食道運動の生理，日消誌59，709～1962.
- 5) 植田正昭：食道運動の研究，日外会誌66，476～490，1965.
- 6) Ingelfinger, F.J.: (a)Esophageal motility, Physiol. Rev. 38 (p. 533～583), 1958. (b)The gastro-esophageal vestibule, its normal function and its role in cardiospasm and gastroesophageal reflux, Amer. J. Med. Sci 228, 1954.
- 7) Botha: Radiological localisation of the diaphragmatic hiatus, Lancet 1 (1962), 1957.
- 8) Code, C.F.: Detection of hiatal hernia during esophageal motility test. Gastroenterology 43(5)

(p. 521～531), 1952.

- 9) Nagler, R.: Serial esophageal motility studies in asymptomatic young subjects. Gastroenterology 41 (p. 371～379), 1961.
- 10) Vantrappen, G.: Simultaneous fluorocinematography and intraluminal pressure measurements in the study of esophageal motility. Gastroenterology 35 (p. 592～602), 1958.
- 11) 佐藤 博：食道噴門部電気内圧曲線検査法，胸部外科19，6，p. 398～404，1966.
- 12) Hightower, N.C.: A comparison of the effects of acetyl-beta-methylcholine chloride (Mecholyl) on esophageal intraluminal pressure in normal persons and patients with cardiospasm. Gastroenterology 26 ; p. 592～599, 1954.
- 13) Stevens, M.B.: Aperistalsis of the esophagus in patients with connective-tissue disorders and Reynand's phenomenon. New Eng. J. Med. 270; p. 1218～1222, 1964.
- 14) 有森正樹：食道癌及び下部食道噴門癌における食道運動の研究並びにその臨床的意義について，日外会誌66，p. 491～504，1965.
- 15) 古内一郎：食道粘膜萎縮症について，気食誌，19（2），p. 114～122，1968.
- 16) 木内宗甫：食道機能異常の観察，日耳鼻67，p. 1345～1354，1964.

訂 正

第17巻第6号 p. 25～45 「食道動態の研究（第1報）食道内圧測定法による食道運動の基礎的研究 内田正興」

訂 正 個 所

p. 41右下から8行目，約10%とあるのを約3%に訂正致します。

circulatory defects of them were reversed. In attack they were reduced or disappeared. Some of the cases of contracting asthma above 5 years did not show the reversion. The improvement of the defects was generally decreased. The reversion tended to decrease in proportion to the length of period during contracting.

Clinical and Pathological Study of Scalene Node Biopsy and Mediastinoscopy in Pulmonary Diseases, Especially Cancer of the Lung

H. Niihara, M. D.

Department of Surgery, School of Medicine, Keio University (Director; Prof. Ichiro Akakura)

The study is to evaluate the validity of scalene node biopsy and mediastinoscopy as methods of clinical examination on various pulmonary disabilities and to discuss the possible route of lymph node metastasis of cancer of the lung.

In a 4 year duration til June, 1966, 111 patients were examined and those included 45 patients of cancer the lung, 17 mediastinal tumor, 10 pulmonary tuberculosis, 8 sarcoidosis, 6 metastatic tumor of the lung and others. In general, scalene node biopsy and mediastinoscopy were infrequently positive in patients with pulmonary diseases unless the mediastinum were involved by the disease or the patients had sarcoidosis.

From the study of cervical lymph node and mediastinal metastases of cancer of the lung based on both examinations of biopsy and mediastinoscopy, an obvious route of metastasis was determined in none of each case and it was considered that metastases were produced via the much complicated route of lymphatic system. Considering the validity of scalene node biopsy and mediastinoscopy, as methods of pre-operative examination, it was assured that scalene node biopsy,

as biopsy of distant lymph node from the lung, is an useful method for determination of indication of surgery, and mediastinoscopy as a good tool of examination of the mediastinum is useful to determine operability of the lesion of the lung.

Study of Esophageal Movement. (2) Intra-esophageal Pressure in Patients with Unusual Sensation of the Pharynx and Larynx

K. Yuge, M. D., et al.

Dept. of Otolaryngology, Nihon Medical College

Intra-esophageal pressure was measured in patients with unusual sensation of the pharynx and larynx. The results were compared with those in normal subjects and the interest was on analysis of the cause of this ailment.

The characteristics of the results were summerized and described as follows:

- 1) Cessation of peristalsis in the patients was observed more frequently than in normal subjects.
- 2) Some showed a general slowing of peristalsis and some showed a fast peristalsis in the lower esophagus.
- 3) Two- or Three- peaked waves were observed in many cases, and a wave suggestive of non-peristaltic wave was also observed.
- 4) The above mentioned findings were compatible with x-ray findings in the patients with unusual sensation of the pharynx and larynx.

Two Cases of Primary Tracheal Tumors

Jo. Ono, M. D., et al.

Department of Otolaryngology, School of Medicine, Keio University

Two cases of primary tumors of the cervi-