 綜 説

気道再建手術の適応と方法

*石原恒夫

Reconstruction of Trachea and Bronchus

Tsuneo Ishihara, M. D.

Department of Surgery, School of Medicine, Keio University, Tokyo

With recent progress in surgical techniques and postoperative managements, radical operations for lesions in the trachea and bronchus have been aggressively performed. Tracheoplasty is mainly performed in patients with tracheal stenosis secondary to tracheostomy, tracheal invasion of thyroid carcinoma, tracheal injuries and primary malignant tumors. Bronchoplasty is performed in patients with lung cancer, tuberculosis, bronchial injuries and benign tumors. Operations for lesions in the tracheobronchus consist mainly of sleeve resection and end-to-end anastomosis. It is now evident that primary anastomosis is possible even if it necessitates a wide resection of the trachea.

In tracheobronchoplasty, not only operative technique but also anesthetic technique is important. Accumulation of carbon dioxide and the occurrence of arrhythmia should be prevented.

This paper summarizes the indication, surgical method and anesthetic technique for surgery of the tracheobronchus.

最近とみに気道再建手術が注目されてきたことは喜ばしいことである。わが国においても、すでに20年余りの歴史をもっている手術であるが、数年前までは、この手術は一部の人の関心をひいていただけであった。

医学会における気道再建のたどってきた道を振り返ってみると、1つの epoch は第14回日本気管食道科学会総会にあった。昭和37年に金沢市で開催された本総会において、「気道および食道の成形」がはじめてシンポジウムに取り上げられた。ついで昭和43年の第20回総会では「気管気管支の再建」がシンポジウムとして基礎的方面と臨床的方面に分けて論じられ、更に昭和48年の第25回総会では再び「気道・食道の再建術、その後の進歩」がシンポジウムとして取り上げられた。

このように日本気管食道科学会においては早くから気道再建が取り上げられていたが、広く胸部外科医の

*慶応義塾大学医学部外科

関心をひくまでには至らなかった。しかし、昭和50年、第28回日本胸部外科学会総会において曲直部寿夫会長が「気管・気管支の手術」をシネシンポジウムとして、また「機能改善を目的とした呼吸器外科をシンポジウムとして取り上げてからは、胸部外科領域には俄かに気道再建に対する関心が高まった。漸く高まってきた気管気管支の手術に対する関心は日本外科学会にも波及し、昭和51年、第76回日本外科学会総会において石川七郎会長は「気管気管支成形を伴う肺手術」を主題の1つに選び、翌52年の第77回総会では村上忠重会長は「気管(支)形成を伴う肺切除」をシネシンポジウムに取り上げた。長らく気管気管支の外科に取りくんできたものにとっては隔世の感を覚えざるをえない。

慶大外科において気管支成形術がはじめて臨床例に行われたのは昭和30年10月24日であった。症例は結核性の左主気管支狭窄を認めた29歳の男子で、端々吻合ではなく、気管支狭窄部を開大する Gedauer 方式

による皮膚弁移植が試みられた。経過は良好であった^{1,2)}。

その頃、大阪大学第1外科においても、腺様嚢胞癌に対して sleeve resection が行われていた。昭和30年4月6日である。この患者は術後22年、健在していると聞いている³⁾。

慶大外科における第2例目の気管支成形術は昭和31年3月30日に行われた。この症例は25歳の女子で、第1例と同じく結核性の左主気管支狭窄であった。この第2例に対してはじめて狭窄部を切除して端々吻合で気管支を再建する術式が選ばれた。当時1人の医局員の友人に毎日新聞の学術の記者がいてこの人がこの画期的な手術の記事を書いた。

沢山の動物で実験を重ねてきたあとではあったが、はじめての端々吻合には時間がかかった。手術手技も麻酔も輸液も今日の技術水準には程遠いものであったのであろう。徹夜で術後管理にあたったスタッフの努力の甲斐もなく、この患者は術後第1病日急性肺水腫で死亡した。輝かしい新聞の報道が却ってわれわれにむなしさを与えた。

あれからすでに20余年が過ぎた。手術手技は進歩し、気道再建手術の成功例が多数報告されるようになった。

昨年(昭和52)の第30回日本胸部外科学会総会において、「気管支形成」がラウンドテーブルディスカッションの主題に選ばれたのを機会に、筆者は気道再建手術の全国集計を行った。その詳細な別誌にゆずるが⁴⁾、昭和52年7月末までに、気管成形術は全国45施設で195例に、気管支成形術は44施設で285例に行われていた。気管成形術をうけた症例は気管切開後の気管狭窄が61例でもっとも多く、甲状腺癌気管浸潤の44例、外傷の42例、原発性気管癌の37例がこれについていた。気管支成形術では肺癌が157例でもっとも多く、結核性瘢痕狭窄の70例がこれについていた。外傷は26例集計された。

本稿においては漸く注目を浴びてきた気道再建手術について全国集計の結果を参考にしながら適応と手術方法を中心に考察を加えてみた。

適応について

気管成形術

1. 気管切開後の気管狭窄

気管切開口に生じた肉芽による狭窄と^{5,6)} 気管カニューレの先端の刺激により生じた肉芽による狭窄と⁷⁾、カフの圧迫により気管壁が変性したために生ずる狭

図1 気管チューブのカフの圧迫で生じた気管狭窄(矢印)

図2 図1の症例の気管狭窄部の切除標本。、気管内腔は著明に狭窄している

窄^{5,7-12)}とある。図1は気管内挿管し、レスピレーターを用いて人工呼吸を行った症例の気管のX線写真である。カフの圧迫により気管に範囲の広い狭窄が発生した。図2は本例の気管の切除標本である。気管を4気管輪含めて切除し、端々吻合で気道を再建した。術前は安静時にも喘鳴が認められたが、術後は喘鳴は全く消失した、図3は本症例の術後の気管造影である。このような気管狭窄に対して保存的な治療を試みることは危険で、内径が1/2以下に狭窄したものでは観血

図3 図1に示した症例の術後の気管造影写真
気管が短縮したために気管分岐部が釣り上
っているが、ほかに著変はない

的に治療すべきである。

2. 外 傷

新鮮外傷と陳旧外傷とある。新鮮外傷でも気管の損傷の明らかな症例では問題はないが、気管損傷の症状の出にくいものでは外傷を見逃し易いので注意を要する。頸部外傷で血痰を認めるときは気管損傷が明らかでなくても、気管支鏡検査を行って、損傷の有無を確かめた方がよい。損傷が部分的で創の哆開がなければ保存的に治療しても良いが¹³⁾、損傷が半周以上に及ぶときは、損傷部位を手術的に処置すべきである。これを放置すると次に述べる陳旧性の瘢痕狭窄¹⁴⁾となる。すなわち気管外傷に対し適切な治療を行わないと受傷3～4週後、喘鳴、呼吸困難の症状が現われ、気管狭窄の存在が明らかとなってくる。

新鮮な気管損傷に対する縫合は、陳旧性の瘢痕狭窄の手術よりも手技が安全で、かつ容易であるので、新鮮外傷を見逃すことのないように注意すべきであろう。

しかし、集計した全国諸施設の成績をみると新鮮な気管損傷の手術例では吻合部狭窄や縫合不全の発生率が比較的高かった。気管が損傷すると周辺の血液が気

道内に流入し、病態が重篤に見えがちである。合併症の発生率の高いのは縫合を急ぐあまり、操作が不正確になるためかも知れない。気道を確認し止血を確実に行えば、縫合は容易なはずである。

3. 腫 瘍

気管に発生する原発性腫瘍には悪性腫瘍と良性腫瘍があるが、われわれが日常接するものはほとんどが悪性腫瘍である。原発性腫瘍そのものの頻度は少ないが、悪性腫瘍としては扁平上皮癌¹⁵⁻²³⁾、腺様嚢胞癌^{16-19, 24-37)}、平滑筋肉腫^{7, 37)}などが報告されている。気管成形術が今日のように普及する前は、これらの腫瘍に対しては鉗子による内視鏡的な切除や照射が行われていた。しかし、鉗除も照射も姑息的で根治しうるものではない。

腺様嚢胞癌では、肉眼的な腫瘍の境界よりも広く浸潤しているものが多い、Pearson³³⁾は腫瘍の肉眼的境界線よりも1 cm離れて気管を切除すべきであると述べているが、われわれも腫瘍が境界と思われる部分より組織学的には、1気管輪進展していた症例を経験している。悪性腫瘍における気管成形術では、術中に気管の両断端を組織学的に詳しく検索しなければならぬことを物語っているものであろう。

気管の原発腫瘍とは別に周囲臓器に発生した悪性腫瘍が気管壁に浸潤してきて、気管内腔に腫瘍が増生してくるものがある。甲状腺癌^{16, 32, 37-46)}がもっとも多いが、副甲状腺癌⁴⁷⁾、食道癌⁴⁸⁾にも気管壁へ浸潤するものがある。図4は甲状腺癌の気管浸潤例の切除標本である。隣接臓器に発生した癌がこのように気管内腔に浸潤してくるのである。

腫瘍が2次的に気管に浸潤してきたものでは、放置すると腫瘍が内腔を閉塞して窒息することがあるの

図4 甲状腺癌が浸潤した気管壁の切除標本。気管を縦に開いたところである。癌が内腔に盛り上っている

で、原発腫瘍を根治できる見込みがなくても、気管の病変部を切除する必要がある。

4. 先天性気管狭窄

稀な奇形ではあるが新生児あるいは幼小児に喘鳴、呼吸困難を認めるときは気管狭窄の存在する可能性もあるので胸部X線写真撮影、気管支鏡検査を行って精査すべきである。横撮りの写真が有用であるといわれているが⁴⁹⁾、深い斜位で撮った写真も気管をみるためには便利である。先天性気管狭窄では気管軟骨が馬蹄型をとらず融合して輪状となり膜模部を欠いている。全気管にこのような気管軟骨の融合を認める症例では、その治療は難しいが⁵⁰⁾じょうろ型の狭窄や気管の一部分に分節状に狭窄を認めるものでは気管成形術の適用により気道の確保がえられるので、早い時期に観血的に奇形をなおすべきであろう。

気管支成形術

1. 肺 癌

わが国においてもっとも多くこの手術の対象となっているのは肺癌である。初期に行った肺癌手術例に局所再発がみられたために、肺癌でこの手術の適応に入るものは少ないのではないかといわれた時代もあったが、今日ではこの術式の応用によって肺癌手術の適応はむしろ拡大されている。

通常の肺葉切除術では根治性に疑問の残る症例に対して、一側肺全切除の適用を検討する前にこの術式の適用をまず考えてみるべきであろう。機能的に一側肺全切除が可能であっても術後の回復は sleeve lobectomyの方が早いし、回復の程度も異なる⁵¹⁾。

また、従来の手術法では切除の適応外におかれていた気管分岐部や下部気管に浸潤した肺癌の中にも、気管気管支成形術の応用によって根治しうる症例がある^{52,53)}。図5は、右上葉気管支に発生した肺癌が下部気管にまで浸潤した症例の術前の気管支鏡写真である。この症例では右上葉を右主気管支、下部気管とともに切除し、気管と左主気管支および右中幹を吻合して新しい気管分岐部を作った。術後2年5カ月を過ぎたが、再発の徴候はなく、元気に働いている。

2. 結核性気管支狭窄

太い気管支の結核性気管支炎を主徴とする肺結核症が今日でも跡を絶たない。化学療法により結核性炎が消退しても瘢痕狭窄を残して治癒すると末梢肺領域に感染を繰返すようになるので、気管支狭窄を治療する必要が生ずる。

全国集計により結核性瘢痕狭窄の手術成績をみると術後の吻合部狭窄が高率に発生していた。術前の化学

図5 右主気管支に発生した肺癌が気管分岐部をこえて下部気管にまで浸潤した症例の気管支鏡写真

療法が不十分であったのか、狭窄部が広範囲であったために、吻合がうまく行かなかったのか詳細は分らないが、悪性腫瘍の症例と異り、結核例では必ずしも健全な気管支壁で吻合できるとは限らないので、術前の化学療法の効果を適格に評価し、手術時期を慎重にきめることが、合併症を防止する要点ではないかと思われる。

3. 外 傷

閉鎖性胸部外傷により主気管支が横切されることがある^{7,54-66)}。胸郭が前後に強く圧縮されると横径がのび、左右の主気管支に気管分岐部を外側に牽引する力が加わるのである。この時期に声門が閉じていると、気道内圧は上り、気管支が断裂し易い状況が生ずる。通常、気管分岐部から2cm以内の左右の主気管支が断裂する⁶⁷⁾。図6は交通事故により胸を強打した症例の受傷後12時間の気管支鏡写真である。この症例では右主気管支が完全に離断していた。図7はこの症例の受傷36時間後の気管支鏡写真である。

このような症例は気管支成形術の適応に入るもので、受傷後早期に手術的に処置すべきである。

手術手技について

病変部への到達経路

筆者が用いている病変部への到達経路について述べる。

病変部が頸部気管や頸胸移行部の気管にあるときは、前頸部の襟状切開で病変部に到達している。襟状切開のみでは視野が十分にえられないときは、これに胸骨縦切開を追加した。

図 6 閉鎖性胸部外傷による右主気管支完全離断例の受傷後12時間の気管支鏡写真
右主気管支は完全に離断しているようにはみえない

図 7 図6と同じ症例の受傷後36時間の気管支鏡写真
気管支鏡所見は時間とともに変化し、右主気管支は閉塞してきている

気管の下3分の1に病変部分があるときは右開胸で気管に到達している。

気管への到達経路の如何によって気管成形術の難易が左右されるので、到達経路については慎重に検討すべきである。

主気管支に病変があるときは、普通の開胸術に準じて開胸している。

切除範囲

気管はその60%を切除しても端々吻合で再建できるということは今日では明らかである⁶⁸⁻⁷⁰⁾。人間の気管は長さ約11cm、気管輪の数は15~19個、平均16.5個である⁷¹⁾。従って10気管輪切除をしても端々吻合により気管を再建することができるというてよい。筆者らは気管輪を10個および9個切除した後、端々吻合で気管を再建した症例をそれぞれ2例経験しているが、これら4例の中に吻合部が哆開したものはない。

主気管支の成形術では切除範囲に悩むことは少い。しかし、左側では主気管支を切除して、端々吻合すると、大動脈弓に左上葉支がさえぎられて、吻合部に予期しない張力がかかることがある。吻合部が気管分岐部の近くに来るときは主気管支の切除量はかなり制限されると思った方がよい。

主気管支の結核性の瘢痕狭窄例で狭窄部の範囲が長いものは、狭窄の著しい部分のみを切除し、残存した狭窄部は壁の内側面をけずりとして内腔を広くし、それから吻合するのも1つの方法である。炎症性に壁全体が肥厚しているので、壁の内側面をけずりとしても壁が弱くなることはない。筆者はこのような方法を時々用いているが、結果は良好である。

吻合法

縫合糸は筆者は初期には chromic catgut を用い、後ナイロン系にか

え、現在ではプロリン糸を用いている。テフデック糸を用いたこともあるが、筆者らが使用してきた縫合糸の中ではプロリン糸がもっとも良いように思われる。

縫合法は粘膜下に針を通し、内腔に糸が出ないようにすること、また気管や気管支の断端の軟骨が上下きちっと合うようにすることが必要である。

減張縫合は行わない。吻合部を胸膜片などで被覆することもしていない。縫合は一層で十分である。

補 填

補填方法としては、今日までいろいろの方法が報告されているが、胸膜による補填^{71,74)}とメッシュによる補填^{75,76)}が気管壁の部分的欠損の修復に用いられて成功している。

しかし、切除範囲が広く、端々吻合では気管を再建できないときには全周補填の問題が生じてくる。人工気管を臨床に用いて成功した報告は長らく聞かなかったが、最近 Neville ら⁷⁷⁾は気管の全周欠損の修復に、silicon rubber prosthesis を用い、輝かしい成績を上げている。

麻 酔

気管気管支成形術の麻酔には2つの意味がある。1つは疼痛からの解放であり、1つは換気の維持である。狭窄の強い症例では特に換気が問題になる。

麻酔の技術的な難しさは気管の病変部が気管分岐部に近くなる程、きびしくなるようである。

頸部気管に病変があるときは、筆者は局所麻酔で手術をはじめ、気管の病変部に達したところで、病変部より肺側の気管を切開し、ここに消毒した気管チューブを術野から挿管して全身麻酔に切りかえている。

吻合のすべてを気管チューブを術野から挿入したままで行うことには無理があるので、気管の後ろ半分に縫合糸をかけたところで、術野から口腔に向けて消毒した気管チューブを逆行挿管し、先に挿入してあったチューブを抜去して、逆行挿管したチューブの先端を気管の肺側断端に挿入している。こうすると形は通常の気管内挿管となるが、術野に露出した気管チューブは清潔なので、術野が汚染されることがない。

胸腔内気管の病変に対しては経口挿管による全身麻酔で手術をはじめているが、開胸後は術野挿管、逆行挿管の手順に従って手術をしている。

この術野挿管による麻酔法には換気の中断がない。問題があるとすれば気管に到達して、術野から挿管するまでの間の換気である。狭窄部が気管分岐部に近づく程、麻酔の手技が難しくなると先に述べたのはその

ことである。

術野から挿管するまでの間、気管狭窄部を越えて細い(テフロン針のような)チューブを挿入し、venturiの原理を応用したjet換気を利用するのも1つの方法である⁷²⁾。

筆者は頸部気管の狭窄の著しい症例に、術野から気管の健常部に挿管するまでの間、部分体外循環を用いたことがある⁷³⁾。体外循環を用いた時間は32分間であり、この症例に関する限り、麻酔の維持には成功した。しかし、術後創からの実質性の出血が多量で、創の治癒は遷延した。体外循環は症例を選んで用いれば、有効な補助手段であるが、みだりに用いるべきものではないと思われる。

術後管理について

気管気管支成形術後の患者は通常の開胸術後の患者と異り、気道内分泌物の咯出が自力では十分にできない。術後管理の最大の要点は気道内分泌物の排除である。自力で十分に咯出できない時期にはnasotracheal suction か気管支ファイバースコープを用いて分泌物を取り除くことが必要である。

合併症について

縫合不全⁴⁾、吻合部狭窄⁴⁾、咯血^{22,77-80)}などの合併症が報告されている。これらの詳細については別に述べた⁸¹⁾。

手 術 成 績

先に紹介した、気管気管支成形術の全国集計に現われた手術成績は必ずしもよくなかった。気管成形術では合併症が20.5%に、手術死亡は7.2%にみられ、気管支成形術では合併症が14.4%に、手術死亡は4.9%にみられた。合併症の多くは吻合部狭窄や縫合不全で占められ、手術手技に改良すべき点が多々残されていることが示された。

筆者らは現在までに73例の気管気管支成形術を行ったが、手術死亡およびそれに準ずるものを4例経験した。4例中の2例は甲状腺癌の気管浸潤例であり、1例は肺癌で分岐部を切除した症例であり、1例は冒頭に述べた術後第1病日急性肺水腫で死亡した気管支成形の1例である。

気管成形3例のうちの2例は突如発生した大量出血のため術後24日および4カ月に死亡した。1例は甲状腺癌の進展例で縫合不全が手術死亡の原因となった。

これらの症例はわれわれの常用している手術手技と

手術適応の選択に多くの示唆を与えた。

ま と め

気道再建手術の適応, 手術手技, 麻酔法, 術後管理, 手術成績についてこの手術の歴史を振り返りながら記した。

文 献

- 1) 道鉢祐二郎ほか: 第9回日本胸部外科学会総会発表 (1956).
- 2) 道鉢祐二郎ほか: 第10回日本胸部外科学会総会発表 (1957).
- 3) 前田昌純: 私信 (1978).
- 4) 石原恒夫ほか: わが国における気管気管支成形術の現況, 日胸外会誌, 26巻8号, 1978年掲載予定.
- 5) Fishman, N.H. et al: Postintubation tracheal stenosis, Ann. Thoracic Surg. 8: 47, 1969.
- 6) 石原恒夫: 気管狭窄に対する気管成形術の応用, 手術, 24: 1452, 1970.
- 7) 石原恒夫ほか: 気管気管支成形術, 胸部外科, 28: 761, 1975.
- 8) Pearson, F.G. & Andrews, M.J.: Detection and management of tracheal stenosis following cuffed tube tracheostomy. Ann. Thoracic Surg. 12: 359, 1971.
- 9) Grillo, H.C. et al: A low-pressure cuff for tracheostomy tubes to minimize tracheal injury. A comparative clinical trial. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 62: 898, 1971.
- 10) Goldberg, M. & Pearson, F.G.: Pathogenesis of tracheal stenosis following tracheostomy with a cuffed tube. An experimental study in dogs. Thorax 27: 678, 1972.
- 11) Ching, N.P.H. et al: Endotracheal damage during continuous ventilatory support. Ann. Surg. 179: 123, 1974.
- 12) Dunn, C.R. et al.: Determinants of tracheal injury by cuffed tracheostomy tubes. Chest 65: 128, 1974.
- 13) 前中由己: 最近の災害外傷の特異性, 胸部外傷, 現代外科学大系年刊追補, 1976-A, p. 61-88, 中山書店, 東京.
- 14) 道鉢祐二郎ほか: 外傷性頸部気管狭窄の気管成形術による治験例, 胸部外科, 12: 27, 1959.
- 15) 早田義博ほか: 原発性気管腫瘍の外科, 日気食会報, 13: 179, 1962.
- 16) Mathey, J. et al: Tracheal and tracheo-bronchial resections techniques and results in twenty cases. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 51: 1, 1966.
- 17) Perelman, M. & Korolyova, N.: Surgery of tumours in the thoracic portion of the trachea. Thorax 23: 307, 1968.
- 18) Houston, H.E. et al: Primary cancers of the trachea. Arch. Surg. 99: 132, 1969.
- 19) Hajdu, S.I. et al: Carcinoma of the trachea clinicopathologic study of 41 cases. Cancer 25: 1448, 1970.
- 20) Birt, B.D.: The management of malignant tracheal neoplasms. J. Laryngol. Otol. 84: 723, 1970.
- 21) Childress, M.E.: Tracheogenic carcinoma. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 64: 573, 1972.
- 22) Grillo, H.C.: Reconstruction of the trachea. Thorax 28: 667, 1973.
- 23) 浜中雄二ほか: 原発性気管癌の1剖検例と本邦報告例における統計的観察. 外科診療, 18: 531, 1976.
- 24) Macmanus, J.E. & McCormick, R.: Resection and anastomosis of the intrathoracic trachea for pulmonary neoplasms. Ann. Surg. 139: 350, 1954.
- 25) Grillo, H.C. et al: Resection of the carina and lower trachea. Ann. Surg. 158: 889, 1963.
- 26) Smith, L.C. et al: Cylindroma (Adenoid cystic carcinoma). A report of fifty-eight cases. Am. J. Surg. 110: 519, 1956.
- 27) Grillo, H.C.: Management of cervical and mediastinal lesions of the trachea. J.A.M.A. 197: 1085, 1966.
- 28) 小野護ほか: 気管原発腫瘍2症例, 日気食会報, 19: 346, 1969.
- 29) Zunker, H.O. et al: Adenoid cystic carcinoma (Cylindroma) of the trachea. Case report with 9-year follow-up. Cancer 23: 699, 1969.
- 30) Richardson, J.D. et al: Adenoid cystic carcinoma of the trachea report to cobalt-60. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 66: 311, 1973.
- 31) Singh, H.M. & Thomas, D.M.E.: A clinical sign of adenocystic tumour of the trachea. Thorax 28: 442, 1973.
- 32) Perelman, M.I. & Korolyova, S.N.: Trachealgeschwülste und die Chirurgische Behandlungen. Thoraxchirurgie Vaskuläre Chirurgie 21: 500, 1973.
- 33) Pearson, F.G. et al: Adenoid cystic carcinoma of the trachea. Ann. Thoracic Surg. 18: 16, 1974.
- 34) Nakratzas, G. et al: Repeated partial endoscopic resection as treatment for two patients with inoperable tracheal tumours. Thorax 29: 125, 1974.
- 35) Baydur, A. & Gottlieb, L.S.: Adenoid cystic carcinoma (Cylindroma) of the trachea masquerading as asthma. J.A.M.A. 234: 829, 1975.
- 36) Abudallo, K. et al: Primary tumors of the thoracic trachea with special emphasis on surgical management. International Surg. 61: 347, 1976.
- 37) 石原恒夫ほか: 気管悪性腫瘍に対する外科的治療, 日気食会報, 28: 254, 1977.
- 38) 三浦健ほか: 喉頭, 気管に浸潤した甲状腺癌の根治的摘出術, 手術, 24: 1366, 1970.
- 39) 広戸幾一郎: 気管に浸潤せる甲状腺癌摘出後の気管造成の一方法, 日気食会報, 21: 214, 1970.
- 40) 松崎弘章ほか: 甲状腺癌に対する気管合併切除の手術経験, 外科, 33: 272, 1971.

- 41) 富田正雄ほか: 気管再建術の臨床的検討, 胸部外科, 27 : 482, 1974.
- 42) 峯田武興ほか: 気管形成を行った甲状腺癌の1例, 手術, 28 : 929, 1974.
- 43) 岩喬ほか: 気管浸潤を伴う悪性甲状腺腫に対する外科治療—とくに気管形成術について—, 外科, 37 : 933, 1975.
- 44) 石原恒夫ほか: 気管に浸潤した甲状腺癌の治療, 手術, 30 : 195, 1976.
- 45) 木村莊一ほか: 甲状腺癌による気管閉塞に対する terminal or mural tracheostomy の1例, 抗研誌, 28 : 37, 1976.
- 46) Ishihara, T. et al: Resection of thyroid carcinoma infiltrating the trachea. Thorax 33巻 1978年 掲載予定.
- 47) Inoue, H. et al: Parathyroid carcinoma with tracheal invasion and airway obstruction. Surgery 掲載予定.
- 48) Thompson, D.T.: Lower tracheal and carinal resection associated with subtotal oesophagectomy for carcinoma of oesophagus involving trachea. Thorax 28 : 257, 1973.
- 49) Cantrell, J.R. & Guild, H.G.: Congenital Stenosis of the Trachea. Am. J. Surg. 108 : 297, 1964.
- 50) 斎藤成司, 犬山径夫: 先天性気管狭窄の一例, 日気食会報, 21 : 194, 1970.
- 51) Naef, A.P. & Grunck, J.S.: Right pneumonectomy or sleeve lobectomy in the treatment of bronchogenic carcinoma. Ann. Thoracic Surg. 17 : 168, 1974.
- 52) 石原恒夫: 気管分岐部に浸潤した肺癌の外科的治療, 日胸, 35 : 734, 1976.
- 53) Ishihara, T. et al: Resection of cancer of lung and carina. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 73 : 936, 1977.
- 54) Richards, V. & Cohn, R.B.: Rupture of the thoracic trachea and major bronchi following closed injury to the chest. Am. J. Surg. 90 : 253, 1955.
- 55) Hood, R.M. et al: Injuries of the trachea and major bronchi. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 38 : 458, 1959.
- 56) Paulson, D.L.: Traumatic bronchial rupture with plastic repair. J. Thoracic Surg. 29 : 636, 1951.
- 57) Mahaffey, D.E. et al: Traumatic rupture of left main bronchus successfully repaired eleven years after injury. J. Thoracic Surg. 32 : 312, 1956.
- 58) Peters, R. et al: Traumatic rupture of the bronchus a clinical and experimental study. Ann. Surg. 148 : 871, 1958.
- 59) Chesterman, J.T. & Satsangi, P.N.: Rupture of the trachea and bronchi by closed injury. Thorax 21 : 21, 1966.
- 60) Larizadeh, R.: Rupture of the bronchus. Thorax 21 : 28, 1966.
- 61) Burke, J.F.: Early diagnosis of traumatic rupture of the bronchus. J.A.M.A. 181 : 682, 1962.
- 62) Drapanas, T. et al: Reversible poststenotic bronchiectasis. New Eng. J. Med. 275 : 917, 1966.
- 63) Eijgelaar, A. et al: A reliable early symptom of bronchial or tracheal rupture. Thorax 25 : 120, 1970.
- 64) Logeais, Y. et al: Traumatic rupture of the right main bronchus in an eight-year-old child successfully repaired eight years after injury. Ann. Surg. 172 : 1039, 1970.
- 65) Schaar, H. et al: Successful late repair of a posttraumatic bronchial stricture. Thorax 27 : 769, 1972.
- 66) 藤村重文ほか: 鈍性胸部外傷による左主気管支の完全離断と癒着性閉塞の治験例, 胸部外科, 29 : 22, 1976.
- 67) Lloyd, J.R. et al: Rupture of the main bronchi in closed chest injury. A reproduction of the injury in the experimental animal, discussion of the possible mechanisms involved. A.M.A. Arch. Surg. 77 : 597, 1958.
- 68) Grillo, H.C. et al: Extensive resection and reconstruction of mediastinal trachea without prosthesis or graft: an anatomical study in man. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 48 : 741, 1964.
- 69) Naef, A.P.: Extensive tracheal resection and tracheobronchial reconstruction. Ann. Thoracic Surg. 8 : 391, 1968.
- 70) Dor, V. et al: Résection étendue de la trachée pour tumeur et sténose. Résultats immédiats et contrôles éloignés à propos de 16 cas. La Presse Med. 79 : 1843, 1971.
- 71) 古泉桂四郎: 気管の伸長能に関する計測的研究, 日気食会報, 17 : 294, 1967.
- 72) 慶応義塾大学外科: 気管成形術—麻酔科医との討論—, 胸部外科, 30 : 208, 1977.
- 73) 深井志摩夫ほか: 人工心肺体外循環を用い気管切除を行った再発甲状腺癌の1例, 外科, 40巻, 1978年 印刷中.
- 74) Penton, R.S. et al: The use of a viable pedicle flap graft for repairing an extensive tracheobronchial defect. Ann. Surg. 135 : 709, 1952.
- 75) Keshishian, J.M. et al: Tracheal reconstruction. J. Thoracic Surg. 32 : 707, 1956.
- 76) Beall, Jr., A.C. et al: Tracheal reconstruction with heavy marlex mesh. Arch. Surg. 86 : 970, 1963.
- 77) Neville, W.E. et al: Prosthetic reconstruction of the trachea and carina. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 72 : 525, 1976.
- 78) Revilla, A.G. et al: Trachea innominate artery fistula after tracheal reconstruction. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 67 : 629, 1974.

79) Arbulu, A. & Thoms, N.W.: Tracheal innominate artery fistula after repair of tracheal stenosis. J. Thoracic Cardiovasc. Surg. 67 : 936, 1974.

80) Deslauriers, J. et al : Innominate artery rupture. A major complication of tracheal surgery. Ann. Thoracic Surg. 20 : 671, 1975.

81) 石原恒夫 : 気道再建手術, 現代外科学大系年刊追補, 1978, 中山書店, 東京, 印刷中.

(別刷請求 : 〒160 東京都新宿区信濃町35
慶応義塾大学医学部外科
石原恒夫)