1. 気管狭窄病態の基礎

*弓 削 庫 太

Symposium: Treatment of Airway Stenosis

1. Experimental Study on Tracheostenosis

Kurata Yuge, M.D.

Department of Otolaryngology, Nippon Medical School, Tokyo

Clinical cases of tracheal stenosis were investigated to study the cause of it. One hundred and eighty-two cases of tracheal stenosis were experienced (according to the data from the division of otorhinolaryngology of 37 universities) between January 1974 and July 1978. Of these cases, about 50% was caused by tracheotomy and about 20% was caused by wounds, of which 60% was caused by traffic accidents.

In order to examine the vessels in the tracheas of rabbits, latex was injected into the aortas of 11 rabbits, and the following results were obtained. The tracheoesophageal arteries of rabbits are branched from right and left longitudinal tracheoesophageal arteries (tentatively named). The right one is branched from the right subclavian artery and the left one from the left common carotid artery. There were some variations at the bifurcation of the left longitudinal tracheoesophageal artery. The branches of the longitudinal tracheoesophageal arteries were ligated at 2 to 4 sites on each side of the right and left, but there was no change in the trachea. There were many vessels in the tracheal mucosa, and the anastomoses were very complicated. It was considered that there was no problem in hemodynamics in the cases of end-to-end anastomosis.

Curettage of tracheal mucosa, tracheotomy, intubation and crushing of trachea were conducted in rabbits and rats. Curettage of the whole circumference of tracheal mucosa did not result in stenosis. Regarding a cannula used for tracheotomy, its shape and size rather than its material are important factors for tracheal stenosis under the consideration of its fitness to the tracheal lumen. Using a tube with cuffs, inflammation of the trachea reaching to the perichondrium was already observed 10 hours after the intubation. When the cannula used was too large, necrosis and desquamation of the whole layers of mucosa, formation of pseudomembrane and respiratory obstruction were observed, even though the application time was short. When tracheal cartilages of more than 3 annuli were crushed, severe stenosis occurred. However, deformation and stenosis will be protected against to some degree if a T-tube, for example, is inserted in time into the crushed site.

I. 緒 言

従来、気管狭窄の原因の大半は気管切開の合併症として問題にされていた。しかし近年、交通外傷に伴う

喉頭及び気管外傷の増加及び全身麻酔、緊急の気道確保の目的からの気管挿管等が新に気管狭窄の原因として注目されるに至り、それらの症例報告も年々増加の傾向にある。

*日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

気管狭窄の症例に直面し、多くの外科医は様々な困

表1 気管狭窄の原因
(37 大学病院の集計)

原因別内訳	S.49年	50年	51年	52年	53年	計
外 傷	13	11	4	3	6	37
気 管 切 開	16	12	19	14	19	80
Intubation	5	5	6	3	3	22
先天性その他 (Relapsing polychondritis)	2	10	3	9	3	27
計	36	38	32	39	31	166

難な問題を克服して、その解決に大変な努力を払って、貴重な治験例を報告している。これら臨床成績をさらに向上させる点からも、気管狭窄病態の基礎的問題の研究は非常に重要と考える。

著者は気管狭窄病態解明の一助とすべく、気管狭窄症例の実態を調査し、つぎに気管の解剖（特に血管について）、さらに、気管狭窄の動物実験を行った結果、興味ある知見が得られたので報告する。

II. 気管狭窄症例の実態調査

気管狭窄の実態を把握する目的で、全国大学附属病院耳鼻咽喉科にアンケートを依頼した。

調査にあたって、腫瘍による気管狭窄は除いて、過去5年間に年に何例気管管狭窄があったか、その原因にはどのようなものが多かったか、治療についてはどのような方法を行っているか、またそれらの予後についても調査を行った。

昭和49年1月～昭和53年7月迄の約5年間についての調査を依頼したが、別記の37校の耳鼻咽喉科から回答を得た。

気管狭窄症例は合計182例で、各年度毎の気管狭窄の内訳は表1の通りである、

気管狭窄の原因の中、気管切開によるものが48.2%を占めているのが注目される。外傷は22.3%、先天性、その他については relapsing polychondritis 3例, laryngotracheomalasia 2例, web 3例, 喉頭アミロイド症1例があった。

気管狭窄症例の年令別内訳は表2に示す如く、0才～10才迄が79例（43.4%）の多くを占め、21才～40才、41才～60才にもピークがみられた。また各年令層において男性に多い傾向がみられた。

外傷による気管狭窄は交通外傷によるものが37例中22例で、59.5%を占めていた。

表2 気管狭窄症例の年令別内訳

年 令	♂	♀	計
0～10	51	28	79
11～20	9	4	13
21～40	21	16	37
41～60	24	12	36
61～	11	6	17
計	116	66	182

表3 気管切開より狭窄出現までの期間

1 週末満	5
1 週 ～ 1 ケ 月	20
1 ケ 月 ～ 3 ケ 月	23
3 ケ 月 ～ 6 ケ 月	8
6 ケ 月	8

表4 Intubation による狭窄

(22例)

a) カフ使用の有無

使 用	16
使 用 せ ず	6

b) Intubation の時間

1 ～ 3 時 間	2
3 ～ 5 時 間	0
5 ～ 10 時 間	0
10 時 間 以 上	20

気管切開より狭窄出現までの期間は表3の如くである。気管切開後3ヶ月迄に64例中48例（75%）に狭窄の出現がみられた。

Intubation による狭窄は表4の如く、22例中カフ使用16例（72.2%）、intubation の時間は10時間以上のものが90%を占めていた。

以上アンケートの結果から、気管狭窄の大部分は気管切開、気管外傷、気管内挿管後に発生していることが判った。

今回は気管切開の方法、カニューレの材質、カニューレの適合性等について精細に調査を行わなかった

が、気管切開後の気管狭窄が全体の約50%を占めていることは注目に値する。

(このアンケートと別に9大学病院耳鼻咽喉科での気管切開例数を調査したが、最近5ケ年に637例実施されており、その中に1例も気管狭窄を発生していない。)

年令別にみると10才以下のものに気切後の気管狭窄例が圧倒的に多く、このことは従来の報告と一致する。

気切後6ヶ月までに64例中48例(88%)が狭窄を起しているの、気切後約6ヶ月間は慎重に経過を観察する必要がある。

外傷後の気管狭窄の約60%は交通事故によるもので、交通事故の患者で頸部損傷あるものに対しては、特に気管損傷の有無を積極的に検索し、損傷ある場合は早急に充分な処置を行うことが肝要である。

Intubation によるものは90%が10時間以上の長時間挿管したものであり、長時間挿管を余儀なくした患者

の経過観察にあたって、特に気管狭窄の有無を調べることを忘れてはならない。

アンケートの項目が少なく、所期の目的を充分達し得なかったが、この結果のみでも気管狭窄の今後の研究に対し、何等かの意義があったものと考ええる。

III. 気管の解剖 (特に血管系について)

気管の粘膜上皮についての研究は、近年透過型、走査型電子顕微鏡の発達により飛躍的な進歩をとげた。しかし一方その血管系についての研究は非常に少ない。

気管腫瘍切除後の気管吻合、気管狭窄部位の切除後の端々吻合、気管内挿管後の気管狭窄の問題等、実際にそれら臨床にあたって、気管の解剖特に血管系についての解剖についての研究は有用であると考ええる。著者は成熟家兎を用いて、まず気管(食道)の血管につ

図1 家兎における気管食道脈分岐様式

- ① もっとも多いタイプ
 右側：右鎖骨下動脈より分岐
 左側：左総頸動脈より分岐
- ② ①と似るが、左縦気管食道動脈の走行が変わっているタイプ
 右側：右鎖骨下動脈より分岐
 左側：左総頸動脈より分岐
- ③ 特殊なタイプ(左総頸動脈より分岐しないもの)
 右側：右鎖骨下動脈より分岐
 左側：左喉頭動脈あるいは左上行咽頭動脈より分岐

いて研究を行った。

1) 研究方法。

エーテル麻酔下に開胸, 心臓を露出した後, 左心室を切開し, あらかじめ血液を十分に流出させた後, 大動脈内にカテーテルを挿入し, ラテックスゴム (ネオプレンラテックス 601A) を約 15cc, 加圧して注入した。胸大動脈はあらかじめ結紮し, 頭頸部領域にラテックスゴムの容易に流入するようにした。頭頸部領域への流入の良否は眼球結膜等へのラテックスゴムの流入の程度で判断した。

2) 研究結果

家兎においては図1の如く, 気管, 食道の側面を左右1本づつ縦走する動脈があり, これを著者は仮に縦気管食道動脈と命名した。

この縦走する2本の動脈は分節状, 樹枝状に気管及び食道に細い分枝をだし, ところどころで, 左右の縦気管食道動脈は吻合していた。特に大動脈弓の高さより下部で吻合は多くみられた。

右側縦気管食道動脈は右鎖骨下動脈より分岐したものであり, 左側縦気管食道動脈は左総頸動脈より分岐したものである。

左右共にこれらの動脈は上頸部で前甲状腺動脈よりの枝としばしば吻合がみられた。これらの動脈は走行, 太さなど個体差が非常に大きい。

右鎖骨下動脈より分岐した血管は, 大動脈弓の高さよりやや下の位置で, さらに数本に分岐し, その内の上行枝は気管, 食道の側壁にそって, 分節状, 樹枝状に細い枝をだしながら, 上方へ走行していた。下行枝

は気管下部, 下部食道, 気管分岐部, 気管支, 肺胞へと, 分節状, 樹枝状, 網状となって終わっている。この実験には11羽の家兎を用いたが, 図1の①の型が一般的であった。なかには縦気管食道動脈の下行枝の中で, 気管の前面を右から左へと, 樹枝状に分岐しながら横ぎり, 左側の血管分枝との吻合がみられた。また下行枝が気管後面を右から左へと横ぎって, 左側の分枝と吻合しているのがみられた。これらの走行, 左右吻合の程度, 血管の太さについての個体差は著しかった。

左総頸動脈より分岐した血管は, 気管, 食道の側面に達すると, 大きく上下に分れ, 下行枝は, 分節状, 樹枝状に枝をだしながら下行し, 右側よりの分枝とところどころで吻合していた。また喉頭側へと進む上行枝は同様に分枝をだしながら上行して, 右側と同様に前甲状腺動脈よりの枝としばしば吻合しているのがみられた。左側縦気管食道動脈においても右側と同様に分岐のしかた, 走行, 血管の太さなどにおいて個体差がみられた。

特殊な例として, 図1の③, 写真1の如く左側の血管系で重要な役割をもつ左総頸動脈より分岐する血管が欠除したものがあつた。この様な事は家兎など齧歯類に比較的多いと云われている。この様な場合, 喉頭動脈あるいは上行咽頭動脈より分岐した血管が縦気管食道動脈となるものと考えられているが, 著者は確認できなかった。

写真2の如く, 縦気管食道動脈より分節状にでた細い枝は, 気管の表面をアーチ状に走り, 様々な位置 (とくに2時, 10時の位置) で, 気管壁内へ侵入して

図2 家兎気管における血管模式図 (墨汁灌流標本より)

弓削庫太論文付図

写真1. 家兎ラテックスゴム注入標本
(図1の③にあたるもの)

写真2. 家兎ラテックスゴム注入標本
(左縦気管食道動脈とその分節状の分岐)

写真3. (ラット) 粘膜上皮は、立方状で幼若であるが、線毛細胞が明瞭である。固有層の炎症反応は、すでに軽度である。

写真4. (ラット) 2回搔爬7日後の気管粘膜を示す。
粘膜は全体が肉芽状となり一部ではポリープ形成をみる。

写真5. (家兎No10) 気管切開部は肉芽により閉鎖し、
癒痕状となり、軟骨の壊死、変性はなく、新生をみる。粘膜表層は再生上皮をみる。

写真6. (家兎No.2) 気管切開部は肉芽により閉鎖し、
癒痕状となっているが、一部は気管腔内にポリープ状に突出している。軟骨の壊死、変性はないが、軟骨の新生は明瞭でない。

弓削庫太論文付図

写真7.(家兎No.5) 気管内腔は壊死組織により充滿している。粘膜は大部分の所で壊死、変性を生じ、炎症は軟骨膜に達している。

写真8.(家兎No.36) 軟骨輪には壊死、変性とその吸収像がみられる。炎症反応はなお高度で、軟骨間を通して粘膜上皮直下にまで及んでいる。

写真9.(家兎No.6) 気管切開部の高度変形を示す(吸気時)。

写真10.(家兎No.6) 写真9の組織像で、軟骨輪の変形が著明である。軟骨の新生はみられるが、離断部の癒合は充分で、粘膜の炎症反応はかなり消退している。

写真11.(家兎No.41) 軟骨輪は原形を止めず、内腔は壊死組織と肉芽で充滿し、破碎された軟骨片は壊死、変性におちいつている。

写真12.(家兎No.48) 2ヶ所に骨折を認めるが、軟骨輪の変性はほとんどない。粘膜には高度の炎症反応をみるが、壊死、変性はない。

いくのをみとめた。アーチ状に走行する血管の走行は、主に気管輪に一致しているが、あるものは、1～3気管輪にまたがり、斜めにまた縦に走って、他のアーチ状の枝と吻合したり、また反対側の枝との吻合もみられた。

一方気管内壁の血管系を追及するために、つぎの実験を追加した。すなわち家兎をエーテル全麻のもとに開胸、左心室を切開し、体温に近く加温した0.9%生理的食塩水を徐々に注入し、右心房を切開し、灌流食塩水が血液を混じない様になったところで、墨汁リングル氏液（リングル氏液に墨汁15%，ゼラチン5～7%の割合に混合したもの）を灌流せしめた後、迅速に頸部を氷塊にて冷却し注入液の凝固の促進をはかった。つぎにホルマリン固定後、適当な部分に切り出して、脱灰、脱水後、ツエロイジン包埋し、20～30 μ の連続切片を作製し、ヘマトシキリン、エオジン重染色を行って観察した。その結果、図2の如く、気管粘膜の血管には、粘膜上皮直下に網状に毛細血管が分布し、それより少々外側に毛細血管網がみられる。これらの血管網は2重構造性で、縦走しているものが多くみられ、ところどころに吻合がみられた。これら毛細血管網と気管軟骨及び輪状靱帯との間の固有層に様々な形態をとった、拡張した多数の静脈がみられた。一方膜性壁部において、アーチ状に走行する動脈が多くみられた。気管粘膜層、輪状靱帯内の血管の状態については詳細な検討を要するが、想像以上に気管内壁は血管が豊富であり、鼻腔に劣らない外気の湿度と温度の調整作用を有するものと考ええる。

ヒトの気管、食道への動脈は屍体において検索した結果は、教科書及び文献にあるごとく、それらへの動脈は大動脈弓より鎖骨下動脈・甲状腺動脈・下甲状腺動脈をへて気管・食道に至るもの、大動脈弓・胸大動脈・気管支動脈を経て気管・食道に分布するもの、また鎖骨下動脈より最上肋間動脈をへて気管・食道へ分枝するものがあった。家兎にみられる様な縦気管食道動脈はないが、それ以上に数多くの動脈から直接分枝をうけており、当然のことながら家兎より「ヒト」の気管、食道の動脈分布状態は高級であった。

以上血管の研究結果から気管の端々吻合は合理的な手術方法であり、積極的に実施してよいと考える。一方、粘膜上皮下には血管が非常に豊富であるので、肉芽除去等の処置は慎重に行う必要がある。

IV. 動物実験

成熟家兎及びラットを用いて、実験を行った。実験

方法によりつぎの5群に分けた。すなわち、気管粘膜搔爬群、気管切開群、気管周囲電気焼灼群、気管挫滅群、気管周囲血管結紮群に分けて実験を行った。

A) 気管粘膜搔爬群

本実験は成熟ラットを用いて実施したが、気管粘膜搔爬後の粘膜の修復について、また粘膜搔爬後狭窄を来たすかを観察した。搔爬方法は従来の著者らの実験方法に準じて気管全周に亘って充分搔爬を行った。

1回搔爬群（1回搔爬後3ヶ月まで経時的に観察）、2回搔爬群（1回搔爬したものを、1週后再搔爬して、2週後まで観察）、及び3回搔爬群（2回搔爬のうち1週後に再々搔爬を行ない、1週後まで観察）の3実験を行い、それぞれについて光顕的、電顕的に観察した。

実験結果：1回搔爬群では、搔爬2日後に多少のバラツキはあったが、創面全体が再生上皮により修復され、間質には中等度の炎症反応をみるのみであった。

搔爬1週後には写真3に示すごとく、再生上皮は多列線毛上皮の形態を示す様になるが、基底細胞の増生がまだみられ、間質にも炎症反応が残っていた。

搔爬2週後には粘膜上皮は分化した多列線毛上皮となり、間質にも炎症所見はほとんど認めなかった。ラット約500匹の気管粘膜搔爬実験において、術後2週より約3ヶ月にわたり、精細に搔爬部位を病理組織学的に検索したが、炎症が軟骨にまで波及し、気管の変形及び狭窄、肉芽の発生などを来たすことはなかった。このことから気管粘膜上皮の再生、修復力の非常に強いことがうかがわれた。

2回搔爬群では、写真4の如く、1週後には搔爬創面の再生上皮による修復が終っているが、上皮は幼若で、間質は炎症反応が強く、高度に肥厚し、一部肉芽形成によりポリープ状を呈していた。2週後、上皮は多列線毛上皮となっていたが、なお基底細胞の増生がみられ、間質の炎症反応は高度であった。

3回搔爬群では、1週後に上皮の再生修復の遅れが目立ち、ところどころに偽膜形成があり、創面は幼弱

表5 気管粘膜搔爬実験

(ラット)

搔 爬 回 数	観 察 期 間	所 見
1 回 (500匹)	2 週～3 ヶ月	正常粘膜に復す
2 回 (10匹)	1 週～2 週	肉芽形成 (+)
3 回 (10匹)	1 週	肉芽形成 (+) polyp (+)

表6 金属カニューレ使用群

(11例)

No.	切 開		カ ニ ュ ー レ		所 見		
	部 位	方 法	挿入期間	抜去～気管摘出	肉 眼	狭 窄	組 織
9	気 管	縦	5日	17日 (+)	閉 塞 (壊死組織)	—	卅
10	〃	円 形	4日	10日		—	卅
11	〃	円 形	16日	直 後 摘 出		—	卅
15	〃	縦	27日 (+)		閉 塞 (壊死組織)	—	卅
32	〃	縦	7日	直 後 摘 出		—	卅
12	輪 状 軟 骨	円 形	3日	14日	閉 塞 (壊死組織)	—	卅
17	〃	縦	5日 (+)		閉 塞 (壊死組織)	—	卅
21	〃	縦	1日	7日		—	卅
22	〃	縦	3日 (+)			—	+(肺炎)
23	〃	縦	14日 (+)	直 後 摘 出		—	卅
24	〃	円 形	7日	直 後 摘 出		—	卅

組織所見 (＋) 炎症が上皮に限局 (＋＋) 炎症が固有層深層におよぶ
(＋＋＋) 炎症が軟骨膜におよぶ (＋＋＋) 炎症が軟骨におよぶ

な再生上皮で被覆され、線毛細胞は僅かに散見される程度であった。間質の炎症反応は2回搔爬群よりさらに強く、創面全体が肉芽し、そのため管腔はやや狭小となり、肉芽のなかには気管腔に大きくポリープ状に突出しているのがみられた。

以上の実験結果から、1回だけの気管粘膜搔爬のみでは、短時間内に何等障害を残すことなく完全に修復されることがわかった。しかしながら、搔爬を2、3回と繰返すと、粘膜の治癒過程に障害を来し、再生修復が遅延し、間質の炎症はより高度となり、なかには著明な肉芽の増生を生じ、気管腔の狭小化を呈するものがみられた。これらの所見は1回搔爬群では全くみられなかった興味ある所見である。これら肉芽の増生、ポリープの形成がその後、徐々に消退して行くものか、それとも更に軟骨膜、軟骨へと炎症が波及して行くものかは、表5の如く実験例数が少く、長期間観察してないので、今後例数を増し、充分検討を加えなければ断定できない。

B) 気管切開群。

家兎(4kg以上)19羽を用いて、第4～第10気管輪の間で、3～4個の軟骨輪を縦切開乃至円形の気管切開を行い、図3のごときカニューレを使用した。気管切開前にチオペンタールナトリウム25mg～50mgを静

注し、局所麻酔に1%ノボカイン(1000×アドレナリン滴加)を使用した。カニューレを挿入後、カニューレを糸糸で皮膚に縫合して、抜去を防いだ。術後感染予防には充分抗生剤を使用し、連日気道内分泌物吸引を実施した。

① 金属カニューレ使用群

表6の如く、11例実験を行ったが、5例において第4～第10気管軟骨輪の間で切開を行い、6例は輪状軟骨を切開した。輪状軟骨を切開しないものは、経過大概ね良好であった。写真5はNo.10の気管切開口の病理組織像である。著者の考案せる特製家兎カニューレを4日間挿入後に抜去して、その10日後に屠殺して検索したものである。肉眼的に既に切開創は完全に閉鎖されており、組織像で軽度の炎症所見がみられるが、切開創は結合織で閉鎖され、気管内腔面は既に粘膜上皮の再生修復がみられ、肉芽等形成なく、表面は平滑で、軟骨の壊死はみられず、一部軟骨の新生がみられた。他の同様の実験例においてもほぼ同様の所見が得られた。

輪状軟骨におよぶ気管切開群はいずれも、術後感染が高度のため膿瘍形成等が多くみられ、従って経過が悪く、長期間観察が出来なかった。

② シリコン、テフロンカニューレ使用群

表7 シリコン, テフロン使用群

(8例)

No.	切 開			カ ニ ュ ー レ			所 見	
	部 位	方 法	大 小	挿 入 期 間	抜去～気管摘出		肉 眼	組 織
1	気 管	縦	中	12時間(+)			閉 塞 (壊死組織)	卅
2	"	"	中	5日	17 日			卅
3	"	"	中	3日 (+)			閉 塞 (壊死組織)	卅
5	"	"	大	24時間(+)			閉 塞 (壊死組織)	卅
6	"	"	大	2日	4ヶ月		狭 窄 著 明	卅
7	"	"	大	24時間(+)			閉 塞 (壊死組織)	卅
8	"	円 形	中	17時間(+)			閉 塞 (壊死組織)	卅
39	"	縦	大	2日	直 後 摘 出			卅

表8 カフ付チューブ使用群

(12例)

No.	切 開 部 位	カ フ 付 チ ュ ー ブ		所 見	
		挿 入 期 間	抜去～気管摘出	肉 眼	組 織
13	気 管	48時間	14 日		卅
14	"	24時間	30 日		卅
16	"	48時間	7 日		卅
18	"	24時間 (+)		壊 死 組 織	卅
19	"	24時間 (+)		壊 死 組 織	卅
20	"	24時間 (+)		壊 死 組 織	卅
25	"	48時間	2 日		卅
29	"	24時間	7 日		卅
31	"	48時間 (+)		壊 死 組 織	卅
38	"	10時間	2 日		卅
37	甲状軟骨と輪状軟骨の間	72時間 (+)		壊 死 組 織	卅
40	甲 状 軟 骨	24時間 (+)		壊 死 組 織	卅

家兎(4kg以上)8羽を用い, 第4～第10気管軟骨輪の間で気管切開を行い, 乳幼児用のシリコン又はテフロン製カニューレ使用した。

表8に示すごとく, No. 1, No. 5, No. 7, No. 8の4羽はシリコンカニューレを挿入後12～24時間後に死亡した。いずれも原因は壊死組織の気管腔閉塞に因るものであった。壊死組織はすべて, カニューレの先端

を中心に形成され, 気管分岐側へのびているのがみられた。No. 5はシリコンカニューレを無理に挿入した例で, 24時間後に死亡したもの。写真7はその組織所見を示す。気管粘膜の壊死脱落, 壊死組織の気管腔閉塞がみられる。

気管切開孔周辺の軟骨膜及び軟骨に一部壊死変性がみられた。

シリコンカニューレで適性なものを使用すると、No.2の如く、写真6に示すごとく順調な経過をとった。

No. 6は気管切開後、かなり太目のシリコンカニューレを無理に挿入したもので、術後2日目に呼吸困難を認めたため、カニューレを抜去し、そのまま約4ヶ月間生存させたが、吸気時に喘鳴が著明に現われたので、直ちに局麻下に頸部を開いて、気管切開部を検索した。写真9に示すごとく、気切部の4輪にわたって、気管に著明な変形が認められた。狭窄部が呼吸と共に膨脹、収縮するのが認められ、吸気時に著明な狭窄がみられた。

組織学的にみると、写真10に示すごとく、気切部は高度に変形し、気管内腔は狭小となり、粘膜上皮には特に異常はなかったが、固有層は肥厚し、瘢痕状で中等度の細胞浸潤がみられた。また軟骨輪の一部に壊死破壊像がみられた。この例が気管切開実験における唯一の気管狭窄例であり。気管カニューレの適合性の重要性を一層痛感した。

③ カフ付チューブ使用群

家兎（4 kg以上）12羽を用い、第4～第10気管輪の間で気管切開し、著者の考案せる図3に示すカフ付シリコンチューブを切開孔から挿入した。カフを充分にふくらませ、気管壁の膨隆するのを確かめて、カフ付チューブを気管壁に固定した。最も長時間のもので、72時間チューブを留置し、またカフ付チューブ抜去後長いもので30日まで生存させて観察した。

No. 18, No. 19, No. 20, No. 31, No. 37, No. 40の6例はカフ付チューブ留置のまま、気管腔内壊死組織閉塞のため死亡した。

組織学的にはチューブ挿入部に粘膜の壊死、軟骨膜に達する高度の炎症がみられた。カフ付チューブ留置

図3 小児用カニューレ（シリコンカフ付、シリコン、テフロン）、特製シリコンカフ付チューブ、小児用 No.1 金属カニューレ 2 個（先端一部切断）、特製家兎用カニューレ（2 個）

表9 気管周囲電気焼灼群

(4 例)

No.	焼 灼 部 位	気管摘出までの 期 間	所 見	
			狭 窄	組 織
35		7 日	—	軟骨の変性・壊死 粘膜の壊死・うっ血
36		7 日	—	軟骨の変性・壊死 粘膜の壊死・うっ血
44		12 日	—	軟骨の変性・壊死 粘膜の壊死・うっ血
46		7 日	—	軟骨の変性・壊死 粘膜の壊死・うっ血

表10 気管挫滅群

(4 例)

No.	挫滅気管輪の数	Tチューブ	気管摘出 までの 期 間	所 見	
				狭 窄	組 織
41	3 本	使用せず	2 日	著 明	卅
43	2 本	挫滅部に挿入	2 日	—	卅
47	1 本	〃	5 日	—	卅
48	4 本	〃	2 日	—	卅

図4 気管周囲動脈結紮実験法

部より気管分岐側へ壊死組織が生じていたが、シリコンカニューレ群より範囲は狭く、限局性であった。シリコンカニューレ使用群と同様、気管内壁の過度の圧迫による粘膜内血管の循環障害によるものと考えられる。

No. 13, No. 14, No. 16, No. 25, No. 29, No. 38の6例には中等度の炎症所見しかみられなかったが、カフの空気もれのため、充分気管壁を圧迫できなかったためと考える。

C) 気管周囲電気焼灼群

気管周囲の障害が気管内腔へ波及するか、また気管軟骨破壊による気管狭窄を想定して、気管周囲の電気焼灼実験を行った(9表)。

No. 36は気管輪を5個、充分に電気焼灼を行った。

写真8, 12に示す如く、軟骨膜、軟骨に炎症が波及し、軟骨間の輪状靱帯から、気管粘膜固有層に及ぶ高度の炎症がみられた。また血管に栓塞がみられた。

D) 気管挫滅群

比較的下位(第8～第13気管輪の間)で気管切開を行い、切開口と輪状軟骨の中間で、気管輪を1～4個の軟骨輪を鋭匙鉗子で強くはさんで挫滅した。

表10に示す、No. 41の3輪を挫滅した1例をのぞき、他は気管口より挫滅部にTチューブを挿入固定した。

No. 41, No. 43, No. 48はそれぞれ2日後に屍殺した。No. 47は5日後に屍殺した。

No. 41はTチューブを使用しなかった例で、外見的に挫滅部位の気管に著明な狭窄がみられた。内腔は全く閉鎖し、肉芽が充満していた。

組織学的には写真11に示す如く、壊死組織と肉芽が

充満し、肉芽内に軟骨片が埋没しているのがみられた。気管輪は原形をとどめることなく多数の軟骨片として散在し、壊死、変性が著明であった。

No. 41, No. 43, No. 48の3例はいずれもTチューブを使用したものである。いずれも気管の変形はみられなかった。

組織学的には写真12に示す如く、粘膜には高度の炎症反応がみられるが、固有層は肥厚し、浮腫、出血、細胞浸潤が著明で肉芽状であったが、壊死、変性はみられなかった。軟骨膜には中等度の細胞浸潤をみた。気管輪には多数の骨折を認め、一部に変性がみられたが、軟骨骨折部の離開は軽度で、ほぼ軟骨輪の形態が保持されていた。

Tチューブ使用例では軟骨輪の変位、変形が軽度で、粘膜にはなお高度の炎症反応がみられたが壊死、変性はみられなかった。

以上の結果から、気管外傷の新鮮例において、受傷部位を切除して、端々吻合を直ちに実施することなく、障害の程度によっては、Tチューブ等をまず使用して、気管輪のつぶれを整復して、気管狭窄の防止をはかってもよい様に思う。またTチューブ等の使用期間等は今後の研究課題である。

E) 気管周囲血管結紮例

4例において、気管周囲動脈を双眼顕微鏡下に図4の如く動脈結紮実験を行った。しかし1例も気管組織に異常所見を得ることができなかった。このことから気管血管系の複雑性がうかがわれる。しかし一方気管壁よりの出血は止血困難であることを示唆するものである。

V ま と め

1. 気管粘膜搔爬群において、1回搔爬では気管狭窄は全く起らなかった。反復搔爬では著明な肉芽・polyp形成を来したものがあつた。

2. カニューレ使用群において、カニューレの材質よりも、カニューレの太さや形の気管腔との適合性の方が、気管狭窄の重要な因子と考えられた。

3. カフ付カニューレ群において、10時間後に、すでに軟骨膜に及ぶ炎症性変化がみられた。

4. カニューレの太すぎる場合には、短時間でも、粘膜全層の壊死・脱落・偽膜形成を生じ、内腔の閉塞するものがあつた。

5. 気管周囲焼灼群において、焼灼部位に一致した気管内側粘膜面に循環障害による高度の炎症の出現がみられた。

6. 気管挫滅群において、挫滅が軟骨3輪以上となると高度の狭窄を生じた。ただし挫滅部位に早期にTチューブを使用することにより、変形・狭窄を防止し得るものと考えた。

気管狭窄臨床例につき、アンケートに御協力いただいた下記大学耳鼻咽喉科に深謝します。

北海道大学、札幌医科大学、弘前大学、秋田大学、東北大学、福島大学、自治医科大学、独協医科大学、埼玉医科大学、防衛医科大学、千葉大学、東京大学、東京医科大学、東邦大学、横浜市立大学、聖マリアンナ医科大学、北里大学、新潟大学、信州大学、金沢医科大学、岐阜大学、名古屋大学、三重大学、奈良県立医科大学、京都府立医科大学、大阪大学、大阪市立大学、兵庫医科大学、岡山大学、川崎医科大学、福岡大学、長崎大学、宮崎医科大学、琉球大学。

なお差出人不明の2校がありました。

終りに本シンポジウムの機会を与えて下さった梅田良三会長、司会の広戸幾一郎教授に感謝します。合せて長年にわたって御指導を頂いた大藤敏名誉教授、橋本泰彦名誉教授、永井汜教授並に解剖学教室吉川文雄教授、病理学教室富士勝成教授に感謝します。なお本研究に御協力いただいた教室員各位及び物心ともに御教授いただいた橘鏡会々員、四五会々員の方々に感謝します。

文 献

- 1) 広戸幾一郎：喉頭外傷の治療，耳展，8：10，1965.
- 2) 切替一郎，他：喉頭・頸部気管狭窄の手術的療法，日気食会報，20：18-27，1969.
- 3) 齊藤紘昭：ヒトの頸部，上胸部気管・食道動脈の解析，解剖学雑誌，51：409-421，1976.
- 4) 広戸幾一郎：喉頭気管狭窄の治療，耳鼻，22：679-687，1976.
- 5) Salassa, J.R., Pearson, B.W. and Payne, W.S.: Gross and microscopical blood supply of the trachea. The Annals of Thoracic Surgery, 24：100-107, 1977.
- 6) Nordin, U. and Lindholm, C.E.: The vessels of rabbit trachea and ischemia caused by cuff pressure. Arch. Otorhinolaryngol., 215：11-24, 1977.
- 7) Nordin, U.: The trachea and cuff-induced tracheal injury, Acta Otolaryngol., supplement 345, 1977.
- 8) 佐藤武男：喉頭・気管狭窄の実態とその治療，耳鼻，24：419-426，1978.
- 9) 石原恒夫：気管・気管支成形術の臨床，日胸，37：433-438，1978.
- 10) 弓削庫太・他：搔爬気管粘膜の修復に関する電顕，並びにオートラジオグラフィによる観察，耳展，21，(補2)：109-125，1978.
- 11) 金子丑之助：日本人体解剖学，第三卷，南山堂，1972.

(別刷請求：〒102 東京都千代田区飯田橋 3-5-5)
日本医科大学附属第一病院耳鼻咽喉科
弓 削 庫 太