モルモット気道上皮の杯細胞のペルオキシダーゼ 活性に関する電顕組織化学的研究

*桑原 英眞

An Electron Microscopic Study on Peroxidase Activity in the Tracheobronchial Epithelium of Guinea Pigs

Hidemasa Kuwabara, M. D.

The First Department of Internal Medicine, School of Medicine,
Gunma University, Maebashi

The distribution and localization of endogenous peroxidase activity in the tracheobronchial epithelium of guinea pigs were investigated with both light and electron microscopes using a cytochemical procedure of the diaminobenzidine- H_2O_2 method after Graham and Karnovsky. Male guinea pigs were used at the following time-intervals after birth; 2 days, 4 days, 2 weeks, 1 month, 2 months and 6 months to 2 years

The following results are obtained;

- 1) Goblet cells in the tracheobronchial epithelium were cytochemically subdivided into two types of cells, that is, the peroxidase-positive cells and the peroxidase-negative cells. Both types of cells were provided with mucous granules. They independently possess the complete secretory function.
- 2) The peroxidase-positive goblet cells were characterized by the presence of reaction product in the r-ER, perinuclear space and some of the Golgi complexes. However, no reaction product was discernible in the entire cytoplasm of the peroxidase-negative cells.
- 3) The peroxidase-positive goblet cells increased with an inverse relation to the peroxidase-negative goblet cells as the animals grew older. Most of the goblet cells in the main bronchi of 2 to 4-day-old guinea pigs were peroxidase-negative, whereas nearly all of the goblet cells of 6 month to 2-year-old guinea pigs were positive.
- 4) The peroxidase-positive goblet cells appeared to be more dominant in the upper trachea than in the main bronchi.
- 5) Reaction product localized in the r-ER, s-ER, perinuclear space and the Golgi complex was also noted in the ciliated cells. Ciliated cells with cytochemical reaction product were consistently distributed throughout the epithelium of the lower respiratory tract.
- 6) The peroxidase activity in the goblet cells and ciliated cells was clearly inhibited with 0.02 M 3-amino-1,2,4-triazole or 0.02M potassium cyanide.

緒 言

気道上皮に見られる杯細胞は慢性気管支炎あるいは気管支喘息の際、その数が増加すると言われている。また、それぞれの杯細胞がもつ粘液顆粒の性状も組織化学的に相違を示すものが

*群馬大学医学部第一内科学教室

あり、各種疾病の際の反応態度が異なることが知られている¹⁾²⁾³⁾⁴⁾。すなわち杯細胞には alcian blue-PAS 法⁴⁾⁵⁾において alcian blue(以下、ABと略す)で染まる分泌顆粒をもつ細胞、ABで染まらず PAS 法で陽性に染まる分泌顆粒をもつ細胞および両者で染まる分泌顆粒をもつ細胞があり、ABで染まるものは酸性ムコ多糖類

を含み, PAS で染まるものは中性ムコ多糖類を含むと考えられており, 慢性気管支炎の場合には酸性ムコ多糖類を含む杯細胞の割合が増加し, 気管支喘息の場合には中性ムコ多糖類を含む杯細胞の割合が増加すると言われている。一方, Azzopardi & Thurlbeck は LDH, G-3PDH など13種類の酵素活性の有無を, ヒトの気管支, ネコおよびマウスの気管を使ってその上皮および腺について組織化学的に検討したが有意の差を認めなかった⁶⁾。このように杯細胞の分泌顆粒の性状に多様性ないし不均一性の存在は認められているが, その意義は不明な点が多く, これを解明することは気道病態を研究する上で重要な課題である。

また最近 horse-radish peroxidase などの外因性ペルオキシダーゼ(以下, ペと略す)が tracer ないし免疫組織化学における marker enzyme として使用されるようになったので^{7,8)}, この点からも内因性ペ活性について充分検討しておくことが必要であると考ええる。

著者は本研究においてモルモット気道上皮の杯細胞に内因性ペ活性の存在を認めたので, 杯細胞に関して電顕組織化学的検討を行い, 内因性ペ活性が陽性の杯細胞と陰性の杯細胞とが存在し, さらに両者の割合は発育に伴って変化するという成績を得たので報告する。なお杯細胞とは核上部に粘液顆粒が緻密な集団を形成し, いわゆる杯を形成するものであるが, ここでは上皮内に認められる粘液性分泌顆粒をもつ細胞のことを単に杯細胞と呼んだ。

材料ならびに方法

1) 実験材料: 正常雄モルモットで生後 2~4 日(5匹), 生後2週間(2匹), 生後1カ月(8匹), 生後2カ月(4匹), 生後6カ月~2年(5匹)のものを使用した。また各種薬物に対する影響を検討するために, β 刺激剤であるイソプロテレノール, コリン作働薬であるアセチルコリン, 気管支喘息と関連深いヒスタミン, 女性ホルモンである 17β -エストラジオールで処置した雄モルモットも計30匹を使用した。イソプロテレノール処置群は dl-塩酸イソプロテレノール20mg/ml液を30分ないし2時間噴霧吸入せしめたもの(5ml/30分), および同液を毎日1

回 5ml, 30分ずつ連続6日間噴霧吸入せしめたもの, アセチルコリン処置群は塩化アセチルコリン 2mg/ml 液を5分ないし60分間噴霧吸入せしめたもの, ヒスタミン処置群は塩酸ヒスタミン 500 μ g/ml~100 μ g/ml 液を5分ないし60分間噴霧吸入せしめたもの, 17β -エストラジオール処置群は1日1回 10 μ g を2日間皮下注射したもの, をそれぞれ撲殺瀉血して材料を採取した直ちに固定液に浸漬した。

2) 固定および組織化学的方法: 表1のごとく行った。すなわち上記モルモットの気管上部, 右主気管支および肺内気管支の一部を摘出してただちに1% paraformaldehyde-1% glutaraldehyde 混合固定液に浸漬し1~2mm 幅のブロックになるように細切した。この固定液で30分間, 前固定を行ったのち, 0.1M cacodylate buffer で2~12時間水洗し, この水洗中に実体顕微鏡下で組織塊の辺縁部を約 100 μ m の厚さに切り出してその組織片をペ反応液に室温1時間, 適宜振とうしながら浸漬した。なお固定に使用した glutaraldehyde はすべて活性炭および陰イオン交換樹脂で精製したものである。ペ活性検出のための反応液は Graham-Karnovsky⁹⁾の方法に準じて, 3, 3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride(以下, DABと略す)を0.05%になるように0.05M Tris-HCl buffer に溶解し H_2O_2 を加えて, 使用直前に作製した^{9,10)}。最終 pH は 1N. NaOH にて pH 7.6になるように調節した。ペ反応終了後は, 型のごとく phosphate または cacodylate buffer-1% osmic acid で後固定を行い, エタノール系列で脱水して epon に包埋した。一部の組織片は後固定の前にさらに, AB-PAS 染色^{4,5)}を行ってから包埋操作を行った。まず光顕用に 2 μ m の厚さの切片を作製し 0.5% toluidine blue で染色を行って観察し組織の部位およびペ活性反応物などの状態を確認したのち, 超薄切片を作りウラン・鉛の二重染色を施して電顕観察を行った。一部の切片は無染色のまま電顕観察を行い反応物を確認した。Toluidine blue 染色を行った光顕標本においては分泌顆粒の少ない, ペ活性陰性の杯細胞の同定は必ずしも容易でないので, 杯細胞の数の算定は次のように行った。すなわち各個体の各部位から, おのおの 3~5 コのブ

表1 組織の固定および組織化学的方法

ロックを取り出して超薄切片を作製し無染色のまま、直接倍率1500倍ないし2000倍にて電顕観察を行い、重複しないように写真撮影して算定した。ペ活性陰性の杯細胞は拡大鏡下でフィルムを検討し、分泌顆粒を2コ以上保有する細胞を数えた。メッシュは Veco 製 R-200A を使用した。

ペ反応のコントロールとして、(1) H_2O_2 を加えない反応液に浸漬したもの、(2) 酵素阻害剤に1時間浸漬したのちさらに同じ酵素阻害剤を加えた反応液に浸漬したもの、すなわちイ) 0.02 M ないし 0.1 M 3-amino-1, 2, 4-triazole (以下, Amitrole と略す) または、ロ) 0.005 M ないし 0.02 M KCN を含む反応液に浸漬したもの、または ハ) カタラーゼ阻害剤として 2×10^{-4} M 2,4-dichlorophenol (以下, 2,4-DCP と略す)¹¹⁾¹²⁾ を含む反応液に浸漬したもの、(3) 内因性 H_2O_2 を抑制ないし破壊するため Tice & Wollman¹³⁾ の方法に従って前固定終了後の水洗からペ反応が終了するまでの全過程に 10mM Na-pyruvate を加えたもの、を使用した。

3) 方法に関する基礎実験: まず前固定液のペ活性に対する影響を検討するために、固定液の濃度を 0.5%, 1%, 2% paraformaldehyde-0.5%, 1%, 2% glutaraldehyde とし、固定時間

については30分, 1時間, 3時間に変えて行い切片を作製して観察を行った。その結果, 0.5% paraformaldehyde-0.5% glutaraldehyde で30分間固定した場合は, 酵素活性の保存は十分であるが形態の保存は悪く, 2% paraformaldehyde-2% glutaraldehyde 液で3時間固定したものは形態の保存は良好であるが酵素活性を示す反応生成物は減少して判別するのには不十分であった。そして 1% paraformaldehyde-1% glutaraldehyde 液で 30分間固定した標本において形態保存および酵素活性ともにもっとも良好な結果を得られることが明らかとなった。

前固定および水洗に用いた緩衝液については 0.1M Na-phosphate 液または 0.1M Na-cacodylate 液の2種類を使用して検討した結果, 反応液の浸透性は Na-cacodylate の方が良好なことが認められたので, 前固定は 1% paraformaldehyde-1% glutaraldehyde (0.1M cacodylate buffer) 液で30分間とした。

次にペ反応浸漬液について H_2O_2 濃度を 0.02%, 0.01%, 0.002% に, 反応温度を 4°C , 室温 37°C に, 反応時間を 30分, 1時間, 2時間にそれぞれ変えて反応物形成を検討したところ, DAB 反応物は H_2O_2 濃度および反応温度が高い方が強く, 反応時間が長い方が強く認められたが,

0.002% H₂O₂, 室温, 反応時間1時間でも十分な結果が得られたのでこの条件を使用した。

結 果

1) 気道上皮におけるペ活性の分布:

モルモットの気管, 気管支はすでに知られているごとく, 多列線毛上皮からなり主な構成細胞は線毛細胞, 杯細胞および基底細胞である。ペ活性は線毛細胞, 杯細胞に認められる他, 上皮内にしばしば遊走して見られる好酸球に陽性であった。

線毛細胞は光顕的にはペ活性陽性を示す褐色の反応物が細胞質全域に, びまん性に淡く認められるが, その程度は細胞先端部で比較的強い傾向が認められた。生後2日目ないし4日目のモルモットの線毛細胞は生後6カ月のモルモットの線毛細胞に比べると褐色の反応物は一般的にやや淡く, 反応の強さに相違はあるが, 成育の程度によって陽性細胞の分布に差異は認められなかった(図1~6)。電顕的にその細胞内分布を調べてみると, ペ活性陽性を示す電子密度の高い沈着物は粗面小胞体, 滑面小胞体 (tubulo-reticular system¹⁴⁾), 核周囲腔 および ゴルジ装置に局在していた(図11)。基底細胞は光顕所見および電顕所見ともにペ活性は陰性であった(図1~6, 10, 15)。電顕像でまれに, 内分泌機能をもつと考えられる, 細胞基底部に小顆粒をもつ細胞³²⁾³³⁾³⁴⁾が認められたがペ活性は陰性であった(図19)。

杯細胞は光顕標本で検討を行って見ると, ペ活性陽性反応物は細胞質全域とくに核上部に見られ, 主に分泌顆粒に存在することがうかがわれる。しかし図9のごとく, 全く陰性の杯細胞もしばしば認められた。ペ活性陰性で分泌顆粒をほとんど持たない杯細胞は toluidine blue 染色標本からは判別困難なことが多いが, 分泌顆粒をもつ杯細胞から判定すると, ペ活性が陽性または陰性の杯細胞の出現率はモルモットの生後発育がすすむにつれて異なり, 生後2~4日目のモルモット主気管支ではほとんどの杯細胞が陰性を示したのに対して, 生後6カ月~2年の例ではほとんどすべての杯細胞が陽性を示した。また同一個体の主気管支と気管上部を比較すると生後2~4日目のモルモットでは主気管

支においてペ活性陽性を示す杯細胞がほとんど見られないのに対して気管上部ではしばしば見られ, 生後2週間目, 生後1カ月目, 生後2カ月目の例では, 主気管支においても成育に伴って陽性杯細胞が増加してくるが, 陽性杯細胞の数は主気管支よりも気管上部でより多い傾向が認められた(図1~6)。次にAB-PAS染色に対する杯細胞の染色性とペ活性の有無との関連を検討するため, ペ反応を行った組織片にさらにAB-PAS染色を施した標本を観察したが, 両者に相関は認められなかった。すなわちペ活性陽性の細胞とペ活性陰性の細胞のそれぞれに, AB と PAS 両者に染まる細胞, ABのみに染まる細胞, PASのみに染まる細胞とがあることが明らかになった。

2) 杯細胞におけるペ活性の電顕所見およびペ活性陽性杯細胞の分布:

ペ活性は分泌顆粒, 粗面小胞体, 核周囲腔に陽性であった。またゴルジ装置の一部もしばしば陽性を示した(図10, 12~17)。また核上部の分泌顆粒集団の顆粒間や細胞質基質にも, ときに陽性沈着物が認められることがあった(図17)。

ペ活性陰性細胞は電顕所見でも反応生成物の沈着が全く認められず明瞭に区別して見られ, しばしば陽性細胞と隣接して存在することもあった(図12, 14, 16, 17, 18)。陰性細胞は細胞内小器官も全く陰性で, 陽性細胞とは対照的である。ペ活性陽性細胞の分泌顆粒も陰性細胞の分泌顆粒も, ともに顆粒の放出を示す所見が認められた(図10, 12, 17)。また分泌顆粒が少なく補充期と考えられる細胞にもペ活性陽性の細胞と陰性の細胞とが区別された(図10, 13, 14, 15, 18)。

ペ活性陽性の杯細胞と陰性の杯細胞の数の割合は気道上部で前者がより多く, また同一の気道部位でも成育に伴って前者の割合が増加する傾向が見られたので, 生後2~4日, 生後1カ月, 生後6カ月~2年, の3群のモルモット気管上部および主気管支を例にとって両者の割合を検討してみた。表2は3群のモルモットの各部位での総杯細胞数に対するペ活性陽性杯細胞の割合を示すが, 主気管支においては生後1カ月の雄モルモットで $53.1 \pm 7.9\%$ (mean $\pm$ S.E.) の杯細胞がペ活性陽性を示したのに対して, 生

桑原英眞論文付図(1)

付図(1) 図1～9：

モルモット気道上皮の内因性ペ活性の光顕所見：褐色ないし黒褐色を呈する部分がペ活性陽性を示している。

図1は生後4日目のモルモット気管上部を示す。ペ活性陰性杯細胞に混在してペ活性陽性杯細胞も見られる。線毛細胞にも淡いびまん性の陽性沈着物が認められるが、これらの沈着物は電顕的には粗面および滑面小胞体などに限局している。上皮内に見られるペ活性陽性の遊走細胞は主に好酸球である。粘膜固有層にも白血球ないし赤血球が強くペ活性陽性を示す所見が見られる。

図2は生後4日目のモルモット右主気管支であるが、淡い褐色を呈する部分は(↓)を除いて、すべて線毛細胞であり、とっくり状に抜けて見えるのはほとんど杯細胞である。上皮と軟骨の間の粘膜固有層にはやはりペ活性陽性の白血球ないし赤血球が認められる。

図3は生後1カ月目のモルモット気管上部を示すが、ペ活性陽性の杯細胞は生後4日目の標本に比べて著増している。

図4は生後1カ月目のモルモット右主気管支であ

り、ペ活性陽性杯細胞が認められるが図3に比べてその数は少ない。

図5は生後6カ月目のモルモット気管上部を示す。ペ活性陽性の杯細胞および線毛細胞の間には遊走白血球が多数認められるがこれはほとんど好酸球である。

図6は生後6カ月目のモルモット右主気管支であるが、杯細胞に強いペ活性陽性沈着物が見られる。

図7、8は生後6カ月目のモルモット主気管支であるが、ペ活性のコントロール所見を示す。図7は H_2O_2 を除いた反応液に浸漬したものであり、図8は酵素阻害剤である Amitrole を反応液に加えたものであるが、ともに上皮細胞には陽性反応物を認めない。電顕的にも反応物は認められない。これらの所見は上皮細胞のペ活性反応物が非特異的沈着によるものではないことを示している。

図9は生後4日目の気管上部の拡大像であるが、ペ活性陽性の細胞と陰性の細胞が混在していることを示す。(↓)で示す部分には陽性杯細胞には含まれた陰性杯細胞が見られる。なお図1,2;図3,4;図5,6はそれぞれ同一モルモットの気管上部および主気管支である。

Toluidine blue 染色(図1～8:170×,図9:340×)

桑原英眞論文付図(2)

桑原英眞論文付図(3)

付図(2) 図10:

生後1カ月目のモルモット主気管支上皮の弱拡大電顕像:

杯細胞の分泌顆粒, 粗面小胞体がペ活性陽性を示す他, 線毛細胞の小胞体にもペ活性陽性沈着物が認められる。図の右端には分泌顆粒放出像を呈するペ活性陰性の杯細胞が見られる(↓)。陽性杯細胞にも顆粒放出像を示すものが見られる(+)。基底細胞はペ活性陰性である。粘膜固有層にはペ活性陽性の顆粒を持った好酸球が見られる。CC: 線毛細胞, NG: ペ活性陰性杯細胞, PG: ペ活性陽性杯細胞, BC: 基底細胞, EO: 好酸球, U-Pb 染色, 1860×

付図(3) 図11, 12:

生後1カ月モルモット主気管支:

線毛細胞では粗面および滑面小胞体, 核周囲腔, ゴルジ装置にペ活性が局在している(図11)。ペ活性陽性の顆粒を持った杯細胞と陰性の顆粒を持った杯細胞が隣接して認められる(図12)。SG: 分泌顆粒, C: 線毛, GO: ゴルジ装置, N: 核, CC: 線毛細胞

無染色(図11: 9300×, 図12: 9200×)

桑原英眞論文付図(4)

桑原英眞論文付図(5)

付図(4) 図13, 14, 15, 16:

生後1カ月モルモット主気管支:

補充期から充満期に至るペ活性陽性の杯細胞の電顕像を示す。図13, 14ではゴルジ装置の一部もペ活性陽性を示している。

また図14, 16ではペ活性陽性の細胞に隣接して陰性の杯細胞も見られる。MC: 肥満細胞, GO: ゴルジ装置, N: 核, NG: ペ活性陰性杯細胞, PG: ペ活性陽性杯細胞, CC: 線毛細胞 図13: 無染色, 9700×, 図14: U-Pb 染色, 12000×, 図15: U-Pb 染色, 4700×, 図16: U-Pb 染色, 6200×

付図(5) 図17, 18, 19:

図17は生後1カ月モルモット主気管支で、ペ活性陰性の杯細胞の分泌顆粒放出像を示す。写真右下にはペ活性陽性杯細胞が見られる。図18は生後4日目のモルモット主気管支で、補充期のペ活性陰性の杯細胞を示す。図19は生後1カ月モルモット主気管支で、小顆粒含有細胞を示す。ペ活性は陰性であった。写真右上にはペ活性陽性細胞の一部が見られる。LP: 粘膜固有層, BL: 基底膜, EG: 小顆粒含有細胞の細胞基底部の小顆粒, GO: ゴルジ装置, SG: 分泌顆粒

U-Pb染色(図17: 11000×, 図18: 13000×, 図19: 13200×)

表2 3群のモルモット気道上皮における杯細胞のぺ活性陽性率

Age of guinea pigs	No. of guinea pigs	Region of the air way	Total goblet cells counted	Peroxidase-positive goblet cells / Total goblet cells *
2- 4 days	2	Upper trachea	244	19.1 ± 7.1
	5	Main bronchi	374	4.8 ± 4.0
1 month	7	Upper trachea	561	66.2 ± 4.1
	7	Main bronchi	423	53.1 ± 7.9 **
6 months - 2 years	3	Upper trachea	210	87.8 ± 3.7
	3	Main bronchi	284	86.9 ± 4.8

* mean ± S. E.

**p-value<0.01 for difference from mean value of the main bronchi of 2—4 day-old guinea pig

p-value<0.05 for difference from mean value of the main bronchi of 6 month—2 year-old guinea pig

図20 生後発育に伴うぺ活性陽性の杯細胞の増加を示す。

後6カ月～2年の雄モルモットでは86.9±4.8%が陽性であり、生後2～4日の雄モルモットではわずか4.8±4.0%が陽性を示すにすぎない。気管上部においても生後1カ月では66.2±4.1%の杯細胞が陽性を示したのに対して、生後6カ月～2年では87.8±3.7%，生後2～4日では19.1±7.1%の杯細胞が陽性を示した。以上をまとめて図20に示す。

また同一齢のモルモットについて、同一個体の主気管支と気管上部を比較すると図21に示すごとく、生後2～4日、生後1カ月の例で主気管支に比して気管上部でぺ活性陽性杯細胞が増加している傾向が見られた。

このモルモット気道上皮におけるぺ活性陽性

図21 生後2～4日、生後1カ月のモルモットの気管上部および主気管支におけるぺ活性陽性杯細胞。

実線で結ばれたものは同一個体を示す。

の杯細胞の割合は、イソプロテレノール、アセチルコリン、ヒスタミン、17β-エストラジオールなどの薬剤によっては明らかな影響を認めなかった。

3) ペ反応のコントロール所見：

H₂O₂を除いたペ反応液に浸漬したものでは杯細胞に陽性反応物は認められなかったが、遊走白血球の顆粒、および線毛細胞の粗面および

滑面小胞体の一部に、まれに弱い反応物形成を認めた。しかし Na-pyruvate で処理した標本では反応物形成は全く認められなかった。このことから、この反応物形成は内因性 H_2O_2 の存在によるものと考えられる¹³⁾。

0.02M Amitrole で処理した例では線毛細胞および杯細胞のペ活性は完全に抑制されたが好酸球および赤血球の反応物形成は抑制されなかった。またこれらの好酸球と赤血球の反応物形成は 0.1M Amitrole でも抑制されなかった。

0.005M KCN で処理したものでは線毛細胞および杯細胞のペ活性はともに完全には抑制されなかったが、0.02 M KCN では完全に抑制された。また好酸球のペ活性は0.02M KCN で完全には抑制されなかったが、赤血球の反応物形成は完全に抑制された。2,4-DCP で処理した例では杯細胞および線毛細胞のペ活性陽性反応物の形成は抑制されなかった。

考 按

肺組織のペ活性については Neufeld ら¹⁵⁾がラット肺組織ホモゲネートを生化学的に測定して、その存在を示唆しているがペ活性は遊走白血球などにも存在するため、彼らの測定したペ活性がどの細胞に由来するかは明らかでない²⁷⁾。最近、伊藤ら¹⁶⁾はヒトおよびウシの気管支腺の一部にペ活性を光顕組織化学的に認めており、AB染色に対する態度からペ活性を示す細胞は漿液細胞であると想定している。現在までに、気道上皮の杯細胞のペ活性について電顕組織化学的に検索した文献はほとんど見られない。

今回の結果から、モルモット気道上皮の杯細胞はペ活性を示す物質を有し、これは主に粗面小胞体、核周囲腔および分泌顆粒に存在し、分泌物として管腔内に放出されることが明らかにされた。分泌顆粒の産生に関しては Palade らの説¹⁷⁾が提出されて以来、蛋白性分泌物は、リボゾームで合成されて粗面小胞体腔を経てゴルジ装置の近くまで運ばれ、そこから小胞によってゴルジ装置に送られ濃縮され、あるいはさらに物質が付加されて分泌顆粒が形成されると考えられている¹⁸⁾¹⁹⁾。

モルモット気道上皮の杯細胞においても、ペ

活性物質は上記経路によって作られ分泌顆粒の中に組み込まれると考えられる所見がある。細胞質基質にもしばしばペ活性反応物が認められたが、標本の形態保存が不良な場合に見られ、形態保存が良好な組織におけるペ活性は粗面小胞体、核周囲腔、分泌顆粒、ゴルジ装置に局限していたため、これは標本作製のさいの酵素の拡散などによる人工産物である可能性が考えられる。

ペ活性が陽性の杯細胞の分泌顆粒は形成直後の幼若なものから成熟して放出される時期のものまですべて陽性を示す。また一方ペ活性陽性物質を全く持たない杯細胞も認められるが、この陰性細胞の微細構造は通常の超薄切片においてはペ活性陽性杯細胞とよく類似する所見を示し、とくに相違は認められず、組織化学反応を行ってはいじめて区別することができる。ペ活性陰性杯細胞の存在については、一般に酵素活性を組織化学的に検出する場合、固定操作に伴い種々の影響を受けることが考えられ、その判断には慎重を要するが、ペ活性陰性の場合、本細胞がまったくペを産生しないことが考えられる他に、本細胞の産生するペの量が極く微量なため今回著者が行った検出法では検出できないこと、または固定により破壊され易く不安定なペを持つ可能性も考えられる。これらの点について著者は 2% paraformaldehyde-2% glutaraldehyde 液で3時間、前固定を行った標本では 1% paraformaldehyde-1% glutaraldehyde 液で30分間、前固定を行った標本に比してペ活性は減弱しており、反応沈着物を認め難い杯細胞が増加することを認めており、一方、生後4日目のモルモット主気管支の未固定凍結標本でペ活性の検出を試みると、線毛細胞には淡いびまん性の反応物が認められ、杯細胞にも一部に反応物を検出することができたが、大多数の杯細胞は反応物を持たないことが認められた。上述の所見は、モルモット気道上皮の杯細胞にはペを産生するペ活性陽性細胞とペを産生していないペ活性陰性細胞とが存在することを強く示唆する事実と考える。また、ペ活性陽性の杯細胞の割合は年齢が進むにつれて増加することが確かめられたが、このことは既述のペ活性陰性の杯細胞が個体の発育によりペ活性物質を産生す

る細胞に転化することを示唆する所見と考えられ、気道上皮におけるペの機能とも関連して注目すべき所見である。しかし今回の観察では、同一の杯細胞がペを産生する細胞に転化するほかに、ペ活性陽性細胞が新生することにより増加する可能性も否定し得ないのでこのことについてはさらに詳細な検討を要する。

従来、ラットの子宮粘膜上皮などのエストロゲン依存性組織にペ産生能力があることが知られているが、これは 17β -エストラジオール投与により亢進することが報告されている²⁰⁾³¹⁾。また、唾液腺に存在するペは β 刺激剤であるイソプロテレノール投与により分泌亢進をきたすことが知られている¹⁰⁾²¹⁾。著者も本研究において、 17β -エストラジオール注射、イソプロテレノール吸入を行い、杯細胞のペ活性物質について検討したが、反応物形成に関して著明な変化を認め得なかった。さらにアセチルコリン、ヒスタミン投与による影響も検討したが、この条件下の刺激では、変化を見出すことはできなかった。モルモット気道の杯細胞のペ産生は上記の実験条件の諸薬剤では影響されないことから、生後の発育に伴うペ活性陽性細胞の増加については、気道への外気の出入、外来性異物の侵入などの刺激が重要な要素の一つとなる可能性があり、今後、気道の病態を検索する際に注目すべき重要な課題であると考え²²⁾²³⁾。

ペの生理的意義に関しては、今までにいくつかの報告がある。その中で、甲状腺ホルモン、プロスタグランジンなどの代謝に関与するとする研究のほかに²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾、バクテリアその他に対する anti-microbial effects があることが知られている²⁴⁾²⁷⁾⁻³⁰⁾。とくに後者については、唾液腺や乳腺の終末部細胞に存在するものについても報告が見られ、その作用についても bactericidal effects のほかに virocidal, fungicidal, spermicidal の効果があるとされている。その化学的組成については唾液腺、乳腺のものはともに免疫学的、生化学的によく一致する性状を示すことが知られている²⁷⁾²⁸⁾が、著者は気道粘膜上皮のペの化学的性状について前述のごとき方法を行っておらず、これらのペと杯細胞のペとの関連は明らかではない。しかし、酵素阻害剤に対する態度からは唾液腺、乳腺に見られる

ペとよく類似することを示唆する所見が得られた⁹⁾¹⁸⁾³⁵⁾。線毛細胞および杯細胞に見られるペ活性については、線毛細胞に吸収機能を示唆する所見があること¹⁴⁾、生後2～4日目の早期にも認められることなどに対して、杯細胞が分泌細胞であること、生後の発育に伴ってペ活性陽性細胞が増加することなど、両者の間には異なる点が多いが、恐らく両種細胞に存在するペの機能は類似しており、気道上皮の生体防御機構の一端を協同して担っていると考えることが妥当であるが、今後さらに検索すべき問題である。

結 語

モルモット気道上皮の杯細胞に関して電顕組織化学的検討を行い次の結果を得た。

- 1) モルモット気道上皮の杯細胞にはペ活性陽性の細胞と、ペ活性陰性の細胞とが認められるが、それぞれ分泌機能をもつことが明らかにされた。
- 2) ペ活性は杯細胞の分泌顆粒、粗面小胞体腔、核周囲腔およびゴルジ装置の一部に陽性であった。
- 3) ペ活性陽性の杯細胞は生後の発育に伴って増加し、陰性の細胞は減少した。
- 4) ペ活性陽性杯細胞の総杯細胞数に対する割合は、主気管支に比べて気管上部で、より高い傾向が認められた。
- 5) モルモット気道上皮の杯細胞の含むペの酵素阻害剤に対する反応態度は、唾液腺や乳腺に見出される“lactoperoxidase”と類似する性質をもつことが示唆された。

本論文の一部は第74回北関東医学会例会および第31回日本気管食道科学会総会において報告した。稿を終るに臨み御校閲をいただいた恩師小林節雄教授ならびに直接御指導と御協力をいただいた本学第一解剖学教室柴崎晋教授に深く感謝の意を表します。さらに種々の御援助を下さいました第一内科学教室、第一解剖学教室の各位に感謝致します。

文 献

- 1) Flory, H.W.: The secretion of mucus and in inflammation of mucous membranes. General Pathology. Flory, H. ed., W.B. Saunders Co., 1962.
- 2) Thurlbeck, W.M., Malaka, D., Murphy, K.: Goblet cells in the peripheral air ways in chron-

- ic bronchitis. *Am. Rev. Respir. Dis.*, 112 : 65-69, 1975.
- 3) Salvato, G.: Some histological changes in chronic bronchitis and asthma. *Thorax*, 23 : 168-172, 1968.
- 4) Mowry, R.W.: The special value of methods that color both acidic and vicinal hydroxyl groups in the histochemical study of mucins. With revised directions for colloidal iron stain, the use of Alcian blue 8GX and their combinations with the periodic acid-Schiff reaction. *Ann. NY Acad. Sci.*, 106 : 402-423, 1963.
- 5) Lamb, D., Reid, L.: Histochemical types of acidic glycoprotein produced by mucous cells of the tracheobronchial glands in man. *J. Path.*, 98 : 213-229, 1969.
- 6) Azzopardi, A., Thurlbeck, W.M.: Oxidative enzyme pattern of the bronchial mucous gland. *Am. Rev. Respir. Dis.*, 97 : 1038-1045, 1968.
- 7) Richardson, J.B., Hogg, J.C., Bouchard, T., Hall, D.L.: Localization of antigen in experimental bronchoconstriction in guinea pigs. *J. Allergy Clin. Immunol.*, 52 : 172-181, 1973.
- 8) Nakane, P.K., Pierce, G.B.: Enzyme-labelled antibodies for light and electron microscopic localization of tissue antigen. *J. Cell Biol.*, 33 : 307-318, 1967.
- 9) Graham, R. C., Karnovsky, M.J.: The early stages of absorption of injected horse radish peroxidase in the proximal tubules of mouse kidney: Ultrastructural cytochemistry by a new technique. *J. Histochem. Cytochem.*, 14 : 291-302, 1966.
- 10) Yamashina, S., Barka, T.: Peroxidase activity in the developing rat submandibular gland. *Lab. Invest.*, 31 : 82-89, 1974.
- 11) Carlsöö, B., Kumlien, A., Bloom, G.D.: A comparative histochemical study of peroxidase activity in the submandibular glands of five mammalian species including man. *Histochemie*, 26 : 80-88, 1971.
- 12) Hirai, K.: Light microscopic study of the peroxidase activity of catalase in formaldehyde-fixed rat liver. *J. Histochem. Cytochem.*, 17 : 585-590, 1969.
- 13) Tice, L.W., Wollman, S.H.: Ultrastructural localization of peroxidase activity on some membranes of the typical thyroid epithelial cell. *Lab. Invest.*, 26 : 63-73, 1972.
- 14) 伊東俊夫, 石井英男: 気道と食道粘膜の形態学, 広川書店, 東京, pp. 69-78, 1970.
- 15) Neufeld, H.A., Levay, A.N., Lucas, F.V., Martin, A.P., Stotz, L.: Peroxidase and cytochrome oxidase in rat tissues. *J. Biol. Chem.*, 233 : 209-211, 1958.
- 16) 伊藤元彦, 長瀬千秋, 光岡明夫, 永田明義, 原田孝之, 森川茂: 気管支腺の機能と構造に関する研究 (1) — 感染防御機構としての気管支腺の意義について —, *日胸疾会誌*, 15 : 186-190, 1977.
- 17) Caro, L.G., Palade, G.E.: Protein synthesis, storage and discharge in the pancreatic exocrine cell. An autoradiographic study. *J. Cell Biol.*, 20 : 473-495, 1964.
- 18) Novikoff, A.B., Beard, M.E., Albala, A., Sheid, B., Quintana, N., Biempica, L.: Localization of endogenous peroxidases in animal tissues. *J. de Microscopie*, 12 : 381-404, 1971.
- 19) 井上金治, 黒住一昌: ゴルジ装置とGERLの構造と機能, *細胞*, 9 : 140-151, 1977.
- 20) Anderson, W.A., Kang, Y., DeSombre, E.R.: Endogenous peroxidase: Specific marker enzyme for tissues displaying growth dependency of estrogen. *J. Cell Biol.*, 64 : 668-681, 1975.
- 21) Oliver, C., Hand, A.R.: Uptake and fate of luminally administered horse-radish peroxidase in resting and isoproterenol-stimulated rat parotid acinar cells. *J. Cell Biol.*, 76 : 207-220, 1978.
- 22) Charkrin, L. W., Baker, A.P., Christian, P., Wardell, J.R.: Effect of cholinergic stimulation on the release of macromolecules by canine trachea in vitro. *Am. Rev. Respir. Dis.*, 108 : 69-76, 1973.
- 23) Boat, T.F., Kleinerman, J.I.: Human respiratory tract secretions. 2. Effect of cholinergic and adrenergic agents on in vitro release of protein and mucous glycoprotein. *Chest*, 67 suppl. : 32-34, 1975.
- 24) Morrison, M., Schonbaum, G.R.: Peroxidase-catalyzed halogenation. *Ann. Rev. Biochem.*, 45 : 861-888, 1976.
- 25) Ham, E.A., Egan, R.W., Soderman, D.D., Gale, P.H., Kuehl, F.A.: Peroxidase-dependent deactivation of prostacyclin synthetase. *J. Biol. Chem.*, 254 : 2191-2194, 1979.
- 26) 浅田浩二: 酸素毒性, *生化学*, 48 : 226-257, 1976.
- 27) Morrison, M., Bright, J., Jajasinghe, W.: Lactoperoxidase. V. Identification and isolation of lactoperoxidase from salivary gland. *Arch. Biochem.*, 111 : 126-133, 1965.
- 28) Thomson, J., Morell, D.B.: The structure, location and distribution of salivary gland peroxidase. *J. Biochem.*, 62 : 483-486, 1967.
- 29) Slowey, R.R., Eidelman, S., Klebanoff, S.J.: Anti-bacterial activity of the purified peroxidase from human parotid saliva. *J. Bact.*, 96 : 575-579, 1968.
- 30) Reiter, B., Oram, J.D.: Bacterial inhibitors in milk and other biological fluids. *Nature*, 216 : 328-330, 1967.
- 31) Lyttle, C.R., DeSombre, E.R.: Generality of oestrogen stimulation of peroxidase activity in growth responsive tissues. *Nature*, 268 : 337-339,

- 1977.
- 32) Bensch, K.G., Gordon, G.B., Miller, L.R.: Studies on the bronchial counterpart of the Kultschitzky cell and innervation of bronchial glands. J. Ultrastruct. Res., 12 : 668-686, 1965.
- 33) Lauweryns, J.M., Cokelaere, M., Theunynck, P.: Neuroepithelial bodies in the respiratory mucosa of various mammals. Z. Zellforsch, 135 : 569-592, 1972.
- 34) Taira, K., Shibasaki, S.: A fine structure study of the non-ciliated cells in the mouse tracheal epithelium with special reference to the relation of "brush cells" and "endocrine cells". Arch. Histol. Jap., 41 : 351-366, 1978.
- 35) Roels, F., Wisse, E., DePrest, B., Meulen, J.: Cytochemical discrimination between catalases and peroxidases using diaminobenzidine. Histochemistry, 41 : 281-312, 1975.
- (別刷請求：〒371前橋市昭和町3-39-22
群馬大学医学部第一内科
桑原 英眞)
- (投稿受付 1980年 2月29日 急載)