咽喉頭異常感と喉頭病変との関連

*石 塚 洋 一

Pharyngo-laryngeal Abnormal Sensation and Laryngeal Diseases

Yoichi Ishizuka, M.D.

Department of Otorhinolaryngology, Teikyo University School of Medicine, Tokyo

Out of 193 cases with complaint of pharyngo-laryngeal abnormal sensation, 101 cases (52.3%) were revealed to have organic abnormalities on clinical examinations mainly in the larynx. The site of organic abnormalities varied depending on the location of abnormal sensation. Close laryngeal examinations are mandatory particularly when the abnormal sensation is well-localized or strictly unilateral.

Key words : pharyngo-laryngeal abnormal sensation, cyst of the epiglottis

I. はじめに

咽喉頭異常感を訴えて来院する患者は増加の傾向にあり、またその訴えは複雑であるため、症例に応じて詳細な検索が必要となる。従ってこのような症例にたいしては、局所的、全身的さらには心因的といった多方面からのアプローチが要求される。間接喉頭鏡検査などにより器質的異常を認めない神経症も多く含まれる¹⁾が、喉頭やその周辺に病的変化を伴う症例については、慎重に対処しなければならない。局所的原因の主なものとしては咽喉頭部の炎症や、腫瘍はもとより舌根扁桃肥大、喉頭蓋形態異常、頸椎異常、食道憩室、食道癌、慢性気管支炎など様々な疾患にわたっている。そこで著者は、咽喉頭異常感を訴えて来院した患者の自覚症状や他覚的所見について分析してみた。その結果、喉頭を中心として、器質的異常を認めた症例も数多く存在することが判明し、さらに患者の訴える異常感の部位によって病変部位に多少の相違が認められたので、個々の症例をまじえながら

若干の考察を加えて報告する。

II. 対象と統計的観察

昭和55年4月から昭和56年3月までの1年間に咽喉頭異常感を訴えて来院した患者193名を対象とした。これはこの年の新患総数(6359名)の約3.0%に相当する。患者の内訳は表1に示すごとく、女子116名、男子77名で年齢分布では30歳代～50歳代にかけて男女合わせて148名と多く、全体の76.7%をしめている。これらの患者について鼻、咽、喉頭の一般的所見の観察、喉頭ファイバースコープ、喉頭断層撮影、頸椎レントゲン検査、食道透視、食道鏡検査、呼吸機能検査、血液検査などを症例に応じて施行した。その結果、諸検査にて異常所見を認めないものは92例(47.7%)で、その他の101例(52.3%)については、なんらかの器質的疾患を認めた(表2)。また、咽喉頭部になんらかの器質的疾患を認めたものは、咽喉頭炎36例、舌根扁桃肥大12例を含めて65例(33.7%)であった。

*帝京大学医学部耳鼻咽喉科学教室
(主任 鈴木淳一教授)

表 1 咽喉頭異常感で来院した患者の年齢分布

表 2 咽喉頭異常感で来院した患者の内訳

異常所見を認めないもの	92例 (47.7%)
異常所見を認めたもの	101例 (52.3%)
鼻アレルギー	11
副鼻腔炎	2
咽喉頭炎	36
舌根扁桃肥大	12
慢性気管支炎・喘息	18
下咽頭パピローム	1
下咽頭外傷	1
声帯ポリープ	1
声帯結節	1
反回神経麻痺	1
内筋麻痺	1
仮声帯腫脹	1
仮声帯浮腫	1
喉頭異物	1
喉頭癌	3
片側性声帯炎	1
喉頭嚢腫	4
気管 Falte	1
食道憩室	1
喉頭斜位	3

Ⅲ. 症 例

症例 1. 66歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

5カ月前より咽喉頭異常感（右顎下部の唾液や食物の嚥下時に魚の骨がささったようなチクチクした異常感）が出現し近くの耳鼻科を受診したが、異常がないのでこのまま経過をみるようにいわれた。その後徐々に症状が増強した

図 1 症例 1, 喉頭癌

患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

ので当科を受診した。初診時、嗄声や嚥下障害は認めなかったが、右顎下部に異常感を訴え（図 1）、間接喉頭鏡検査にて右側の喉頭蓋喉頭面に灰白色の腫瘍を認め、声帯および仮声帯は正常であった。この症例の喉頭ファイバースコープ所見を図 1 に示した。病理組織学的検査の結果、扁平上皮癌と診断、 ^{60}Co 4000 rad照射にて喉頭所見も改善し、咽喉頭異常感も消失した。

症例 2. 60歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

3カ月前より左側顎下部に重苦しい感じの異常感があり（図 2）、1カ月前より嚥下時に、左側顎下部に何かひっかかる感じと軽い疼痛が出現したため当科を受診した。初診時、間接喉頭鏡検査にて左側喉頭蓋喉頭面に、灰白色の腫瘍を認め病理組織学的検査の結果、扁平上皮癌と診断された（図 2）。

図 2 症例 2, 喉頭癌

患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

症例 3. 56歳 女子

主訴：咽喉頭異常感

1カ月前より咽喉頭異常感（右側の甲状軟骨部付近の重苦しいような異常感）が出現した。初診時、嚔声はなく、間接喉頭鏡検査にて右側仮声帯に腫瘍状の腫脹を認め、病理組織学的検査にて扁平上皮癌と診断され、 ^{60}Co 照射を開始し、腫瘍の縮小と異常感の消失をみた（図3）。

症例 4. 47歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

4カ月前頃より咽喉頭異常感（左側の甲状軟骨部付近に、何かつかえた感じの異常感）があったが、嚔下痛や嚔下障害はないので、放置していた。最近症状が気になり近医を受診したところ、左側仮声帯腫脹を指摘され当科を紹介された。初診時、間接喉頭鏡検査にて、左側仮声帯腫脹を認め、喉頭断層撮影でも左側喉頭室の消失を認めた（図4）。仮声帯腫脹は表面平滑で軽度発赤を認める他は著変なく、自覚的にも

図 3 症例 3, 喉頭癌

患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

異常感の他には訴えがないためこのまま経過観察中である。

症例 5. 52歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

1カ月前の感冒後より咽喉頭異常感（左顎下部付近の腫脹感と、ときどき嚔下時にひっかかるような感じの異常感）が出現したため当科を受診した。初診時、嚔下痛や嚔声はなく、間接喉頭鏡検査にて、喉頭蓋舌面の左側に黄色で球状の大きいチステ様の腫瘍を認めた（図5）。全身麻酔下に摘出したが、ネリガラシ様の内容物を含み、リンパ組織内に重層扁平上皮が陥入した嚔腫であった。

症例 6. 51歳 女子

主訴：咽喉頭異常感

1カ月前より咽喉頭異常感（左側顎下部の異常感）が出現し当科を受診した。初診時、間接喉頭鏡検査にて右側の喉頭蓋に、嚔腫を認めた

図 4 症例4, 仮声帯腫脹
喉頭断層写真と喉頭ファイバースコープ所見

(図6)。

症例7. ■■■ 48歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

4年前より咽喉頭異常感（甲状軟骨部付近が
つまると感じるような異常感）があり、感冒時に
症状が増強することがあるため、当科を受診した。
初診時、嚥声や嚥下痛はなく間接喉頭鏡検
査にて、右側仮声帯前方に血腫様病変を認めた
ため、全身麻酔下に摘出した（図7）。病理組
織学的には喉頭粘膜の浮腫性変化という結果で
あったが、引き続き経過観察中である。

症例8. ■■■ 63歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

図 5 症例5, 喉頭蓋嚢腫
患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

図 6 症例6, 喉頭蓋嚢腫
喉頭ファイバースコープ所見

2週間位前より、咽喉頭異常感（甲状軟骨部
付近の重苦しいような異常感）が出現したため
当科を受診した。初診時、嚥声はなく間接喉頭
鏡検査にて左側声帯の発赤を認め、片側性声帯
炎と診断された（図8）。

症例9. ■■■ 41歳 男子

図 7 症例 7, 仮声帯浮腫
患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

図 8 症例 8, 片側性声帯炎
患者の訴える異常感部位と喉頭ファイバースコープ所見

図 9 症例 9, 気管 Falte
喉頭ファイバースコープ所見

主訴：咽喉頭異常感

5 年前に頭部外傷を受け脳外科にて手術を施行し、その時に気管切開を受けている。この 7 カ月前より咽喉頭異常感（甲状軟骨部下方に何かひっかかっているような異常感）が出現したため当科を受診した。初診時、嗄声や呼吸困難はなく間接喉頭鏡検査にて気管壁に、Falte 様の突出が認められた（図 9）。気管切開による

図 10 症例 10, 喉頭斜位
喉頭ファイバースコープ所見

ものと考えられたが、呼吸機能検査などで異常を認めないため、このまま経過観察中である。

症例 10. ■■■ 42 歳 男子

主訴：咽喉頭異常感

2 カ月前より咽喉頭異常感（甲状軟骨部付近に何かつかかっているような異常感）があるた

め、精査を希望して来院した。初診時、間接喉頭鏡検査にて喉頭が全体にねじれており、右側喉頭蓋が舌根部に、左側喉頭蓋が下咽頭後壁に接触していた。その他の喉頭所見に異常なく、諸検査にても異常を認めないために喉頭斜位と診断された(図10)。

Ⅳ. 考 察

喉頭疾患においては嘔声や嚥下困難、嚥下痛、呼吸困難といった典型的な症状を訴えることが多いが、なかには比較的無症状に病気が進行したり、異常感程度の軽い症状ではじまることもある。ここに報告した症例のように咽喉頭異常感を主訴として来院した患者の中には、喉頭やその周辺に病変を認める様々な疾患が含まれていることがわかった。これらの中から代表的な疾患について、患者が自分自身で訴えた異常感部位と間接喉頭鏡所見を、一つにまとめてみた(図11)。図に示したように病変部位の解剖学的相違によって、患者の訴える異常感部位が左右に偏していたり、また、それが甲状軟骨部より上部であったり、下部であったり、症例に応じて相違していることがわかる。すなわち、顎下部付近の訴えは、喉頭蓋を中心に病変を認め、その内訳は喉頭蓋嚢腫、喉頭蓋悪性腫瘍、喉頭異物(魚骨)であった。甲状軟骨上部外側の訴えは仮声帯に病変を認めた仮声帯腫脹(慢性炎症)と仮声帯より発生した癌腫であった。甲状軟骨部正中部付近に異常感を訴えた患者では、反回神経麻痺、声帯結節、声帯ポリープ、片側性声帯炎など声帯を中心に病変を認めた。甲状軟骨部下方の訴えは下咽頭下部のパピローマ、食物による外傷の症例であった。これを部位別にまとめてみると顎下部付近の訴えは、喉頭蓋、甲状軟骨部上部外側は仮声帯、甲状軟骨部付近は声帯と披裂部、甲状軟骨部下方の訴えは下咽頭下部と気管、食道入口部の異常を示すことが明らかとなった(図12)。咽喉頭異常感を訴えて来院する患者の病変部位について三宅²⁾は患者の訴える異常感が「ネクタイの結び目」より上下左右に離れている時は、局所的な病変によることが多いので注意を要すると報告している。

喉頭蓋の炎症性疾患は、嚥下痛や呼吸困難を

訴えることが多いが、本症例にもみられたような喉頭蓋に発生した癌腫の初期や喉頭蓋の良性腫瘍では、咽喉頭異常感で受診するケースもみられる。喉頭蓋に発生する良性腫瘍には嚢腫、乳頭腫、血管腫、脂肪腫、線維腫など種々あるが、日常臨床でよくみられるのは喉頭蓋嚢腫があり、全喉頭嚢腫の約半数³⁾をしめその好発部位は喉頭蓋舌面である。喉頭蓋嚢腫は発育が緩慢で徐々に増大するものが多く、その症状も比較的軽度で咽喉頭異常感で来院するものや無症状で偶然発見される場合もある⁴⁾。著者が経験した4症例でも患者の訴えが左右に偏しており、初発症状も異常感程度の軽いもので、嚥下時における異常感を伴っていたのが特徴的であった。しかし、大きくなると嚥下障害や呼吸困難などの症状も出現⁵⁾するので、早期に適切な処置が望まれる。

一側仮声帯の腫瘍状腫脹を伴う病変においても病変部と同側の異常感を訴える症例があり、このような病態を呈するものの中には炎症性腫脹⁶⁾や癌腫や良性腫瘍⁷⁾などがある。また、喉頭結核⁸⁾においても、仮声帯腫脹を認めることもあるので注意深い観察と全身的な検査が必要となってくる。また、喉頭蓋病変と同様に嚥下時における異常感を伴うことが多いので、患者への問診も十分に行わなければならない。

片側性声帯炎の症例で咽喉頭異常感を訴えて来院した症例を経験したが、これまでも嘔声を主訴とする患者が多い中で異常感を主訴とする症例も報告⁹⁾されている。声帯ポリープ、声帯結節さらには披裂部の運動の左右不同を認め、咽喉頭異常感を主訴とした症例を経験したが、間接喉頭鏡検査では声帯はもちろんのこと披裂部の形態学的異常や運動異常、偏位ならびに梨状陥凹の観察も注意深く行い、喉頭病変を正確に把握する必要がある。喉頭の運動異常については咽喉頭異常感患者のラリノグラムの検討から高橋¹⁰⁾は明らかに喉頭における運動障害のあるものが多かったと述べている。また、喉頭蓋喉頭面などの見にくい部位については、喉頭ファイバースコープによる検査も積極的に取り入れなければならない。咽喉頭異常感を訴えて来院した患者の年齢分布は、30歳代～50歳代にかけて76.7%と大部分を占めており、何ら

図 11 患者の訴える異常感部位と間接喉頭鏡所見

かの器質的異常を認めた症例の中で舌根扁桃肥大12例の平均年齢は43.1歳, 咽喉頭炎36例の平均年齢は40.6歳であった。60歳以上の症例の中には悪性腫瘍患者が含まれていたことから, 患者の訴えに laterality があり, かつ限局性の訴えを有する高年齢者には悪性腫瘍の可能性も念頭において検査を進める必要がある。

喉頭蓋や仮声帯に病変をもつ患者の訴えはよく聞いてみると嚥下時の異常感が持続していることがあり, その病変の解剖学的位置よりも患者の訴える異常感部

図 12 咽喉頭異常感を訴える部位と喉頭病変部位

位は比較的上方であることが多い。これは、嚥下時における喉頭の挙上運動といった生理的な機構が関連しているものと推察される。

咽喉頭異常感と舌根扁桃との関係は古くから述べられてきた問題であるが、喉頭蓋の前屈強度により喉頭蓋縁と舌根扁桃の接触が起ることから喉頭蓋の形態異常の問題も重視する必要がある。著者の経験した症例は、喉頭全体がねじれており、喉頭斜位と考えられるが、咽喉頭異常感出現のメカニズムなどについては、形態学の問題も含めて今後さらに検討を要する問題である。

咽喉頭異常感を訴える患者の自覚症状は非常に複雑で、その表現も多種多様である。異常所見を認めなかった92例については食物の嚥下時には感じないがカラつば飲み時に、何かひっかかる感じがするという訴えが多いのが特徴的であった。また、“のどの奥に何か玉のような物が動いている”“薬を飲む時につまる感じがする”“ビー玉がつかえている感じ”“何かひっついている感じ”“髪の毛がついている感じ”といったように、その表現方法が個性的であった。器質的病変を認めた症例については、各症例間に異常感の表現に特徴はなかったが喉頭に病変を有する患者では“何かひっかかる感じ”“重苦しい感じ”を限局性に訴えた症例が大部分で、食物の嚥下時の異常感も伴っていた。また舌根扁桃肥大症例ではカラつば飲み時に“つかえる感じ”“物がひっかかる感じ”を訴えたものや、摂食後の残存感を訴えた症例が多くみられた。

以上のことから、咽喉頭異常感を訴えて来院した患者については、異常感を感じる場所はその辺なのか患者自身の手で“顎下部なのか”“甲状軟骨部なのか”“前胸部なのか”指で示めさせることが大事で、同時に問診や局所の視診、触診さらには喉頭所見の観察を慎重に行わなければならない。

この他にも鼻や気管、食道といった関連領域などの問題も常に念頭におきながら、咽喉頭異

常感がどのような訴えでどのような部位に存在するのか、嚥下との関連性はどうか、訴えが左右に偏していないかといったことに注意を向ける必要がある。

V. 結 語

咽喉頭異常感を主訴として来院した患者193名について検討したところ、咽喉頭部になんらかの器質的異常を認めたものは全体の33.7% (65例) であった。また、患者が訴える異常感部位によって、病変部位に解剖学的相違が認められた。

本論文は東邦大学耳鼻咽喉科学教室において経験した症例である。御指導御協力をいただいた小松崎篤教授ならびに教職員各位に心から感謝申し上げます。なお、本論文の要旨は第33回日本気管食道科学会にて発表した。

文 献

- 1) 大森一弘：咽喉頭異常感症の臨床的研究，耳展，9：1-21，1966.
- 2) 三宅弘一：咽喉頭異常感，耳喉，46：95-101，1974.
- 3) Holinger, P. H. and Johnston, K. C.: Benign tumors of the larynx. Ann. Otol., 60: 496-509, 1951.
- 4) 小松晃・他：喉頭蓋ならびに全身に多発せる類上皮嚢腫の1例，耳喉，42：69-76，1970.
- 5) 博多弘・他：喉頭蓋嚢腫の1例，耳喉，43：549-551，1971.
- 6) 田村宏之：肥厚仮声帯の基礎と臨床，日気食会報，28：184-194，1977.
- 7) 法水正水・他：喉頭に原発した Nourilemmoma の1例，日耳鼻，67：1415-1420，1964.
- 8) 南条昭一・他：最近経験した喉頭結核と思われる三症例について，耳喉，44：227-231，1972.
- 9) 石井英男・他：出血性声帯炎の臨床，日気食会報，20：43-50，1969.
- 10) 高橋義勝：咽喉頭異常感患者のラリンゴグラムに就て，日気食会報，29：299-310，1978.

別刷請求：〒213 川崎市高津区溝ノ口74
帝京大学医学部附属溝口病院
耳鼻咽喉科 石塚 洋一

(投稿受付 1982年4月30日)