早期肺癌切除例の検討

*半沢 偽, 和田 源司

木村 秀樹

A Study of Resected Early Lung Cancers

Suguru Hanzawa, M.D., Genji Wada, M.D. and Hideki Kimura, M.D.

Department of Thoracic Surgery, Kenseibu Hamamatsu Medical Center, Hamamatsu

Fifteen cases of early lung cancer resected in our clinic for the last seven years were examined.

Four of them were hilar type. Three cases were male heavy smokers and taken to the hospital on account of bloody sputum and slight fever. The localization of the tumor was revealed by bronchoscopy in all cases. Pre-operative diagnosis, three squamous cell carcinomas and one adenocarcinoma, was established by biopsy and/or brushing cytology. Lobectomy was performed in two cases, and in other two cases lobectomy with sleeve resection of bronchus and segmentectomy with wedge resection of bronchus were carried out. The case with limited resection was lost by metastasis in the opposite lung eighteen months after the operation.

Eleven cases, one male and ten females, were peripheral type. Only one case was smoker. Complaints were seen in only three cases. Eight cases were asymptomatic and seven of these eight were detected by mass X-ray survey. Among those eleven cases, five were diagnosed by percutaneous needle biopsy. The final diagnoses were adenocarcinoma in nine cases, squamous cell carcinoma in one and carcinoid in the remainder. Lobectomy was performed in ten cases, and partial resection was done in one case because of poor pulmonary function. All cases are alive and the longest post-operative course is six years and six months.

A case of well differentiated papillary adenocarcinoma in hilar region and a case of moderately differentiated squamous cell carcinoma in peripheral region were demonstrated.

The value of limited operation for early lung cancer and the utility of mass survey with X-ray and sputum cytology for the early detection of lung cancer were discussed.

Key words: 肺門部（肺門型）早期癌, 肺野末梢部（肺野型）早期癌, 縮小手術, 集団検診

緒 言

厚生省による本邦における疾患別死因統計によれば, 昭和56年度には, 全悪性腫瘍による死亡率が, 脳血管疾患, 心疾患のそれを超え, 第1位になったと推計されている¹⁾。なかでも肺癌の死亡率は急速に上昇しつつあり, 今後も数十年にわたり増加を続けることが予測され²⁾, 1980年代のうちには, 死亡例の絶対数において

*県西部浜松医療センター 胸部外科

も胃癌のそれを凌ぐことになろうといわれている³⁾。

肺癌は, このように著しく増加しつつあるが, 一方その予後は他臓器の癌に比較して, 著しく不良であるのが特徴である。すなわち, 肺癌は, 発見された時点ですでにその多くがⅢ, Ⅳ期の, いわゆる進行癌であり, 肺癌治療の第一選択である外科療法はもとより, 化学療法, 放射線療法などについても, その効果を十分期

待し得ぬ状態であることが多い。よって肺癌の治療成績と予後の向上を図るためには、その早期発見と早期診断につとめ、可及的早期に治療を開始する以外に方法はない³⁾。

肺癌の早期発見のためには、集団検診をはじめ、いくつかの試みがなされているが、必ずしも満足すべき成果を挙げているとはいえない。

われわれの施設では、これまで約7年間に、早期肺癌と確認された症例を15例経験しているが、これらの症例について、向後の早期発見と治療、ひいては予後の向上に役立たせるべく、主として臨床的な立場から検討を加え、若干の文献的考察を加えたので報告する。

検索対象

昭和51年1月より57年6月までに、当施設において入院治療を受けた肺癌症例は335例、男女比は226対109であった。このうち89例が外科的に摘除されており、入院切除率は26.6%となる。TNM (JJC) 分類に照らした臨床病期は、Ⅰ期90例、Ⅱ期39例、Ⅲ期101例、Ⅳ期105例で、Ⅲ、Ⅳ期のいわゆる進行癌症例が全体の61.5%を占めている。

これら症例のうち、切除後の組織形態学的検索により早期癌と確認されたのは、肺門部発生例4例、肺野末梢部発生例11例である。

ここで、肺門部早期癌とは、区域気管支までの太い気管支に発生し、気管支壁内に限局し、 n_0M_0 のものとし、肺野末梢部のものは、亜区域支より末梢に発生し、腫瘍径は20 mmを超えず、 $p_0n_0M_0$ のものとして検索を行った。

検索結果

Ⅰ) 肺門部 (肺門型) 早期癌

今回検討の対象になった肺門部早期癌4例を表1に示す。

全症例とも男性で、年齢は53歳から73歳、いずれも喫煙係数 (Brinkman Index) 660以上の重喫煙者で、3例が血痰を主訴に来院している。発生部位は、区域支および気管支幹の中枢側気管支であった。これら症例の胸部X線写真では、2例が無気肺像、1例は肺門部浸潤影、他の1例は末梢肺野の炎症性変化を思わせる淡い浸潤影を呈していた。

全例に気管支鏡検査が行われ、腫瘍を直接確認し、この部の生検ないし擦過細胞診によって術前の確定診断を得ているが、3例が扁平上皮癌、1例が腺癌であった。内視鏡による腫瘍の肉眼所見は、扁平上皮癌の1例が結節型を示しているが、他の3例では、可動性の腫瘍による気管支腔の閉塞が主たる変化であった。

これら症例のうち、1例に気管支楔状切除を伴う区域切除術を施行し、他の3例には肺葉切除術を施行したが、腺癌の1例には、気管支管状切除後気管支形成術を行っている。

手術根治度は、治癒切除3例、相対的非治癒切除1例であった。

予後についてみると、区域切除術の行われた第3例を、対側肺転移によって1年6カ月にて失い、また、第1例は2年7カ月目、在宅のまま死亡しているが、死因は不明であった。他の2例はそれぞれ3年7カ月、1年6カ月現在健在であり、従前通りの日常生活に復している。

表 1 肺門部早期癌

症例	年齢・性	B. I.	発見動機	発生部位	X線所見	細胞診	確定診断	術式 (根治度)	肉眼所見	組織診	予後 (死因)
1	67♂	705	血痰	右-B ²	浸潤影無気肺	扁平上皮癌	気管支擦過	右上葉切除 (治癒切除)	ポリーブ型	中分化扁平上皮癌	2年7カ月死 (不明)
2	53♂	1480	血痰	右-B ⁸	浸潤影無気肺	扁平上皮癌	気管支擦過	右下葉切除 (治癒切除)	ポリーブ型	中分化扁平上皮癌	3年7カ月生
3	73♂	1060	血痰	左-B ⁸	浸潤影	扁平上皮癌	気管支擦過	左S ₆ 区域切除 気管支形成 (相対的非治癒切除)	結節浸潤型	高分化扁平上皮癌	1年6カ月死 (対側肺転移)
4	63♂ Ex-smoker	660	発熱	右-Tr-inf.	索状影浸潤影	腺癌	気管支擦過 検	右中・下葉切除 気管支形成 (治癒切除)	ポリーブ型	高分化腺癌	1年6カ月生

肺門部早期癌のなかでは、比較的稀であると思われる肺門部早期腺癌であった症例4を報告する。

〔症例〕 63歳, 男性, 農業

主訴: 発熱

家族歴, 既往歴: 特記すべきことなし

B.I. 660 (Ex-smoker)

現病歴: 昭和54年末より時に微熱, 悪寒を自覚することあり。右気管支拡張症の診断のもとに抗生物質の投与を受けていたが, 56年に入りこれが頻回になり, 精査を目的に同年3月6日当院に入院した。

入院時, 身長168cm, 体重54kg, 体表にリンパ節を触知せず。心音純, 深呼吸時右前胸部に捻髪音を聴取するも, 他に特記すべき理学的所見を認めず。血液, 生化学的検査に異常所見なし。

胸部X線写真では, 右中下野に, 肺門につながる索状影を伴う淡い浸潤影が認められるが, 明らかに腫瘤を思わせる所見は認められない(写真1)。気管支造影では, 右中幹に略楕円形の陰影欠損を認め, 右B⁴⁺⁵は造影されず, 下幹以下には棍棒状ないし念珠状の拡張性変化を認める(写真2)。気管支鏡検査では, 右主気管支の内腔をほぼ閉塞するがごとき可動性の腫瘤が直視された(写真3)。この腫瘤よりの生検により乳頭状腺癌(写真4), 擦過細胞診では分化型腺癌(写真5)との診断を得た。

3月18日, 右中下葉 sleeve lobectomy を施行した。

切除肺の肉眼的検索では, 腫瘍は右下幹, B⁴⁺⁵入口部直下よりポリープ状に管腔内に突出し, 中枢側に向って増殖しており(写真6), 肺実質には腫瘍浸潤を思わせる変化は認められなかった。写真7は腫瘍の全剖組織標本である。

組織学的には, 気管支壁よりポリープ状に増殖した高分化乳頭状腺癌(写真8)の診断を得た。PAS, Alcian blue 染色では, 円柱状の腫瘍細胞の胞体内に少量の粘液貯溜を認める細胞が散見されるが, 概して粘液産生性に乏しく, 腺房状または導管を思わせる構造は認められず, 気管支上皮に由来する腺癌と思われた。気管支壁への腫瘍浸潤は認められず, 廓清したり

写真 1

写真 2

リンパ節に転移は認められなかった。

術後1年6カ月, 健在である。

以上検索を行った肺門部早期癌4例の組織学的診断は, 3例が高分化ないし中分化扁平上皮癌, 1例が高分化腺癌であり, 術前の細胞学的診断に一致していた。扁平上皮癌2例および腺癌例は, 気管支腔内にポリープ状に増殖し, その茎部は気管支壁の一部に局限しており, 周辺

半沢 尚・他論文付図(1)

写真3

写真4

写真5

写真6

写真7

写真8

半沢 尚・他論文付図(2)

写真9

写真10

写真11

写真12

写真13

気管支上皮の一部には basal hyperplasia が認められるのみであったが、結節浸潤型を示した扁平上皮癌の1例においては、腫瘍組織に連続する部以外の所にも、化生性変化が認められた。

Ⅱ) 肺野末梢部(肺野型)早期癌

当施設において、これまでに経験した肺野末梢部の早期癌は11例である(表2)。性別は、男性は1例のみで、他の10例が女性であった。年齢は46歳から83歳まで広く分布している。喫煙者は症例7の1例のみで、他の10例に喫煙歴はない。発見動機をみると、11例中7例は集団検診によって発見されており呼吸器症状があったのは3例に過ぎない。残りの1例は、他疾患の治療中になら呼吸器症状のないままに発見されている。発生部位は上葉の S¹⁺², S³ の末梢領域に発生したものが7例あり、上葉に多くみられた。胸部X線写真上は、9例が明瞭な腫瘤影を呈しており、1例は末梢領域での浸潤影、残りの1例は淡い雲状影を示していた。

気管支鏡検査が全例に行われているが、内視鏡により腫瘍所見が確認されたのは、扁平上皮癌例1例のみである。TV透視下擦過細胞診により確定診断を得たのは5例、1例が内視鏡検査後の喀痰細胞診により腺癌と診断されているが、残り5例はいずれも、経皮的肺針生検によって腺癌との診断を得ている。

術前、細胞学的には9例が腺癌、1例がカルチノイド、1例が角化扁平上皮癌と診断されている。

10例に肺葉切除術が施行されたが、1例のみ、肺機能上の制約により部分切除術に終り、治癒切除10例、相対的非治癒切除1例となった。最長6年6ヵ月経過例を筆頭に全例の生存をみている。

症例7の概略を供覧する。

〔症例〕 72歳、女性

主訴：血痰

家族歴、既往歴：特記すべきことなし

B.I. 30

現病歴：昭和53年12月頃血痰あり、近医にて異常なしとされ放置していた。54年9月下旬再度血痰あり、胸部X線写真上異常陰影を指摘され、10月17日当院に入院した。

入院時、身長136cm、体重28kg、体表リンパ節触知せず、理学的に胸部に異常所見を認めず。血液、生化学的検査に特記すべき異常所見なし。

胸部X線写真では、右肺門に接するがごとく、右 S^{3b} に 25×20 mm、略円型の淡い腫瘤状陰影が認められた(写真9)。気管支鏡にて、右 B^{3b} に右側壁より膨隆する腫瘍が直視されたが、粘膜表面は内視鏡的には平滑であった

表 2 肺野末梢部早期癌

症例	年齢・性別	B. I.	発見動機	発生部位	X線所見	細胞診	確定診断	術式(根治度)	組織診	予後
1	52♀	0	咳嗽	右-S ³	浸潤影	カルチノイド	気管支擦過	右下葉切除(治癒切除)	カルチノイド	6年6ヵ月生
2	63♀	0	集検	左-S ¹⁺²	腫瘤影	腺癌	気管支擦過	左上葉切除(治癒切除)	中分化腺癌	4年9ヵ月生
3	46♀	0	集検	右-S ³	腫瘤影	腺癌	針生検	右上葉切除(治癒切除)	高分化腺癌(細気管支肺胞型)	4年1ヵ月生
4	61♀	0	集検	右-S ⁴	腫瘤影	腺癌	気管支擦過	右中葉切除(治癒切除)	中分化腺癌	3年8ヵ月生
5	77♀	0	集検	左-S ³	雲状影	腺癌	針生検	左上葉切除(治癒切除)	高分化腺癌(細気管支肺胞型)	3年3ヵ月生
6	59♀	0	集検	右-S ³	腫瘤影	腺癌	針生検	右上・中葉切除(治癒切除)	高分化腺癌	3年1ヵ月生
7	72♀	30	血痰	右-S ³	腫瘤影	扁平上皮癌	気管支擦過	右上葉切除(治癒切除)	中分化扁平上皮癌	2年9ヵ月生
8	61♀	0	集検	右-S ³	腫瘤影	腺癌	針生検	右上葉切除(治癒切除)	中分化腺癌	2年1ヵ月生
9	81♂	0	他疾患	右-S ⁹	腫瘤影	腺癌	針生検	右下葉切除(治癒切除)	中分化腺癌	1年10ヵ月生
10	70♀	0	集検	右-S ³	腫瘤影	腺癌	気管支擦過	右上葉切除(治癒切除)	高分化腺癌(細気管支肺胞型)	1年10ヵ月生
11	83♀	0	咳嗽	右-S ⁶	腫瘤影	腺癌	気管支擦過後喀痰	右 S ⁶ 部分切除(相対的非治癒切除)	高分化腺癌	2ヵ月生

(写真10)。この部よりの擦過細胞診(写真11)と、内視鏡検査施行後の喀痰細胞診により、角化扁平上皮癌の診断を得た。

11月28日、右上葉切除術を施行した。

切除肺を肉眼的に検索すると、腫瘍は右 B³_b 分岐部直下にある、腫瘍の最大径は18mmで、周囲の肺実質とはほぼ明瞭に境されていた(写真12)。

組織学的には、中等度分化型の扁平上皮癌(写真13)であり、所属リンパ節および廓清したリンパ節への転移は認められなかった。

術後2年9カ月現在、健在である。

肺野末梢部早期癌11例の組織学的診断は、カルチノイド1例、中分化扁平上皮癌1例、腺癌が9例であり、術前の細胞学的診断と全て一致していた。腺癌9例は高度ないし中等度に分化した乳頭状腺癌と診断され、そのうち3例は細気管支肺泡型とされたが、残り6例中5例においても、腫瘍の辺縁部には明らかなbronchiolo-alveolar type の増殖形態が認められた。

考 察

肺にあっては、その解剖学的基本構造の複雑さゆえに、早期癌については、中樞側肺門部に発生したものと、肺野末梢部に発生したものとに分けて検討がなされている。

肺門部(肺門型)早期癌については、区域支までの太い気管支に原発した肺癌で、気管支壁内に限局し、リンパ節および遠隔転移のないものであり、その組織型の如何を問わないとする池田⁹⁾による定義が広く用いられているが、肺野末梢部(肺野型)のものについては、組織型による予後の相違などから、研究者によって異なった定義が用いられる場合があり、統一されたものはない。今回、われわれの検索にあたっては、於保ら⁵⁾にならい、解剖学的に亜区域支より末梢に原発した肺癌で、腫瘍の最大径が20mmを超えず、組織学的に胸膜浸潤、リンパ節転移なく、かつ遠隔転移の認められぬものと定義した。われわれの施設において、これらの定義を満足する肺門部早期癌は4例、肺野末梢部早期癌は11例であった。それぞれは、これまでの当施設における肺癌全症例の1.2%、3.3%に

相当する。

早期肺癌の報告例は少なくない。血痰などの自覚症があっても、X線写真上明確に異常所見を確認し難い場合の多い肺門部早期癌でも、昭和54年までに101例が集計されており⁶⁾(本稿の自験例のうち2例が含まれる)、肺野型早期癌はさらに多数が報告されている³⁾⁷⁾⁸⁾。

今回、われわれが検討した肺門部早期癌の臨床的背景は、これまでの報告例⁶⁾⁷⁾とほぼ一致している。すなわち、肺門部早期癌は男性に多いとされているが、自験例は全例男性で、年齢分布は、いわゆる肺癌年齢に一致し、50歳代から70歳代であり、喫煙歴に関しては、いずれもB.I. 660以上の重喫煙者であり、中樞発生肺癌と喫煙との因果関係を示唆するものであった。発見動機については、無症状のものはなく、4例中3例に血痰が認められた。呼吸器症状のなかでも血痰の重要性については、Moerschら⁹⁾沢村ら¹⁰⁾の多くの研究者による指摘があり、血痰を主訴とする入院患者のうち、3.1%¹¹⁾ないし34.2%¹²⁾の基礎疾患が肺癌であったと報告されている。当施設においても、血痰を訴えた患者224名のうち50名、22.3%が肺癌であった¹³⁾。このうち既述したごとく、4名が根治的治療が可能と思われる早期癌と確認されたものであり、持続的な乾性咳嗽とともに、血痰は肺癌を追究するうえで最も重要な症状であることに異論はない。

肺門部早期癌の胸部X線所見については、自験例のなかには、無所見とされた例はないが、前里ら⁶⁾の集計によると、胸部X線写真正常の例が増加しつつあるという。細胞診を用いた喀痰検診や、なんらかの呼吸器症状が発現した場合の、積極的な内視鏡検査が、これまで看過されていたきわめて早期の症例をも検出するようになったからであろう。

自験肺門部早期癌4例のうち1例は、気管支上皮に由来すると思われる腺癌であった。肺門部における早期腺癌は、本邦においても於保ら¹⁴⁾、香月ら¹⁵⁾によって報告されているが、前里ら⁶⁾は、これらの症例も含めて101例中3例であったと報告しており、検索性数は扁平上皮癌に較べて少ない。肺門部早期扁平上皮癌の組織発生、増殖進展様式、肉眼的所見分類および予後

などに関しては、下里ら¹⁶⁾による詳細な記載があるが、肺門部早期腺癌に関しては、その発生母地、増殖形式などについてなお未解決な点があると思われる。本報告例は、鍋島ら¹⁷⁾の報告例に類似するものと思われるが、管腔内をポリープ状に中枢側に向って増殖する肉眼的形態は稀であると思われる。その組織発生、増殖進展様式などについても、さらに多数の早期例による詳細な検討が期待される。

全身状態と肺機能上の制約により、症例3には、気管支楔状切除と区域切除術が行われた。気管支断端に癌浸潤はなかったものの、相対的非治癒切除に終り、1年6ヵ月後対側肺転移により失っている。予後の観点からは、現在当施設においては、主として進行癌における中枢側気管支の閉塞性変化の改善を目的に施行している、YAG laser による、いわゆる endoscopic surgery の適応であったかとも思われる。

今回検討の対象となった、自験肺野末梢部早期癌11例について、その性比をみると、先の肺門部早期癌とは対照的に、男女比は1対10と女性が多かった。井内ら¹⁸⁾、吉田ら⁸⁾は、自験肺野型早期癌例の分析のなかで、男女比はそれぞれ15対8、26対14で男性に多いとしているが、われわれの症例では、於保ら³⁾の報告した傾向に近似している。年齢は70歳以上が5例、最高年齢は83歳で、肺門部早期癌例に比較して高齢者により高頻度にみられている。喫煙歴、発見動機は組織型とともに、肺門部早期癌とは著しい対照を示している。すなわち、喫煙歴のあるものは1例のみで、しかも喫煙係数はわずか30であり、病因論的な意義はないと思われる。発見動機は、11例中7例が集団検診で異常陰影を指摘されており、また1例は白内障治療中に胸部異常陰影を指摘されたもので、呼吸器症状は自覚されず、本来は集団検診によって発見されるべき性質のものであった。

この11例の術前診断は、全て細胞診によって得られている。経気管支的検索により診断の得られたのは5例であるが、一方経皮的肺針生検によって診断されたものが5例あり、末梢領域における小病巣に対する本法の有用性が示唆された。経皮的肺針生検ないし肺穿刺を routine に行う場合、気胸、血胸、腫瘍播種などの合併

症¹⁹⁾をきたす可能性はなしとしないが、より早期の治療に結びつき得る診断上の手法として有意義であると考ええる。

組織学的には、血痰をみた1例が中分化扁平上皮癌、咳嗽を訴えた1例がカルチノイド、他の9例が高度ないし中等度に分化した乳頭状腺癌と診断された。乳頭状腺癌9例中8例には、程度の差こそあれ bronchiolo-alveolar type の増殖形態が認められている。末梢領域における肺癌の組織発生と、増殖の初期段階におけるこの組織形態が如何なる意義を有するかは、なお症例を重ねたうえでの検討が必要であろう。

いずれにしても、肺末梢部における早期癌では、腺癌がより高頻度にみられたことは、諸家の報告に一致している。

本報告における早期肺癌15例のうち、2例には、高齢にもとづく全身状態ないし心肺機能上の制約より、それぞれ区域切除、部分切除が行われている。縮小手術は、区域切除あるいは部分切除による小範囲切除術であり、的確な合併療法を選択しつつ、その根治性とともにより予後をも期待しようとするもので、肺機能が限界線上にある高齢者が主たる適応となる。この術式は根治度、予後などに照らして問題ありとされ、種々の論議がなされてきたが、井上ら²⁰⁾による本邦における集計によれば、縮小手術施行例全例の実測5年生存率は19.9%で、肺葉切除に比較して著しく劣るものではない。さらに治療手術と考えられた例の5年生存率は44.3%であったと報告している。Bennett ら²¹⁾、Jensik²²⁾による比較的多数の症例による検討においても、その成績は肺葉切除に較べて劣るものではない。適応症例の多くが末梢発生腺癌であるため、局所再発、早期のリンパ節転移を如何に防止するかが問題となるが、早期癌例にあっては十分根治性を期待し得るものと考ええる。

当施設においては、昭和56年12月までに入院治療を受けた全肺癌例307例中、集団検診によって発見されたものは、X線検診によるもの63例、喀痰検診によるもの2例で、後者には明らかに早期癌と断定し得る例はなかったものの、その予後は明らかに良好であった²³⁾。本稿において報告したごとく、このなかには肺野型早期癌7例が含まれていた。末梢発生肺癌の早期発

見に, X線検診が有効であることは言をまたないが, 中枢発生例を早期に検出するには, 目下のところ, 喀痰細胞診を用いた定期的検査による検出以外に方法がない。概して予後が不良とされている中心型肺癌の, 早期発見, 早期治療による予後の改善が, 肺癌全体の予後の向上に貢献するところは大きい。X線検診とともに, 喀痰細胞診を用いた肺癌検診システムの充実が望まれる。

結 語

自験早期肺癌15例について, 臨床的な背景とともに組織型の分布などについても検討を加え, 2症例の概略を供覧した。早期癌に対する縮小手術の有意性についても考察を加え, 肺癌の早期発見の為の集団検診の意義を強調した。

文 献

- 1) 厚生統計協会: 昭和56年における人口動態統計の概況(年間推計), 厚生指標, 29: 44, 1982.
- 2) 青木国雄・他: 今後のわが国の肺がんについて, 総合臨床, 31: 1763-1768, 1972.
- 3) 於保健吉・他: 早期肺癌, 手術, 35: 625-633, 1981.
- 4) 池田茂人: 肺門部早期肺癌について, 肺門部早期肺癌図譜, 医学書院, 東京, pp. 2-3, 1976.
- 5) 於保健吉・他: 集検と早期肺癌, 臨床成人病, 3: 335-339, 1973.
- 6) 前里和夫・他: 肺門部早期肺癌の1治療例一本邦報告101例の文献的考察一, 日胸, 40: 577-582, 1981.
- 7) 池田茂人: 早期肺癌, 診断と治療, 68: 254-260, 1980.
- 8) 吉田猛郎・他: 肺野型早期肺癌の臨床病理学的検討, 肺癌, 22: 346, 1982.
- 9) Moersch, H.J. et al.: Clinical significance of hemoptysis. J.A.M.A., 148: 1461-1465, 1952.
- 10) 沢村猷児・他: 「血痰外来」からみた肺癌, 日胸 35: 343-347, 1976.
- 11) 本間日臣: 血痰, 咯血, 日本医事新報, 2429: 3-10, 1970.
- 12) 西本幸男・他: 咳痰咯血(血痰), 臨床と研究, 54: 1-5, 1977.
- 13) 半沢偽: 血痰の臨床, 第3回東海せきとたん研究会講演, 1982.
- 14) 於保健吉・他: 早期肺門型肺癌の臨床と病態, 臨床科学, 13: 1215-1225, 1977.
- 15) 香月秀雄・他: 早期肺癌の診断, 外科診療, 18: 1135-1143, 1976.
- 16) 下里幸雄・他: 肺門部早期扁平上皮癌の進展の様相, 臨床放射線, 21: 987-998, 1976.
- 17) 鍋島秀雄・他: 中枢側気管支に発生し管内性にポリープ状発育を示す肺乳頭状膀胱癌の3例, 肺癌, 21: 199-206, 1981.
- 18) 井内敬二・他: 早期肺癌53例の分析, 肺癌, 22: 243, 1982.
- 19) 市場正敏・他: 肺癌 Needle biopsy 後の胸壁播種の1例, 肺癌, 15: 337-342, 1975.
- 20) 井上権治・他: 第19回日本肺癌学会総会シンポジウムに関する全国アンケートのまとめ, 肺癌, 19: 1-9, 1979.
- 21) Bennett, W.F. et al.: Segmental resection for bronchogenic carcinoma: A surgical alternative for the compromised patient. Ann. Thorac. Surg., 27: 169-172, 1979.
- 22) Jensik, R.J.: Limited surgical resection in the treatment of lung cancer, 肺癌, Suppl.: 1-4, 1978.
- 23) 半沢偽・他: 集検発見肺癌例の臨床的検討, 日胸, 41: 589-596, 1982.

別刷請求: 〒432 浜松市富塚町328

県西部浜松医療センター胸部外科

半沢 偽