●睡眠時無呼吸症候群

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療

戸川 清, 宮崎 総一郎
山川 浩治

Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Kiyoshi Togawa, M.D., Soichiro Miyazaki, M.D., and Koji Yamakawa, M.D.
Department of Otorhinolaryngology, Akita University School of Medicine, Akita

Satisfactory results in the treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) depend on precise diagnosis of the site and the severity of obstruction and application of the proper treatment. History-taking including sleep behavior, local and general physical examinations, X-ray examination, fluoroscopy, fiberoptic, polysomnography give us very useful informations for this decision. Among these, polysomnography is the most useful.

OSAS is treated conservatively or operatively as indicated case to case. Among the conservative treatments, body weight reduction with hypocaloric diet is essential in the obese. Nasal CPAP is widely used and known to be effective, however, its long-lasting use is problematic. Medications of antibiotics and antiallergics are useful for reduction of mucosal swelling caused by inflammatory and allergic reactions. Application of a dental prosthesis protruding the mandible is effective. Among the surgical treatments adenotonsillectomy is mainly performed on the infants and children with OSAS. If OSAS is created by intranasal pathologies, intranasal surgeries of various types are applied. When the causative region exists in the palato-pharynx, UPPP is very effective. Tracheostomy gives an instant relief on heavy obstructive dyspnea. If we encounter such heavily disturbed cases, we should not hesitate to do tracheostomy.

Key words : obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), adenotonsillectomy,
uvulopalatopharyngoplasty (UPPP), polysomnography, nasal CPAP

I. はじめに

睡眠時無呼吸症候群¹⁾の患者を治療する場合は、本症の原因、程度の適確な診断が必須の前

提であり、それに応じた治療法が選択されなければ期待する効果は得られない。

睡眠中の無呼吸状態は換気流（経口と経鼻）と呼吸運動（胸部と腹部）の有無から閉塞型、中枢型、混合型に分類される²⁾。三者の比率は閉塞型が大多数を占めるし、閉塞型は治療効果が明らかな例が多い。

秋田大学医学部耳鼻咽喉科学教室
別刷請求：〒010 秋田県秋田市本道1-1-1
秋田大学医学部耳鼻咽喉科学教室
戸川 清

投稿受付：1989年6月23日

II. 閉塞型睡眠時無呼吸症の原因と診断

1. 狭窄原因疾患

睡眠時呼吸障害の原因は多様(表1)である³⁾。そのうち閉塞性障害の主要原因は、乳幼児は咽頭扁桃アデノイド増殖症(略してアデノイド)、口蓋扁桃高度肥大で、その他鼻疾患による両側鼻閉例、小顎症、巨舌症、舌根嚢胞がみられる。成人は鼻副鼻腔の閉塞性疾患、軟口蓋、特に後口蓋弓や口蓋垂の位置・形態異常、口蓋扁桃や舌扁桃の高度肥大、下顎骨形態異常など

表1 睡眠時呼吸障害の原因

1. 閉塞性呼吸障害

1) 鼻・副鼻腔疾患

外鼻孔狭窄、鼻中隔彎曲症、アレルギー性鼻炎、肥厚性鼻炎、副鼻腔炎、鼻茸、鼻腔悪性腫瘍

2) 上咽頭疾患

後鼻孔閉鎖、Tornwaldt病、アデノイド増殖症、咽頭扁桃炎、上咽頭腫瘍

3) 中咽頭疾患

軟口蓋形態異常、咽頭筋麻痺、口蓋扁桃肥大症、舌扁桃肥大症、咽後膿瘍、中咽頭腫瘍

4) 下咽頭・喉頭疾患

喉頭蓋奇形、喉頭軟化症、喉頭蓋浮腫、喉頭蓋嚢胞、喉頭蓋腫瘍、下咽頭腫瘍

5) 顎・口腔疾患

小顎症(単独、Pierre Robin)、巨舌症(浮腫、血管腫、リンパ管腫)、下顎骨形態異常、下顎関節拘縮

6) 頸椎疾患

脊柱彎曲症・硬直症、変形性脊椎症

7) 神経疾患

両側反回神経麻痺、球麻痺、Shy-Drager症候群(神経系変性)

8) その他の異常

肥満(単純、二次的)、末端肥大症、甲状腺機能低下症

2. 非閉塞性呼吸障害

1) 中枢神経性

脳幹部出血・梗塞・変性・腫瘍、脳炎、頸髄障害(灰白炎、変性、外傷)

2) 原発性肺胞低換気症(Ondine's curse)

3) 気管支・肺性

慢性閉塞性肺疾患

がある。肥満の合併はすべての原因について障害の程度を増強する。これらの原因の1つによってのみ障害がおこるとは限らず、複数原因併存例も少なくない。個々の原因の程度は比較的軽くても、複数原因によって障害を増強させるから、障害原因とその程度の診断が正しい治療の前提となる⁴⁾。

2. 狭窄部位と程度の診断

1) 病状聴取: 患者の睡眠状況(目覚めと熟睡感、睡眠中途覚醒、異常行動)、睡眠時の呼吸状況(周期性か一様性、呼吸停止の頻動と持続時間、いびき音の性状、胸・腹部の呼吸性運動状況)、日中活動状況(傾眠、頭重感、注意散漫、薬剤常用など)

2) 局所・全身所見: 上気道各部位の視・触診、内視鏡検査、X線検査(咽頭部側面、立位と仰臥位、透視記録)、肥満度、顔貌、胸郭形態から狭窄の部位、程度を推定する。

3) 睡眠ポリグラフ検査 polysomnography: 自然睡眠状態で脳波(EEG)、眼球運動(EOG)、オトガイ筋EMG、心電図(ECG)、動脈血酸素飽和度(SaO₂)、経皮PO₂とPCO₂、呼気O₂とCO₂濃度、食道内圧、呼吸曲線(鼻孔、口囲、胸・腹部)、換気量、呼吸数、心搏数、いびき音などを連続記録・解析して睡眠障害、睡眠中の呼吸障害、循環器への影響の程度を総合判定する。

われわれは呼吸障害判定基準を食道内圧値におき、呼吸性変動幅が16~20 cmH₂Oを軽度、21~40 cmH₂Oを中等度、40 cmH₂O以上を重度呼吸障害とし、これにSaO₂低下度(80%以下)、その他を加味して治療方針を決めている(表2)。

表2 睡眠時呼吸障害の指標

1. 食道内圧
2. 動脈酸素飽和度
3. 動脈酸素・二酸化炭素分圧
4. 一回換気量
5. Apnea Index
6. 睡眠段階の変化、睡眠構築の変化
7. MSLT(Multiple Sleep Latency Test)
8. RR間隔
9. その他(血圧、イビキ音、筋電図など)

III. 閉塞性睡眠時無呼吸症の治療

本症の治療は、閉塞原因の種類、程度に応じて保存療法や手術療法の単独または組み合わせが適宜選択される(表3)。

1. 保存療法

1) 薬物療法：上気道粘膜の炎症性腫脹による狭窄に対して、抗生物質や非ステロイド抗炎症剤の全身投与や局所使用(ネブライザー療法、点鼻使用)が奏効する。特に乳幼児の急性鼻・咽頭炎や急性咽頭扁桃炎による呼吸障害例に有効ことが多い。鼻アレルギーに対しては、抗アレルギー剤の局所および全身投与をすることで睡眠時呼吸障害が改善されることも経験する。慢性炎症を伴う軽度障害例に漢方薬投与も試みられている。利尿剤アセタゾラミド(ダイアモックス)も用いられるが、閉塞型無呼吸症にはあまり有効ではない。抗うつ剤や精神安定剤は、閉塞型障害には時に増悪させることもあり、使用は慎重を要する。

2) 体重減少：肥満者に低カロリー食、生活指導、カウンセリングなどによって減量をはか

る。減量に成功すればその効果は大きい、体重の再増加を防ぐには本人や周囲の人々の長期間の努力が必要である。

3) 経鼻持続陽圧送気法 nasal CPAP (continuous positive airway pressure)：中等度以上の閉塞性障害例には保存療法の中では最も有効な方法であり⁵⁾、欧米諸国では普及している。われわれも睡眠ポリグラフ検査中に経鼻陽圧付加をすると食道内圧変動幅は減少し、呼吸も変動型から規則性になり、血液ガス組成の改善を観察している(図1)。しかし本法は、軟口蓋下垂や咽頭粘膜過剰ひだ形成例には著効を示すが、舌根沈下、扁桃高度肥大例ではその効果はさほどでない(表4の症例7, 8)。またたとえ非常に有効であっても、連夜の鼻マスク装着はわずらわしいようで、中等度の狭窄例では長続きがしないという。わが国では現在市販の携帯用装置は1種輸入されているが、近い将来複数が出るであろう。国産品はまだない。

4) 下顎プロテーゼ (Esmarch)：下顎を3~5 mm 前方移動した位置で、上下歯列が咬合するように作ったプロテーゼを装置することにより、睡眠による下顎沈下を防ぎ、睡眠時呼吸状態の改善を睡眠ポリグラフで証明した報告がある⁶⁾。本法は nasal CPAP より患者の負担は軽いようであるが、下顎の前進距離が大きいと顎関節に負担になる。睡眠時呼吸障害の程度が強くなければ、下顎帯の外部装着も有効である。

5) 経鼻挿管：乳幼児の中・下咽頭狭窄例に有効であるが、成長による気道断面積増大を保つには長期にすぎるとし、管理も面倒である。

6) 音響誘発皮膚・筋刺激装置：いびき音に反応して電気刺激が生じて覚醒反応(筋緊張回復)をおこして上気道を広げ、いびきの軽減をはかる器機と、無呼吸を検出してオトガイ部電極でオトガイ舌筋を刺激する器械とがある。理論は面白いが、患者の体動で電極がはずれることがあり、問題が残っている。

2. 手術療法

前述の保存療法で期待した効果が得られず、睡眠時の呼吸障害が強い場合や、患者が希望した場合には、原因狭窄部を確認の上でそれに応じた手術方法が施行される。

1) 鼻閉が主因ならば、その病因に応じて鼻

表3 睡眠時呼吸障害の治療

1. 保存療法

- 1) 上気道疾患(特に感染)に対する抗炎症療法、全身投与、局所治療
- 2) 全身性疾患に対する薬物療法
- 3) 減量療法(食事療法、その他)
- 4) 経鼻持続陽圧療法 nasal CPAP
- 5) 生活指導(節酒、規則性日課、運動など)
- 6) 精神心理的カウンセリング
- 7) 体力調節(斜位、側位)、下顎帯使用
- 8) 音誘発皮膚刺激装置

2. 手術療法

- 1) 鼻腔整復術(鼻中隔矯正+鼻甲介手術)
- 2) 鼻内副鼻腔手術、鼻茸切除術
- 3) アデノイド切除術
- 4) 口蓋扁桃摘出術
- 5) 口蓋弓形成術(uvulopalatopharyngoplasty)
- 6) 舌扁桃切除術、舌根正中部分切除術
- 7) 喉頭蓋部分切除術
- 8) 舌骨前方牽引固定
- 9) 下顎骨切離・前方移動
- 10) 気管切開術

図1 Polysomnographic effect of CPAP on OSA

表4 Effect of CPAP

Case	Age/Sex	Causes of obstruction	Grade of OSA	Minimum effective CPAP	Change in P. esoph.	Change in SaO ₂	Apnea index	Effect of CPAP
1 S.E.	59 M	Palatoptosis	marked	6~9cmH ₂ O	50 → 10 ~80 → ~20	78 → 93 ~97 → ~97	55.9 → 0	definite
2 K.I.	68 M	Palatoptosis Obesity	marked	8~12	40 → 10 ~60 → ~15	56 → 70 ~75 → ~74	43.2 → 0	definite
3 T.N.	41 M	Palatoptosis Obesity	marked	7~11	40 → 4 ~60 → ~8	46 → 75 ~65 → ~80	10.6 → 0	definite
4 U.A.	56 M	Palatoptosis Obesity	moderate	4~8	20 → 4 ~40 → ~8	75 → 90 ~96 → ~98	8.7 → 0	definite
5 S.M.	37 M	Palatoptosis Obesity	marked	6~9	40 → 4 ~60 → ~8	82 → 94 ~96 → ~98	1.0 → 0	definite
6 F.S.	51 F	Palatoptosis Obesity	marked	3~6	20 → 4 ~30 → ~8	42 → 86 ~98 → ~98	0 → 0	definite
7 S.F.	54 M	Stenosis at root of tongue	marked	15~	20 → × ~40 → ~	60 → 48 ~80 → ~60	27.8 → ×	slight
8 K.U.	24 M	Tonsillar hypertrophy	marked	15~	60 → 60 ~80 → ~80	26 → 20 ~97 → ~80	52.1 → 52.7	no change

腔整復術(鼻中隔矯正術+鼻甲介手術), 鼻内副鼻腔手術を選択施行する。

2) 幼小児鼻閉の主要原因の一つであるアデノイド増殖症には, アデノイド切除を行う⁹⁾。原因が口蓋扁桃高度肥大ならば扁桃摘出術を行う。われわれが施行したほぼ全例に自他覚所見の著しい改善が得られた⁸⁾。

図2はアデノイド増殖症による高度の睡眠時無呼吸を呈した7歳男児の術前と術後の睡眠経過の比較図である。術前には入眠時の睡眠深化が妨げられて浅眠状態で経過し, 睡眠時間が延長している。無呼吸は頻繁に発生し, 食道内圧変動幅は30~40 cmH₂Oに達している。術後は正常の睡眠パターンに復し, 初期に深睡眠期に到達し, 中途覚醒はみられない。無呼吸は激減し, 主にREM期に数回みられた。食道内圧変動も10 cmH₂O前後と正常範囲内で, かつ一定と

なった。

3) 軟口蓋, 特に後口蓋弓下垂や過長口蓋垂が主因であれば, 咽頭形成術 uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) を行う。本法の原型は1960年代に池松⁹⁾, 1970年代 Quesada などにより行われていたが, Fujita ら(1981)¹⁰⁾ の詳細な術式発表を契機に世界的に広まった。これは polysomnography による睡眠研究の著しい発展と機を一にしている。現在は種々の変法が発表されている。

われわれは, 扁桃摘出後に口蓋垂の両側に垂直切開を前口蓋弓頂の1 cm 上まで加え, その頂点から下・側方へ弧状に粘膜を切離し, 前面は前口蓋弓の曲面に合わせる。後面は後口蓋弓を下・後方へ切離を進め, 扁桃床創面に達したら後口蓋弓を前方に牽引し, 楽に扁桃床をおおい前口蓋弓と合う線で下方へ切り進む。扁桃床

図2 アデノイド増殖による高度鼻呼吸障害例の術前術後の睡眠経過図

下端の高さで後口蓋弓に水平の割を入れて、後口蓋弓を前口蓋弓と筋ごと縫合する。最後に口蓋垂を上極から1~1.5 cm 残して切断・縫合する(図3)¹¹⁾。手術効果は少数の例外を除いて満足のゆくものであった。術前後の検査一式が揃った例の比較で分かる。効果不十分な原因は、肥満者や軟口蓋以外に下顎後位や舌根~下咽頭の異常合併などによった。術後合併症は短期間液体の鼻への逆流が10%あったほか、咽頭刺激感・異物感、味覚異常がみられた。

4) 舌根部に原因があれば、舌扁桃切除術や舌根部分切除術(藤田)¹²⁾を行う。著者はまだ経験していないが、本法の適応となる例がわれわれのUPPP 施行例の中にいるから、今後追試の

図3 咽頭(口蓋垂・口蓋・咽頭)形成術(UPPP)
①形通り扁桃摘を行う。uvula 側縁から上方へ正中線と平行に粘膜切開をおき、②前口蓋弓頂点より1 cm 位上まで達したら側・下方へ弧状に切開を進める。③扁桃床創面に達したら、そのまま下へ切り進み、扁桃床下端の高さで後口蓋弓を横切し、それで扁桃床創面を覆い、自由縁を前口蓋弓と縫合する。三角窩付近横切の際、血管に注意する。④口蓋弓の縫合が終わったら、口蓋垂先端に糸をかけておき、均衡を保ちつつ切開予定線の色づけする。⑤口蓋弓上縁から1 cm 位、離れた部分で切断する。⑥できた創面を対称的に縫合する。

予定である。

5) 喉頭縁に原因があれば、喉頭蓋部分切除術や披裂喉頭蓋ひだの部分の切除(レーザー法)が行われる。

6) 下顎後位や小顎症に対しては、下顎骨切断・前方移動術が報告されているが¹³⁾、侵襲が大きいわりに長期成績は良いとはいえないようだ。

7) 気管切開術は閉塞性睡眠時無呼吸症、特にその原因が下咽頭、喉頭にある場合の最も有効な手段である。欧米では経鼻 CPAP や低カロリー食事療法などが無効な例に適応されている。こうした症例は高度肥満が多いので、気管口永続確保、特に前頸皮膚のたるみで気管口が開塞されないように種々の工夫がなされている¹⁴⁾。われわれは Pickwick 症候群の3例に気管切開術をUPPP と併施し、高度の心陰影拡大が数か月以内に著しく縮小したものを経験している(図4)。

気管切開術は肥満者や短頸者に対するUPPP 施行の際にも行い、術後(抜管後)の呼吸障害を予防する。

原因が複数ある症例には二、三の術式が併施されることがある。すなわち適応を誤れば、手術をしても良い効果が得られないのは当然である。またどの手術を行っても術後の正しい管理と経過観察が大切である。

IV. おわりに

睡眠時無呼吸症候群のうち、閉塞性呼吸障害に対する治療法の種類を保存療法と手術療法に大別し、個々の方法やその適応、治療効果、問題点などを述べた。またこれらの治療効果の客観的判定法として polysomnography が有用であることを例示した。

本症は睡眠自体に対してはもとより、呼吸機能、循環機能、精神機能に悪影響を及ぼし、高度の障害が持続すると胸郭変形、高血圧、心不全や突然死の原因ともなるので、本症の疑いがあれば積極的に局所および全身的検索を進め、その原因部位、気道狭窄の程度を正確に診断し、それに応じた適切な治療を行う必要がある。

図4 Pickwick 症候群(14歳, 男)に対する治療(気管切開+咽頭形成術)の効果

〔左図〕 身長164 cm, 体重106 kg, 肺性心。

〔右図〕 術後70日, 体重80 kg, 心所見改善。

文 献

- 1) Guilleminault, C., et al.: The sleep apnea syndromes. *Annu. Rev. Med.*, 27: 465-484, 1976.
- 2) Gastaut, H., et al.: Polygraphic study of the episodic diurnal and nocturnal (hypnic and respiratory) manifestations of the Pickwick syndrome. *Brain Res.*, 2: 167-186, 1966.
- 3) a) 戸川 清: いびき. *耳喉*, 46: 685-690, 1974.
b) 同: 睡眠障害の原因としての耳鼻咽喉科領域疾患. *呼と循*, 37: 17-20, 1989.
- 4) Togawa, K., Miyazaki, S., Yamakawa, K., et al.: Obstructive sleep dyspnea—diagnosis and treatment—. *Acta Otolaryngol., Suppl.*, 458: 167-173, 1988.
- 5) Sullivan, C.E., et al.: Reversal of obstructive sleep apnea by continuous positive airway pressure applied through the nares. *Lancet*, 1: 862-865, 1981.
- 6) Kloß, W., Meier-Ewert, K., and Schäfer, H.: Zur Therapie des obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syndroms. *Fortschr. Neurol. Psychiat.*, 54: 267-271, 1986.
- 7) 今野昭義, 戸川 清: 乳幼児における咽頭扁桃, 口蓋扁桃肥大と睡眠中の上気道狭窄について. *耳喉*, 49: 7-15, 1977.
- 8) 宮崎総一郎・他: 小児のアデノイド・口蓋扁桃肥大による睡眠時呼吸障害と手術治療. *臨床脳波*, 29: 732-738, 1987.
- 9) 池松武之亮: いびきの研究第4報. いびきの一治療法. *日耳鼻*, 64: 434, 1961.
- 10) Fujita, S., et al.: Surgical correction of anatomic abnormalities in obstructive sleep apnea syndrome: uvulopalatopharyngoplasty. *Otolaryngol. Head Neck Surg.*, 89: 923-934, 1981.
- 11) 戸川 清: いびきの治療. *図説耳鼻咽喉科講座-3. 鼻副鼻腔疾患*(本多芳男他編集), pp.246-247, メジカルビュー社, 東京, 1984.
- 12) Fujita, S., et al.: Midline later glossectomy as treatment for obstructive sleep apnea syndrome. (submitted)
- 13) Wittig, R., et al.: Mandibular advancement as a treatment of sleep apnea syndrome. *Sleep Res.*, 12: 296, 1983.
- 14) Fujita, S., et al.: Permanent tracheostomy with advancement of skin flaps, indication, technique and results. Poster presentation, Annual Meeting AAO & HNS, 1982.