米麴の褐変に関する研究(第2報)

褐変前駆物質の検索

大場俊輝・水頭幸太郎・村上英也・原 昌道・高橋利郎・加藤明彦

(国税庁醸造試験所)

昭和 44 年 12 月 11 日受理

米麴を蒸留水に浸漬し濾過した場合、その麴米残渣の褐変度と濾液の着色度との間に高い相関($r=0.6462^{**}$, $n=22$)があり、米麴の褐変前駆物質は濾液にも一部溶けこむことを知ったので、濾液中の褐変前駆物質を検索し、次の結果を得た。

1. アルミナクロマトグラフィーにおいて、褐変前駆物質は酢酸溶出区分に溶出され、この区分を減圧濃縮し薄層クロマトグラフィーを行なった結果、褐変性麴のみに存在し褐変しない麴には存在しない三種のスポットを認めた。

2. そのうちデンストメーターによるスポットの濃度比から $R_f 0.47$ のスポットが褐変前駆物質の主力をなし、このものは Dowex 50-X 8 陽イオン交換樹脂に吸着され、1 N 塩酸で溶出されることを認めた。

3. $R_f 0.47$ のスポットの物質は、アミノ酸アナライザークロマトグラフィーにおける溶出ピークの位置および紫外外部吸収曲線の形などより、DL-DOPA (3,4-dihydroxyphenylalanine) に極めて類似している物質であることを確認した。

緒 言

麴の褐変度と麴浸出濾液の着色度との関係については、秋山ら¹⁾が麴浸出液の着色するものは麴米残渣も必ず褐変してくると報告し、村上ら²⁾はこのような褐変性麴を用いて醸造した場合、酒母、もろみおよび清酒の色が濃く、酒粕もまた褐変すると報告している。今回筆者らも麴浸出濾液の着色度と麴米残渣の褐変度との間に高い相関があることを確認した。したがって麴の褐変前駆物質は麴浸漬液にも一部分溶けこむことを知った。

E. R. MILLER³⁾は velvet bean の水浸出液が赤色を帯び、空気にさらすと褐変し最後に黒くなることを認め、この液から DOPA を分離同定しているが、褐変性麴を蒸留水に浸漬した場合濾液にもこのような現象を呈することから、褐変性麴の濾液中にもこのような前駆物質が存在するのではないかと考え、非常によく褐変する麴と全く褐変しない麴を用い、D. GLICK⁴⁾のカテコールアミンの分離、T. NAGATSU ら⁵⁾が tyrosine と DOPA の分離に用いた活性アルミナ吸着法、T. NAGATSU⁵⁾、H. TAKAHASHI ら⁶⁾の方法による Dowex 50-X 8 陽イオン

交換樹脂クロマトグラフィーならびに薄層クロマトグラフィーを行ない米麴浸漬濾液中の褐変前駆物質を検索した。本報ではこの結果について報告する。

実 験 方 法

1. 麴

麴は村上ら⁷⁾の方法により、白米(精米歩合 75%)を水洗、浸漬、水切の後蒸し、蒸米(白米相当量 10 g)を 100 ml 容三角フラスコに採り、殺菌のため再び蒸して 10 lbs に至ってから直ちに蒸気を止め、放冷後斜面培養より麴菌菌体(0.5 g 位)を採り接種し、よく攪拌後 34°C の恒温器に入れ、引込後 20 時間目一度攪拌し、40 時間目に出麴した。実験操作を容易にするために α 米もしばしば使用した。すなわち、 α 麴は原ら⁸⁾の方法により、 α 米 20 g を 200 ml 容三角フラスコに入れ、種麴を均一に懸濁させた製麴水(0.02 M, K_2HPO_4 - KH_2PO_4 緩衝液 pH 6.5, 0.02% NH_4NO_3) 5 ml を加えた。すなわち、吸水歩合 25% である。攪拌後 34°C の恒温器に入れ、引込後 20 時間目で一度攪拌し、40 時間目に出麴した。

2. 使用菌株

醸造試験所保存菌株を使用した。RIB 128⁹⁾ は米麴を強く褐変する菌株、RIB 647¹⁰⁾ は米麴を褐変しない菌株で、いずれも市販もやしから分離した *Asp. oryzae* である。

3. 米麴の褐変度の判定と着色度

第1報¹¹⁾に従い、出麴（白米 10 g に相当）に 50 ml の蒸留水を加え、時々攪拌し、1 時間室温で浸出し、濾紙にて濾過する。濾紙上の麴残渣をそのまま室温に 1 日放置した後その褐変の程度を観察する。全く白色のものから、褐変～黒色の濃さにしたが 1～6 に数値化した。着色度は濾過後 9 時間後に日立 101 型スペクトロホトメーターを用いて、OD₄₃₀¹²⁾ を測定した。

4. 米麴浸漬液の着色度の経時的変化

α 麴（ α 米 100 g に相当）を 500 ml の蒸留水に浸漬し、経時的にミリポアーフィルターで濾過した濾液の着色度を測定した。浸漬温度は室温ならびに 40°C、測定時間は 0～10 時間である。

5. 米麴浸漬液の着色度におよぼす pH の影響

α 麴（ α 米 100 g に相当）を 500 ml の蒸留水に浸漬し、40°C、3 時間保持後、濾液の pH を変えて着色度の変化を測定した。pH の調整には、濾液 50 ml に少量の 0.5 N 塩酸、1 N カセイソーダを加えて行なった。着色度は日立 101 型スペクトロホトメーターを用いて測定した。

6. アルミナ吸着法による褐変前駆物質の分離

褐変前駆物質を麴から分離する方法は D. GLICK⁴⁾ のカテコールアミン類の分離に用いられる方法に従った。

Method

ARNOW's reaction Positive on compounds having
2 or 3 phenolic OH groups

Procedure	
1) sample (effluence)	2ml
2) 0.5N HCl	1ml
3) Nitrate-molybdate reagent	1ml
4) 1N NaOH	2ml
5) OD ₄₃₀ ¹²⁾ absorption	

Fig. 1 Separation of precursor of browning substances from rice-koji by alumina.

方法は Fig. 1 に示す。発色方法は ARNOW¹²⁾ の方法により行なった。ARNOW の反応は多価フェノールに特有な呈色（赤色）を示す。

7. 酸性活性アルミナカラムクロマトグラフィー

α 麴（ α 米 100 g に相当）に 500 ml の蒸留水を加え 40°C、3 時間保持した後 3,000 rpm、15 分、遠心分離し、上澄液を 0.5 N 塩酸で pH 4 に調整後 45°C 以下で約 30 ml にロータリーエバポレーターで減圧濃縮した。この濃縮液に MERCK 社製酸性活性アルミナ 10 g を加え、マグネティックスターラーで攪拌しながら 3 N アンモニアで pH 8.5 にし約 10 分間攪拌する。その後上澄液をすてアルミナを内径 20 mm のカラムにつめ、カラムを 200 ml の蒸留水でよく水洗後、0.3 N 酢酸 200 ml で溶出し、溶出液は 10 g ずつ分取した。その 1 ml をとり ARNOW¹²⁾ の方法によって発色を行ない OD₄₃₀¹²⁾ を測定した。フォリンの試薬による発色には 0.5 ml をとり、0.4 M、Na₂CO₃ 5 ml、フォリン試薬 1 ml を加え、40°C、30 分後の発色を OD₄₉₀¹³⁾ で測定した。

8. イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィー

T. NAGATSU ら⁵⁾、H. TAKAHASHI ら⁶⁾ の方法に従い、内径 20 mm のカラムを用い Dowex 50-X 8 陽イオン交換樹脂を 8 cm の高さに充填し、酸性活性アルミナカラムクロマトグラフィーにおける 0.3 N 酢酸溶出区分をロータリーエバポレーターで約 20 ml に減圧濃縮した試料をイオン交換樹脂に吸着させた。カラムを 400 ml の蒸留水でよく洗った後、展開溶媒として 1 N、塩酸ならびに 4 N 塩酸を用いて溶出を行なった。カラムからの溶出液は 10 g ずつ分取した。その 0.5 ml をとり前記方法でフォリンの試薬による発色を測定した。なお、イオン交換樹脂の再生には 2 N カセイソーダ、2 N 塩酸を用いて行なった。

9. 薄層マロマトグラフィー

i) 薄層：シリカゲル Kieselgel G を用いた。

ii) 展開溶媒：次の 4 種を用いた。

溶媒 I. *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：1：2）

溶媒 II. *sec*-ブチルアルコール：水（4：1）

溶媒 III. 水飽和 *n*-ブチルアルコール

溶媒 IV. *n*-プロピールアルコール：アンモニア：水（8：1：1）

iii) 展開方法：酸性アルミナカラムクロマトグラフィーにおける 0.3 N 酢酸溶出区分をロータリーエバポレーターで 2 ml に減圧濃縮し試料とした。また、イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーにおける各区分は 2 ml に減圧濃縮し試料とした。これらの試料と標準物質の水あるいはエタノール溶液を同一薄層板上、下端から

1.5 cm 離れたところに点状に附し、風乾後展開そうに入れ展開した。

iv) スポットの確認

蛍光のほか、次の発色法を用いた。

UV：紫外線燈（2,537 Å）での蛍光

フォリン反応：0.4 M Na_2CO_3 を噴霧後フォリン試薬を噴霧する。

ニンヒドリン反応：ニンヒドリンをアセトンに 0.2% 溶かした液を噴霧後 100°C、5 分間加熱する。

ジアゾ反応：*p*-ジアゾベンゼンスルホン酸を 0.4 M, Na_2CO_3 溶液に 0.2% 溶かした液を噴霧する。

塩化第 2 鉄反応：0.5% 塩化第 2 鉄溶液を噴霧する。

ARNOW 反応¹²⁾：ARNOW の試薬を噴霧する。

赤血塩反応¹³⁾：赤血塩を pH 7~8 の磷酸緩衝液に 0.5% 溶かした液を噴霧する。

硝酸銀反応：硝酸銀 1 g を蒸留水 8 ml に溶した液を噴霧する。

モリブデン酸アンモニウム反応：モリブデン酸水溶液を噴霧する。

GIBBS 反応¹⁴⁾：GIBBS の試薬を噴霧する。

BPB 反応：0.1% プロム・フェノールブルーのエタノール溶液を噴霧する。

フロログシノールの反応¹⁵⁾：フロログシノールをメタノールに 2% 溶かした液を噴霧後、0.1 M チオ硫酸ソーダ水溶液を噴霧する。その後 0.1 N カセイソーダ溶液を噴霧する。

v) スポットの濃度

酸性アルミナカラムクロマトグラフィーにおける 0.3 N 酢酸溶出区分を 2 ml に減圧濃縮した試料を展開溶媒 *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：2：1）を用いて上記方法で展開し、薄層を展開そうから取りだした後、溶媒を飛ばすために 12 時間室温で風乾した。風乾後褐色に褐変したスポットを OZUMOR デンシトメーター（明日香工業製）を用いて濃度比を測定した。フィルターは 440 mμ を用いた。

10. アミノ酸アナライザーによる分析

日立オートアミノ酸アナライザー KLA-3 B 型を用いて測定した。イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーにおいて 1 N 塩酸溶出区分を 2 ml に減圧濃縮し、十数枚の薄層板の下端から 1.5 cm 離れたところに線状に引き、展開溶媒 *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：1：2）を用い、乾変を防止するため、展開後ただちに該当する R_f の部分をかきとって集め、30 ml のエタノールを加えて、マグネティックテスターで攪拌後濾過し、薄層担体を少量のエタノールで洗って濾液、洗液を台

してロータリエバポレーターで減圧濃縮して 2 ml のエタノール溶液とした。この試料 0.25 ml を 1 ml の稀釈用緩衝液で稀釈し、各アミノ酸 0.25 μmol 濃度の 14 種のアミノ酸を含む中酸性アミノ酸標準溶液と混合して分析を行なった。用いた標準アミノ酸は Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine である。そのほかの標準アミノ酸と比較にあたっては 0.25 μmol 濃度の標準アミノ酸と混合して測定した。

11. 紫外外部吸収曲線

日立 EPS 型自記分光光度計を用いて測定した。試料は薄層からかきとった上記エタノール試料を蒸留水で稀釈して測定し、標準品との比較にあたっては標準品の水溶液を用いた。

実験結果

1. 米麴浸漬濾液の着色度の経時的变化

第 1 報¹¹⁾で報告したように米麴が褐変する最適温度は 40°C であるので浸漬温度を 40°C とし、室温に浸漬した場合と比較した。結果を Fig. 2 に示す。

Fig. 2 Change of color of filtrate during the steeping of rice-koji in water.

褐変性麴である RIB 128 の米麴浸漬濾液の着色度は室温で浸漬した場合よりも褐変最適温度である 40°C で浸漬した場合の方が短時間の間に着色度は増加し、4 時間までは直線的傾向を示し、7 時間で最高になり、それ以後はかえって漸次退色する。これに反して、非褐変性麴類である RIB 647 の米麴浸漬濾液の着色度は RIB 128 の米麴浸漬濾液の着色度に比較して極めて低く、経時的な着色度の増減も認められなかった。

2. 米麴浸漬濾液の着色度におよぼす pH の影響

Fig. 3 の結果に示すように、RIB 128 の米麴浸漬濾液は pH 9~10 のアルカリ性側では著しく着色度は増加し、酸性側では逆に減少する傾向を示した。RIB 647 の米麴浸漬濾液の着色度は pH に影響されず着色度の増

Fig. 3 Change of color of the filtrate at various kinds of pH.

加減少はなかった。そこで、褐変性麴の濾液中にはアルカリ性で非常に着色しやすい物質が存在するものと考えられる。

3. 麴の褐変度と麴浸漬濾液の着色度との関係

米麴の褐変度と濾液の着色度は Table 1 に示す。使用した菌株数は 22 株である。麴の褐変度と濾液の着色度との間の相関係数 $r=0.6462$ であり、危険率 1% で有意であった。すなわち、濾液の着色度が大きいほどその米麴も強く褐変すると判定することが可能である。米麴を水に浸漬し濾過した場合、麴米残渣も褐変するが褐変前駆物質は濾液にも一部分溶けこむものと考えられる。

Table 1 Relation between the color of filtrate and the browning degree of koji

Color OD_{410}^{510}	Browning degree	Color OD_{410}^{510}	Browning degree
0.036	3	0.010	3
0.046	4	0.014	2
0.027	3	0.008	1
0.030	3	0.004	1
0.020	4	0.012	2
0.018	5	0.016	5
0.023	4	0.012	2
0.008	3	0.008	1
0.023	6	0.007	1
0.018	4	0.012	4
0.018	4	0.009	1

Numbers of browning degree correspond to the degree of browning in order.

Correlation coefficient

$r=0.6462^{**}$ ($n=22$, Total number of strain)

4. アルミナ吸着法による褐変前駆物質の分離

米麴を水に浸漬し濾過した濾液から褐変前駆物質を分離する方法は実験方法に前記の方法で行なった。

Table 2 の結果に示すように ARNOW の反応と米麴の褐変度との間の相関係数 $r=0.4116$ ($n=28$) となり、危険率 5% で有意であった。すなわち、アルミナに吸着され、0.3 N 酢酸で溶出された多価フェノールが米麴の褐変に関与しているものと考えられる。

Table 2 Relation between ARNOW's reaction of the effluences and the browning degree of koji

ARNOW's rea. OD_{410}^{510}	Browning degree	ARNOW's rea. OD_{410}^{510}	Browning degree
0.055	4	0.104	6
0.047	1	0.074	1
0.012	4	0.072	2
0.040	4	0.054	2
0.069	2	0.060	2
0.085	3	0.060	1
0.084	3	0.041	1
0.065	5	0.067	3
0.064	4	0.092	6
0.078	3	0.088	6
0.090	3	0.064	5
0.066	5	0.058	6
0.094	4	0.058	1
0.038	1	0.082	6

Numbers of browning degree correspond to the degree of browning in order.

Correlation coefficient

$r=0.4116^{*}$ ($n=28$, Total number of strain)

5. アルミナカラムクロマトグラフィーによる褐変前駆物質の分離

アルミナカラムクロマトグラフィーの結果は Fig. 4, Fig. 5 に示す。

米麴を褐変する菌株である RIB 128 の麴浸漬濾液と米麴を褐変しない菌株である RIB 647 の麴浸漬濾液の

Fig. 4 Chromatographic separation of precursor of browning substances by alumina column (1)

Fig. 5 Chromatographic separation precursor of browning substances by alumina column (2)

アルミナカラムクロマトグラフィーを比較した場合、RIB 128 は酢酸溶出区分に ARNOW の反応発色性ピークがあり、RIB 647 には認められなかった。フォリン反応発色性ピークも ARNOW の反応発色性ピークと一致した。

6. アルミナカラムクロマトグラフィーにおける酢酸溶出区分の TLC

アルミナカラムクロマトグラフィーにおける 0.3 N 酢酸溶出区分を減圧濃縮し薄層クロマトグラフィーを行なった結果を Fig. 6 に示す。展開溶媒は *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：1：2）である。

Fig. 6 Thin-layer chromatogram of fraction B separated by alumina column.
Kieselgel G
n-Butanol : AcOH : H₂O (4 : 1 : 2)

展開溶媒を飛ばすため薄層を風乾している間に褐色に着色する RIB 128 の麴のみに顕著に検出された R_f 0.96, 0.56, 0.47 の三種のスポットと RIB 128 の麴と RIB 647 の麴の両方に検出された黄色傾向の R_f 0.23 のスポットが認められた。

呈色反応は R_f 0.96 のスポットがフォリン反応、ジアズ反応、塩化第2鉄反応、ARNOW の反応において陽性、ニンヒドリン反応陰性であるのに対し、 R_f 0.47 のスポットは以上の呈色反応に陽性であった。この結果、 R_f 0.47 のスポットの物質はニンヒドリン反応陽性であるので一種のアミノ酸と考えられる。

7. 薄層クロマトグラフィーにおける各スポットの濃度

アルミナカラムクロマトグラフィーにおける酢酸溶出区分を減圧濃縮し、薄層クロマトグラフィーを行なった後薄層を風乾後デンストメーターで各スポットの濃度比を測定した結果を Table 3 に示す。

濃度比の大きさは R_f 0.47, 0.23, 0.96, 0.56 の順序であった。この中、0.23 のスポットは米麴を褐変する RIB 128 の麴と米麴を褐変しない RIB 647 の麴の両方に検出されることから、また、 R_f 0.56 のスポットは褐

Table 3 Comparative concentration of colored substance of the spots shown by % obtained by densitometry

R_f	Concentration ratio(%)
0.96	22
0.56	0~6
0.47	44
0.23	28

変の程度も少なく不安定で検出されたりされなかったりする場合があることから米麴の褐変に関与しているとしても極めてその占める役割はわずかであることを知った。 R_f 0.96, 0.47 の両スポットのうち、濃度比から R_f 0.47 のスポットを主スポットとみなし以下このスポットについて実験をすすめた。 R_f 0.96 のスポットについては後報でさらに検討し報告する予定である。

8. イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーによる褐変前駆物質の分離

アルミナカラムクロマトグラフィーの酢酸溶出区分を減圧濃縮し、Dowex 5-X 8 陽イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーによる褐変前駆物質の分離を行なった結果を Fig. 7 に示す。 R_f 0.23, 0.96 のスポットは樹脂に吸着されずに水溶出区分に、 R_f 0.47 の主スポットは 1 N 塩酸溶出区分に、 R_f 0.56 のスポットは 4 N 塩酸溶出区分に各々分離された。

Fig. 7 Purification of precursor of browning substances by Dowex 50 (H⁺)

9. 主スポット物質の TLC の R_f 値と発色性

前記方法にて薄層クロマトグラフィーを行ない種々のフェノール物質の R_f 値と主スポット物質の R_f 値とを比較した結果を Table 4 に示す。展開溶媒 *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：1：2）ではフェノール性物質でもあり、アミノ酸でもあって褐変前駆物質である DL-DOPA と R_f 値は一致したが、*sec*-ブチルアルコール：水（4：1）、水飽和 *n*-ブチルアルコール、*n*-プロピルアルコール：アンモニア：水（8：1：1）では異なった R_f 値を示した。

Table 4 R_f of the main spot on TLC (Kieselgel G) compared with those of various kinds of phenol

	<i>n</i> -Butanol : AcOH : H ₂ O 4 : 1 : 2	<i>sec</i> -Butanol : H ₂ O 4 : 1	H ₂ O satu- rated <i>n</i> -Butanol	<i>n</i> -Propanol : NH ₄ OH : H ₂ O 8 : 1 : 1
main spot-substance	0.47	0.08	0.08	0.00
DL-DOPA	0.47	0.31	0.22	0.18
Dopamine	0.55	0.40	0.32	0.35
Tyramine	0.62	0.43	0.45	0.70
Chlorogenic acid	0.55	0.25	0.13	0.21
Catechol	0.96			
Resorcinol	0.96			
Hydroquinone	0.95			
Pyrogallol	0.88			
Phloroglucinol	0.92			
Protocatechuic acid	0.90			

Table 5 Color reaction of the main spot-substance and DOPA

	R_f 0.47 spot	DOPA
Folin	bluish violet	bluish violet
ARNOV	red	red
Ninhydrin	reddish violet	reddish violet
Red prussiate	reddish brown	reddish brown
Diazo	orange	orange
Silver nitrate	brown	brown
Ammonium molybdate	yellow	yellow
GIBBS	violet(-)	violet(-)
B.P.B.	—	—
FeCl ₃	bluish grey	green
Phloroglucinol + sodium thiosulfate + NaOH	brown	yellow

Fig. 8 Analysis of the main spot-substances with amino acid analyzer

薄層から主スポットの R_f 値に該当する部分をかきとりエタノールで溶出した試料を用いて濾紙上の呈色反応を DL-DOPA と比較した結果を Table 5 に示す。表に示したように殆どどの呈色反応は同じであったが、塩化第2鉄反応、フロログルシノールの反応の呈色性がやや異なった。

10. アミノ酸アナライザーにおけるクロマトグラフィー

Fig. 8 に示すように、主スポット物質のクロマトグラフィーにおける溶出ピークの位置は中酸性アミノ酸区分の leucine と tyrosine との間に存在し、14種の標準アミノ酸のいずれともピークは重ならなかった。また、DL-DOPA も同じ位置に溶出され、DL-DOPA と主スポット物質とを混合して分析した結果は単一のピークを与えた。

11. 紫外外部吸収曲線

DL-DOPA と比較した紫外外部吸収曲線の結果を Fig. 9 に示す。主スポット物質の極大吸収は $282\text{ m}\mu$ であり DL-DOPA の極大吸収と一致した。

Fig. 9 The UV-absorption spectra of the main spot-substances and DOPA.

考 察

米麴をよく褐変する麴を蒸留水に浸漬した場合、濾液の着色度と麴米残渣の褐変度との間に高い相関があり、米麴の褐変前駆物質が濾液に一部分溶けこむことを知った。濾液中の褐変前駆物質を活性アルミナカラムクロマトグラフィー、Dowex 50-X 8 陽イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーならびに薄層クロマトグラフィーを行ない分離精製した。米麴の主褐変前駆物質は酸性展開溶媒による薄層クロマトグラフィーの R_f 値、大部分の発色試薬による呈色性、アミノ酸アナライザーによるクロマトグラフィーおよび紫外外部吸収曲線の極大吸収値が DL-DOPA とよく一致した。

なお、大脇ら¹⁶⁾は褐変性麴の水浸出残渣のアセトンまたはエチルアルコール浸出液濃縮部の *n*-ブチルアルコール：酢酸：水（4：1：2）の展開溶媒によるペーパークロマトグラフィーにおいて、展開濾紙の乾燥するにつれて紫色に着色し、フェノール性を有する R_f 0.28, 0.38, 0.80 の三種のスポットを認め、 R_f 0.28 のスポ

ットはペーパークロマトグラフィーでの R_f 値、蛍光、塩化第2鉄反応からして DL-DOPA と類似しているが紫外外部吸収曲線は異なるものであったと報告している。今回筆者らが分離した物質は紫外外部吸収極大値が DL-DOPA とよく一致した。中性展開剤による薄層クロマトグラフィーにおける R_f 値の違い、塩化第2鉄反応、フロログルシノールの呈色性においてやや相違が認められた。しかし、その他の点で DL-DOPA と非常によく似ており、この物質は DL-DOPA に類似した物質と考えられる。

文 献

- 1) 秋山裕一, 長沢 悠, 村上英也: 本誌, 56, 728 (1961)
- 2) 村上英也, 上野 伸, 大井健徳, 河合美登利, 竹越俊夫, 村山正夫, 吉沢 淑: 本誌, 52, 56 (1957)

- 3) E.R. MILLER: *J. Biol. Chem.*, 44, 481 (1920)
- 4) D. GLICK: *Methods of biochemical analysis*, 16, 293 (1968)
- 5) T. NAGATSU, M. LEVITT and S. UDENFRIEND: *J. Biol. Chem.*, 239, 2910 (1964)
- 6) H. TAKAHASHI and T.B. FITZPATRICK: *Nature*, 209, 888 (1966)
- 7) 村上英也, 鈴木 与, 大脇京子, 桑原健治: 醸試報, 137, 12 (1965)
- 8) 原 昌道, 脇田征也, 大塚謙一: 醸工, 45, 400 (1967)
- 9) 村上英也, 鈴木 与, 長縄真琴, 大脇京子: 醸試報, 137, 1 (1965)
- 10) 村上英也, 牧野正則: 醸試報, 140, 4 (1968)
- 11) 大場俊輝, 村上英也, 原 昌道, 横関公男, 牧野正則, 江頭勇次: 本誌, 64, 1074 (1969)
- 12) L.E. ARNOW: *J. Biol. Chem.*, 118, 531 (1937)
- 13) 化学の領域: 8, 181, (1954)
- 14) H.D. GIBBS: *J. Biol. Chem.*, 72, 649 (1927)
- 15) H.A. SCHROEDER: *J. Chromatog.*, 30, 537 (1967)
- 16) 大脇京子, 村上英也: 醸工, 44, 775 (1966)

J. Soc. Brew. Japan, Vol. 65, No. 5, P 425~P 432

Studies on the Browning of Rice Koji.

Part 2. On the precursor of browning substances.

by

Toshiteru OBA, Kotaro SUIITO, Hideya MURAKAMI, Shodo HARA,
Toshiro TAKAHASHI and Akihiko KATO

(RESEARCH INSTITUTE OF BREWING, TAX ADMINISTRATION AGENCY, KITA-KU, TOKYO)

The rice koji for sake brewing usually shows white color, but it sometimes turns to brown during storage in the air. The precursor of browning substances in rice koji was studied by comparing two kinds of koji made by culturing two kinds of *A. oryzae* on steamed rice; one is strain RIB 128 which always makes koji brown, and another is strain RIB 647 which always does not brown.

When the koji was steeped in water at room temperature and filtered, both the filtrate and the residue gradually colored brown in the presence of air and finally became black. Browning degrees of the filtrate were compared between the kind of strain and/or the temperature of the steeping water as shown in Fig. 2. The coloration in both filtrate and residue was increased at alkaline pH of steeping water as shown in Fig. 3. High correlation was obtained statistically between the color of filtrate and the browning degree of the residual matters as seen in Table 1. Therefore, it is clear that the precursor of browning substances of rice koji is soluble in water. Studies were hereafter carried out by using the filtrate of rice koji made by culture of RIB 128, and the results described below were obtained.

1. The precursor of browning substances in the filtrate was adsorbed onto alumina at pH 8.5 and eluted with 0.3 N acetic acids as shown in Figs. 1, 4, 5 and Table 2. The eluate obtained by acetic acid from alumina column was collected and evaporated under reduced pressure at about 45°C, followed by thin-layer chromatography (TLC). Three spots on TLC became gradually in the air. On the contrary, no spots on TLC were found in the eluate obtained from the filtrate of rice koji made by

culture of strain RIB 647. (Fig. 6) From the densitometric analysis of three kinds of spot-substance, the substance of R_f 0.47 was regarded as a main precursor among three spot-substances as shown in Table 3.

2. The eluate by acetic acid from alumina column was subjected to chromatography by Dowex 50-X 8, followed by successive elution with water, 1 *N* HCl and 4 *N* HCl, and the spot-substances of R_f 0.96, 0.47 and 0.56 were separated as shown Fig. 7.

3. Comparing the R_f of TLC and color reactions of the main spot-substance with those of DL-dihydroxyphenylalanine (dopa), the main spot-substance was found to be similar to the latter substance as shown in Table 4 and 5.

4. The chromatographic pattern of the main spot-substance examined with an amino acid analyzer was the same as that of DL-dopa, which was eluted between leucine and tyrosine as shown in Fig. 8.

5. UV-absorption maximum of the main spot-substance was found to lay at 282 $m\mu$, and it was the same as that of DL-dopa. (Fig. 9)