ホスト–ゲスト作用による不斉なフォトピリドン生成およびエネルギーと立体化学変化の分子軌道法解析

染川 賢一*, 尾堂 結華, 大戸 朋子, 橋本 浩晃, 宮地 淳, 下茂 徹朗

鹿児島大学大学院理工学研究科化学生命・化学工学専攻, 〒 890-0065 鹿児島市郡元 1-21-40

*e-mail: some@apc.kagoshima-u.ac.jp

(Received: June 23, 2009; Accepted for publication: December 4, 2009; Advance publication: March 28, 2010)

光反応理論、不斉合成そして太陽エネルギー蓄積で興味をもたれる 2-ピリドン (**1**) の光励起による不斉フォトピリドン (**2**) の生成実験と、その光反応のエネルギーと立体化学変化について主に半経験的量子化学計算を用いた動的解析 (MO 解析) を行った。

先ず不斉な新規なイミドアミドホスト (**1**)-**3**などを調製し、水素結合錯体 **1a**-(**1**)-**3**などとして光反応し、不斉な (**R**)-**2a** などの合成を行った。次に **1** の光励起一重項 (S_1) **1*** の MO 解析は、**1*** が非平面な enantiomer 平衡体 ($1^*_{\Phi(+)}$ と $1^*_{\Phi(-)}$; $\Delta E_K \approx 8-9 \text{ kcal/mol}$) として存在すること、また 3 種のポテンシャルエネルギー面 (PES) を求め、 $1^*_{\Phi(+)}$ は $r_{3-6} \approx 2.0 \text{ \AA}$ 付近の失活で (**R**)-**2** になることを示した。**1**-(**1**)-**3** の光反応での (**R**)-**2** の生成は、**1**-(**1**)-**3** の S_1 励起では $1^*_{\Phi(+)}$ -(**1**)-**3** となり、 r_{3-6} の減少と失活で、(**R**)-**2**-(**1**)-**3** となり、それとなることを示された。そこで (**d**)-**3** 利用の場合の MO 解析を行い、**1**-(**d**)-**3** からは $1^*_{\Phi(-)}$ -(**d**)-**3** を経て (**S**)-**2** が生成することを示した。また著名な Bach らのホスト **6** による **1** $\rightarrow$ (**R**)-**2** の光反応も MO 解析し、検証した。

さらに **1** $\rightleftharpoons$ **2** の大きなエネルギー蓄積、置換基効果そして触媒作用を MO 解析し、新しい太陽エネルギー蓄積系を提案した。

キーワード: 2-ピリドン, フォトピリドン, 分子軌道法解析, 不斉ホスト, 光原子価異性, PM5, 遷移状態解析, 太陽エネルギー蓄積

1 はじめに

光化学反応のうち特に本題の $[4\pi]$ 電子環状反応や付加環化反応などは自然界でも起こり [1]、また合成反応のキーステップとなる [2]。それらがどのような立体化学や配向で起るかの選択性は、 $[6\pi]$ 電子環状反応を含め、フロンティア電子論や Woodward-Hoffmann (WH) 則の分子軌道 (MO) 法解析で理解出来るとされる [3]。しかし複雑な反応系や奇妙な選択性を示す例もあり [4]、我々は光反応の遷移状態 (TS) を動的に解析 (MO 解析) することにより、それらの原因は主に配座や CH/π 、極性効果などとして明らかにしてきた [5]。前報ではシクロオクテンの光増感不斉異性化での基質の配座平衡の

存在のこと [6]、また光付加反応での水素結合による異変解析について述べた [7]。

ところで Scheme 1 の 2-ピリドン (**1a**) からフォトピリドン (**2a**) への光原子価異性化は、逆旋 $[4\pi]$ 電子環状反応に属し、高歪み化である。**2a** がかなり安定であることからノルボルナジエン (NBD) $\rightleftharpoons$ クワドリシクラン

Scheme 1

* 鹿児島大学名誉教授

Scheme 2

(QC)系 [8]と同様に光エネルギー蓄積・変換反応として研究された形跡はあるが [9]、最近は前者の研究はあまり見られない。

一方で 4-メトキシ-2-ピリドン (**1b**) は光異性化で β -ラクタムでもある **2b** を高収率で与え、光学分割もなされ、ペニシリン系医薬の合成原料として、また抗 HIV 用炭素オキセタノシン医薬のそれとして有用となっている [10]。また最近 Bach らは **1b** の光原子価異性化や光付加を、不斉な Kemp's イミドのホスト-ゲスト作用を利用して不斉に行うことに成功し [11]、注目されている。しかしその不斉反応のエネルギーや立体化学変化の原因については言及していない。

本報では Scheme 1 の光異性化反応の理解の深化と応用を目標にして、主に MOPAC 法による TS 解析を利用し、先ず 2-ピリドン系 (**1**) の光励起と、その原子価異性化反応プロセスの定量的理解法を述べる。次に水素結合能力をもつ天然由来の簡便な不斉イミドアミド (**3-5**) (Scheme 2) を合成し、水素結合錯体 **1**·(*R*)-**3** などを確認し、それへの光照射による不斉な **2** の生成実験を行う。そしてその不斉原子価異性化の MO 解析を行い、エネルギーと立体化学変化から反応プロセスと不斉化の原因を明らかにする。さらに **1** $\rightarrow$ **2** が NBD $\rightleftharpoons$ QC 反応系の約 2 倍の高エネルギー蓄積であることを示し、その利用開発のための試算と提案を行う。

2 実験と計算方法

2.1 不斉ホスト、イミドアミド (**3-5**) の調製と水素結合錯体 **1**·**3** などの評価

(*R*)-**3** の合成は前述したが、以下のような [12]。Kemp のイミドカルボン酸を酸塩化物にして後、窒素雰囲気下でピリジン溶媒中市販の (*R*)-プロリナルと加熱して 69% の収率で得た ($[\alpha]_D = -47.2^\circ$ (CH₃CN))。その X 線結晶構造データは意図した分子内水素結合 CH₂OH/O=C の存在を示す (Figure 1)。

ホスト **4** (及び **5**) は同じく酸塩化物と (*R*)-ロイシン (及び (*R*)-フェニルアラニン) エチルエステルとの脱 HCl

Figure 1. X-ray data and ORTEP drawing of (*R*)-**3**.

反応を行って得た (収率 69%(81%))。物性値は次のようである。**4**: mp.134-136 °C, $[\alpha]_D = -32.9^\circ$ (CH₃CN), **5**: mp.58-61 °C, $[\alpha]_D = -0.8^\circ$ (CH₃CN)。不斉点はいずれも天然の (*R*)-配置で、絶対配置は (*S*)-配置である。

ホスト分子 (**H**) とゲスト分子 (**1a**: **G**) との重クロロホルム中での会合度を見るため、¹H NMR での Job's プロットを、 $[H] + [G] = 10 \text{ mM}$ として $X = [H]/([H] + [G]) = 0-1.0$ の 10 点で行った。グラフは $X = 0.5$ のとき最大値で 1:1 会合が推定された。また会合定数 K_a の測定では、**1a** の NH ピーク δ_{NH} の変化を NMRTIT プログラム [13] を用いた $[G]$ 対 $\Delta\delta_{NH}$ 曲線の解析を行った。その結果溶解性のよい **5** のとき $K_a = 91.3 \text{ M}^{-1}$ が得られた。

2.2 **1a** とホスト (**3-5**) との混合溶液の光化学反応

Bach らの方法 [11] を参考にして、**1a** ($1.0 \times 10^{-2} \text{ M}$) とホストの CHCl₃ または CH₂Cl₂ 溶液を室温で高圧水銀灯で光照射し、**2a** の光学純度を HPLC 法 (CHIRALPAC AD (ダイセル化学工業)、溶離液 E₁OH、光源 254 nm) で測定した。**2a** の光学異性体ピークは 8.5 min (**2afr**) と 10.1 min (**2abk**) であり、**1a** の減少約 30% でのデータを Table 1 に示す。なお **5** のピークは後者と重なった。ホスト **3** と **4** ととも早いピークの光学異性体が生成し易いことが分かった。なお 3.1 節で述べるように前の **2afr** ピークが (*R*)-**2a**、後者が (*S*)-**2a** の立体化学と推定された。少し条件は異なるが Bach らは **1b** から **2b** の ee23% を報告している [11]。

Table 1. Photoisomerizations of **1a** in the presence of hosts (**3,4**)

Entry	1a [M]	Host	Solvent [M]	Irradiation (hr)	2a (peak)	Enantiomer excess (ee%)
1	1×10^{-2}	3	2.5×10^{-2}	8	2afr > 2abk	13
2	1×10^{-2}	4	5.0×10^{-2}	8	2afr > 2abk	23
3	1×10^{-2}	4	5.0×10^{-2}	8	2afr >> 2abk	42

2.3 分子シミュレーション計算

主に WinMOPAC(富士通 KK)MOPAC2002 の、TS 解析では PM5 法を用い [3c, 5]、前報同様 [6b] のキーワード (EF PM5 PRESIZE) を用いた基底状態最適化後 [14]、MOF-S で UV 計算、(EF SINGLET EXCITED) を用いた励起一重項状態計算 [6b] を行った。また水素結合関与の計算では MOPAC のホームページで推められ、文献もある PM3 法 [15] を用いて、ホストとゲスト 2 分子接近による相互作用計算はその安定化位置を予想して行った。またその錯体の励起後の **1** の、C₃-C₆ 原子間接近による原子価異性化などの反応性を観察した。さらに Bach らの **1b** の光不斉原子価異性化反応結果 [11a] も分子シミュレーションで検証した。

Table 2. Potential energies and relative energies of pyridone **1** and photopyridone **2**.

Method	1a	(1b)	2a	(2b)
B3LYP* (au)	-323.5331051		-323.3442677	
rel. B3LYP (kcal/mol)	0.0		56.7	
PM5 (kcal/mol)	-23.3		26.1	
rel. PM5 (kcal/mol)	0.0	(0.0)	49.4	(48.0)

*Basis set: 6-13 + G (d)

を PM5 法で TS 解析を行い、式 (1) のルートであると推定された。

3 計算結果と考察

3.1 ピリドン (**1**) からフォトピリドン (**2**) への光原子価異性化反応の分子シミュレーション

3.1.1 **1a** から **2a** への光反応のエネルギーと反応プロセス

先ず Table 2 に **1a** と **2a** の B3LYP レベル等でのエネルギー差を示す。その差約 50kcal/mol は NBD ⇌ QC 系 [8] のほぼ 2 倍に当たる。

その光反応過程は、Figure 2 の P1, P2, P3 の 3 ルート

Figure 2. Molecular simulation of photoreaction process and energies on the photoisomerization from **1a** to **2a** (PM5).

A* は **1a**(0.0kcal/mol) の励起一重項状態 (**1a***: 76.5kcal/mol)、E は **2a**(49.4kcal/mol) の位置である。なお横軸は C3-C6 の長さ (r_{3-6} (Å))、縦軸は相対内部エネルギーに相当する相対 HOF 値 (rel. HOF(kcal/mol)) を示す。P1 プロセス (紫線) は **1a*** の r_{3-6} (=2.82Å) を 0.1Å 刻みで減少し、なだらかな 2.2(B 点)~2.0Å(B'' 点) 付近、そして C 点即ち TS1(r_{3-6} =1.75Å, rel.HOF=142.5kcal/mol, -925 cm⁻¹ (TS の負の振動数)) を経て D(119kcal/mol) に至る。D はシクロブテニルイソシアナート型をしているが、基底状態化 (のキーワード: 失活) で E(**2a**の構造) となる。しかし TS1 は A* より 66kcal/mol も高く、同一励起状態での現実の変化点としては考え難い。一方基底状態の P2 プロセス (赤線) は、**2a** の r_{3-6} (=1.60Å) を少しずつ増加して、F 点即ち TS2(2.20Å, 86.6kcal/mol, -1385 cm⁻¹) を経て、A 即ち **1a** となることを示す。TS2 の E-F 間の高さ 37.2kcal/mol は **2a** がかなり安定であることを示唆する。P3 プロセス (緑線) は P1 の途中 (B'': 2.0Å, 105kcal/mol) からの失活 (基底状態化) で F' となり、**2a** に至ることを示す。なを、B(2.2Å) 付近からの失活は **1a** にもどることが示唆された。以上のことから **1a** の励起による **2a** 生成は、P1 の 2 つの励起ポテンシャルエネルギー面 (PES) と P2 の 2 つの基底 PES のうちの、式 (1) の過程を経て行われていることが推定される。B と F、B'' と F' にはこの図では重なりは見られないが、目下の P2 面 ($S_{0,0}$) には振動レベル ($S_{0,n}$: $n=1,2,\dots$) の積上げがある [16]。従って B'' の $S_{1,0}$ と F' 付近の $S_{0,n}$ との重なりによる失活で、**2a** の生成に至ったと示唆される。**1a** → **2a** は 49kcal/mol (B3LYP/6-31+G(d) レベルでは 57kcal/mol) ものエネルギー蓄積で、光エネルギー変換材料系 [8] として一考に値する。

Figure 3. Molecular Simulation of photoisomerization process and energies from **1b** to **2b** (PM5).

3.1.2 **1b** から **2b** への高収率光反応のエネルギーと反応プロセス

Scheme 1に示したこの光反応過程も、Figure 3の3ルート (P1, P2 および P3) を TS 解析し、前項同様式 (2) と推定された。

その際 P1 過程の $B \rightarrow B''$ 間で窪みがあり、P2 との接近による重なり効果で失活し易く、**2b**化の大きい収率 [16] に寄与していることが示唆された。また **1b*** の A^* では $r_{1-2}=1.57\text{\AA}$ で、**1a*** の $r_{1-2}=1.61\text{\AA}$ より短い。PM5 法では **1a*** では鎖状型、**1b*** では六員環型と構造表現の違いを生じている。このように4位メトキシ置換基が変換過程のエネルギーと立体構造 (次項のねじれ角) そして変換率に好ましく影響していることが示唆され、Hongo らの実験結果文献 [10c] の解釈に役立つ。

3.1.3 励起一重項 **1*** の配座異性と **2** 生成過程で観察される立体化学の変化

Figure 2の **1a***、Figure 3の **1b*** はいずれも平面でなく、二面角 Φ_{1236} は **1a*** で $+17.4^\circ$ 、**1b*** で $+17.8^\circ$ であり、各々二面角が逆符号の配座異性体が存在することが推定された。Figure 4の1) にピリドンの **1a*** のねじれ配座異性体2種 (**1a***₍₊₎ と **1a***₍₋₎) のエネルギーと立体化学データ、そしてキーワード :SADDLE 使用で求めた平衡エネルギーデータ (9.0kcal/mol, -877cm^{-1}) を示した ((+) と (-) は Φ_{1236} の符号を示す)。その TS 構造は全体の結合距離の長い平面である。2) では **1a***₍₊₎ の、 $B'' \rightarrow F' \rightarrow$

Figure 4. Conformational behaviour of singlet excited pyridone **1a*** and the selective valence-isomerization to **2a**.

2a過程の r_{3-6} 減少で、(*R*)-**2a**が生成することを示す。3) では **1a***₍₋₎の同様のシミュレーションで (*S*)-**2a**が生成することが示された。即ち **1a***の立体配座によりその逆旋的 [4 π] 電子環状反応の回転方向の選択性が決まることを意味する。なお、(*R*)-**2a**は本郷らの光学分割による (*IR*, 4*R*)-(+)-2- アザビシクロ [2.2.0] ヘキサ -5- エン -3- オン [10c]、および Bach らのホスト **6**による不斉原子価異性体 [11a] に相当する。そのような不斉誘導とその解析については次節で述べる。

3.2 **1a** とホスト (*l*)-3(=*S*)-3) とのホスト - ゲスト作用と、不斉光異性化による (*R*)-**2a** 生成の分子シミュレーション

3.2.1 ホスト (*l*)-3 の分子内水素結合と、**1a** との分子間水素結合

Figure 5(a)に (*l*)-3の、水素結合に有効な PM3 法 [16] による安定配座構造を示した。アミド結合部の回転等を行い最安定配座を求めたものであり、先の X-ray ORTEP 図 [12] と同じく $\text{CH}_2\text{OH}/\text{CO}$ 間に分子内水素結

Figure 5. MO data of (a) (*l*)-3 and (b) **1a** • (*l*)-3 conformations (PM3).

Figure 6. Molecular simulation of photoreaction process and energies for the valence isomerization from **1a**•(*I*)-3 to (*R*)-**2a** (PM3).

合が見られ、イミド部の非対称化が示唆される。Figure 5(b)に **1a** と (*I*)-3 の水素結合部接近による安定配座を示す。フリーなイミド側を使い、1:1 比で 4.3kcal/mol の水素結合安定化が認められる。なおフリーでないイミド側を用いた場合より 0.6kcal/mol 安定である。

3.2.2 **1a**•(*I*)-3 の光反応による (*R*)-**2a** 生成のエネルギーと反応プロセス

Figure 6に、3.1.1 と同様にして求めた P1 プロセス ($A \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow C \rightarrow D$) と P3 プロセス ($B' \rightarrow F' \rightarrow E$)、そして $A^*(\mathbf{1a}^*\cdot\mathbf{3})$ と $E(\mathbf{2a}\cdot\mathbf{3})$ の構造を示した。

Figure 2と同様のエネルギー変化であり、この反応の過程も $A \rightarrow A^* \rightarrow B' \rightarrow F' \rightarrow E$ と判断される。エネルギーで A^* が単独反応の場合より 3.1kcal/mol 高いなどは、主に $\mathbf{1a}^*\cdot\mathbf{3}$ より $\mathbf{1a}\cdot\mathbf{3}$ の水素結合作用が約 2kcal/mol 大きいことによる。 $\mathbf{1a}^*$ が Φ_{1236} で正で、 $\mathbf{2a}$ で Φ_{1634} で正であるので、(*R*)-**2a** が誘導されている。即ち (*I*)-3 により (*R*)-**2a** が有利に生成した 2.2 節の実験結果が再現されたことを意味する。

3.3 **1a**•(*d*)-3 は光励起による変化で (*S*)-**2**•(*d*)-3 となることの検証

コンピュータ上で (*d*)-3 を用いると **1a** から (*S*)-**2a** が不斉誘導されるか検証した。

Figure 7に、**1a**•(*d*)-3 について Figure 6 と同様の解析を行い、 A , A^* そして E の結果を示す。

$A(\mathbf{1a}\cdot(\mathbf{d})\cdot\mathbf{3})$ と $A^*(\mathbf{1a}^*\cdot(\mathbf{d})\cdot\mathbf{3})$ のエネルギーは 3.2 節の

Figure 7. MO verification on photoisomerization from **1a**•(*d*)-3 to (*S*)-**2a** (PM3).

それと全く同じで、 A^* 中の $\mathbf{1a}^*$ の立体化学は二面角 Φ_{1236} と Φ_{1634} が、前項のそれと逆符号 $\Phi_{(-)}$ になっている。また E の中で (*S*)-**2a** が誘導された。これらの現象は 3.1.3 項の立体化学の変化と同様である。従ってキラルなホストは水素結合により、不斉な配座平衡のポピュレーションを上記のように片寄らせる役割をしていることが推定された。

3.4 **1a** と Bach らのキラルラクタムホスト **6** との相互作用と (*R*)-**2a** 生成などの検証

Bach らは Kemp's イミドラクタムのイミド部片側還元体の不斉分割を行い、キラルなホスト **6** を合成し、その **1a**•**6** 錯体などの 76° K での光異性化により (*R*)-**2a** (ee18%) などを得ている (Schem 3)[11]。そこで我々は分子シミュレーションによる $\mathbf{1a}\cdot\mathbf{6}$ 、 $\mathbf{1a}^*\cdot\mathbf{6}$ そして $\mathbf{2a}\cdot\mathbf{6}$ 結果を得、Figure 8に示す。

6 により $\mathbf{1a}^*(+)$ そして、(*R*)-**2** に誘導される。このように彼らの不斉合成の実験結果をシミュレーション出来た。**1a** の 3-H, 6-H が **6** の残基部に近くなる、立体障害の少ない $[4\pi]$ 逆旋反応と考えられる。

Scheme 3

Figure 8. MO verification of the photoisomerization from **1a · 6** to (R)-**2a** (PM3).

4 1 から 2 への光変換の大きな吸熱エネルギー等の考察

1と2のエネルギー差は約50kcal/molであり、1の置換基により、その値は変化することが分かり、2の収率も4-位、N-位置換等で100%近くになる[10c]。この系は、太陽エネルギー蓄積や光記録材料などとして研究開発中のNBD-QCシステム系[10]のエネルギー差約21kcal/mol[10b]の2倍強の蓄積となる。そのような材料への観点から本節で、1) 逆反応(2 → 1)ステップのエネルギーコントロール法、2) 可視部光吸収化の情報、を追加する。なお1 → 2の光反応機構と共に、2a → 1aの熱反応はWH則では禁制であるが、溶媒中130°で起り、固相では160°で起こったというデータがある[10d]。

4.1 逆反応(2a → 1a)のエネルギーデータとコントロール法

Figure 2における2a $\xrightarrow{\Delta}$ 1aの熱変化のTS(F点)は2a(E点)より37.2kcal/mol高く、A* → B''(28.5kcal/mol)よりも大きい。従って高ひずみ化合物の2aがかなり安定的に得られる事実が検証された。一方で蓄積されたエネルギーをより容易に放出し、サイクルさせるにはTS2を低くする方法・条件が望まれる。Figure 9

Figure 9. Molecular simulation of acid catalysis for back valence isomerization (2a → 1a) (PM5).

に2aの酸触媒下の、 r_{3-6} の拡大による1a化の計算データ (rel. HOF(kcal/mol)) を示す。

TSの相対HOFが31.7kcal/mol、と5.5kcal/mol下がり、熱反応が起る値になった。Figure 2の、プロトン化しないときよりTSの大きな低下があることを示唆する。従ってリサイクルでは酸触媒が推奨される。また2a · H⁺と1a · H⁺のエネルギー差は60kcal/molと拡大し、変換の容易さと可視光部発光やその応用も考えられる。

4.2 可視光吸収・変換化合物について

2-ピリドンの光吸収は $\lambda_{\text{max}} = 300 \text{ nm}$ ($\log \epsilon \approx 4$)程度であり、さらに長波長吸収と大きい ϵ が望まれる。3,4,6-トリフェニル-2-ピリドン類固体はピレンよりも大きい発光強度のブルー蛍光を持つことで大変興味深い[17]、 λ_{max} は340nm付近であり、2-ピリドン骨格ではそれ程伸びない。Figure 10にN-メチル-3-イソキノロン体(7)[18]のPM5法によるUV吸収 $\lambda_{\text{max}} = 392 \text{ nm}$ (π - π^*)とその光原子価異性体(8)への変化のデータを示した。A*等の記号はFigure 2と同じ意味をもつ。7は可視光吸収も可能であり、エネルギー差B''-A*値、F-E値の小さいこと、P1プロセス($S_{1,0}$)とP2プロセス($S_{0,n}$)との接近があり、重なりが考えられることなどから、この系は太陽エネルギー蓄積に効率よく対応すると期待される。

また多環縮合系のペンタセン骨格は有機EL材料として開発展開中であり、幅広い可視スペクトルをもつので本反応でも興味をもたれ、検討した。すでにNBD ⇌ QC系には置換基情報がある[8]。その情報を

Figure 10. Molecular simulation data for photoreaction of N-methyl,1-trifluoromethyl-3-isquinolone(7) to the valence isomer(8).

Figure 11. Molecular simulation data for photoreaction of 6-trifluoromethyl-pentacene(9) to the valence isomer(10).

考慮し、6,13-ジ置換ペンタセン (**9**) は Figure 11の光原子価異性体 (**10**) へのエネルギーパターンを得た。太陽エネルギー蓄積・可視光変換材料等への応用が考えられる。

5 結論

2-ピリドン(**1**)の光励起による不斉なDewarピリドン(**2**)生成を実験し、反応プロセスとエネルギーをMO法により動的に解析した。ホストによる不斉化の原因と条件が明らかとなった。また面白い試算と提案をした。

1) 実験では、水素結合能をもつ不斉なホスト、イミドアミド **3**~**5**を合成し、**1**·(*l*)-**3**などとして光励起し、不斉な **2**生成を行った。また Bach のホスト **6**による **2**[11] と比較した。

2) MO 解析ではまず、(1) **1**の S_1 励起種 1^* は光学異性な平衡体 ($1a^*_{\Phi(+)}$ と $1a^*_{\Phi(-)}$) であり、その障壁は 8-9kcal/mol と推定された (二面角 $\Phi_{(+)}$ = Φ_{1236} = +17.4°)。

(2) $r_{3,6} \div 2 \text{ \AA}$ の失活 ($S_{1,0} \rightarrow S_{0,n}$) で $\Phi_{(+)}$ 体から (*R*)-**2**、 $\Phi_{(-)}$ 体から (*S*)-**2**の生成となる。

3) 高い収率のメトキシ置換体 **1b**等の解析も行い、**2**生成条件の知見を得た。

4) **1**·(*l*-プロリノール)-**3**((*l*)-**3**)の光反応での (*R*)-**2**生成は、**1**·(*l*)-**3**の S_1 励起で $1^*_{\Phi(+)}$ ·(*l*)-**3**となり、 $r_{3,6}$ の減少と失活により、(*R*)-**2**·(*l*)-**3**と進行して (*R*)-**2**生成に至ると説明される。

5) MO 解析による検証追加

(1) (*d*)-**3**利用による解析：**1**·(*d*)-**3**からは次式で (*S*)-**2**が生成する。

(2) Bach らのホスト **6**による (*R*)-**2**生成の解析：**1**·(*R*)-**6**からは次式で (*R*)-**2**が生成する。

6) (1) 逆反応 (**2** → **1**) を効率よく起こす酸触媒の方法を提案した。

(2) 可視光吸収材の 3-イソキノロン (**7**) とその原子価異性体 (**8**)、および同じくペンタセン (**9**) とその異性体 (**10**)、の変換プロセスとエネルギーを試算した。

7) 結局 **1** → **2** の [4π] 逆旋環化の回転選択性は、**1**·(*l*)-**3** の光励起で生成するエネルギー有利な 1^* の、配座異性体の不斉な立体化学によって決まる。 $1^* \cdot (l)\text{-}3$ は $S_{1,0}$ と

$S_{0,n}$ (n は振動レベル) との重なりで失活し、不斉な **2** となる。また逆反応を効果的に起す方法、および太陽光等での変換が期待される系を提案した。

本研究は鹿児島大学学術情報基盤センターにて導入された Gaussian 03W などの計算化学ソフトを用いて、また一部鹿児島大学学長裁量経費を得て行った。感謝申し上げます。

参考文献

- [1] CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology, 2nd, ed., by W. Horspool, F. Lenci, CRC Press, (2004).
- [2] a. J. D. Winkler, M.B. Rouse, M.F. Greaney, S. J. Harrison, Y. T. Jeon, *J. Am. Chem. Soc.*, **124**, 9726 (2002)PubMed doi:10.1021/ja026600a; b. N. Hoffmann, *Chem. Rev.*, **108**, 1052 (2008)PubMed doi:10.1021/cr0680336; c. D. Albrecht, B. Basler, T. Bach, *J. Org. Chem.*, **73**, 2345 (2008).PubMed doi:10.1021/jo7027129
- [3] a.I.フレミング(福井謙一監修、竹内敬人・友田修司訳)、フロンティア軌道法入門、講談社 (1978); b. 友田修司、フロンティア軌道論で化学を考える、講談社(2007) p.180; c. 時田澄男、染川賢一、パソコンで考える量子化学の基礎、裳華房(2005) p.132; d. M. Irie, *Chem. Rev.*, **100**, 1685 (2000); e. 横山泰、光化学、**39**, 162 (2008).
- [4] a.水主高昭、小幡透、下茂徹朗、染川賢一、日化誌、167(2000); b. T. Shimo, K. Somekawa, *Photocycloaddition Reactions of 2-Pyrones* (in [1c]), CRC Press, Section 82, pp.1-19 (2003); c. T. Bach, M. Kemmler, E. Herdweck, *J. Org. Chem.*, **68**, 1994 (2003)PubMed doi:10.1021/jo0264372; d. G. L. Lange, M. G. Organ, M. Lee, *Tetrahedron Lett.*, **31**, 4689 (1990). doi:10.1016/S0040-4039(00)97707-4
- [5] a.徳永大輔、下茂徹朗、橋本浩晃、大戸朋子、染川賢一、*J. Comput. Chem. Jpn.*, **6**, 283 (2007)doi:10.2477/jccj.6.283; b. Y. Odo, T. Shimo, K. Hori, K. Somekawa, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **77**, 1209 (2004);doi:10.1246/bcsj.77.1209c. H. I. Omar, T. Shimo, K. Somekawa, *J. Mol. Struct. (Theochem)*, **763**, 115 (2006).doi:10.1016/j.theochem.2006.01.035
- [6] a. T. Mori, Y. Inoue, *CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology*, 2nd, ed., by W. Horspool, E. Lenci, CRC Press (2003) Chap.16-1; b. H. Hashimoto, T. Shimo, M. Atsuchi, M. Mitsushio,

- K. Somekawa, *J. Comput. Chem. Jpn.*, **7**, 135 (2008). doi:10.2477/jccj.H2009
- [7] T. Shimo, K. Sato, W. Wang, T. Obata, T. Iwanaga, T. Shinmyozu, K. Somekawa, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **81**, 894 (2008). doi:10.1246/bcsj.81.894
- [8] a. A. Cox, *Photochemical Aspects of Solar Energy Conversion* (in *Photochemistry* **32**, edit. by W. M. Horspool, The Royal Society of Chemistry (2001) p.407; b. H. Nishino, A. Nakamura, Y. Inoue, *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2*, 1693 (2001) doi:10.1039/b100751n; c. K. Raghavachari, R. C. Haddon, H. D. Roth, *J. Am. Chem. Soc.*, **105**, 3110 (1983) doi:10.1021/ja00348a026; d. M. Z. Kassae, E. Vessally, *J. Mol. Struct. (Theochem)*, **716**, 159 (2005). doi:10.1016/j.theochem.2004.12.006
- [9] M. Matsui, B. Joglekan, Y. Ishigure, K. Shibata, H. Muramatsu, Y. Murata, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **66**, 1790 (1993). doi:10.1246/bcsj.66.1790
- [10] a. N. Katagiri, M. Sato, N. Yoneda, S. Saikawa, T. Sakamoto, M. Muto, C. Kaneko, *J. Chem. Soc. Perkin Trans. I*, 1289 (1986) doi:10.1039/p19860001289; b. N. Katagiri, H. Sato, C. Kaneko, *Chem. Pharm. Bull.*, **38**, 288 (1990); c. H. Hongo, H. Iwasa, C. Kabuto, H. Matsuzaki, H. Nakano, *J. Chem. Soc. Perkin Trans. I*, 1747 (1997) doi:10.1039/a605698i; d. W. L. Dilling, N. B. Tefertiller, A. B. Mitchell, *Mol. Photochem.*, **5**, 371 (1973).
- [11] a. T. Bach, H. Bergmann, K. Harms, *Org. Lett.*, **3**, 601 (2001) PubMed doi:10.1021/ol007004t; b. T. Bach, H. Bergmann, B. Grosch, K. Harms, *J. Am. Chem. Soc.*, **124**, 7982 (2002). PubMed doi:10.1021/ja0122288
- [12] Y. Odo, T. Shimo, M. Kawaminami, K. Somekawa, *Anal. Sci.*, **20**, 119 (2004). PubMed doi:10.2116/analsci.20.707
- [13] 日本化学会生体機能関連化学部会(編)、生体機能関連化学実験法、化学同人(2003), pp.19-33.
- [14] S. Kiri, Y. Odo, H. I. Omar, T. Shimo, K. Somekawa, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **77**, 1499 (2004). doi:10.1246/bcsj.77.1499
- [15] a. <http://www.openmopac.net>; b. 村井昭、中島剛、田原徳夫、*J. Comput. Chem. Jpn.*, **1**, 123 (2002). doi:10.2477/jccj.1.123
- [16] 光化学事典編集委員会(編)、光と化学の事典、丸善 (2002), pp.318-325.
- [17] S. Minakawa, S. Moriwaki, H. Inada, M. Komatsu, H. Kajii, Y. Omori, M. Tsumura, K. Nakamura, *Chem. Lett.*, **36**, 1014 (2007). doi:10.1246/cl.2007.1014
- [18] J. A. Joule, K. Mills, *Heterocyclic Chemistry*, 4th ed., Blackwell Publishing (2007) p.129.

Formation of Chiral Photopyridones by Host-Guest Interaction and Molecular Orbital Analysis of the Energy and Stereochemical Changes

Kenichi SOMEKAWA*, Yuka ODO, Tomoko OOTO, Hiroaki HASHIMOTO,
Jun MIYAJI, and Tetsuro SHIMO

Department of Chemistry, Biotechnology and Chemical Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University 1-21-40 Korimoto, Kagoshima 890-0065, Japan

*e-mail: some@apc.kagoshima-u.ac.jp *Professor emeritus of Kagoshima University

Formations of chiral photopyridones(**2**) from 2-pyridones(**1**) are very interesting as examples of photoreaction theory, chiral syntheses and solar energy-storage. We here report chiral **2** preparation from **1** with chiral hosts(*(l)*-**3** etc.), and molecular orbital analyses of the energy and stereochemical changes.

The synthesized chiral imido-amido host (*(l)*-**3** etc. produced complexes **1a**·(*(l)*-**3** etc., to follow the photoreactions to give (*R*)-**2a**.

Molecular simulation of the excited singlet state (S_1) **1*** showed that **1*** exists as two conformers (**1***_{Φ(+)} and **1***_{Φ(-)}: $\Delta E_K \doteq 8\sim 9\text{kcal/mol}$) to be non-planer and enantiomeric, and **1***_{Φ(+)} was shown to go to (*R*)-**2a** via three kinds of potential energy surfaces(PES).

Formation of (*R*)-**2a** by photoreaction of the **1a**·(*(l)*-**3** complex was simulated to be introduced to **1***_{Φ(+)}·(*(l)*-**3** by S_1 excitation of the **1a**·(*(l)*-**3**, followed by decrease of the r_{3-6} and deactivation to (*R*)-**2a**. We then verified that molecular simulation of similar **1a**·(*(d)*-**3** singlet excitation gives (*S*)-**2a**, and that molecular simulation of **1a**·**6** host-guest experiments by Bachs' also gives (*R*)-**2a**.

Moreover we checked the large energy-storage, substituent effect, and acid-catalyst effects for **1** $\rightleftharpoons$ **2** recycle reactions, and propose new solar energy-storage and photosensitized systems.

Keywords: 2-Pyridones, Photopyridone, Molecular simulation, Chiral host, isomerization, PM5, Transition state analysis, Solar energy storage