痔核と誤診された悪性黒色腫の1例

宮崎県立日南病院

外科：弓 削 静 彦*

柴 田 匡 之 友 寄 英 雄 進 藤 憲 文**

皮膚科：池 田 裕 子***

病理検査科：二 宮 健 二****

はじめに

Malignant Melanoma 悪性黒色腫は稀な疾患でしかも悪性度が強く皮膚及び眼に発生したものは数多く発表されているが、消化管系に原発する事は稀で、肛門直腸部の発生例は欧米では1857年 Moor が報告していらい約250例、本邦においては1929年に江崎が発表してから29例の報告をみるにすぎない。わたくしどもは肛門部に原発したと思われる悪性黒色腫の1例を経験したので多少の文献的考察を加えて報告する。

症 例

患者：田○千○，76歳，女性

主訴：両そけい部腫瘤形成

家族歴：既応歴：昭和43年9月某開業医で痔核といわれて根治手術を受けているが、この時とくに留意せねばならないような注意はうけていない。術1カ月後より両そけい部に腫瘤の発現をみとめたが、特別愁訴ないままに退院した。その後腫瘤は漸次増大してきたので、昭和44年3月9日両そけい部腫瘤形成の主訴で某婦人科を受診し、翌3月10日本院に紹介された。直腸狭窄症状、排便障害なく、便通は1日1行で普通便である。

入院時所見：栄養良好で眼瞼結膜はやや貧血状。血圧180～96mmHg。脈拍は82回/分で調律整。緊張良好。心電図所見としては左室肥大を認める。胸部所見としてはレントゲンにて両下肺野に雲状陰影あり(写真1)。腹部所見では肝、脾を触れず、また腫瘤や圧痛点なども認められなかった。なお、左鎖骨上窩リンパ節の腫大を認めた。局所々見では両そけい部に鳩卵大の腫瘤を数個認め、弾性軟で境界は比較的鮮明、移動性なく、また同部に一致した皮膚の色素沈着は認めなかった。肛門部の11

写真1 入院時胸部単純写

写真2 入院時局所所見

時、6時方向に黒色の小指頭大の腫瘤及び右大陰唇にもマッチ頭大の黒色の腫瘤を認めた(写真2)。直腸指診にて肛門輪直上11時、6時方向に弾性硬の小指頭大の腫瘤

* 久留米大学医学部第一外科客員教授

** 同上 副手

*** 同 皮膚科

**** 同 第一病理

及び後腹膜に鶏卵大の弾性硬の腫瘤を触知した。直腸鏡所見としては肛門輪より約20cm 挿入可能で直判粘膜に器質的变化は認めない。婦人科的、泌尿科的に特記すべき異常はなかった。臨床検査成績は表1に示す通りであ

表 1

臨床検査成績	3 月 18 日	7 月 18 日
血液一般		
赤血球	350×10 ⁴	382×10 ⁴
白血球	7200	8800
ヘモグロビン	71%	76%
ヘマトクリット	36%	39%
尿		
蛋白	±	±
糖	—	—
ウロビリノーゲン	(+)	+
ビリルビン	—	—
メラニン尿	—	—
沈査	白血球数個	白血球・赤血球 扁平上皮数個
尿		
潜血反応	—	—
肝機能検査		
総蛋白	7.5	5.1
A/G	1.53 (60.5/39.5)	1.06 (51.5/48.5)
T.T.T.	3.5	1.1
C.C.F.	—	—
B.S.P. (45分)	0%	
黄疸指数	5.0	5.0
コレステロール	170	148
アルカリフォスファターゼ	5	39.5
酸性フォスファターゼ	1.4	
血清梅毒反応	陰性

写真3 H・E 染色(100×)

る。悪性黒色腫の疑いで3月10日そけい部より試験切除を行った。摘出リンパ節は外見上黒色を呈しており、囊腫状硬度で割を加えるに内容は黒色泥状であった。組織

写真4 H・E 染色(400×)

写真5

写真6

表2 本邦肛門直腸黒色腫例

No.	年 度	発 表 者	年 齢・性	部 位	大 き さ
1	1929	江 崎	31 男	直腸	手拳大
2	37	橋 本	62 男	肛門輪より上方約3cm	2×2cm
3	37	後 藤	62 ?	肛門より3cm上	2×1.5cm
4	41	伴	52 男	肛門輪直上	5.5×5cm
5	42	土 肥	52 男	肛門輪より2cm上	5.5×5cm
6	43	原	男	肛門輪より8cm上迄	
7	43	斉 藤	40 男	直腸	
8	46	渡 辺	42 男	肛門輪直上	7×4×6cm
9	46	藤 村	67 男	肛門部	梅実大
10	50	鈴 (森)	65 男	肛門輪より上方25~12cm迄	クルミ大ポリプ2個
11	58	吉 井	65 男	直腸	鶏卵大
12	58	坪 (倉)	63 男	直腸	
13	59	三 浦	64 男	肛門部	外痔核様
14	60	藤 野	46 男	直腸肛門移行部	5.5×4×3cm
15	60	藤 野	60 男	直腸肛門移行部	鶏卵大
16	60	橋 爪	72 男	肛門部	鶏卵大
17	60	秋 保	69 男	肛門輪より上方4~12cm	鶏卵大
18	61	古 町	54 男	直腸	
19	62	佐々木	62 男	肛門輪直上	鶏卵大
20	64	吉 見	61 男	直腸肛門部	豌豆大
21	65	田 中	71 男	直腸肛門部	3×2.5cm
22	65	柴 田	50 男	肛門部	3×3.5cm
23	65	広 瀬	68 男	直腸	3×3cm
24	66	広 瀬	72 男	肛門輪より3cm	3.2×3cm
25	67	原 田	64 男	肛門輪より5cm	3.5×3.4cm
26	68	高 月	61 男	肛門輪より3cm	4×3×2.5cm
27	68	高 月	67 男	肛門輪より8cm	4×10cm
28	68	高 月	63 男	肛門輪より1cm	4×5cm
29	69	太 中	76 男	肛門部	7×4.5×5cm
30	70	弓 削	76 男	肛門輪直上	小指頭大

診にて転移性悪性黒色腫と確診した。即ち、病理所見としては写真3, 4に示すように蜂窩形成をなし腫瘍細胞の胞体の大きさはまちまちであるが紡錘形のものが多く束状ないし群状の配列を示して増殖し、核分裂及び異形像を著明に認めた。

しかもヘマトキシリン・エオジン染色でこれら腫瘍の細胞質内に多数の暗褐色の色素顆粒を認め、この色素はベルリン青鉄反応で陰性であり、マッソン染色で黒色の明瞭なメラニン色素を同定し得た。

入院後経過：前述の通り両そけい部、後腹膜、ウィルヒョウ氏リンパ節又肺にも転移を認めすでに根治的処置の対称ではなかった。入院後より直ちに制癌剤の投与、即ち、M.M.C. 24mg, 5FU 5000mg, Endoxan, 1200mg, Toyomycin 12mgの各経量を投与した。4月2日

患者の希望もあり姑息的に両そけい部リンパ節廓清術を施行。6月下旬頃より写真5, 6のように大陰唇部の浮腫状腫大と黒色腫の増大をみたのでコバルト照射を始めたが、その後肝腫大、腹水、咳嗽、呼吸困難を訴え、肺転移も増強したので病巣線量4600Radにて中断、昭和44年7月25日死亡した。

考 按

Malignant Melanoma 悪性黒色腫は皮膚、眼に発生しやすく、消化管の発生は非常に稀である。本症はMelanosarkoma 黒色肉腫, Blackcancer 黒色癌, Melanoepithelioma 黒色上皮腫, Melanoblastoma 色素形成細胞腫とも呼ばれているが、非常に悪性度の高いことより現在はまだ単にMelanoma 黒色腫という名が一般

化されている。本症はメラニン色素を有する腫瘍で消化管での発生は1857年 Moor が直腸発生例を報告している。欧米では約250例、本邦では1929年江崎により報告され現在29例にしかすぎない(表2)。また消化管原発の黒色腫は直腸肛門部にのみ見られるようでその発生原因及び発生母地については、Allen 等の Melanoblastic Epithelium, Mann 等の Melanophoren, Masson 等の神経原説等種々の説があって未だ定説がないようである。

メラニン色素証明法としては基底細胞内に介在する所謂色素細胞 Melanocyte がメラニンを産生すると考えられ、色素細胞は tyrosinase を有し、これが酸素の存在の下に tyrosin に作用して Dopa (dioxypyhenylalanine) を形成、これが更に数段階を経てメラニンになるといわれている。切除切片を Dopa 液に浸すと色素細胞は黒変して色素産生能のあることを示すが、担色細胞は陰性で色素産生能のないことを示す。即ち、この Dopa 反応が陽性を呈すれば診断の有力な根拠となる。またメラニン自身の硝酸銀環元能を利用した Masson 染色では黒変したメラニン色素を同定でき、尿についてはメラニン色素を含有する腫瘍組織中の色素原 Melanogen が血中に入り、更に尿中に排泄されるものを検出するもので、その方法としては、(1)尿を放置すれば次第に黒色となり不透明となる。(2)被検尿に硝酸または塩化第二鉄のような酸化剤を加えると Melanogen が酸化されて不溶解性の Melanine に変ずるため暗黒色の沈澱を生ずる。(3)尿にニトロプルシッドナトリウム液及び NaOH を加えて振盪し更に酢酸を加えると青または暗青色に変化する等である。直腸肛門部黒色腫の黒色腫全体に対する度合、直腸肛門部悪性腫瘍に対する度合は表3に示しておいた。人種別についてみると有色人種に少なく、Mayer, Gumport によれば白人42人に対して黒人1人の割合であると報告されている。性別については Allen, Spitz, Mayer, Gumport, Quan, Morson, Volkstädt らはほぼ同率であったと報告し、Braasted は男:女=18:1と、Mason によれば約3.2倍の割に男性が多いとしているが、本邦症例では男:女=10:19とむしろ女性の発生が多い。年令的には他の悪性腫瘍と同じくいわゆる50歳以上の癌年令層に殆ど占められている。発生部位については外国の報告と同じく本邦においてもわたくしどもの症例を加えて肛門部18例(60%)、直腸肛門移行部4例(13.3%)、直腸8例(26.7%)と半数以上が肛門部に発生している。

症状は排便障害、出血、疼痛等であるが、なかには全く無症状に経過して偶然発見される場合もある。転移については他の悪性腫瘍と同じくリンパ行性、血行性、播種性でありわたくしどもの症例も両そけい部リンパ

表3 発生頻度

	黒色腫全体に対する度合(%)	肛門直腸悪性腫瘍に対する度合(%)
Dukes, Bussey (1947)	0.5	
Raven (1948)	5.6	0.2
Braastad, Dockerty, Dixon (1919)	1.6	
Pack, Scharnagel, Gerber (1952)	1.6	0.25
Meyer, Gumport (1953)	0.9	
吉田 (1954)	2.2	
Delaney, Sucdamore, Waugh (1954)	1.0	1.6
Radiumhemmet (1957)	1.3	0.5
Quan, White, Deddisch (1959)		0.5
Pack, Martins (1960)	1.6	1.25
Miles (1931)		0.2
Morson, Volkstädt (1963)		0.25
Teimourian (1963)	0.8	
McSwain (1964)	1.3	
Pack, Ruben, Oropeza (1967)		0.7

(高月ら統計引用)

節、後腹膜転移、会陰部皮膚また肺に転移を認めた。Reven によれば粘膜下組織を通り腸管全周に浸潤し、膀胱、子宮、仙骨部への転移は少ないといっているが、わたくしどもの症例が剖検できなかったのは非常に残念である。鑑別疾患としては直腸ポリープ、直腸癌等があるが、肛門部に発生した場合最も注意せねばならないのは痔核との鑑別である。Allen が1931年に外痔核様黒色腫を初めて報告しているが、その後本症を痔核と誤診した例も数例報告されており、わたくしどもの症例も痔核として処置されたもので痔核が popular な疾患であるがゆえに安易な気持ちではなくその診断に際しては細心の注意を払わねばならない。治療は、(1)手術療法、(2)放射線療法、(3)化学療法及びこれらの併用であるが、一般に早期にそけい部リンパ節廓清を含む腹会陰式直腸切斷術が行なわれているようである。また手術よりもむしろ放射線療法が優れているという報告もある。予後についてみると11年の生存報告もあるが、一般に全く不良でその原因として Pack は、(1)早期治療が困難である。(2)診断が遅れる。(3)悪性度が強く転移が早いことを指適しているが、早期に発見し充分な加療がなされるならば治療の可能性もあるものと考えられる。

むすび

わたくしどもは痔核と誤診された76歳の女性の肛門部に原発したと思われる悪性黒色腫の1例を経験したので、多少の文献的考察を加えて報告した。

(終わりに組織検索上御教示賜わった久留米大学第1
病理学中島敏郎教授に深謝いたします)。

文 献

- 1) Gumport, S. L. and Mayer, H. W. : Ann. Surg., 150 : 989, 1959.
- 2) Raven, R. W. : Proc. Poy. Soc. Med., 41 : 469, 1948.
- 3) 佐々木, ほか : 消化器病の臨床 4 : 211, 1962.
- 4) 高月, ほか : 大腸肛門誌 21 : 42, 1968.
- 5) Morson, B. C. et al. : J. Clin. Path., 16 : 126, 1963.
- 6) Braasted, F. W. et al. : Dis. Colon. Rect. 3 : 15, 1960.
- 7) Mayer, H. W. et al. : Ann. Surg., 138 : 643, 1953.
- 8) 太中, ほか : 癌の臨床 15 : 831, 1969.
- 9) 佐藤, ほか : 臨皮 23 : 707, 1969.
- 10) Pack, G. T., Gerber, D. M. and Scharanagel, I. M. : Ann. Surg., 136 : 905, 1952.
- 11) Allen, A. C. and Spitz, S. : Cancer. Jan., 1 : 44, 1953.

Standardization of Clinical Evaluation in Medical Treatment of Hemorrhoids

T. Sakabe, M.D.

The 3rd Dept. of Surgery, Nihon University

Y. Sumikoshi, M.D.

Central Health Insurance Hospital, Tokyo

Y. Matsushima, M.D., A. Kinugasa, M.D.

Matsushima Hospital, Yokohama

K. Yanagita, M.D.

The 1st Dept. of Surgery, Toho University

It is important to evaluate the clinical response of medical treatment by means of standardized method in comparison between each different kind of drugs.

An attempt to standardize the clinical evaluation of treatment of hemorrhoids was made. The principle of method was to give marks to each symptom of hemorrhoids according to their severity and final evaluation was made by means of percentage of demerit marks between pre- and post-treatment.

Results of oral administration of Fragivix, which is a new oral drug for hemorrhoids, with its double blind test are reported.

An Example of Melanoma Diagnosed Wrongly as Hemorrhoids

S. Yuge, M.D., M. Shibata, M.D., H. Tomoyori, M.D.,

N. Shindo, M.D., Y. Ikeda, M.D. and K. Ninomiya, M.D.

A woman aged 76 years underwent an operation for hemorrhoids. After a month of the operation I observed malignant tumors in both inguinal regions. The regions had been badly swollen. As a result of pathologic diagnosis of the extirpative matter, I ascertained it Melanoma. The therapy with ^{60}Co 4600 Rad, carcinostatic drug (Mytomycin 24 mg, 5FU 5000 mg, Endoxan 1200 mg, Toyomycin 12 mg) did not work well. The Melanoma metastasised on the lungs and other organs and it caused her death. I made the report of this case for the rarity of the Melanoma in the digestive system.