直腸肛門部に発生した細網肉腫の1例

慶応義塾大学医学部外科学教室

高 梨 利 次 安 藤 幸 史 丸 田 守 人
馬 場 正 三 星 野 喜 久

慶応義塾大学病院中央臨床検査部病理

三 方 淳 男

消化管に発生する悪性リンパ腫はまれであり、大腸、直腸に発生するものはさらにまれである。最近われわれは直腸肛門部に発生した細網肉腫の1例を経験したので報告する。

症 例

患者：63歳，男

主訴：肛門部腫瘍

家族歴：特記すべきことなし

既往歴：30歳頃，鼠径リンパ肉芽腫症に罹患したことがある。

現病歴：昭和45年9月初旬，主訴に気付いたが，腫瘍は次第に大きくなり，出血と疼痛を伴うようになった。また頻回に便意を催すが，少量の排便をみるのみになったので，昭和46年1月13日，本院を受診した。

腫瘍は肛門の左側を中心に肛囲約 $\frac{2}{3}$ 周にわたって存在し，辺縁はやや隆起し，平皿状の腫瘍を形成し（写真1），指診では肛門輪より7cmまで達しており，弾性硬である。組織生検で細網肉腫と診断され，昭和46年1月23日手術のために入院した。

現症：体格中等，栄養やや不良，眼瞼結膜に貧血なく，黄疸をみとめない。体温 36.5°C ，血圧150/90，脈搏数76整，咽頭，口蓋，扁桃に異常なく，頸部，腋窩部，鼠径部にはリンパ節の腫大をみとめない。胸部に異常なく，腹部にも腫瘍，圧痛，抵抗などなく，肝，脾を触れない。

諸検査所見：赤血球 454×10^4 ，白血球数7600，血色素量14.4g/dl，ヘマトクリット42.5%，粒球数 20×10^4 ，白血球分画は桿状核1%，分葉核56%，好酸球1%，好塩基球0%，リンパ球28%，単球3%であり，又，骨髓像にも異常をみとめない。便潜血反応陽性，尿所見正常，血清電解質，肝機能検査，心電図いずれも正常であった。

胸部レ線像では縦隔陰影に異常をみとめない。リンパ管造影でも大動脈周囲及び腸骨動脈周囲リンパ節にも異

写真1 肛門外観

常所見はない。注腸透視所見では直腸膨大部に陰影欠損をみとめた（写真2）。以上の所見から直腸肛門部に発生した細網肉腫の診断で，昭和46年2月5日全麻下で手術を行なった。

手術所見：下腹部正中切開で開腹，腹水なく，肝，脾は正常で，胃，小腸，大腸にも何ら病変はみとめられず，また後腹膜リンパ節の腫大もない。直腸病変は前立腺に一部浸潤しており，その他の臓器組織への浸潤，転移はない。

前立腺を一部切除して，腹会陰式直腸切断術を行なった。S状結腸は後腹膜を通して人工肛門となし，一次的に開放し，旧肛門部創は一期的に閉鎖した。リンパ節廓清は下腸間膜動脈を根部で切断し，下腸間膜動脈周囲リンパ節，大動脈周囲リンパ節，腸骨動脈周囲リンパ節，さらに鼠径部リンパ節の廓清を行なった。

剔出標本の肉眼所見：腫瘍は直腸膨大部から肛門部にかけて，ほぼ全周に及んでおり，縦7cm×横8cmの円形で，灰白色を呈している。周辺はやや隆起し，全体的に浅い潰瘍を形成し，所々深い部分もある。境界は明瞭で，剖面でも限局性である（写真3，4）。

組織学的所見：類円形ないし，不整形の大きな核を有する腫瘍細胞が粘膜下層から筋層内にかけて著明に浸

写真2 注腸レ線像

写真3 剔出標本直腸粘膜面

写真5 腫瘍組織像 (H-E 染色)

写真4 剔出標本腫瘍剖面

写真6 腫瘍組織像 (鍍銀染色)

潤増殖している。腫瘍細胞はかなり異型性が強く、核分裂像を認め、特徴的配列はみられない。鍍銀染色では個々の腫瘍細胞と銀線維との関係は極めて密であり、またいわゆる癌蜂巣をみとめず、PAS染色でも粘液産生の所見はみられない。以上の所見から細網肉腫と考えられた(写真5, 6)(1018/71)。また廓清リンパ節はすべて正常であった。

術後経過：術後43日間にエンドキサン1400mg, ビンクリスチン7mgを投与し、4月20日軽快退院した。現在まで6ヶ月を経過しているが、再発の徴はない。

考 案

リンパ組織より発生する腫瘍は今日なお発生、病理、分類などに関して、統一した見解がないようであるが、一般に悪性リンパ腫とは、Hodgkin's disease, lymphosarcoma, giant follicular lymphoma, reticulum cell sarcoma などリンパ組織より発生する腫瘍を総称している。

これらの腫瘍は単一のリンパ節または一群のリンパ節から発生し、それが他所のリンパへ蔓延して行くのであるが、多中心性に発生するのか、原病巣から転移性に拡がるのか疑問のあるところである。その経過は他の悪性腫瘍と同様に体重減少、衰弱などを伴い、悪液質、貧血、その他の合併症によって死亡することが多い。また末期には末梢血中に腫瘍細胞の出現をみることがある¹⁾。

消化管に発生する悪性リンパ腫の頻度については、Warren²⁾は消化管悪性腫瘍3132例中28例、0.9%であり、Irvine³⁾は935例中32例、3.4%と云っているように、まれなものである。

年齢ではLoehr⁴⁾によると100例中2歳から81歳に及び、平均54歳であるという。

男女比は多くの報告は、およそ2:1で男に多い⁷⁾。

消化管における発生部位については、Loehr⁴⁾は100例中胃64例、小腸25例、虫垂2例、大腸10例で、そのうち4例が直腸であったとのべている。しかしWychulis⁵⁾は、大腸に原発した悪性リンパ腫50例のうち盲腸部26例であるのに対し、直腸に発生したものはなく、S状結腸直腸移行部と横行結腸に病変のある多発例が1例のみであったと報告している。

本邦における直腸肉腫を集めた塩谷⁶⁾の報告によると、46例の直腸肉腫のうち細網肉腫は芝⁷⁾及び塩谷⁶⁾の2例のみであったという。

直腸にはリンパ網内系の反応性増殖があり、通常の場合にはlymphoid polypの形をとる。Helwig¹³⁾によるとこのような腫瘍では組織学的には正常のリンパ濾胞がみとめられるという。本例では腫瘍細胞は多形性の大き

な核と好酸性胞体を有する異型細網細胞であり、リンパ濾胞の存在はみとめられない。

悪性リンパ腫の治療は、化学療法と放射線療法が有効とされる。化学療法ではビンカ・アルカロイド、ブレオマイシンなどが有効とされている⁸⁾⁹⁾。また放射線療法については以前より本疾患の局所療法として有効であるといわれていたが、全身に拡大した症例に対しても有効であることが報告されている¹⁰⁾。

悪性リンパ腫に対する手術療法については、本症が局所性疾患かあるいは全身性病変であるか問題のあるところであるが、Warren²⁾, Irvine³⁾, Dawson¹¹⁾, 芝⁷⁾, 坂井¹²⁾らは本疾患の手術施行例の中に長期生存を示す例があり、外科治療の予後は良好であると云っている。本例では直腸肛門部に発生した限局性の細網肉腫であり、手術療法の適応と考えられ、発生部位からリンパ節廓清を含む直腸癌手術を施行し、化学療法を追加した。

む す び

直腸肛門部に発生した細網肉腫のまれな一例に腹会陰式直腸切断術を行ない、六ヵ月後の現在再発の徴をみない。引続き経過観察中である。

文 献

- 1) Robbins, S. L.: Pathology, 3rd edition, 667 Saunders Company, Philadelphia & London, 1967.
- 2) Warren, S. and Lulenski, C. R.: Primary Solitary Lymphoid Tumors of the Gastrointestinal Tract. Ann. Surg. 115: 1, 1942.
- 3) Irvine, W. T. and Johnstone, J. M.: Lymphosarcoma of the Small Intestine with Special Reference to Perforating Tumors. Brit. med. J. 42: 611, 1954.
- 4) Loehr, W. J., Mujahed, Z., Zahu, F. D., Gray, G. F. and Thorbjarnarson, B.: Primary Lymphoma of the Gastrointestinal Tract. Ann. Surg. 170: 232, 1969.
- 5) Wychulis, A. R., Beahr, O. H. and Woolner, L. B.: Malignant Lymphoma of the Colon. Arch. Surg. 170: 232, 1966.
- 6) 塩谷謙二, 泊康男, 高橋一郎: 直腸細網肉腫の1例, 外科診療, 8: 1498, 昭和41年.
- 7) 芝茂, 上西力: 消化管の細網肉腫, 最新医学, 19: 1836, 昭和39年.
- 8) 木村禰代二, 他: 悪性リンパ腫の化学療法, 日本臨床, 27: 1593, 昭和44年.
- 9) 木村禰代二, 他: 悪性リンパ腫の化学療法, 最新医学, 24: 816, 昭和44年.
- 10) Kaplan, H. S.: Clinical Evaluation and Radiotherapeutic Management of Hodgkin's Disease and the Malignant Lymphomas. New

Engl. J. Med. 278 : 892, 1968.

- 11) Dawson, I. M. P., Cornes, J. S. and Morson, B. C.: Primary Malignant Lymphoid Tumors of the Intestinal Tract. Brit. J. Surg. 49 : 80, 1961.

- 12) 坂井保信 : リンパ性細網肉腫の生存期間とそれ

に關与する要因について, 日本網内系学会会誌, 7 : 239, 昭和42年.

- 13) Helwig, E. B., et al.: Lymphoid Polyps (Benign Lymphoma) and Malignant Lymphoma of the Rectum and Anus. Surg. Gynec. & Obst., 92 : 233, 1951.

2. A Report of a Case of Reticulum Cell Sarcoma of Rectum

T. Takanashi, M.D., K Ando, M.D., M. Maruta, M.D.,
S. Baba, M.D., Y. Hoshino, M.D. and *A. Mikata, M.D.

Department of Surgery, Keio University School of Medicine

*Section of Pathology, Institute of Laboratory Medicine, Keio University

A case of reticulum cell sarcoma of the rectum encountered in our department was reported. Only a very few cases have been reported in the world literature.

Patient was a 63-year-old male, complaining of anal bleeding. An elastic firm ulcerated tumor was found at the anal canal, part of which was bulging through the anus. Digital and anoscopic examination revealed the upper border of the tumor was approximately 7 cm from the dentate line. Biopsy revealed that the tumor was reticulum cell sarcoma. Fluoroscopic examination was carried out, to rule out the multi-centric lesions. Radical operation, synchronous combined abdominoperineal excision of rectum was performed including the dissection of inguinal and para-ortic lymphnodes. Resected specimen was also proved to be a primary reticulum cell sarcoma of the rectum.

Chemotherapy (1400 mg of Cytosan and 7 mg of Vincristine) was given postoperatively. The patient is in good health as of 6 months after the surgery.

3. Etiology and Treatment of Rectal Procidentia

S. Tsuchiya, M.D., H. Shimazu, M.D. and H. Nakano, M.D.

The 1st Department of Surgery, Tokyo University, School of Medicine

Thirty cases of rectal procidentia underwent various operative procedures were reported. The incidence rose to a peak in the third decade in both sexes but there was another peak in the seventh decade in the female. In contrast to the fact that the disease is more prone to occur in the female in Europe and America, there were more male patients in our series as in most of the Japanese reports. There was an unusual case, a 16-year-old male patient, who had procidentia with particular form of rectal adenomata in association with abundant rectal secretion resulting in hypoproteinemia and hypopotassenemia, which disappeared after pull-through resection of the rectum.

The commonest antecedant etiologic condition was constipation. Electro-myographic study was carried out to verify the dysfunction of the pelvic floor in cases of the rectal prolapse. The dysfunctioning pelvic floor is an important precipitating condition, if not a primary etiology, in developing and accelerating the prolapse.

Of manifold therapeutic procedures, Roscoe-Graham's operation was most effective to prevent recurrence. The Gant-Miwa plication method with Thiersch wire was proved to be a simple but effective procedure and worthy of trial.