肛門疾患に対するゼロイドの使用効果

弘前市 東北肛門病院

鳴 海 裕 行

弘前大学医学部 第2外科

今 充 阿 保 優 高 野 歆

肛門疾患に対する保存的療法の一つとして新しく開発されたゼロイド Zeroid の臨床効果について検討する。これは長さ10cm, 外径1.2cm のプラスチック製円筒状の器具で, 中に冷却液が入っている。これを通常の冷蔵庫内で -4°C に凍結させ肛門部の局所的冷却を行なうものである。

術前のもの30例, 術後のもの20例, 計50例に使用し, 82.0%の症例に臨床症状の改善ないしは消失をみた。特に出血・疼痛に対して極めて有効であった。

以上の詳細について述べるとともに, 肛門疾患の保存的治療の一つとしてゼロイドは今後主要な地位を占めるものと予測するものである。

I. はじめに

従来痔核, 脱肛, 裂肛などに対する保存的療法としては, 刺激物を避け, 便通を整え, 適當の運動をし, 入浴することによって局所の循環をよくし清潔を保つようにするなどの方法がとられている。また古くから無数に出現している軟膏や坐薬があり, 最近では経口治療剤も出現し, 多くの人々に用いられている訳である。

しかしながら保存的治療にはおのずから限界があり, その対象とされるものは初期のごく限られたもののみとされている。また軟膏や坐薬の効果についても批判¹⁾²⁾のあるところである。大部分のものはすでに手術適応とされるべきものでありながら, 専門医を受診する際には日数も経ちかなり増悪した状態にあるのが普通である。手術忌避の気持ちが強いために, 日夜苦痛に耐えている患者の何と多いことであろう。

一方, 根治手術の適応とされ, 患者も手術を希望しながら妊娠中であるとか, 他の重篤な合併症があるとか, 高齢者であるとか, また仕事の都合でどうしても保存的治療に頼らなければならない場合も屢々経験するところである。このような症例に対して従来とられて来た方法ではわれわれ臨床医がその治療に戸惑うことも多く, 何か違った新しい治療方法が期待されていた。

今回, ゼリア新薬工業より新しく考案されたゼロイドの提供を受け, その効果について検討する機会を得た。すなわち局所を直接冷却 cooling することによってその治療効果を期待するという方法である。興味ある知見を得たので報告する次第である。

II. ゼロイド (Zeroid) とその使用方法

ゼロイドは写真1の如く全長10cm, 外径1.2cm の円筒状のもので, 基部の2cm の部分が把手となっている。プラスチック製の容器に冷凍液が入っており, これを -4°C に凍結させて肛門に挿入し, 局所的冷却を行なうことを意図としたものである。普通の冷蔵庫のフリージングボックス内で6~8時間で -4°C に凍結される。表面にゼリーを塗って肛門部へ挿入し, 約5分間放置しておく。通常は1日1回とするが, 2ないし3回使用しても差し支えない。使用後洗滌すれば半永久的に使用可能である。

写真1 ゼロイド Zeroid

全長10cm, 外径1.2cm の円筒状。中に溶液が入っている。冷蔵庫で -4°C に冷却後, 先端にゼリーを塗って肛門に挿入する。

III. 効果判定基準

小平, 柳田, 坂部, 隅越ら³⁻⁶⁾の提唱する臨床効果判

定基準に従った。すなわち痔核、疼痛、出血、脱出、腫張、痒感、分泌物の7つの臨床症状と、これに既応歴、罹病期間を加えた9項目について使用前と使用後の判定時とに採点する。その減点率について

85以上を著効

84~70を有効

69以下を無効

とした。

使用期間は著効が認められたものは別として、効果の認められないものは一応14日間で打ち切りにした。

IV. 臨床例

症例は表1の如く男性30名、女性20名の計50例である。年齢をみると最高が87歳、最低が17歳で、30~39歳台が最も多くなっており、平均年齢は39.2歳であった。

また表2の如く、現在までに手術を受けたことのない症例が30例で、既往で当院にてすでに手術を受けているものが20例となっている。臨床診断は内痔核が合計32例、外痔核2例、裂肛9例、直腸脱3例、さらに術後の創治癒遅延症例が4例となっている。

表1 症 例

	♂	♀	計
10~19歳	3	1	4
20~29	8	4	12
30~39	8	7	15
40~49	5	4	9
50~59	3	0	3
60~69	2	3	5
70~	1	1	2
計	30	20	50

表2 症 例

術前のもの 術後のもの

	例 数		例 数
内 痔 核	18	内 痔 核*	3
内痔核・かんとん	3	内 痔 核 再 発	4
内 外 痔 核	1	内 痔 核 残 存	2
内 痔 核・裂 肛	1	外 痔 核	2
裂 肛	4	裂 肛	5
直 腸 脱	3	創 治 癒 遅 延	4
計	30	計	20

* 1例は痔瘻手術後 2例は外痔核手術後
他はすべて内痔核手術後のもの

V. 成 績

全症例とその使用効果についての一覧表は表3、表4に示してある。これを各疾患毎にまとめてみると表5のようになっている。

すなわち全体として50例中、著効例は29例で、有効例が12例となっており、41例82.0%にゼロイドの効果が認められている。また術前の症例群30例では24例80.0%に、術後の症例群20例では17例85.0%に効果が認められている。

特に手術適応とされながらも保存的治療に頼らざるを得なかった80歳以上の2症例や、妊娠末期のかんとん痔核2例に使用して便利であった(写真2, 3参照)。また直腸脱の3例や裂肛の9例にもいずれも効果が認められている。

さらに術後再手術を要する程の所見がないにもかかわらず、疼痛、出血、脱出感などの愁訴が長期間残存する症例にわれわれは屢々遭遇する訳であるが、これらの症例についても従来他の保存的療法にはみられない著しい効果を認めることが出来た。

いずれにしてもゼロイドの使用しないしは使用後に多少の冷感を訴えるもの以外、壊死、出血、浮腫、疼痛などの合併症や副作用は全く認められなかった。

主な症状に対する効果を検討してみると、表6の如くになっており、痔核に対しては71.0%に効果がみられ、その消失ないしは改善に要する日数の平均値は9.5日であった。

疼痛に対しては75.0%に効果が認められ、その効果発現日数の平均は6.5日であった。

また出血については夫々93.6%、6.2日となっており、脱出腫張に対するそれは73.2%、8.0日となっている。

すなわちいずれの症状に対しても効果が認められるが、有効率や改善までに必要する日数からみて、出血と疼痛に対する効果が特に顕著であった。

VI. 総括および考按

古くから各種の疾患に対し冷却や加温する方法が治療法として認められ、広く一般に行なわれて来た。今世紀前半では特に熱を用いる方法が大いに開発されたが、近年になって低温学の技術も進歩し、多くの疾患に対する主要な治療法としてその地位を占めるに至った。すなわち、液体窒素やその他の寒冷発生材料、ならびに器具・器械等により胃潰瘍、皮膚瘡、血管腫、尖圭コンジロームなどの皮膚疾患、眼科、内耳疾患、鼻出血、慢性子宮頸管炎、前立腺外科、肝外科、脳外科などの治療に利用され、特に血管組織や出血に対する治療に優れた実績を

表3 症 例 (術前のもの)

症 例	姓 名	年 齢	性	病 名	主な症状の改善	判 定	期 間
1	山○要○郎	46	♂	内 痔 核	10→8	無効	14日(現在継続)
2	坂○伸○郎	40	♂	"	7→0	著効	3日
3	藤○と○え	30	♀	"	7→0	著効	12日
4	中○ 角○	43	♂	"	7→0	著効	4日
5	川○ ツ○	67	♀	"	8→1	著効	4日
6	山○ 隆	20	♂	"	9→4	無効	14日
7	一○ 実	62	♂	"	9→0	著効	2日
8	斉○ 峰○	36	♂	"	7→2	有効	13日
9	古○ 満○	52	♂	"	7→0	著効	5日
10	原○シ○子	42	♀	"	7→0	著効	5日
11	藤○弥○郎	62	♂	"	12→7	無効	7日(現在継続)
12	安○ 俊○	87	♂	"	11→2	著効	14日
13	成○ 則○	17	♂	"	9→2	有効	5日
14	工○ 七○	44	♂	"	12→5	無効	14日(現在継続)
15	松○ 雅○	20	♂	"	8→2	有効	8日
16	西○ 満	26	♂	"	8→1	著効	12日
17	工○ 幸○	34	♂	"	8→0	著効	3日
18	桜○ 一○	47	♂	"	14→9	無効	8日(現在継続)
19	阿○ 幸○	24	♀	内痔核かんとん(妊娠9カ月)	21→3	著効	7日
20	黒○ 永○	25	♀	内痔核かんとん(妊娠10カ月)	21→6	有効	7日
21	福○ ト○	48	♀	内痔核かんとん(気管支喘息)	16→14	無効	11日(現在継続)
22	下○ 尚○	28	♂	内 外 痔 核	6→0	著効	14日(現在継続)
23	樋○ミ○エ	23	♀	内痔核・裂肛	7→0	著効	8日
24	花○ 純○	28	♂	裂 肛	4→0	著効	8日
25	工○ イ○	69	♀	"	6→0	著効	2日
26	木○ 幸一	39	♂	"	3→1	有効	7日(現在継続)
27	新○ 巖	39	♂	"	7→1	著効	5日
28	横○ な○	83	♀	直 腸 脱	5→0	著効	5日(現在継続)
29	清○ 正○	59	♂	"	8→0	著効	7日
30	神 ○フ	44	♀	"	7→1	有効	14日(現在継続)

あげている。従って出血性の肛門疾患にもこのような冷却療法を応用できることは当然考えられる訳である。

しかしながら一般に使用されるためには、いわゆる Cryosurgery⁷⁾⁸⁾のような極端に低い温度(-120°C)では freezing injury を生ぜしめる危険がある。従って組織に変化を来たすような冷凍 freezing ではなく、あくまでも冷却 cooling でなければならず、その目的にあった器具としてゼロイド Zeroid が開発された訳である。これは特殊な溶液により通常の冷蔵庫で5~8時間で-4°C に凍結されるという⁹⁾(図1参照)。またゼロイドの挿入時間は5分が適当とされている¹⁰⁾(図2, 図3参照)。蔵本¹⁰⁾、豊田¹¹⁾らによれば、ゼロイド冷却による直腸肛門部の組織学的変化は認められず、あくまでも機能的作用に止どまるという。溶液についても一法師¹²⁾によれば人体に全く無害であるという。臨床効果につい

ては、塚本¹³⁾、五戸¹⁴⁾、有広¹⁵⁾、蔵本¹⁶⁾、斉藤¹⁷⁾らによって少数例ではあるがその有用性が確認されているところでもある。

著者らは50例についてその臨床効果を検討した訳であるが、41例82%にその有効性が認められている。特に出血、疼痛についての効果が著しいことは特記すべきことであろう。又妊娠中や高齢者や年少者、他の疾患の合併などで手術不能な症例に使用して便利であった。さらに自験例では術後の愁訴残存例にも20例中17例、85%に治療効果が認められている。少くとも三枝¹²⁾の批判する坐薬の効果よりは優れた成績と判断してよいであろう。今後肛門疾患の保存的治療方法として主要なる地位を占めるものと思われる。

以上の成績について今後の検討を要する点を2, 3あげると、

表4 症 例 (術後のもの)

症 例	姓 名	年 齢	性	既往手術	病 名	主な症状の改善	判定	期 間
1	奈○岡○市	34	♂	痔瘻手術	内痔核	11→0	著効	2日
2	米○ 豊	17	♂	外痔核手術	"	6→0	著効	5日
3	下○ 節○	26	♂	"	"	13→5	無効	14日(現在継続)
4	三○ 達○	18	♂	"	内痔核再発	13→10	無効	14日(現在継続)
5	村○ 憲○	37	♂	内痔核手術	"	6→1	有効	14日
6	鎌○ ヤ○	69	♀	"	"	8→2	有効	14日(現在継続)
7	中○ 直○	25	♂	"	"	7→0	著効	5日
8	北○ テ○	32	♀	"	内痔核残存	9→1	著効	7日
9	宮○ 洋○	35	♀	"	"	12→7	無効	7日(現在継続)
10	花○ 瑞○	37	♂	"	外痔核	7→0	著効	2日
11	磯○ツ○エ	30	♀	"	"	5→0	著効	2日(現在継続)
12	五○嵐○子	32	♀	"	裂 肛	5→1	有効	14日
13	千○ 勝○	31	♂	"	"	6→1	著効	3日
14	吉○き○の	47	♀	"	"	7→0	著効	7日
15	根○イ○ヨ	38	♀	"	"	4→0	著効	8日
16	工○ 義○	27	♂	"	"	5→0	著効	2日
17	下○ 春○	35	♀	"	創治癒遅延	6→1	有効	14日(現在継続)
18	三○千○子	29	♀	"	"	5→1	有効	10日
19	鎌○ 晴○	51	♂	"	"	5→1	有効	14日
20	後○美○子	18	♀	"	"	7→0	著効	7日

表5 成 績

術前のもの

	著効	有効	無効	計
内 痔 核	10	3	5	18
内痔核かんとん	1	1	1	3
内 外 痔 核	1			1
内 痔 核・裂肛	1			1
裂 肛	3	1		4
直 腸 脱	2	1		3
計	18	6	6	30
	24(80.0%)			

術後のもの

	著効	有効	無効	計
内 痔 核	2		1	3
内 痔 核 再 発	1	2	1	4
内 痔 核 残 存	1		1	2
外 痔 核	2			2
裂 肛	4	1		5
創 治 癒 遅 延	1	3		4
計	11	6	3	20
	17(85.0%)			
総 計	29	12	9	50
	41(82.0%)			

第1に判定基準の問題があげられる。著者らが判定基準としてとりあげた小平ら³⁻⁶⁾の方法では多少の疑問点が残る。すなわち痔核の大きさが小指頭大のものとかすかに存在するものとに2点の差をつけるのが果たして適当であろうか。第Ⅲ度の痔核は嵌頓しているものの範疇に入れてよいのかどうか。既往歴のあるものをすべて1点つけてよいのかどうか。罹病期間の10日間以上のものは2点にするなど検討すべき点が多い。ただ現在他の適当な治療効果についての判定基準がないため、この基準に則らざるを得ないということである。

第2に著者らは治療期間を一応14日間で打ち切りにして

真写 2 妊娠中のかんとん痔核 (ゼロイド使用前)
25歳、妊娠10カ月の女性。痔核がかんとんし、浮腫と血栓が著明である。激痛を伴う。

写真3 妊娠中のかんとん痔核（ゼロイド使用後）
ゼロイド使用後7日目。痔核は縮小，浮腫はなくなり，疼痛も消失している。

表6 各症状に対する効果

痔核に対する効果

	著効	有効	無効	計	効果発現までの日数
例数	17	5	9	31	平均 9.5日
	22(71.0%)				

疼痛に対する効果

	著効	有効	無効	計	効果発現までの日数
例数	22	2	8	32	平均 6.5日
	24(75.0%)				

出血に対する効果

	著効	有効	無効	計	効果発現までの日数
例数	37	7	3	47	平均 6.2日
	44(93.6%)				

脱出・腫脹に対する効果

	著効	有効	無効	計	効果発現までの日数
例数	23	7	11	41	平均 8.0日
	30(73.2%)				

いるが，その理由はそれ以上使用しても大して効果が認められないと判断したからである。しかしながらこの点については多少疑問のあるところであろう。

第3に follow-up の必要性である。冷却による治療効果は組織学的変化がないあくまでも機能的なものだとすれば，当然再発のことを考慮しなければならないであろう。すなわちゼロイドの効果は長期間持続するものかどうか，あるいは一時的な保存療法として価値があるのかという問題である。

第4に，自然治癒の問題がある。著者らはゼロイド使

図1 ゼロイドの温度変化

ゼロイドをフリージングボックス内で冷却した場合の温度変化。冷却ダイヤル中で5～8時間後に -5°C となる。（鈴木ら⁹⁾による）

図2 ゼロイド直腸挿入時の温度変化（人）

挿入前 -7°C であったゼロイドは，挿入後最初の1分間で $+16^{\circ}\text{C}$ となり，5分後には $+29.5^{\circ}\text{C}$ となる（蔵本ら¹⁰⁾による）。

用時に原則として他の治療法は行っていないが，症状の改善や消失が比較的短期間に急激にみられるものは別として，自然経過によるものかゼロイドの効果によるものかは区別し得ないともいえるであろう。

VII. 最後に

肛門疾患に対するゼロイドの冷却効果について検討を加えた。

1) 症例は内痔核を主とした術前のもの30例，術後のもの20例，計50例であった。

2) 50例中41例，82.0%に臨床症状の改善ないしは消失をみた。

図 3 ZEROID による COOLING の直腸（膨大部）温度変化

ゼロイド挿入後直ちに $29^{\circ}\sim 30^{\circ}\text{C}$ に低下するが、5分後には回復し、約20分後に挿入前の温度に戻る。（蔵本ら¹⁰⁾による）

3) 特に出血や疼痛に対し極めて有効であった。

4) 高齢者や妊娠中の症例、さらに他の合併疾患のために手術不能の症例に使用して便利であった。

5) 副作用、合併症の発生は1例も認められなかった。

すなわちゼロイドの臨床効果は優れたものであり、今後肛門疾患の保存的療法の一つとして主要なる地位を占めることが予測される。

文 献

- 1) 三枝純郎：肛門外科の臨床，p. 139，金原出版，1965年。
- 2) 三枝純郎：外科，10，222，1964。
- 3) 柳田謙蔵ほか：大腸肛門誌，21，(3)，43，1968。
- 4) 隅越幸男ほか：診療と保険，10，1059，1968。
- 5) 坂部孝ほか：外科診療，11，89，1969。
- 6) 坂部孝ほか：大腸肛門誌，23，(2)，32，1970。
- 7) 柳田謙蔵ほか：最新医学，27，667，1972。
- 8) 西谷亮一郎ほか：大腸肛門誌，25，(4)，290，1972。
- 9) 鈴木伊豆美ほか：医化学総合研究所，Personal Communication。
- 10) 蔵本新太郎：東邦大学第1外科，Personal Communication。
- 11) 豊田博子ほか：医化学総合研究所，Personal Communication。
- 12) 一法師忠康ほか：ゼリア新薬工業板橋研究所，Personal Communication。
- 13) 塚本長ほか：ゼロイドの使用経験，東北大学第1外科，未発表。
- 14) 五戸達雄ほか：痔核に対するゼロイドの使用経験，東邦大学第1外科，未発表。
- 15) 有広忠雅：分娩後脱肛に対するゼロイド使用知見，慈恵大付属青戸分院産婦人科，未発表。
- 16) 蔵本新太郎ほか：ゼロイド使用経験について，川口工業東部病院外科，未発表。
- 17) 斉藤宏ほか：Zeroid の使用経験，新潟労災病院外科，未発表。

Original Articles

1. Histological Classification of Colo-rectal Polyps

T. Muto

Department of Surgery School of Medicine University of Tokyo, Japan

Benign polypoid lesions of the large bowel were divided into four groups on the basis of histological differences, and clinical implication were described in detail with special reference to malignant potential.

Both juvenile polyps and Peutz-Jeghers polyps are hamartomatous and polyposis in colitis is inflammatory in origin. These polyps and metaplastic polyps are non-neoplastic lesions which have no relation to adenoma or carcinoma in any way.

Adenoma is a benign neoplastic lesion which is subdivided into tubular, papillary and villous adenoma on the basis of the difference of growth patterns. It has malignant potential which is closely related to the size of the tumour. The idea of Morson that for the purpose of clinical diagnosis and treatment, the best criterion for malignancy is invasion through the line of the muscularis mucosae was introduced. If there is no submucosal invasion, the polyp will behave as a benign lesion, provided that it is completely removed. Examples were presented supporting the view that there seemed to be two main courses in the malignant transformation of colo-rectal adenomas.

It is stressed that understanding of histological classification of colo-rectal polyp is very important in the management of the patients with this disease.

2. Clinical Evaluation of "Zeroid" for the Treatment of Anal Diseases

H. Narumi

Tohoku Proctologic Clinic, Hirosaki

M. Konn, M. Abo and N. Takano

The second Department of Surgery, Hirosaki University School of
Medicine, Hirosaki, Japan

The estimation of the clinical effect of Zeroid, which was developed as a tool of conservative treatment for anal diseases, was performed.

Zeroid is a plastic cylinder, 10 cm long, 1.2 cm in diameter, and it contains freezing fluid. Frozen Zeroid at -0.4°C was inserted into anus and local cooling effect was expected.

1) Fifty cases of internal hemorrhoid were tried. The ratio of male and female was 30:20. Average age was 39.2 years old.

2) Once or twice a day, it was used. Inserting time was 5 minutes. Treating pe-

riod was 14 days.

3) Forty one cases out of fifty cases (82%) proved to be effectual for the clinical symptom.

4) It had an instant effect on bleeding or pain.

5) It was convenient especially for the aged patients who could not bear with operation because of severe other diseases. It was also effective for the post operative complaints.

6) No side effect was observed. In conclusion, Zeroid seem to be very useful for the conservative treatment of anal diseases.

3. A Case of Epitheloid Gell Granuloma Disease Node Arising from Ileocaecal Lymph Node

T. Anzai

City of Kawaguchi, Saitama Province, Japan

A case of epitheloid cell granuloma disease was met with by us which arose from the ileocaecal lymph node. This case found out only by histopathological examination after doubtful preoperative and postoperative diagnosis.

The patient was a 31 year old male, a cast-iron worker. About March, 1971, he went to a hospital in his neighborhood, complaining of a pain in the right lower abdomen, emaciation and poor appetite, and his case was diagnosed as chronic gastritis. He underwent treatment for about 5 months as outpatient. In December of the same year, he was hospitalized for two weeks under the diagnosis of acute hepatitis. Again, on February 14 of the next year, he was hospitalized for 2 months under the diagnosis of acute bronchitis. Then in March, the same year this case was diagnosed as right uretero-lithiasis and was transferred to this hospital.

Findings

Blood examination: erythrocytes 3,820,000; leucocytes 8,200; Sahli's test 72%; Al-p 7.0; T-p 6-9; ASLO 100, CRP +6; R-A (-). Abdominal findings: On palpation something tumorous was felt around the surgical wound from appendectomy, but we were not able to tell exactly what it was due to the strong tension of the abdominal wall. On histopathological examination, epitheloid cells were seen accompanied by a number of Langerhans's giant cells and foreign giant cells, and so the case was suspected, first of all, to be sarcoidosis. Kveim's reaction was negative. No shadow was seen in the lungs.

Since this case developed on a single organ, we will report it as epitheloid cell granuloma disease, following the view adopted by the 6th International Conference on Sarcoidosis.