回盲部リンパ節に発生した Epitheloid cell granuloma Disease の1例

埼玉県川口市 長江病院外科

安 斉 恒 雄

術前診断及び術後診断に苦勞し病理組織学的診断に依って始めて解明した回盲部リンパ節に発生せる Epitheloid cell granuloma Disease の1症例を経験した。患者は32歳男子鋳物工, 1971年3月頃から右下腹部痛, るいそう, 食思不振を訴え慢性胃炎の診断で約5ヶ月通院治療同12月から約2週間急性肝炎の診断で入院, 翌年2月14日から約2週間急性気管支炎の診断で入院, 同3月右尿管結石と診断された。同日当院に転医。所見, 血液検査: 血液検査3828, 赤血球382万, 白血球8200, ザーリ72%, Al-P 7.0, T.P 6.9 ASLO 100 C.R.P+6, R-A (-) 腹部所見, 虫垂切除の手術創周辺に腫瘤状のものが触れたが腹壁緊張が強く明瞭に触知出来なかった, 病理組織学的診断でランゲルハンス型巨細胞及び異物性巨細胞を多数伴った Epitheloid cell が見られサルコイドーシスが第一に考えられた, Kveim's Test (-) 肺に陰影なし, 単一臓器に発生した点から第6回国際サルコイドーシス会議の見解に従って Epitheloid cell granuloma Disease として報告する。

結 論

第6回世界 Sarcoidosis 会議において Extrapulmonary Sarcoidosis の発生率は5~10%と発表された。細田氏によれば次の4条件を充たさない Sarcoidosis 症例は Epitheloid cell granuloma Disease と云う形で整理されるという。即ち4条件とは①病理組織学的に Epitheloid cell granuloma であること②臨床的に全身系統病変であること③病因学的に未知であること④免疫学的に細胞免疫不全, クバウム反応陽性であることとなっている。筆者も細田氏の分類に従うものとする。本症例は約一年前から病名不明の形で入院及び外来治療を受け緒種の検査の後1972年3月開腹した所回盲部リンパ節に2個の鳩卵大腫脹が認められたものである。病理組織学的には明らかに Sarcoidosis の所見を呈し免疫学的にはツ反(-) Kveim 反応(-) γ -globulin には著変なし, 胸部X線所見も Sarcoidosis 様陰影が見られず細田氏に従い本病名とした。大腸肛門学会領域の下限は肛門病変であり, 上限は回盲部になるわけであるが境界領域病変の症例報告に意義を認めた。第6回世界サルコイドーシス事務局からの解答では回盲部病変のサルコイドーシスについての統計処理はなされていないと云うことから, その稀少性の上で症例報告とする。

症 例

32歳男子鋳物工

主訴: 右下腹部痛, 食思不振, るいそう

現病歴: 1971年3月, 心窩部痛にて他院にて

慢性胃炎と診断され約5ヶ月間の加療を受けたが病状軽快せず, 他に2~3ヶ所の病院で受診したが診断名はみなまちまちであった。すなわち, 胃炎, 急性肝炎, 気管支炎, 右尿管結石等の病名をつけられた。しかし上記主訴は次第に著明化していった。1972年3月当院に来院直ちに入院指示。

既往歴: 17年前に虫垂切除以外別になし。

家族歴: 父33歳にて戦死, 母40歳にてノイローゼで自殺, 長男34歳健在, 妹30歳健在, 妹1歳の時死亡(死因不明)以上の如く家族歴に肺結核及びその他の結核に罹患した人はない。

初診: 1972年3月1日

入院時所見: 栄養不良, 眼瞼結膜口唇の貧血著明

胸部理学的所見: 正常

腹部所見: 虫垂切除術創周辺に腫瘤様のものを触知したが明瞭ではなかった。

手術所見: 回盲部リンパ節の腫脹, 盲腸起始部より肛門側約15cm 位まで漿膜の炎症著明ゴマ粒大の結節群していた。又, 回盲末端部から口側に約20cm まで漿膜の炎症著明, 盲腸壁は Ödematose Verdicken Morsch. 回盲部リンパ節の大きさは鳩卵大2ヶ, 豌豆大3ヶ確認, 回盲結腸口の狭窄著明。

病理検査所見: ランゲルハンス氏巨細胞及び異物性巨

① 回盲部リンパ節が2コ鳩卵大に腫脹している

② 直腸壁は edematose に肥厚し Morsch である。ゴマ粒大の結節が群集している。

③ 弱拡大、多数のランゲルハンス氏巨細胞及び異物性巨細胞を伴った上皮様細胞がみられる。

細胞を多数伴った上皮様細胞が見られる。結節並びにその陳旧線維化がリンパ節内に多発し凝固壊死巣は全く認められず。結核菌染色、陰性、悪性腫瘍像の疑いなし。

結論および考案

診断は困難であり、術前は腸管癒着症、術後は腸結核との診断をしたのであるが、病理検査にて Sarcoidosis

④ 上記の強拡大

⑤ 上記の強拡大

⑥ 結節並びにその陳旧線維化がリンパ節内に多発しているが、凝固壊死巣は全く認められない

と判定された。本症例の病因に関しては識々の憶測がなされているが症候群として独立して考察するのか或は結核症の一変型であるか明かでない。回盲部リンパ節に原発した症例の集計はなされていないが、最近我が国では種々の臓器の良性悪性を問わず腫瘍は登録するようになりつつある。Sarcoidosis に関しては1960年から登録性になった。多発性、全身性に発生した症例の集計及び分類は行なわれているが、本症例の如き局部にのみ発

生した Sarcoidosis の研究はなおざりになっている。本手術により、術前44kg の体重が術後3ヶ月にて健康時の57kg にまで恢復したことは、今後 Sarcoidosis の治療法として、外科手術の方法論上、問題を提起するものであろう。

文 献

1) 千葉保之他：サルコイドーシス，最新医学，27：

p. 1252-1393, 1972.

2) 細田裕：サルコイドーシスの疫学，医師会雑誌，68：p. 269-272, 1972.

3) 北村包彦：本邦に於けるサルコイドーシスの実態，日本医事新報. No. 2474：p. 27-30, 1971.

4) Hosoda, Y. et al.： The 6th International Conference on Sarcoidosis, Tokyo, September 11-15, 1972.

日本大腸肛門病学会雑誌 26 巻 2 号 正 誤 表

254 頁. Symposium X

誤 正

(I) As_2O_3 4 gm.

Cu (OH) $_2$ 1 gm.

誤 正

S 1 gm. → 0.3 gm.

ethyl aminobenzoate 1 gm.

glycerid ad lio. → lib.

(II) Practiced by us 18 → is reported.

riod was 14 days.

3) Forty one cases out of fifty cases (82%) proved to be effectual for the clinical symptom.

4) It had an instant effect on bleeding or pain.

5) It was convenient especially for the aged patients who could not bear with operation because of severe other diseases. It was also effective for the post operative complaints.

6) No side effect was observed. In conclusion, Zeroid seem to be very useful for the conservative treatment of anal diseases.

3. A Case of Epitheloid Gell Granuloma Disease Node Arising from Ileocaecal Lymph Node

T. Anzai

City of Kawaguchi, Saitama Province, Japan

A case of epitheloid cell granuloma disease was met with by us which arose from the ileocaecal lymph node. This case found out only by histopathological examination after doubtful preoperative and postoperative diagnosis.

The patient was a 31 year old male, a cast-iron worker. About March, 1971, he went to a hospital in his neighborhood, complaining of a pain in the right lower abdomen, emaciation and poor appetite, and his case was diagnosed as chronic gastritis. He underwent treatment for about 5 months as outpatient. In December of the same year, he was hospitalized for two weeks under the diagnosis of acute hepatitis. Again, on February 14 of the next year, he was hospitalized for 2 months under the diagnosis of acute bronchitis. Then in March, the same year this case was diagnosed as right uretero-lithiasis and was transferred to this hospital.

Findings

Blood examination: erythrocytes 3,820,000; leucocytes 8,200; Sahli's test 72%; Al-p 7.0; T-p 6-9; ASLO 100, CRP +6; R-A (-). Abdominal findings: On palpation something tumorous was felt around the surgical wound from appendectomy, but we were not able to tell exactly what it was due to the strong tension of the abdominal wall. On histopathological examination, epitheloid cells were seen accompanied by a number of Langerhans's giant cells and foreign giant cells, and so the case was suspected, first of all, to be sarcoidosis. Kveim's reaction was negative. No shadow was seen in the lungs.

Since this case developed on a single organ, we will report it as epitheloid cell granuloma disease, following the view adopted by the 6th International Conference on Sarcoidosis.