若年者直腸癌について

東邦大学第1外科教室

小野田 肇 加藤祐之助 小林 一 雄
粕川 剛義 吉雄 敏文

29歳以下の若年者直腸癌症例17例を経験した。これら17例と30歳以上の直腸癌症例262例を対照群として、臨床所見、臨床病理学的所見、術後遠隔成績等について検討を行なったところ、若年者例では、colloid carcinoma が2例あり、対照群に比べその占める割合は高く、しかも、この組織型の進展度および予後は非常に悪いことが判明した。しかし、組織学的には adenocarcinoma papillare が多くを占め、対照群に比べ、けしてその悪性度、進展度、予後についても一般的に考えられているほど悪くはないということが判明した。

I. はじめに

直腸癌に対する外科的治療としては、1826年、Lisfrance が腫瘍摘出手術に初めて成功して以来、Vernienil と Kraske によりさらに改良が行なわれ、1895年には、Gerata が直腸のリンパの流れについて示摘し、より根治性の高い治療法が工夫されるべきであることを主張した。

1908年にMiles が腹会陰式直腸切断術を行ない、手術死亡率の著名な低下をもたらし、今日なお、この術式が直腸癌手術の主流をなしている。

近年、本邦でも直腸癌の症例は増加の傾向にあり、消化管癌の内では、胃癌に次いで多い。しかし、癌は普通、中、高年層に多く、若年者に発生することは、比較的、稀とされている。しかも、若年者癌は、一般に悪性度が高く、進展も早いため、予後が悪いというのが諸家の一致した意見である。

しかし、29歳以下の若年者に発生する直腸癌についての詳細な検討を加えた報告は、本邦はもちろん、欧米でも散見する程度である。そこで、著者らの経験した若年者直腸癌症例について、30歳以上の直腸癌症例に対する比較、検討を行なってみた。

II. 症 例

1952年より1973年までの22年間に、東邦大学第一外科教室で外科的治療を行なった直腸癌症例は、279例である。この内で、29歳以下の若年者癌症例は、17例、6.1%である。

1) 年齢、性別比

全症例の各年齢分布では、表1の如くで、50歳から69

表 1 直腸癌全症例の年齢分布

年 齢	例 数		計	%
	♂	♀		
20～29歳	12	5	17	6.1
30～39	17	13	30	10.7
40～49	23	16	39	13.9
50～59	33	36	69	24.8
60～69	52	29	81	29.1
70～79	24	15	39	14.0
80～89	2	2	4	1.4
計	163	116	279	100.0

表 2 若年者症例の年齢分布

年 齢	例 数		計	%
	♂	♀		
～19歳	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	2	0	2	11.8
23	1	0	1	5.9
24	1	1	2	11.8
25	3	0	3	17.6
26	1	1	2	11.8
27	2	0	2	11.8
28	0	1	1	5.9
29	2	2	4	23.4
計	12	5	17	100.0

歳までが全体の53.9%を占めており、癌年齢を示している。

若年者17例の年齢は、22歳から29歳までで、平均年齢、25.9歳であるが、25歳以上が、12例と20代後半に集中している。19歳以下の症例は1例もない(表2)。

性別比は、若年者例では男子12例、女子5例で、2.4:1となり、30歳以上の症例では男女比が1.4:1で、若年者例に、かなり男性の多い傾向がみられた。

2) 病悩期間

初発症状に気づいてから、来院するまでに1カ月半から3年と広範囲にわたっており、約 $\frac{2}{3}$ の症例は6カ月以内に来院手術を受けている。これを男女別にみると、男性では、全例1年以内に来院しているが、女性では、2例が1年以上経て来院しており、30歳以上では、約90%は1年以内に来院しており、約 $\frac{2}{3}$ は6カ月以内に来院手術を受けている。

病悩期間では、若年者の女性に、やや遅れが認められた(表3)。

表3 病悩期間

	例数()内%	
	29歳以下	30歳以上
3カ月以内	5(29.4)	79(30.2)
3～6カ月	7(41.1)	96(36.7)
6～12カ月	3(17.7)	55(21.0)
12～24カ月	1(5.9)	21(8.0)
24～36カ月	—	9(3.4)
36カ月以上	1(5.9)	2(0.7)

3) 臨床症状

来院時主訴は、多量の下血から、紙に血がつく程度の出血が、17例中14例(82.3%)にあり、その他に便秘、肛門部痛、体重減少、排便異常、下痢などがあり、2つ以上の症状を合併したものが多かった。

図1の如く、30歳以上の症例に較べ出血が若年者例に多いことがわかった。しかし、入院時の貧血の状態をみると、Hb 10gr/dl 以下は2例のみであった。又、5kg以上の体重減少は4例に認められ、若年者例での比率は、やや高かった。また、スクリーニングで、無症状で発見されたものは1例もなかった。

4) 診断

直腸癌は、直腸内指診で約80%が、残りは内視鏡で診断できる。

直腸内指診の重要性は、癌腫の発見はもちろんだが、癌腫の硬度と可動性、および癌腫周囲の直腸粘膜の浸潤状態を知ることである。

図1 入院時主症状

内視鏡検査では、生検は当然だが、polypoid 腫瘍と潰瘍形成腫瘍とを見分けることと腫瘍の大きさを知ることが主である。

著者らの若年者例での指診発見率は、14例82.3%である。

補助的診断としての注腸レ線検査は欠かせないものであり、合併病変を認めれば、是非とも colonofiberscopy を行ない悪性の疑いがあれば生検すべきである。また、選択的動脈撮影も欠かせないもので、遠隔転移(特にH-factor)の検索はもとより、下腸間膜動脈撮影による癌腫の浸潤度(P-factor)や左結腸曲の造影の有無を検討し手術時の参考とする。低位直腸肛門部癌では、鼠経リンパ管造影を行ない転移を認めれば手術時同時郭清を行う。

III. 臨床病理学的所見

1) 癌腫占居部位

癌腫の下縁を肛門輪より測定した。3.0cm 未満の肛門部、3.0cm 以上8.0cm までの直腸膨大部、8.0cm 以上の直腸骨盤部に分類した所、肛門部3例、直腸膨大部11例、直腸骨盤部3例で、表4の如く、30歳以上の症例

表4 直腸癌の占居部位 ()内%

	29歳以下	30歳以上
直腸骨盤部	3例(17.7)	59例(22.6)
直腸膨大部	11 (64.6)	143 (54.5)
直腸肛門部	3 (17.7)	60 (22.9)

と同様に、直腸膨大部に集中する傾向にあり、特に両群に有意の差を認めていない。

2) 癌腫の肉眼的分類

切除した癌腫の肉眼的分類では、Borrmann I 型 3 例, Borrmann II 型 9 例, Borrmann III 型 4 例で, 30 歳以上の症例とともに潰瘍形成限局型が多数を占め瀰漫性浸潤型 (Borrmann IV 型) を示すものは, 1 例も認められなかった。

3) 組織学的分類

組織学的には, adenocarcinoma papillare 10 例, adenocarcinoma tubulare 3 例, colloid carcinoma 2 例, carcinoma solidum simplex 1 例, squamous cell carcinoma 1 例で, その細胞異型度をみると, well-differentiated 6 例, moderately-well-differentiated 5 例, poorly differentiated 4 例と, 比較的悪性度の低い分化度の高いものが多かった (表 5). 30 歳以

表 5 直腸癌の組織学的分類 () 内 %

組 織 型	29 歳 以下	30 歳 以上
adenocarcinoma	13 例 (76.5)	232 例 (88.5)
corcinoma simplex	1 (5.9)	13 (4.9)
squamouscell carcinoma	1 (5.9)	8 (3.2)
colloid carcinoma	2 (11.7)	9 (3.4)

上の症例では, adenocarcinoma 232 例, carcinoma solidum simplex 13 例, squamouscell carcinoma 8 例, colloid carcinoma 9 例であり, 若年者例に colloid carcinoma の占める割合が高いようである。

4) 癌腫の大きさ, および深達度

切除標本の癌腫の大きさでは, 最大径が 2.0 cm 以下は 1 例もない. 5.1 cm 以上が 12 例 (75%) あるが, 10.1 cm 以上は 1 例もなかった. 30 歳以上の症例では 2.0 cm 以下 6 例, 5.1 cm 以上 107 例 (51.6%) で, この内 10.1 cm 以上のものが 3 例あり, 平均病期期間がほぼ同じであることを考慮すると若年者例に, より大きくなる傾向が大であると考えられる (表 6).

表 6 癌腫の大きさ () 内 %

cm	29 歳 以下	30 歳 以上
2.0 cm 以下	0 例 (0)	6 例 (2.9)
2.1 ~ 5.0	4 (25.0)	94 (45.4)
5.1 ~ 10.0	12 (75.0)	104 (50.2)
10.1 cm 以上	0 (0)	3 (1.5)

次に深達度では, 癌の浸潤が粘膜下層 (sm) までにとどまるものが 2 例, 固有筋層に浸潤するもの (pm) 6 例, 腸壁外およびその周囲臓器に浸潤するもの (A or S₁₋₃) 9 例である. 一方, 30 歳以上の症例では, 癌の浸

潤が粘膜までのもの (m) 5 例, sm まで 6 例, pm まで 82 例, A or S₁₋₃ まで 85 例であり, 腸壁外およびその周囲臓器に浸潤する割合は, 若年者例 52.9%, 30 歳以上の症例では 47.7% であり, 一般的に考えられているほど若年者癌の浸潤傾向は強いものではないようである (表 7).

表 7 癌 深 達 度 () 内 %

深 達 度	29 歳 以下	30 歳 以上
m	0 例 (0)	5 例 (2.8)
sm	2 (11.8)	6 (3.4)
pm	6 (35.3)	82 (46.1)
A or S ₁₋₃	9 (52.9)	85 (47.7)

癌の大きさと早期癌の関係が, 最近本邦でも問題になっているが²⁾, まだ, 大腸早期癌の定義についての規約は検討の過程にあり, 一応胃癌研究会の早期癌の規約に準じて, 癌の浸潤が粘膜 (m) または粘膜下層 (sm) までにとどまり, 固有筋層 (pm) におよばないものを直腸早期癌と定義すると, 著者らの経験した全直腸癌症例のうち 2.0 cm 以下の微小癌 6 例と早期癌 13 例について検討した. 微小癌 6 例の深達度は, pm 3 例, A or S₁₋₃ 3 例で, このうち, n₁, n₂ のリンパ節転移が, 各 1 例ずつあった. また早期癌 13 例では, 2.0 cm 以下のものは 1 例もなく, 8.0 cm におよぶ 1 例を除いては, すべて 2.1 cm ~ 5.0 cm のものであった. 故に, 癌腫の大きさから, その深達度を予想することは非常に危険である³⁾.

5) リンパ節転移

若年者癌では, リンパ節転移のないもの (n₀) 8 例, 腸管に近接するリンパ節転移のあるもの (n₁) 3 例, 上直腸動脈幹部または中直腸動脈に沿った側方部および鼠経部にリンパ節転移のあるもの (n₂) 3 例, 下腸間膜動脈根部および内腸骨動脈に沿って腹部大動脈周囲のリンパ節転移のあるもの (n₃) 3 例, n₃ より遠位にリンパ節転移のあるもの (n₄) はなかった.

30 歳以上の症例では, リンパ節転移のあるもの 54.4% で, 若年者例 53.0% に比べ, とくにリンパ節転移率での差は認められなかった.

6) 血行転移および腹膜播腫

血行転移では, 肝転移が 2 例あり, 肺転移はなかった. 腹膜播腫陽性例は 3 例である.

30 歳以上の症例では, 肝転移 33 例, 肺転移 5 例, 腹膜播腫 50 例であり, 若年者例に血行転移を認めるパーセントは少ないという結果が出た. 腹膜播腫ではとくに差はなかった.

表 8 病期 (Stage) 分類

Stage	p	n	A or S	D	M
I	1~2	0	0	0	0
IIa	3~4	0	1	0	0
IIb	3~4	1	1	0	0
III	3~4	2	2	1	0
IV	3~4	3	3	2	(+)

注: p (壁深達度)

- 1: 粘膜内にとどまるもの。
2: 粘膜下層にとどまるもの。
3: 固有筋層又は漿膜下層にとどまるもの。
4: 漿膜に達するか又はこれをこえるもの。

n (転移リンパ節, リンパ節群別は UICC-TNM 国分委の方法による)。

A (直腸外膜) または S (漿膜)

- 0: 全く出ていないもの。
1: 辛じて出ているもの。
2: 明らかにしているもの。
3: 他臓器に及んでいるもの。

D (腹膜播種性転移)

- 0: 認めないもの。
1: 癌腫に近接する腹膜にのみ認めるもの。
2: 遠隔腹膜に少数の転移を認めるもの。
3: 遠隔腹膜に多数の転移を認めるもの。

M (遠隔転移)

- (+): 遠隔転移を認めるもの。
(-): 遠隔転移を認めないもの

表 9 直腸癌の Stage 分類 () 内%

Stage	29 歳 以下	30 歳 以上
I	2例(11.7)	11例(4.9)
IIa	5 (29.4)	76 (29.0)
IIb	2 (11.7)	31 (11.6)
III	3 (17.8)	49 (18.4)
IV	5 (29.4)	95 (36.1)
計	17	262

7) 併存病変

若年者直腸癌との併存病変としては, 多発性大腸ポリポージス 1 例, Satellite polyp 2 例, さらに 1 例は, Borrmann I 型の 7.5cm におよぶ癌腫とは別に有茎性 polyp の malignant change を起したと考えられる adenocarcinoma papillare を 2 カ所に併存したものがあつた。30歳以上の症例では, 多発性大腸ポリポージス 1 例, Satellite polyp 18 例で, このうち malignant change の認められたものが 2 例あり, 切除例での併存病変率は, 若年者例では 25.0%, 30 歳以上の症例では 9.4%と, 明らかに若年者例に多かった。

IV. 病期 (Stage) 分類

著者らの採用している大腸癌 stage 分類によると³⁾, (表 8). 若年者例では, stage I 2 例, IIa 5 例, IIb 2 例, III 3 例, IV 5 例で, 表 9 に示した如く, 30 歳以上の

表 10 29歳以下の直腸癌症例の治療および予後

No.	氏 名	年齢	性	組 織 型	深達度	n	Stag	治 療	予 後
1	I.M.	25	♂	adeno. ca. pap.	pm	n ₀	IIa	Anterior resect.	17 年 生 存
2	Y.H.	24	♀	adeno. ca. pap.	sm	n ₀	I	l-hemicolecto- proctectomy	3 年 9 カ月死亡 (他疾患死)
3	A.K.	23	♂	adeno. ca. pap.	sm	n ₀	I	Miles	11 年 生 存
4	M.T.	22	♂	colloid. ca.	S ₂	n ₂	III	Miles	6 カ月死亡
5	M.K.	27	♂	colloid. ca.	S ₂	n ₂	III	Miles	1 年 6 カ月死亡
6	Y.Y.	29	♀	squamous. ca.	S ₁	n ₈	IV	Miles	1 年 3 カ月死亡
7	A.K.	28	♀	adeno. ca. pap.	S ₂	n ₀	IV	Miles	1 年 5 カ月死亡
8	H.T.	29	♀	adeno. ca. tub.	S ₃	n ₃	IV	colostomy	6 カ月死亡
9	K.S.	27	♂	adeno. ca. pap.	pm	n ₁	IIb	Miles	7 年 11 カ月生存
10	S.T.	22	♂	adeno. ca. pap.	S ₃	n ₁	IV	Miles	1 年 6 カ月死亡
11	E.U.	25	♂	adeno. ca. tub.	pm	n ₀	IIa	Anterior resect.	6 年 4 カ月生存
12	Y.R.	26	♂	ca. simplex.	S ₁	n ₁	IIb	Miles	1 年 10 カ月死亡
13	S.H.	26	♀	adeno. ca. pap.	pm	n ₀	IIa	Pull-through	5 年 10 カ月生存
14	T.G.	24	♂	adeno. ca. tub.	pm	n ₀	IIa	Miles	5 年 1 カ月生存
15	S.S.	29	♂	adeno. ca. pap.	pm	n ₀	IIa	Welch	4 年 10 カ月生存
16	N.Y.	29	♂	adeno. ca. pap.	S ₁	n ₂	III	Anterior resect.	3 年 8 カ月生存
17	Y.K.	25	♂	adeno. ca. pap.	S ₂	n ₃	IV	Miles	8 カ月死亡

症例との間に、各 stage に占めるパーセントでとくに著名な差はなかったが、やや若年者例に stage I の占める割合が高かった。

V. 治 療

姑息手術として、人工肛門造設術のみを施行した症例は1例である。16例に対し癌腫切除術を行なったが、治癒切除ができたのは12例で、治癒切除率は70.6%である。

術式では、表10の如く自然肛門温存術式が5例、他はすべて人工肛門術式である。

30歳以上の症例では、人工肛門造設術のみに終わったものの56例、試験開腹3例で癌腫切除は203例に対して行なったが、このうち治癒切除のできたものは180例で、治癒切除率68.7%である。

治癒切除率では、わずかだが若年者例に高い結果を得た。

VI. 術後遠隔成績

表10に示した如く、早期癌の症例で3年9カ月後に他疾患で死亡した1例を除き、8例が現在までに癌で死亡

している。他の8例はいずれも健在で、術後3年8カ月から17年を経過している。これを各 stage 別にみると、リンパ節転移のない I, IIa では、他疾患死を除き全例(6例)健在で、うち5例は5年以上経過している。リンパ節転移のある IIb では、1例が骨髄転移で死亡し、1例は7年11カ月を経ており健在である。IIIでは、1例が3年8カ月を経過し健在だが、2例は1年6カ月以内に死亡した。IVは5例で、全例が1年6カ月以内に死亡した。

これを生存率でみると、表11の如く stage IV の1例を除き、全例が3年以上経過しており、I, IIa では、3年生存率、5年生存率ともに100%、IIb では、ともに50%、IIIでは、3年生存率33.3%、5年生存率0%、IVでは、ともに0%である。

30歳以上の症例では、5年生存率、I 100% IIa 88.1%、IIb 41.2%、III 24.0% IV 0%で、stage III で多少若年者例に予後の悪いことがわかった。

次に、遠隔成績について、本邦はもとより欧米でも余り報告されてない colloid carcinoma について検討した。若年者例に2例あり、stage III で、miles 手術を行なったが、1例は6カ月後、1例は1年6カ月後に死

表 11 直腸癌の3年生存率・5年生存率 ()内%

Stage	29 歳 以 下		30 歳 以 上	
	3 年 生 存 率	5 年 生 存 率	3 年 生 存 率	5 年 生 存 率
I	2/2(100.0)	1/1(100.0)	9/9(100.0)	6/6(100.0)
IIa	5/5(100.0)	4/4(100.0)	54/56(96.4)	37/42(88.1)
IIb	1/2(50.0)	1/2(50.0)	15/23(65.2)	7/17(41.2)
III	1/3(33.3)	0/2(0)	13/33(39.4)	6/25(24.0)
IV	0/4(0)	0/4(0)	0/65(0)	0/41(0)

表 12 直腸癌 Colloid carcinoma 症例

No.	氏 名	年齢	性	主 訴	病期	Stage	治 療	予 後	開腹時・死亡時所見
1	*M.K.	27	♂	下 血	2 月	III	Miles	1 年 6 月死亡	n2 S2
2	*M.T.	22	♂	下 血	4 月	III	Miles	6 月死亡	肺 転 移
3	S.S.	67	♂	腹 痛	2 月	IV	Exploratory Laparotomy	3 月死亡	癌性腹膜炎、肝転移
4	O.K.	87	♀	下 血	1 年	IV	Colostomy	1 年 5 月死亡	肺転移、腹膜播腫
5	H.T.	79	♀	肛門痛	3 月	IV	Colostomy	3 月死亡	肺 転 移、n4
6	F.S.	48	♂	下 血	3 月	III	Miles	1 年 死 亡	
7	O.H.	65	♂	下 血	6 月	IV	Miles	7 月死亡	肺 転 移
8	Y.K.	64	♀	肛門痛	6 月	III	Miles	1 年 2 月死亡	肝転移、癌性腹膜炎
9	M.S.	31	♀	下 血	3 月	IIa	Pull-through	不 明	
10	W.Y.	56	♂	便 秘	3 月	IIb	Pull-through	4 年 死 亡	肝転移、癌性腹膜炎
11	S.Y.	47	♂	肛門痛	6 月	III	Anterior Resection	6 月死亡	n2

* 若年者症例

亡した。

30歳以上の症例では9例あり、stage は、IIa 1例、IIb 1例、III 3例、IV 4例で、その遠隔成績では、消息不明の1例を除き、全例死亡しており、IIb の4年死亡を除いては、いずれも1年5ヶ月以内に死亡した(表12)。

VII. 考 察

29歳以下の直腸癌症例を若年者癌として、臨床的および病理学的に検討した。外科的治療を行なった若年者例は17例で、19歳以下の症例はない。同期間に扱った30歳以上の直腸癌症例は262例あり、若年者例の占める割合は6.1%である。本邦での報告例の集計平均は6.0%で、これと頻度は一致する(表13)。直腸癌が多い欧米の報告では、Bacon⁴⁾の2160例の大腸癌例で、30歳以上の発生頻度は2.1%、20歳以下は0.41%であり、Miller⁵⁾の3805例では、29歳以下は0.86%、Glenn⁶⁾の0.77%と非常に低く、本邦では若年者直腸癌の発生頻度は、欧米に比べかなり高いことがわかった。

表 13 若年者直腸癌の発生頻度<本邦例>

報告者(年度)	10 代	20 代	全症例数
鈴 木(1932)	2例	11例	169例
唐 津(〃)	1	7	70
藤 浪(1935)	0	4	58
後 藤(〃)	2	15	165
永 堀(1939)	2	10	160
住 田(1940)	1	4	59
土 肥(1941)	0	6	155
西 川(〃)	2	8	182
山 口(〃)	3	2	75
青 柳(1951)	2	18	352
津 田(〃)	0	6	212
薬師寺(1953)	0	3	27
斉 藤(1955)	0	10	300
中川原(1972)	0	4	72
小野田(1975)	0	17	279
計	15	125	2335

男女比では、2.4:1と男性に多い傾向があるが、これは Mayo⁸⁾の1.33:1、Millerの2.1:1.2など、諸家の報告をみても若年者例では、男性に多い傾向がみられる²⁾⁶⁾⁷⁾⁹⁾。

主症状では、程度の差はあれ出血が14例(82.3%)で、30歳以上の症例に比べても高率に発生しており、また癌腫占居部位では、直腸肛門部3例(17.7%)、直腸膨大部11例(64.6%)、直腸骨盤部3例(17.7%)と肛門輪より

8.0cm 以下に集中傾向があり、これは30歳以上の症例でも同様であったし、間島らの326例の報告でも、肛門部12.6%、膨大部61.7%、骨盤部25.8%と膨大部以下に集中していた¹⁰⁾¹¹⁾。著者らは、膨大部以下の14例全例を直腸内指診で癌腫を触知しており、たとえ若年者でも、下血のある場合には直腸癌にたいする注意を怠ってはならない。

組織学的には、adenocarcinoma papillare が最も多く認められた。同じ腺癌でも細胞異型については、Miller⁵⁾、Rosato¹²⁾、陣内¹³⁾らは若年者大腸癌では、未分化な、そして浸潤性の強いものが多いと報告しているが、著者らの症例では、比較的悪性度の低い分化度の高い腺癌が多かった。

しかし、adenocarcinoma のうち粘液造成型では、粘液結節型 muconodulare を示すものが多いが、粘液細胞型 mucocellulare を示す colloid carcinoma は少ないといわれているが、著者らの症例では、この colloid carcinoma が2例あり、若年者例での発生率は13.3%で、30歳以上の症例では3.7%であった。colloid carcinoma の発生率については、Morson¹⁴⁾によると大腸癌の約2%であり、Rankin, & Chumley は、若年者大腸癌の4.9%に発生したと報告しているが、著者らの若年者直腸癌では、30歳以上の症例に比べかなり高率に発生することがわかった。また、この組織型を示すものは進展が早く、予後が非常に悪いということも判明した。この組織型を示す症例が増加すれば当然全体として若年者直腸癌の予後が悪いという結果がでてくるのではなかろうか。

癌腫の大きさと深達度の関係について検討したが、若年者例では、5.1cm 以上が75%、30歳以上の症例では、51.6%で若年者例により大きくなる傾向のあることがわかった。

しかし、深達度では、腸壁外およびその周囲臓器に浸潤するもの(A or Si-a)が52.9%、30歳以上では47.7%で、とくに差は認められず、また2.0cm 以下の微小癌6例、早期癌13例についても検討したが、とくに大きさと深達度の関連性はないことがわかった。

リンパ節転移は、若年者例の53.0%に認めた。また30歳以上の症例では54.4%で、とくにリンパ節転移陽性率での差はなかった。一般に大腸癌のうちでも直腸癌のリンパ節転移陽性率は高いことが知られており、山田¹⁵⁾49.9%、Thomas¹⁶⁾830例中48.7%等の報告があり、また、30歳以下での報告としては、大腸癌全体について Mayo⁸⁾54例中64.8%、陣内¹³⁾26例中73.1%など若年者例ではリンパ節転移陽性率の高い報告が多く、著者らの症例とは一致しなかった。

血行転移、腹膜播腫については、30歳以上の症例との間に差はなかった。このように、リンパ節転移、血行転移、腹膜播腫の陽性率からみても、若年者直腸癌の進展がとくに早いものとは考えにくい。しかし、colloid carcinoma 11例についてみると、表12に示した如く開腹時および剖検時に血行転移、とくに肺転移が他の組織型に比べて高率に発生しており¹⁷⁾、しかも、この組織型が若年者例に高率に発生することを考慮すれば、けして進展性が早いものではないと断言することは出来ない。

併存病変としては、とくに satellite polyp が多く、しかも若年者例に多く発生することがわかった。Floyd¹⁸⁾は、1687例の大腸癌のうちの約12%に adenomatous polyp を併存していたと述べ、Glenn⁶⁾は、1026例中17.5%に併存した polyp を認め、しばしば悪性変化すると警告している。著者らの併存 polyp でも、21例中3例に malignant change が起っており、これら polyp の取り扱いには、慎重を期すべきであると考えられる。

治癒切除率では、若年者例 70.6%、30歳以上の症例 68.7%で、これまでの報告にみられるように、若年者例では、悪性度が高く、進展が急速で治癒切除率も低いという意見とは一致しなかった⁵⁾¹³⁾¹⁹⁾²⁰⁾。

各 stage 別術後遠隔成績からも、若年者直腸癌の予後は、悪いものではないが、30歳以上の症例も含めて、リンパ節転移のあるものでは、非常に予後が悪い結果となっており、Dwight²¹⁾は、大腸癌でリンパ節転移が1ヶあれば、5年生存率は37%に、2ヶ以上あれば26%に低下すると報告しているように、著者らも、リンパ節転移を最も重視するべきである²²⁾。また、若年者例では、できれば、自然肛門温存術式をとも考えることも多いと思うが、癌腫占居部位として直腸膨大部以下に発生することが多く、側方リンパ節郭清を充分に行う必要があり、術式の選択には慎重を期すべきである。

VIII おわりに

1952年より1973年までの22年間に経験した 279例の直腸癌のうち、29歳以下の若年者症例は17例である。組織学的には、比較的悪性度の低い高分化性の腺癌が多くを占め、深達度、リンパ節転移、血行転移、腹膜播腫についても、とくに進展が早いということはなかった。また、治癒切除率においても、術後遠隔成績でも、30歳以上の症例に比べ、とくに差は認められなかった。

しかし、colloid carcinoma が、若年者例に多く発生し、しかも、この組織型は進行が早く、血行転移率が高く、予後が非常に不良であるということは、注目すべき事実である。

以上、若年者直腸癌症例に、30歳以上の症例を比較検討し、若干の文献的考察を加えた。

本論文の要旨は、第3回日本消化器外科学会大会で発表した。

稿を終るにあたり、御校閲をいただいた東邦大学第1外科、亀谷寿彦教授に深甚なる謝意をささげます。

文 献

- 1) 小林一雄ほか：選択的下腸間膜動脈撮影法の臨床的検討，大腸肛門誌，27：200，1974。
- 2) 山田 肅：大腸早期癌，癌の臨床，16：1151，1970。
- 3) 粕川剛義：大腸早期癌の臨床研究および大腸癌の病期分類についての考察，大腸肛門誌，26：371，1973。
- 4) Bacon, H. E.: Cancer of the colon, Rectum and Anal canal, 206, J. B. Lippincott Co., Philadelphia, 1964.
- 5) Miller, F. E. & Liechty R. D.: Adenocarcinoma of the Colon and Rectum in Persons under Thirty Years of Age, Am. J. Surg., 113：507，1967。
- 6) Glenn, F. & McSherry, C. K.: Carcinoma of the Distal Large Bowel.: 32-year review of 1026 cases, Am. J. Surg., 163：838，1966。
- 7) 中川原儀三ほか：若年者直腸癌について，外科，35：1243，1973。
- 8) Mayo, C. W. & Pagtalunan, R. J. G.: Malignancy of colon and rectum in patients under 30 years of age, Surgery, 53, 711, 1963。
- 9) Gazzaniga, A. B. et al.: Adenocarcinoma of the Colon and Rectum, Am. J. Surg., 120：62，1970。
- 10) 間島 進ほか：直腸癌 326 例の臨床的ならびに病理学的観察，癌の臨床，13：1088，1968。
- 11) 白鳥常男ほか：直腸癌，外科診療，17：265，1975。
- 12) Rosato, F. E. et al.: Carcinoma of the colon in young people, Surg. Gynec. Obst., 129：29，1969。
- 13) 陣内伝之助ほか：若年者大腸癌，外科治療，23：121，1970。
- 14) Morson, B. C. & Dawson, M. P.: Malignant epithelial tumors, Gastrointestinal pathology, 551, Blackwell, Melbourne, 1972。
- 15) 山田 肅：結腸直腸癌，臨床と研究，48：80，1972。
- 16) Thomas, W. H. et al.: Analysis of 830 patients with rectal adenocarcinoma, Surg. Gynec. Obst., 129：10，1969。
- 17) Hindo, W. A. et al.: Patterns of Recurrent and Metastatic Carcinoma of The Colon and Rectum Treated with Radiation, Dis. Col. & Rect., 15：436，1972。
- 18) Floyd, C. E. et al.: Cancer of the colon, rectum and Anus: Review of 1687 cases,

- Ann. Surg., 163 : 829, 1966.
- 19) Maingt, R.: Tumors of the rectosigmoid, rectum and anal canal, Abdominal operations, 2 : 2029, Appleton-century Co., New-York, 1974.
- 20) Recio, P. & Bussey, H. Jr.: The pathology and prognosis of carcinoma of the rectum in the young, Surg. Gynec. Obst. 129 : 789, 1969.
- 21) Dwight, R. W. et al.: Factors influencing survival after resection in cancer of the colon and rectum, Am. J. Surg., 117 : 512, 1969.
- 22) 小野田肇ほか: 直腸癌の治療方針と化学療法および放射線療法の検討, 大腸肛門誌, 28 : 56, 1975.

3. Fundamental Study on the Diminutive Polyps of the Colon by Mucosal Stain and Dissecting Microscope

T. Kosaka

Institute of Gastroenterology Tokyo Women's Medical College, Tokyo

On this study, "Diminutive Polyp" means any raised or protruded mucosa (5 mm or less in its diameter). Such a lesion is impossible to make the differential diagnosis from its gross appearance.

The dissected colon specimens fixed with formalin were stained with Carazzi-hematoxylin and these 277 diminutive polyps were studied dissecting microscopically. Moreover they could be classified as four types. The pit of normal mucosa usually shows circular, similar and regular. Four types are as follows.

- (1) Circular Type····Pit shows circular and enlargement of the normal mucosa.
- (2) Papillary Type····Pit looks like star. Owing to papillary infoldings, pit becomes small or narrow.
- (3) Tubular Type····Various pit can be found from circular to oval and irregular.
- (4) Sulcus Type····Pit can not seen, but sulcus formation (cerebral gyrous like) can be found.

Histologically, the circular type was only elongation and enlargement with normal Lieber-Kühn crypt, papillary type was typical hyperplastic polyp, tubular type was tubular adenomatous polyp and sulcus type was papillary adenomatous polyp.

4. Carcinoma of the Rectum in Young Generation

H. Onoda, Y. Katoh, K. Kobayashi, T. Kasukawa and T. Yoshio

First Department of Surgery, School of Medicine Toho University, Tokyo

Case-records from surgical files of the Toho University Hospital of 279 patients with carcinoma of the rectum who were seen in a 22-year-period, 1952 through 1973, were reviewed.

Seventeen patients with carcinoma of the rectum were twenty nine years old age or younger. Carcinoma of the rectum in persons under the first three decades of life is rare, occurring only 6.1 percent of all patients with carcinoma of the rectum. There were twelve male and five female patients: a sex ratio of 2.4:1 with males predominating.

Clinical histories were analyzed with careful attention to symptoms. Operative procedures and pathologic details of the lesions in 17 patients and their inquiries were studied concerning the survival of patients following surgical treatments.

The incidence of colloid carcinoma to be 13.3 percent in young patients was found.

Patients with colloid carcinoma had much poorer prognosis. Metastasis of the lymph nodes was certainly the most accurate prognostic factor.

5. Experience of Cryosurgery for Anorectal Carcinoma

Y. Yamamoto, Y. Andō, S. Endō, T. Isomoto, K. Sano and Y. Kinugasa

Department of Surgery, Kawasaki Medical College, Okayama

(Directed by Prof. Kaisō Sano)

During one year period between June 1974 and May 1975, seven cases with anorectal carcinoma, which mainly claimed anal bleeding and pain, were treated by cryosurgical technique. Six of them were so advanced and or unfavorable bad conditions for operation, and remaining one was a malignant polyp.

In the case of cryosurgery on gastrointestinal tract like rectum, we have to rely on our own eyes in principle in order to eliminate the danger of perforation. Therefore, cryotherapy is limited to the lesions situated within the wall around 10 cm. above the anal ring. There are, however, following advantages that it can be performed under local anesthesia and in less than one hour, and therefore it may work for the patient with complications.

From the experience of cryosurgery for anorectal carcinomas, we will report and discuss the further problems.

6. The Double Blind Studies of Bromelain for the Patients following Surgical or Cryosurgical Hemorrhoidectomy

T. Yoshio, K. Yanagita and R. Nishitani

First Department of Surgery, Toho University School of Medicine, Tokyo

Y. Matsushima and A. Kinugasa

Matsushima Hospital, Yokohama, Kanagawa

Y. Hirata

Hirata Proctological Clinic, Tokyo

T. Utsunomia

Department of Surgery, Ohkura National Hospital, Tokyo

T. Sakabe and K. Kato

Third Department of Surgery, Nihon University School of Medicine, Tokyo

The double blind studies of bromelain for 161 patients following surgical or cryosurgical